

600 CATAPLASMATA.

EMBROCATIO DISCUTIENS.

℞. Herbarum aromaticarum libras sex.

Coque cum Aquæ quantum satis, vase clauso, per quadrantem horæ; et in colaturæ librarum viginti quatuor dissolve

Muriatis (vel Acetatis) ammoniacæ uncias quatuor.

Alcoholis Juniperi libras duas.

Usus: Physconia viscerum abdominalium, præcipue hepatis, lienis, ovariorum; paralysis; tumores articularum; arthrodynia rheumatica aut podagrica; anchylosis; contractura.

EMBROCATIO STIMULANS.

℞. Linimenti stimulantis unciam unam—
duas.

Aquæ libram unam. Miscæ.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA ACETATUM.

℞. Farinæ cujuscunque (vel Micæ Panis) quantum opus.

CATAPLASMATA. 601

Aceti quantum satis, ut fiat cataplasma
sæpius de die frigide applicandum.

Usus : Tumores vel ecchymoma ex con-
tusura, distorsione aut luxatione.

CATAPLASMA EX ALLIO.

℞. Radicis Allium-Cepæ quantum placet.
Coque in Aquæ quantum satis donec
mollescant radices.

Usus ad suppurationem promovendam.

CATAPLASMA EX AQUA MARINA.

℞. Muriatis sodæ,
—— calcis, ana unciam semis.
Aquæ libram semis.
Misce, ut fiat solutio, cui adde
Farinæ cujuscunque quantum satis.
Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores glandularum et articulorum
scrophulosi.

CATAPLASMA COMMUNE.

℞. Micæ Panis veteris quantum opus.

Coque cum Aquæ (vel Lactis aut decocti
Althææ) quantum satis.

Adde sub finem coctionis

Farinæ seminis Lini pauxillum.

Ut fiat catasplasma.

USUS : Tumores inflammatorii.

Vel :

℞. Farinæ cujuscunque,

Mellis, ana partes æquales. Misc.

USUS : Furunculus aliive tumores inflam-
matorii, ubi intentio est suppurationem
promovere.

CATAPLASMA E CONIO.

℞. Herbæ Conii maculati pulv. quantum opus.

Coque cum Aquæ quantum satis, ad con-
sistentiam catasplasmatis.

NB. Ubi tempus anni permittit, herba
recens contusa in formam catasplasmatis præ-
ferri meretur.

USUS : Scirrhus; ulcera carcinomatosa, scro-
phulosa, aliave, cum magna irritabilitate
conjuncta.

CATAPLASMA E DAUCO.

℞. Radicis Daucus-Carotæ recentis rasæ
quantum opus.

Vel ;

℞. Radicum Daucus-Carotæ quantum opus.
Coque in Aquæ quantum satis, donec
mollescant.

Usus parti nudæ applicando : Ulcera pu-
trida, carcinomatosa ; herpes ; psoriasis
scroti et genitalium.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

℞. Florum Anthemis nobilis (vel herbæ
Artemisia - Absinthii, aut herbæ
Gentiana - Centaurei),

Radice Bryoniæ albæ recentis, ana
unciam unam.

Foliorum Malvæ rotundifoliæ (vel Ra-
dicis Althææ officinalis) unciam
semis.

Concisa et contusa coque in Aquæ libris
quatuor, ad colaturam librarum trium, quæ
pro fotu ter de die applicando inserviat.

Herbis a Colatura remanentibus adde
Olei Olivarum (vel Axungiae porcinae)
unciam unam.

Ut fiat cataplasma parti affectae applican-
dum.

USUS: Angina inflammatoria (G. FORDYCE).

Vel:

℞. Radicis Bryoniae albæ uncias tres.

Florum Sambuci nigræ unciam unam.

Concisa et contusa coque in aquæ libra
una per mediam horam; dein effunde aquam
et adde herbis expressis.

Gummi-resinæ Ammon, aceto quantum
satis solutæ, unciam semis.

Muriatis ammoniacæ drachmas duas.

Alcoholis camphorati unciam unam.

Ut fiat cataplasma.

Vel:

℞. Fæcum vini recentium quantum placet.

Coque ad consistentiam cataplasmaticis.

USUS: Tumores articulorum; contusura;
luxatio.

CATAPLASMATA. 605

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞. Seminis Lini usitatissimi quantum placet.
Aquæ quantum satis.

Coque per mediam horam, addendo sub
finem coctionis

Micæ panis veteris quantum satis.

Ut fiat cataplasma.

Vel :

℞. Farinæ Seminis Lini quantum placet.
Aquæ fervidæ (vel decocti Althææ)
quantum satis.

Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores phlegmonoidei.

CATAPLASMA EPISPASTICUM.

℞. Farinæ Avenæ (vel Tricici),
—— Seminis Sinapis nigræ, ana un-
cias duas.

Aceti quantum satis.

Ut fiat cataplasma, in duas portiones di-
videndum, quæ plantis pedum applicentur.

Quandoque additur :

Radici Cochlearia - Armoraciæ rasæ
uncia semis.

606 CATAPLASMATA.

Usus : Morbi nati ex sudore consueto locali suppresso, aut exanthematibus chronicis vel acutis retropulsis.

CATAPLASMA E POMO.

Pomum assatum (vel aqua ad mollitiem coctum) per cribrum aut linteum trajicitur, ut partes duræ separentur.

Usus : Ophthalmia, nudo oculo applicando.

CATAPLASMA SEDATIVUM.

Fit addendo cataplasmati communi vel emollienti :

Solutionis opii unciam unam alteramve.

Vel :

Addendo cataplasmati communi :

Acetatis plumbi liquidi drachmam unam alteramve.

Usus : Ulcera aut tumores valde dolentes.