

PHARMACOPŒIÆ

CHIRURGICAE,

SECTIO PRIMA,

SISTENS

MEDICAMENTA PRÆPARATA.

ACIDA.

ACIDUM ACETICUM concentratum et dilutum.

Usus concentrati : Hæmorrhœa gingivarum aut faucium scorbuticorum; hæmorrhagia alveoli post dentem evulsum. — *Forma vaporis* : Ad aërem noxiū et effluvia putrida et contagiosa corrigenda. — *Naribus adplicando* : Ad refocillandos ægros sub operationibus chirurgicis. — *Diluti* :

Ad gargarismata, lotiones, injectiones, enemata et fatus varios.

ACIDUM CITRICUM.

Usus : Gingivarum laxitas; ulcera oris et faucium putrida, scorbutica, etc.

ACIDUM MURIATICUM.

Usus eximus *forma vaporis*: Ad corrigenda et destruenda effluvia morbosa putrida et contagiosa varia (GUYTON-MORVEAU). (Vide *Liquor Alexiterius*). *Penicillo applicando*: Ulcera scorbutica; aphthæ; verruca aut callositas cutis. — *Aqua multa diluti forma injectionis*: Stranguria habitualis. — *Forma pediluvii*: Podagra atonica, retrocedens, aberrans.

ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

VIRTUS: Antiseptica; miasmata morbosa nosocomiorum et venena narcotica, ac plura venena animalia efficaciter destruens.

Usus: Ulcera cutis vel faicum putrida; vulnus recens ex morsura canis rabidi. — *Forma vaporis*: Ad corrigendum aërem et effluvia morbosa varia nosocomiorum, etc. (Vide *Liquor Alexiterius*).

ACIDUM NITRICUM.

VIRTUS: Caustica. — *Diluti*: Antiseptica.

Usus: Verruca. — Item pro parandis præ-

paratis variis. — *Forma vaporis*: Ad corrigenda et destruenda effluvia nosocomiorum morbosa, putrida.

ACIDUM PHOSPHORICUM.

Usus *forma lotionis aut fatus*: Arthrodynia podagrifica.

ACIDUM SULFURICUM.

VIRTUS *diluti*: Styptica.

ACIDUM TARTAROSUM.

Usus idem fere ac acidi citrici.

ALCALIA ET SALES SALINI.

AMMONIACA.

VIRTUS : Caustica, corrosiva.

Usus naribus adPLICando : Asphyxia ;
Syncope. — *Forma lotionis, linimenti, etc.*

Vulnus ex morsura canis rabidi, viperæ,
ex punctura vesparum, apium, etc. ;
erythema ex ambustura recenti ; tophi ;
tumores cystici.

(Vide *Linimentum ammoniacale, embrocatione*).

ACETAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus *scopo resolvendi*: Tumores frigidi;
orchiocle; ophthalmia.

CARBONAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus idem ac ammoniacæ.—*Aqua diluti*:
Tumores lactei; tumores et ulcera scro-
phulosorum et rhachiticorum.

MURIAS AMMONIACÆ.

Usus *forma fatus aut lotionis frigidæ scopo
resolvendi*: Vulnera, tumores, et dolores
ex contusura, distorsione, luxatione; ec-
chymoma; orchiocle.

SUCCINAS AMMONIACÆ.

Gallis *Eau de Luce*.

Usus *naribus adplicando*: Syncope.

POTASSA.

VIRTUS: Caustica.

Usus: Lixivii saponariorum ambustura
mox initio; vulnus ex morsura canis
rabidi.—*Forma balnei*: Tumores et ulcera
scrophulosorum et rhachiticorum. *Forma
linimenti*: Tumores varii ex lympha
coagulata.

POTASSA FUSA.

Usus : Caro fungosa; excrescentiae; paralysis extremitatum inferiorum (POTT).

CARBONAS POTASSÆ.

VIRTUS idem fere ac potassæ sed mitior.

MURIAS POTASSÆ OXYGENATUS.

Usus : Psora; herpes; ulcera syphilitica?

NITRAS POTASSÆ.

Usus forma gargarismatis, aut enematis, etc.

Scopo refrigerandi.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

Usus *cum melle*: Ulcera oris, etc. putrida.

— Scopo dentifricio ad mundundos dentes.

S O D A.

Usus idem ac potassæ.

BORAX seu BORAS SODÆ ALCALESCENS.

Usus : Aphthæ.

CARBONAS SODÆ.

Usus idem ac carbonatis potassæ.

MURIAS SODÆ.

Usus forma fotus : Scopo discutiendi
decipitati in sacculis scopo resolvendi :
 Tumores rheumatici ; odontalgia ; otalgia
 et tonsillitis rheumatica. — *Item forma*
fotus, balnei : Tumores scrophulosorum
 et rhachiticorum ; contusura ; distorsio. —
Forma injectionis : Cerumen induratum.
 — *Forma balnei* : Morbi cutis aliive ubi
 balnea maris convenientiunt.

NITRAS SODÆ.

Usus idem ac nitratis potassæ.

TERRÆ ET SALES TERREI.

C A L X.

VIRTUS : Caustica.

Usus : Nævi et excrescentiæ. — Item ad
 parandam *Aquam Calcis* dictam.

CARBONAS CALCIS.

Lapides cancerorum, testæ ovorum, conchæ
 ostrearum, aut corallia rubra aqua probe

abluta, dein siccata in pulverem tenuissimum redigantur, qui per linteum trajiciatur.

VIRTUS : Antacida.

USUS scopo exsicandi : Ulcera. — Item ad pulveres dentifricios.

MURIAS CALCIS.

USUS aqua diluti : Ulcera phagedænica; tumores aliave vitia scrophulosorum. — Item ad parandam Aquam marinam artificialem.

PHOSPHAS CALCIS USTUS.

Frusta cornu cervi aut ossa animalium ad albedinem calcinata in pulverem tenuissimum redigantur.

USUS inspergendo : Hæmorrhagiæ; ulcera laxa, humida.

ALUMINA.

SYN. Terræ bolares.

VIRTUS : Exsiccans.

ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ ACIDUS cum POTASSA vel AMMONIACA.

VIRTUS : Styptico-adstringens.

516 METALLA, OXYDA,

Usus *forma lotionis, injectionis, etc.* Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ; gingivarum laxitas; Pernio.

ALUMEN FUSUM seu USTUM.

VIRTUS: Corrosivo-Styptica.

USUS: Caro luxurians; excrescentiæ; ulcera putrida.

METALLA EORUMQUE OXYDA,
ET SALES METALLICI.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

SYN. *Causticum Lunare; lapis infernalis.*

VIRTUS: Caustica.

USUS *per se*: Caro luxurians; ulcera callosa; excrescentiæ; tumores indolentes, atonici.
— *Aqua diluti forma gargarismatis vel injectionis*: Ulcera oris et faucium ex hydrargo; cynanche ulcerosa putrida; fistula; blennorrhœa.

DOSIS: Grani unius ad grana 500 aquæ.

ET SALES METALLICI. 517

PRÆPARATA ARSENICI.

OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Usus *aqua soluti*: Carcinoma; ulcera phagedænica.—*Cum oleo triti*: Morbi cutanei rebelles apud HINDOUS.

PRÆPARATA BISMUTHI.

OXYDUM BISMUTHI.

Usus: Cosmeticus.

PRÆPARATA CUPRI.

OXYDUM CUPRI VIRIDE.

VIRTUS: Corrosiva.

Usus: Ulcera atonica, callosa, cancrosa; excrescentiæ.

SULFAS CUPRI.

Usus *per se*: Ulcera callosa, fungosa; excrescentiæ. — *Aqua soluti*: Hæmorrhagia; blennorrhœa.

PRÆPARATA FERRI.

OXYDUM FERRI RUBRUM.

VIRTUS: Styptica; exsiccans.

518 METALLA, OXYDA,

MURIAS FERRI.

VIRTUS : Styptica, corrodens.

Usus pro paranda tinctura.

SULFAS FERRI.

Usus aqua soluti : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

Usus forma fatus, balnei, etc. : Distorsio; luxatio.

PRÆPARATA HYDRARGYRI.

OXYDUM HYDRARGYRI GRISEO-NIGRUM.

Usus forma unguenti : Syphilis; ulcera syphilitica; varices ani dolentes; tumores ex lympha coagulata; ophthalmia palpebrarum.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

Usus : Ulcera syphilitica; cutis vitia varia.

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

VIRTUS : Irritans, corrosiva.

Usus forma pulveris inspergendo : excrescentiæ et ulcera syphilitica. — Forma linimenti : Ophthalmia; ulcera.

MURIAS HYDRARGYRI.

Usus varia forma : Ulcera syphilitica. —

Forma frictionum superficie oris internæ :
Syphilis ; ulcera oris , faucium et narium
syphilitica. — *Oculo inflati :* Maculæ
corneæ.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

Usus : Psora , aliave cutis vitia varia.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

VIRTUS : Corrosiva , caustica ; summe ve-
nenata.

Usus aqua soluti : Syphilis ; blennorrhagia
syphilitica ; psora , aliave cutis vitia varia.

SULFAS HYDRARGYRI LUTEUS cum
excessu oxydi.

VIRTUS : Irritans ; corrosiva ; emetica.

Usus : Amaurosis. *Vide* PULVIS ERRHINUS.

PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Usus : Morbi cutis ; tinea ; herpes ?

520 METALLA, OXYDA,
PRÆPARATA PLUMBI.

OXYDUM PLUMBI ALBUM,
PLUMBI SEMIVITREUM,
PLUMBI RUBRUM.

VIRTUS : Venenata ; sedativa ; adstringens ;
exsiccans.

ACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

VIRTUS eadem ac priorum.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

SYN. Extractum Saturni ; acetum lithargyrii.

Usus varia forma : Hæmorrhagia ; hæ-
morrhœa ; blennorrhœa ; phlegmone ;
erythema ; cutis vitia varia ; cnesmus
localis ; varix ani ; ophthalmia ; ecchy-
moma ; arthrodynia rheumatica.

PRÆPARATA STIBII s. ANTIMONII.

MURIAS STIBII OXYGENATUS.

SYN. Butyrum antimonii.

VIRTUS : Caustica , corrosiva , venenata.

Usus : Excrescentiae ; ulcera callosa ; tumores
indolentes ; caries ; staphyloma.

ET SALES METALLICI. 521

TARTRIS STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Tartarus emeticus s. antimonialis.*

USUS : Ulcera rebellia.

PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.

USUS : Herpes ; ophthalmia palpebrarum ;
fissura papillarum ; ulcera.

SULFAS ZINCI.

USUS *forma varia* : Blennorrhœa ; ophthalmia ; cutis vitia varia ; ulcera ; varix ani.

SULFURETA.

SULFURETUM CALCIS,

POTASSÆ aut SODÆ.

USUS *internus* : Ptyalismus aliave morbi
ex hydrargyro. *Externus forma lotionis,*
balnei, etc. : Morbi cutis varii.

SULFURETUM HYDRARGYRI RUBRUM.

USUS *forma fumigationis* : Ulcera ; excrescentiæ , aliave vitia syphilitica rebellia.

OLEA ET OLEOSA.

OLEA VOLATILIA,

VIRTUS *in genere* : Stimulans , resolvens.

OLEUM VOLATILE BENZOES.

Usus idem sere ac olei camphoræ.

OLEUM VOLATILE CAMPHORÆ.

Usus : Arthrodynia rheumatica et podagrīca ;
Myodynīa.

OLEUM CAMPHORÆ NITRICATUM.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Excrescentiæ aut ulcera callosa ,
fungosa ; myodynīa aut arthrodynia rheu-
matica inveterata , rebellis ; paralysis.

OLEUM FLORUM CARYOPHILLI
AROMATICI.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Odontalgia a carie dentis ; paralysis
linguae.

OLEUM FLORUM LAVANDULA-SPICÆ.

Usus : Ganglion ; tumores frigidi.

OLEUM FOLIORUM MELALEUCA-
LEUCADENDRI.

Usus idem ac olei camphoræ.

OLEUM HERBÆ THYMUS-SERPILLI.

Usus idem ac olei lavandulæ.

OLEUM THEREBINTHINÆ PINUS-LARICIS.

Usus: Ulcera putrida et verminosa; dolores rheumatici; pernio; tumores atonici.

NB. Leniter calefactum est stypticum egregium arteriæ vulneratæ adPLICANDO.

OLEUM RADICIS VALERIANÆ CELTICÆ.

Usus præcipiuus pro frictionibus post balnea vaporis.

OLEA FIXA.

VIRGUS in genere: Emolliens; involvens;
relaxans.

OLEUM AMYGDALARUM.

CACAO BUTYRACEUM.

OLEUM CERÆ.

¶. Ceræ flavæ quantum placet.

Arenæ puræ pondus duplum.

Liquefacta simul ex retorta destilla.
 Post liquorem acidum (qui seorsim ser-
 vetur) transit oleum crassum collo retortæ
 adhærens , quod leni calore admoto fusum
 cum nova quantitate arenæ semel ac iterum
 destilletur.

VIRTUS : Summe emolliens.

Usus : Fissura papillarum aut cutis ; ery-
 thema ex gelu aut igne ; contractura.

OLEUM SEMINIS HYOSCIAMI NIGRI.

VIRTUS : Sedativo-emolliens.

Usus idem ac sequentis.

OLEUM SEMINIS LINI USITATISSIMI.

Usus : Ulcera rebellia præcipue **NOLI ME
 TANGERE** dictum. — Item ad frictiones ,
 enemata , etc.

OLEUM OLIVARUM.

PALMÆ.

OLEUM SEMINIS RICINI.

VIRTUS : Leniter cathartica.

OLEA partim VOLATILIA partim FIXA.

OLEUM FLORUM MATRICARIA - CHAMOMILLÆ COCTUM.

Usus : Spasmi ; colica flatulenta aut spasmodica (ventri adfricando) ; dysuria ; varices ani dolentes.

**OLEUM BACCARUM LAURI NOBILIS
EXPRESSUM.**

Usus idem fere ac olei chamomillæ cocti.

**OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ
EXPRESSUM.**

Usus : Cephalæa aliive dolores nervosi.

OLEA EMPYREUMATICA.

VIRTUS in genere : Stimulans ; resolvens.

OLEUM ANIMALE.

Usus : Debilitas localis ; paralysis ; tumores frigidi.

OLEUM PETROLEI.

Usus : Tumores atonici ; ecclymoma ; distorsio.

OLEUM PYRO-TARTAROSUM.

SYN. *Oleum Tartari fætidum.*

N. Tartari vulgo venalis quantum opus,
Ut retorta terrea ad duas tertias eo
repleatur.

Recipiente amplio adaptato leni igne des-
tilla, donec nubeculæ albae prodire incipient.
Tunc mutato excipulo et juncturis luto probe
munitis summo ignis gradu urgeatur destil-
latio. Oleum cum acido junctum sic in exci-
pulo obtentum ab eodem, ope vitri sepa-
torii, separetur et seorsim denuo cum aqua
destilletur.

Usus : Tumores atonici; glandulæ tumidæ
et induratæ; topi; ligamentorum et ten-
dinum contractura.

OLEA ANIMALIUM FIXA CONCRETA.

VIRTUS eadem ac oleorum fixorum.

ADEPS SUILLA s. AXUNGIA PORCINA.
BUTYRUM.

SEVUM OVILLUM.

ADIPO-CERA PHYSETERUM,

Vulgo *Spermaceti.*

Usus pro emplastris et unguentis.

CERA FLAVA ET ALBA.

Usus idem ac priorum. — Item *firma enematis*: Dysentéria; fluxus hæmorrhoidum immodicus.

S A P O N E S.

VIRTUS in genere: Stimulans, resolvens.

SAPO AMMONIACALIS.

Vide *Liniuentum ammoniacæ*.

SAPO COMMUNIS.

SAPO TEREBINTHINATUS.

SYN. *Sapo Starkeyanus*.

¶. Potassæ uncias decem.

Olei volatilis Terebinthinae Pinus-Laricis
uncias octo.

Calefacta simul terantur.

VIRTUS: Leniter stimulans; resolvens.

Usus: Dolores rheumatici; tumores frigidi.

ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

ALCOHOL.

————— CONCENTRATUM.

————— DILUTUM.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca; antiseptica;
sanguinem coagulans; antiphthiriaca.

Usus *forma fotus, lotionis, gargarismatis, injectionis, etc.* : Erysipelas faciei aliarumve partium; ulcera faucium erysipe latosa, putrida, gangrænosa, atonica; caries; gangræna; ulcera cutis putrida; halitus oris foetidus; hæmorrhagia narium; vulnera arteriarum; varices ani; hæmorrhoidum fluxus immodicus.—*Forma balnei, fotus, lotionis* : Blechropyræ; asthenia generalis aut localis.

ALCOHOL CAMPHORATUM.

N. Camphoræ uncias duas.

Alcoholis libram unam. Misce.

Usus : Arthrodynia aut myodynbia rheumatica; debilitas localis; ulcera atonica, gangrænosa; erythema ex punctura insectorum; distorsio; ecchymoma. — Item in incipiente panaritio linteo eo madido involvendo digitum.

ALCOHOL COCHLEARIÆ SIMPLEX.

COMPOSITUM.

Usus : Gingivarum laxitas et ulcera scorbutica.

ALCOHOL MELISSÆ COMPOSITUM.

— AROMATISATUM COLONIENSIMUM.

— ROSMARINI.

— SERPYLLI.

Usus: Ambustura levior; partium debilitas;
tumores frigidi; paralysis linguæ et fau-
cium; angina ulcerosa, atonica; maculæ
et pustulæ faciei; ecchymoma; distorsio;
subluxatio.

ALCOHOL ALCALISATUM.

SYN. *Tinctura Tartari.*

R. Carbonatis potassæ libram unam.

In crucibulo igne forti funde; dein ab
igne remoto et adhuc calido probe contrito
affunde

Alcoholis concentrati libras duas.

Digere per quadriduum vase probe clauso,
sæpius agitata phiala; dein cola.

Usus idem ac sequentis.

ALCOHOL AMMONIACATUM.

— AMMONIACATUM aromatisatum.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci dulcis et
aromaticus.*

Usus utriusque: Tumores frigidi; tumores

scrophulosorum et rhachiticorum; tumores lactei. — Linteo aut panno iisdem madido partem involvendo.

AETHER ET AETHEREA.

AETHER SULFURICUS.

Usus : Cephalalgia, aliive dolores rheumatici et nervosi saepe subito levantur adplicando parti affectæ linteum eo madidum, moxque palma manus superposita illud arcte premendo per aliquot minuta ita ut aëris accessus arceatur (WARD). — Guttula una alterave gossypio excepta et mox denti carioso, vel auris meatui imposita odontalgiam et otalgiam atrocissimam saepe levat. — Ambusturam mox initio adplicando curat.

AETHER ALCOHOLISATUS.

Syn. *Liquor anodynus mineralis* HOFFMANNI.

Usus idem fere ac ætheris. — *Aqua dilutum cum melle* : Vulnera.

TINCTURÆ.

TINCTURA ARNICÆ.

℞. Radicis Arnicæ montanæ uncias duas.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, sœpius agitato vase;
dein cola.

Usus internus: Dysenteria. - *Forma lotionis,*
fotus, gargarismatis: Ulcera putrida, gan-
grænosa; ulcera faucium putrida (angina
gangrænosa cum scarlatina).

TINCTURA ASSÆ FÆTIDÆ.

Usus: Ulcera putrida, atonica; caries.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami Myroxyli Peruferi unciam unam.
Alcoholis libram unam. Misce.
Digere per triduum et cola.

Usus: Ad vulnera et ulcera laxa exsiccanda
et consolidanda.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA.

Usus idem fere ac præcedentis: Ulcera

atonica. — Item ad vulnera ab accessu
aëris defendenda.

TINCTURA CATECHU.

Usus : Gingivarum laxitas ; ulcera scorbu-
tica ; hæmorrhagia.

TINCTURA CINCHONÆ.

Usus : Gangræna ; vulnera aut ulcera pu-
trida.

TINCTURA COSMETICA.

¶. Balsami concreti Styracis-Benzoin un-
cias sex.

Styracis officinalis un-
ciam unam.

Pulverisatis affunde

Alcoholis libram unam.

Digere vase clauso per quatuordecim
dies ; dein cola.

Usus præcipuus pro lotione cosmetica.

TINCTURA EUPHORBIÆ.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus cautus : Ad limites cariei ponendos ;
ulcera sordida , atonica.

TINCTURA GINGIVALIS.

R. Gummi-resinæ Myrrhæ,

— — — Mimosæ cathechu pulv.
ana unciam unam.

Balsami Myroxylī Peruiferi drachmam
unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis,

— — — Cochleariæ officinalis, ana
uncias tres.

Digere per octiduum, saepius agitato
vase; dein cola.

Usus: Laxitas et ulcera gingivarum vel
faucium scorbutica.

TINCTURÆ LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

Usus internus et externus: Arthrodynia,
aut myodynæ rheumatica; debilitas par-
tium; paralysis; enuresis juniorum habi-
tualis; enuresis ex debilitate sphincteris
vesicæ; hydarthrus.—*Forma injectionis*
Drachmæ tres—quatuor ad libram unam
aqueæ: Sinus et fistulæ ita ut suppuratio
callositatis excitetur.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

N. Oxydi ferri rubri libram unam.

Acidi muriatici concentrati quantum satis.

Ut fiat solutio saturata, saepius agitato vase, ita ut pars ferri in fundo maneat; dein cola et adde

Alcoholis pondus triplum.

Usus *forma fatus*: Scirrus mammæ; carcinoma.—Item ad verrucas aliasve excrescentias.—*Internus*: Dosi guttarum decem saepius repetendo: Dysuria ex coarctatione urethræ spasmodica. **CLINE.**

TINCTURA MYRRHÆ.

Usus: Ulcera atonica, putrida; caries.

TINCTURA ODONTALGIA, Ph. DAN.

N. Rasuræ ligni Guajaci officinalis, Corticis Laurus-Sassafras pulv. ana unicam unam.

Radicis Anthemis-Pyrethri drachmas sex,

Foliorum Nicotiana-Tabaci drachmas tre.

Herbæ Thymus-Serpylli,
— Origani vulgaris, ana drachmas
duas.

Camphoræ drachmam semis.

Opii scrupulum unum.

Concisis et contusis affunde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum, saepius agitato
vase; dein cola.

Usus: Odontalgia cariosa aut rheumatica.

(Gossypio exceptam denti carioso im-
ponendo; vel leniter calefactam simpli-
citer instar collutorii adhibendo)— Para-
lysis linguæ.

TINCTURA SEDATIVA.

R. Opii unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per octiduum, saepius agitato vase;
dein cola.

Usus: Ulcera syphilitica rebellia; herpes;
serpigo; dolores spasmodici in variis
corporis partibus; odontalgia; otalgia;
ophthalmia.

TINCTURA TURIONUM PINUS-ABIETIS.

R. Extracti Turionum Pinus-Abietis uncias duas.

Alcoholis Cochleariae officinalis uncias decem.

Misce ut fiat solutio.

Usus: Scorbatus; hæmorrhœa gingivarum, aliave vitia oris scorbutica.

TINCTURA VULNERARIA COMPOSITA.

R. Tincturæ Cinchonæ officinalis,
— Myrrhæ, ana unciam unam.

Misce.

Interdum cum successu additur,
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis uncia semis.

Digere leni calore.

Usus: Vulnera tendinum aut nervorum; vulnera aut ulceræ sordida, cariosa.

TINCTURA VULNERARIA SIMPLEX.

SYN. *Tinctura Mastiches.*

R. Resinæ Pistacia-Lentisci (vulgo *Mastiche dicti*) unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per triduum, saepius agitato vase; dein cola.

Usus: Vulnera membranarum, tendinum aut ligamentorum, sedata inflammatione; denudatio et vulnera ossium.

A C E T A.

ACETUM AROMATICUM.

Usus *præcipuus*: Pro odoratu aut lotione ad effluvia aëris putrida et contagiosa corrigenda; syncope.

ACETUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ unciam unam.

Alcoholis quantum satis.

Ut fiat solutio, cui adde terendo,
Aceti vini uncias decem.

Usus: Emphysema putridum; gangræna;
ulcera faucium putrida, atonica.

ACETUM COCHLEARIA-ARMORACIÆ.

R. Radicis Cochlearia-Armotaciæ recentis rasæ unciam unam.

Aceti vini libram unam.

Macera per octiduum ; dein cola.

Usus præcipue *cosmeticus* ad lentigines faciei ; Ulcera oris scorbutica.

A C E T U M V I N I vel **C E R E V I S I A E**.

Est acidum aceticum dilutum vulgo venale prostans.

Usus *forma lotionis* : Totius corporis ad pestem arcendam.— Item *pro odoratu, lotione, fotu, etc.* : Ad effluvia putrida et contagiosa corrigenda ; ulcera putrida ; contusura ; distorsio , cephalalgia ; syncope.

A C E T U M S C I L L I T I C U M.

Usus *forma gargarismatis* : Tonsillitis aut cophosis pituitosa.

L I Q U O R E S.

L I Q U O R A L E X I T E R I U S A C E T A T U S
(*GUYTON - MORVEAU*).

R. Sulfatis potassæ drachmam unam.

Acidi acetici unciam semis.

Immitte in phialam unciæ unius capacem.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

s. Acidum muriaticum oxygenatum extemporaneum (GUYTON-MORVEAU).

R. Oxydi manganesii nigri pulv. drachmam unam.

Immitte in phialam vitream quæ continet circiter uncias duas, eique affunde Acidi nitro-muriatici (vulgo *Aqua regia* dicti) quantum opus.

Ut phiala ad duas tertias circiter repleatur.
Agita liquorem singula vice, quando opus habes.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

(CHENEVIX).

R. Muriatis calcis oxygenati quantum placet.

Usus horum trium liquorum egregius est pro odoratu ad corrigenda effluvia putrida et contagiosa.

Vide etiam infra *Solutiones Alexiterias varias.*

LIQUOR AD APHTHAS.

R. Boracis pulv. drachmas duas.

Tincturæ Myrrhæ,
Aquæ destillatæ, ana unciam unam.
Mellis rosacei uncias duas. Misce.

Usus : Portio hujus mediante penicillo aut
linteo adplicetur aphthæ fricando ter qua-
terve de die.

LIQUOR AURICULARIS.

℞. Bilis Taurinæ drachmas tres.
Balsami Myroxyl Peruiferi drachmam
unam.
Misce.

Usus : Fluxus materiæ foetidæ ex meatu
auditorio. — Instillando guttam unam
alteramve bis die (HUGH SMITH).

LIQUOR AD CONDYLOMATA (PLENCK).

℞. Acidi acetici,
Alcoholis, ana unciam semis.
Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.
Aluminis,
Camphoræ, ana drachmam semis.
Misce.

Vel pro re nata melius :

- R. Muriatis hydrárgyri,
- Aluminis, ana uncias duas.
- Camphoræ drachmas duas.
- Acidi acetici,
- Alcoholis, ana libras duas. Misce.

Usus : Condylomata, verrucæ, et rhagades.

Penicillo hoc liquore madido semel vel
bis die leniter adfricando.

LIQUOR AD DYSECŒAM primus.

- R. Olei Terebinthinæ guttas quadraginta,
- Olei Amygdalarum unciam semis.
- Misce.

Usus : Dysecœa ex secretione céruminis
impedita. — Instillando quotidie guttulas
aliquot meatui auditorio, prævie probe
mundato.

LIQUOR AD DYSECŒAM secundus.

- R. Muriatis sodæ drachmam unam.
- Aquæ destillatæ quantum satis.
- Ut fiat solutio saturata.

Usus : Dysecœa ex cerumine indurato. —

Portio hujus liquoris meatui auditorio instilletur, ibique per aliquot minuta retingatur, perficando leniter aurem externam; dein auris aqua tepida eluatur; idque bis die repetitur.

LIQUOR AD ODONTALGIAM.

R. Resinæ Pistacia-Lentisci quantum placet.
Olei Terebinthinae quantum satis.
Ut fiat solutio.

Usus : Portio gossypio excepta denti dolori imponitur.

LIQUOR AD PERNIONES.

R. Acetatis plumbi liquidi partem unam.
Alcoholis Rosmarini officinalis partes quatuor. Misce.

Usus : Linteum hoc liquore madidum applicetur parti affectæ omni nocte.

LIQUOR AD ULCERA ORIS.

R. Oxymellis cuprati unciam semis.
Tincturæ Myrræ unciam unam.

Vel :

- ¶. Sulfatis cupri grana duo.
Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

Vel :

- ¶. Nitratis argenti fusi granum unum—duo.
Aquæ destillatæ uncias sex. Misce.
Usus : Portio penicillo applicetur semel vel
bis die , cavendo ne pars deglutiatur.

S O L U T I O N E S .

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXI-
TERIA (GUYTON - MORVEAU).

- ¶. Muriatis sodæ pulv. libras sex.
Immitte in vas vitreum vel terreum
amplum, et adde
Acidi sulfurici concentrati libras duas.
Pone super cineres calidos ut fiat eva-
poratio.

Vel melius :

- ¶. Muriatis sodæ pulv. libras quinque.
Immitte in vas terreum aut crucibulum
Hessiacum amplum et affunde gradatim
Acidi sulfurici concentrati libras quatuor.
Portando vas de loco uno in alterum

SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. Aqua camphorata Bateana.

R. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

Usus aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.

SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMO-NIACALIS.

SYN. Aqua saphirina; aqua cœlestis; aqua ophthalmica cœrulea.

R. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

Usus: Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ cornææ.

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. Liquor Swietenii.

R. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

NB. Proportio ingredientium mox dicta sufficit ad lustrandum cubile quod lectos ægrorum decem continet. — Hæc vaporisatio pro re nata bis terve de die repetenda est.

SOLUTIO ARSENICATA.

℞. Oxydi arsenici albi subtilissime pulv.,
Carbonatis potassæ, ana grana sedecim.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Mixta digere balneo arenæ ut fiat solutio.

Usus: Ulcera carcinomatosa. — Miscendo drachmam unam cum aquæ libra una et micæ panis quantum satis.

SOLUTIO CUPRI AMMONIACALIS.

℞. Oxydi cupri viridis grana viginti quatuor.
Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.
Misce, ut fiat solutio, cui adde
Aquæ destillatæ uncias septem.

Usus pro injectione, lotione vel linimento cupratis.

SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. Aqua camphorata Bateana.

R. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

Usus aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.

SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. Aqua saphirina; aqua cœlestis;
aqua ophthalmica cœrulea.

R. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

Usus: Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ corneæ.

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. Liquor Swietenii.

R. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

Alcoholis diluti libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Syphilis. — Uncia semis continet quartam grani partem.

NB. Ut plurimum cito symptomata morbi fugat, sed ad morbum radicaliter curandum non raro fallit et in irritabili corporis habitu saepe multum nocet.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

R. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam.

Aquæ destillatæ uncias duodecim. Misce.

Usus : Ulcera atonica, herpetica. — Portio penicillo aut linteo carpto excepta applicetur semel vel bis die.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

R. Nitratis argenti fusi scrupulum unum.

Aquæ destillatæ unciam semis.

Usus eximus : Ulcera lardacea aliave rebellia. — Linteo hac solutione madido marginem ulceris tangendo. — Aquæ libris tribus dilutæ : Ulcera oris; Blennorrhœa.

SOLUTIO SEDATIVA.

R. Extracti opii drachmas duas—quatuor.
Aquaæ servidæ libram unam.
Misce terendo.

Usus: Ulcera aliave cutis vitia pruriginosa,
irritabilia, syphilitica rebellia.—Appli-
cando linteum carptum hac solutione
madidum ter quaterve de die.

SOLUTIO STYPTICA.

SYN. *Aqua styptica; aqua cupri vitriolati
composita P. E.*

R. Sulfatis cupri,
Aluminis, ana uncias tres.
Aquaæ destillatæ servidæ libras duas.
Misce, ut fiat solutio; dein cola et adde
Acidi sulfurici unciam unam semis.

Usus: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blen-
norrhœæ.

SOLUTIO ZINCI ALUMINOSA.

SYN. *Aqua aluminosa Bateana.*

R. Sulfatis zinci,
Aluminis, ana unciam semis.

Aquæ servidæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio; dein cola.

Usus varia forma: Vulnera aut ulcera im-
munda; vitia cutis; ophthalmia; blen-
norrhœæ.

A Q U Æ.

AQUA CALCIS.

Usus egregius: Ad exsiccanda ulcera, præ-
sertim scorbutica regionum septentriona-
lium.—**Forma injectionis:** Ad fistulas.—
**Prophylacticus forma lotionis vel injec-
tionis:** Infectio syphilitica, herpetica.

AQUA CALCIS CINCHONATA.

Est infusum corticis cinchonæ officinalis
unciæ unius in libra una aquæ calcis.

Usus internus et externus: Ulcera crurum;
vitia scrophulosa; aphthæ aliive morbi
ex acido ventriculi.

AQUA CAMPHORATA.

℞. Camphoræ drachmam unam.
Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui affunde,
Aquæ fervidæ libras duas.
Probe simul agita; dein refrigerata cola.

Usus pro injectionibus.

AQUA MARINA.

AQUA MARINA ARTEFACTA.

Usus frigidæ aut calidæ *forma balnei, fatus, lotionis*: Morbi cutis; tumores et ulceræ scrophulosa; debilitas muscularum, ligamentorum.

AQUA ROSÆ.

Usus pro collyriis et lotionibus variis.

AQUA SALVIAE.

Usus pro collutoriis.

D E C O C T A E T I N F U S A.

D E C O C T U M A D S T R I N G E N S.

Usus *forma enematis vel lotionis*: Diarrhoea rebellis; prolapsus. — *Forma injectionis*: Blennorrhœæ.

DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

Usus *internus*: Ischuria paralytica; ecchymoma aliave incommoda ex lapsu aut contusura.

DECOCTUM CORTICIS CINCHONÆ.

INFUSUM CORTICIS CINCHONÆ.

Usus *internus et externus*: Suppuratio ulcerum aut vulnerum profusa; atonia generalis aut localis; ulcera putrida, gangrenosa.

DECOCTUM DRUPÆ IMMATURÆ
JUGLANDIS REGIÆ.

Usus *internus et externus*: Vitia cutis varia.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

— SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

Usus: Vitia syphilitica varia.

DECOCTUM FOLIORUM NICOTIANA-TABACI.

¶. Foliorum Nicotiana-Tabaci siccatorum drachmas duas—quatuor.

Aquæ fervidæ libram unam.

Bulliant per aliquot minuta; dein digere calide per horam et cola.

Usus *forma enematis*: Ileus; obstipatio rebellis; ascarides recti.

NB. Forma lotionis in tinea laudatur a **JUSTAMOND**, sed in iis casibus ubi illud capiti applicui, nauseam et vomitum molestum causavit et tineam non sustulit.

DECOCTUM VERATRI ALBI.

Usus: Morbi cutis. Vide *Lotiones*.

MUCILAGINES.

MUCILAGO GUMMI ASTRAGALUS-TRAGACANTHÆ, aliarumque Astragali specierum.

MUCILAGO GUMMI MIMOSÆ NILOTICÆ vel **SENEGAL**.

Vulgo *Gummi Arabicum*.

MUCILAGO Radicis ALTHÆÆ officinalis.

MUCILAGO seminis LINI USIT ATISSIMI.

— PLANTAGO-PSYLLII.

— PYRUS-CYDONIÆ.

VIRTUS : Involvens ; emolliens.

MUCILAGO CAMPHORATA.

N. Camphoræ unciam unam.

Mucilaginis cujusvis libram semis.

USUS : Ulcera putrida et gangrænosa ; ulcuscula cutis dolentia ; verruca faciei mali moris , dolens.

GELATINÆ.

GELATINA AMYLI.

— ANIMALIS.

— ICHTHYOCOLLÆ.

USUS præcipuüs forma enematis : Dysenteria ; irritatio recti , vesicæ partiumque adjacentium a causa quacunque . — Item ad nutriendum corpus in dysphagia .

NB. Gelatina animalis nuper ab ARM. SEGUIN ad curandas dialeipyras eximum remedium inventum fuit. *Vide* pag. 459.

S U C C I.

SUCCUS Foliorum RUMEX - ACETOSÆ.

OXALIS-ACETOSELLÆ.

Usus *forma cataplasmati* : Ulcera scrophulosa.

SUCCUS FRUCTUS CITRI MEDICÆ.

Usus : Vitia scorbutica.

SUCCUS Herbæ COCHLEARIÆ officinalis.

SISYMBRIUM-NASTURTII.

Usus : Vitia scorbutica.

EXTRACTA.

EXTRACTUM ACONITUM-NAPELLI.

Usus *internus* : Arthrodynia rheumatica vel podagrīca.

EXTRACTUM BILIS TAURINÆ.

Usus *aqua diluti* : Maculæ corneæ; pterygium.

EXTRACTUM CONII MACULATI.

Usus aqua soluti: Ulcera carcinomatosa.—

Internus: Scirrhos prostatæ, mammæ etc.

EXTRACTUM DRUPÆ JUGLANDIS
REGIÆ.

¶. Drupæ Juglandis regiæ immaturæ (vulgo
Nuces Juglandis virides dictæ) versus
solsticium æstivum collectæ quantum
placet.

In mortario lapideo cum pauxillo aquæ
in pulpam contunde; dein succum prelo
expressum in balneo aquæ, spatula continue
agitando, ad mellis consistentiam evapora.

Usus: Ulcera oris ex hydrargyro; morbi cutis.

EXTRACTUM HYOSCIAMI NIGRI.

OPPI.

Usus utriusque varia forma: Dolores spas-
modici, et morbi externi variii cum irri-
tabilitate morbosa juncti.

EXTRACTUM TURIONUM PINI.

Usus: Ulcera, aliave vitia scorbutica.

P U L V E R E S.

PULVIS ANTISEPTICUS COMPOSITUS.

¶. Pulv. Radicis Arnicæ montanæ,
 —— Corticis Cinchonæ officinalis,
 Camphoræ alcohole irroratæ et contritæ,
 ana partes æquales.

Simul pulverisata misce.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa rebellia.

PULVIS ARNICÆ.

¶. Radicis Arnicæ montanæ sero automno vel
 hyeme collectæ, dein siccatae et pulv.
 quantum placet.

VIRTUS eximia antiseptica.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa aliave
 rebellia.

PULVIS ARSENICALIS (JUSTAMOND.)

¶. Sulfureti stibii nigri unciam unam.

Oxydi arsenici albi unciam semis.

Mixta igni expone in crucibulo ut fluat
 massa ; dein refrigerata teratur in pulverem.
 Quandoque cum successu additur :

Extracti opii drachma una—tres.

U S U S *inspergendo* : Carcinoma ; excrescentiae ; ulceræ fungosa , rebellia.

P U L V I S B E L L A D O N Æ .

R. Foliorum Atropa-Belladonæ in umbra
siccatorum et pulv. quantum placet.

U S U S *inspergendo* : Carcinoma.

P U L V I S C A R B O N U M .

V I R T U S eximia antiseptica.

U S U S : Halitus oris fœtidus ; ulceræ oris,
faucium, aliarumve partium fœtida, pu-
trida, gangrænosa et carcinomatosa.

P U L V I S a d C A R C I N O M A (C O S M E V . B E R N A R D)

R. Sulfureti hydrargyri rubri drachmas duas.
Cinerum e soleis calceorum antiquis com-
bustis grana octo.

R E S I N A E D R A C A E N A - D R A C O N I S grana duo-
decim.

Oxydi arsenici albi scrupulos duos.

Misce fiat pulvis tenuissimus, cuius portio
pauxillo aquæ mixta penicillo parti ulceratæ
applicetur, quæ dein tegatur linteo carpto.

Usus : Ulcus carcinomatosum, præcipue
nasi vel faciei. — Eschara post triduum aut
quadriduum decidens ut plurimum ulcus
bonum relinquit.

PULVIS AD CARCINOMA (PLUNCQUFT).

R. Ranunculus-flammulæ unciam unam.

Anthemis-Cotulæ unciam semis.

Sulphuris purificati drachmam unam.

Oxydi arsenici albi drachmas duas.

Misce ut fiat pulvis subtilissimus, cuius
portio albumine ovi trita parti affectæ ap-
plicetur, post 48 horas auferendo escharam.

PULVIS CINCHONÆ.

R. Pulv. Corticis Cinchonæ officinalis quan-
tum placet.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa, aliave
rebellia.

PULVIS RADICIS COLUMBO.

Usus leviter inspergendo : Ulcera rebellia
(HOME).

PULVIS CORALLIORUM RUBRORUM.

Usus dentifricius.

PULVIS E CUPRO.

℞. Oxydi cupri viridis pulv. quantum placet.

PULVIS E CUPRO COMPOSITUS.

℞. Oxydi cupri viridis,

Muriatis hydrargyri, ana drachmam
unam. Misce.

Usus : Ulcera genitalium, aliarumve par-
tium rebellia.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Pulv. corticis Cinchonæ officinalis drach-
mas duas.

— Coralliorum rubrorum drachmam
unam.

Gummi-resinæ Myrrhæ,
Tartritis potassæ aciduli, ana drachmam
semis. Misce.

PULVIS ERRHINUS.

℞. Foliorum Asari Europæi,

— Origanum-Majoranæ,

— Teucrium-Mari,

Florum Lavandula-Spicæ, ana partes
æquales.

Pulverisita misce.

Usus : Otalgia ; dysecœa ; dolor faciei ; cephalæa rheumatica vel nervosa ; secretio muci narium impedita ; morbi quidam oculorum.

Vel :

R. Sulfatis hydrargyri lutei cum excessu oxydi granum unum.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ pulv. grana octo. Misce.

Usus : Amaurosis. Quarta pars hujus pulveris attrahatur naribus semel vel bis de die.

(WARE).

PULVIS ESCHAROTICUS.

R. Aluminis fusi unciam unam.

Oxydi hydrargyri rubri unciam semis.
Misce.

Usus : Caro luxurians aut fungosa ulcerum vel vulnerum.

PULVIS AD EXCRESSENTIAS.

R. Foliorum Juniperus-Sabinæ ,

Oxydi cupri viridis (vel oxydi ferrirubri)
ana partes æquales.

Misce probe terendo.

PULVIS AD ALBUGINEM.

℞. Vitri subtilissime pulv. quantum placet.

Vel:

℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati
quantum placet.

Usus: Portio infletur oculo semel aut bis die.

PULVIS E PLUMBO.

Syn. Trohisci Rhazis; pulvis è Cerussa
compositus.

℞. Oxydi plumbi albi acido acetico parati
drachmas quinque.

Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Traga-
canthæ) drachmas tres. Misce terendo.

Usus pro lotione, injectione, collyrio: Vitia
cutis; pruritus; inflammations locales.

PULVIS E PLUMBO COMPOSITUS.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.

Corticis Quercus-Roboris libram unam.

Subtilissime separatiim pulverisata.

Misce.

Usus inspergendo ad ulcera scrophulosa.

PULVIS AD PROLAPSUM.

℞. Florum Punica-granati pulv.,

Aluminæ pauxillo oxydi ferri rubri
mixtæ (vulgo *Boli Armenæ*), ana
partes æquales.

Usus *inspergendo* parti prolapsæ, antequam
reponatur.

P U L V I S Q U A S S I Æ .

N. Ligni Quassiæ amaræ pulv. quantum placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia.

P U L V I S R H E I .

N. Radicis Rhei palmati pulv. quantum
placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia
(HOME). — *NB.* Si simul valde irritabilia
sunt, additur octava pars opii.

P U L V I S S A C C H A R I .

Usus *inspergendo* : Ulcera.

P U L V I S S T I B I A T U S .

N. Phosphatis calcis stibiati grana sex—octo.
Vel:

N. Phosphatis calcis grana triginta duo.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce. Divide in doses quatuor.

Usus *internus*: Dysuria urethralis chronica ex transpiratione impedita aut suppressa, sumendo pulverem unum omni nocte.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis,
Gummi-resinæ Kino, ana partes æquales.

PULVIS E SULPHURE.

Usus *internus* vel *externus* forma frictionum *perse*; vel cum saliva aut axungia mixti: Psora; vitia oris ex hydrargyro; dolores artuum ex hydrargyro.

PULVIS AD ULCERA CRURUM.

R. Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam unam.

Nitratis potassæ drachmas tres. Misce.

Usus *internus*: Tumores crurum et ulcera inflammata præcipue lotricum. — Dosi drachmæ semis bis die.

PULVIS AD ULCERA TENDINUM.

R. Resinæ Pistacia-Lentisci,

Gummi-Resinæ Myrrhæ, ana partes
æquales.

Usus inspergendo: Ossa cariosa, et tendines
aut ligamenta denudata et ulcerata.

HERBÆ AROMATICÆ.

- N. Florum Lavandula-Spicæ,
- Arnicæ montanæ,
- Herbæ Origanum-Majoranæ,
- Thymus-Serpylli,
- Rosmarini officinalis, ana unciam
unam.

Grossiuscule concisa misce et usui serva.

Usus pro embrocatione, fotu aut cataplas-
mate discutiente.

HERBÆ EMOLLIENTES.

- N. Herbæ Malvæ rotundifoliæ,
Foliorum Verbascum-Thapsi,
Radicis Symphyti officinalis,
— Althææ officinalis, ana partes
æquales.

Concisa misce et usui serva.

SPONGIÆ, ALIARUMVE SUBSTAN-
TIARUM PRÆPARATIO.

SPONGIA PRÆPARATA.

Hæc substantia est Nidus mollis elasticus
Zoophyti, STIRPS OFFICINALIS dicti.

S P O N G I A exsiccata et ab heterogeneis
adhaerentibus probe purgata eximii usus est
per se ad lavanda vulnera post operationes
chirurgicas et ad mundanda ulcera; nec non
ad ulcera aut abscessus profuse suppurantes,
illam superponendo linteo carpto.—Ad hæ-
morrhagias sistendas applicando frequenter
spongiam aqua frigida vel aceto madidam.—
Ad prolapsum uteri forma pessarii.—In para-
lysi sphincteris ani vel vesicæ ad urinam exci-
piendam vel effluxum fæcum impediendam.
Servit etiam ad fatus frigidos vel calidos
applicandos, ad collyria oculo applicanda etc.

Humectata dein filo arkte circumdata
et sic *per se* siccata; aut ceræ flavæ calidæ

566 LYCOPARDON BOVISTA.

liquefactæ immersa, dein fortiter expressa et
sub prelo frigefacta, postea in portiones variae
magnitudinis et formæ concisa egregii usus
est pro *Turundis*, quæ vulnerum, ulcerum
aut fistularum orificiis angustis immissæ
eadem intumescendo dilatant, et sic puri
exitum liberum creant.

BOLETUS LARICINUS.

IGNIARIUS.

Hi Boleti a cortice externo albo et duro,
nec non a substancia fistulosa probe sepa-
rentur; dein discussi ictibus mallei repetitis
contundantur, donec adeo mollescant, ut in
portiones minores discindi possint.

Usus : Hæmorrhagiæ ex arteria aut vena
majori vulnerata.

LYCOPERDON BOVISTA.

Parenchyma molle spongiosum ac pul-
verulentum quod sub cute externa est, sepa-
retur et usui servetur.

Usus inspergendo : Hæmorrhagia; hæmor-
rhois; ulceræ; intertrigo.

M O X A.

In oriente paratur ex foliis Artemisiæ vulga-
ris probe in umbra siccatis, quæ dein contusa
manibus tamdiu persfricantur, donec species
lanæ formetur, quæ addito pauxillo moschi,
aut aliis substanciæ odoriferae in conos ef-
formatur. In Europa hodie ut plurimum ex
gossypio conficitur, quod solutioni nitratis
potassæ saturatæ immersum, dein exsiccatum
in cylindros quatuor pollicum longos et unius
pollicis diametri formatur. Cylinder talis in
tubum ex charta crassiori confectum immit-
titur, et parti affectæ applicatus accenditur,
et durante combustione sic facile digitis
applicata tenetur. Postquam gossypium ad
ultimam portionem usque consumptum fue-
rit, pars usta unguento digestivo tegitur.

Usus in omnibus morbis ubi ferrum candens
seu cauterisatio utilis inventa fuit, præ-

cipue in doloribus fixis chronicis violentis rheumaticis aliisve variarum corporis partium.—Nuper etiam cum successu in aphonya nervo recurrenti in collo moxam applicavit DUBOIS.

FINIS PRIMÆ SECTIONIS.