


Uebersicht
der
abgebildeten Handels-Pflanzen
in
systematischer Ordnung dargestellt
als
Hilfsmittel zum Nachschlagen.

Pflanzenreich IX. Th.

N n



Erste Klasse.

Amomum Zingiber. Gemeiner Ingber.

Abbildung: Jacquin hort. Vindob. Vol. 1. tab. 75.

Rheed. hort. Malabar. t. 12.

gebr: Wurzel.

Zingiber spurium Retz. Block-Ingber.

Abbildung: Rheed. Malab. II. p. 27. f. 13.

Blackwell Herbar. tab. 402.

gebr: Wurzel.

Zingiber Cassumunar R. Wahrer Cassumunar
Ingber.

Abbildung: Rosc. tab. 5.

Amomum latifolium Lamark. Kurkume.

Abbildung: Rheed. Mal. II. p. 13. t. 7. Berlin,

Jahrbuch der Pharmacie 1797. t. 1.

gebr: Wurzel.

Amomum Zedoaria. Kurkume, Zitwer.

gebr: Wurzel.

Amomum Curcuma. Lange Kurkume, gelber Ingber.

Abbildung: Rheed. Malab. 2. p. 11. t. 11.

Blackwell Herb. t. 396.

Jacq. Hort. Vindob. 3. t. 4.

gebr: Wurzel.

N n 2

Amo

Amomum Cardamomum. Cardamom; Ingber.

Abbildung: Lam. illustr. t. 2. f. 2.

Rumph. Amb. V. p. 122. t. 65. f. 1.

gebr: Saamen.

Amomum Racemosum var. β . Paradies Ingber.

Abbildung: Rheed. Malab. II. t. 6.

Blackwell-Herbar. tab. 385.

gebr: Saamen.

Amomum Hirsutum. Arabische Costuspflanze.

Abbildung: Berl. Jahrbuch d. P. 1797. t. 2.

Rheed. Malab. II. p. 15. t. 8.

gebr: die Rinde der Wurzel.

Maranta Galanga. Galgant.

Abbildung: Rumph. Amboin. 5. t. 63.

gebr: Wurzel.

Amomum Repens. Cardamomen.

Abbildung: Rheed. Malab. II. t. 4. et 5.

gebr: Saamen.

Kæmpferia Galanga. Kämpferische Galgant Pflanze.

Abbildung: Lamark illustr. Gen. Vol. I. p. 7.

No. 14. tab. 1. Fig. 1.

Rheed. Malab. II. t. 41.

gebr: Wurzel.

Salicornia Herbacea. Glaschmelz.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 1.

Oeder. Flor. Danic. t. 330.

gebr: das Kraut.

Zwey

Zweyte Klasse.

Ligustrum vulgare. Gemeiner Hartriegel.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1141.

Schkuhr bot. Handb. t. 2. a. n. 2. p. 7.

gebr: die Blumen und die Blätter.

Olea Europæa. Gemeiner Delbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 199.

Plenk. Icon. Med. tab. 11.

gebr: das aus den Saamen gepresste fette
Del.

Fraxinus Ornus. Manna: Esche.

Abbildung: Duham Arb. 1. p. 252. t. 101.

Bauh. Histor 1. lib. 8. p. 177.

Fraxinus rotundifolia. Rundblättrichte Esche.

Abbildung: Willd. Berlin. Bamuz. p. 116. t. 6. f. 1.

gebr: der aus dem Baum fließende unter
dem Namen Manna bekannte Saft.

Fraxinus parvifolia. Kleinblättrige Esche.

Abbildung: Plukenet t. 182. f. 4.

gebr: ebenf. die Manna.

Fraxinus excelsior. Gemeine Esche.

Abbildung: Oeder Fl. dan. t. 968. Schkuhr bot.
Handbuch t. 557.

Blackwell Herb. t. 328.

gebr: Rinde, Blätter und Saamen.

Jas-

Jasminum officinale. Gemeiner Jasmin.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 3.

Blackwell Herb. t. 13.

Jasminum grandiflorum. Großblumiger Jasmin.

Abbildung: Rheed. Malabar 6. p. 91. t. 52.

gebr: die Blumen, auch von

Jasminum sambac oder *Nyctantes sambac*.

Abbildung: Lam. illustr. t. 6. f. 1.

Veronica officinalis. Ehrenpreis.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 248.

Blackwell Herb. t. 148.

gebr: die Blätter.

Veronica beccabunga. Wachungen.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 511.

Blackwell Herb. t. 48.

gebr: das frische Kraut.

Gratiola officinalis. Gnadenkraut, wilder Urin.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 363 Bulliard

herb. t. 130.

Schkuhr bot. Handb. tab. 7. Black-

well Herb. t. 411.

gebr: die Blätter.

Rosmarinus officinalis. Gemeiner Rosmarin.

Abbildung: Plenk. Icon. und t. 18.

Black-

Blackwell Herb. t. 159.

gebr: die Blätter und Blüthen.

Salvia officinalis. Gemeiner Salbey.

Abbildung: Plenck Icon. pl. Med. t. 19. Blackwell
Herb. t. 10.

Schkuhr bot. Handb. t. 4.

gebr: die Blätter und Blumen.

Salvia sclarea. Muskateller Salbey, Scharlach-
kraut.

Abbildung: Plenck Icon pl. Med. t. 8. Blackwell
Herb. t. 122.

gebr: die Blätter.

Piper nigrum. Gemeiner oder schwarzer Pfeffer.

Abbildung: Rheed. Hort. Malab. VII. p. 23. t. 12.
Lam. illustr. Gener. t. 23.

gebr: die Beere.

Piper Cubeba. Cubeben.

gebr: die Beere.

Piper longum. Langer Pfeffer.

Abbildung: Rheed. Hort. Malabar 7. p. 27. t. 14.
Blackwell Herb. t. 356.

gebr: die Blumenähre.

Drit

Dritte Klasse.

Valeriana officinalis. Gemeiner Baldrian.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 570.

Blackwell Herb. t. 271.

Schkuhr Botan. Handb. t. 5.

gebr: die Wurzel.

Valeriana Phu. Weißer großer Garten-Baldrian.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 250.

Hort Eyst. 9. t. 2. f. 1. Ripin mono-
petal 1. t. 3.

gebr: die Wurzel.

Valeriana celtica. Celtischer Baldrian, Narden.

Abbildung: Plenk Icon. med. t. 29.

Jacquin Collect G. 1. p. 24. t. 1.

gebr: die Wurzel.

Valeriana spicata. Indischer Baldrian.

Abbildung: John in Act. Bengal. Vol. 4. p. 433.

gebr: die Wurzel.

Iris Florentina. Florentin. Schwettel, Weilwurz.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 414. Hort. Eyst.

vern. 8. p. 4. f. 3.

gebr: die Wurzel.

Iris germanica. Deutsche Schwert- u. Lillie.

Abbildung: Plenk Icon. med. t. 34.

Blackwell Herbar. t. 69.

gebr: die Wurzel.

Iris

Iris pseud-acorus. Gelbe Wasser-Lilie.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 404.

Schkuhr. bot. Handb. t. 5. a. b.

gebr: die Wurzel.

Cyperus longus. Europäisches Cypergras.

Abbildung: Jacquin Ic. rar. t. 297.

Scheuchzer Agrostol. 578.

gebr: die Wurzel.

Cyperus rotundus. Asiatisches Cypergras.

Abbildung: Moris. Hist. 3. t. 11. f. 1.

Scheuchzer Gram. t. 9. f. 3.

gebr: die Wurzel.

Saccharum officinarum. Zuckerrohr.

Abbildung: Rumph amboinens. 5. t. 74. f. 1.

Sloan. Jam. 31. hist. 1. p. 108. t. 166.

gebr: der aus der Pflanze gepresste Saft.

Avena sativa. Gemeiner Haber.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 422.

gebr: der Saamen.

Triticum aestivum. Sommerweizen.

Triticum hybernum. Winterweizen.

Triticum spelta. Speize, Dinkel, Kern.

Abbildung: des Sommerweizens: Blackwell Herb.

t. 40. f. 4. 5.

des Winterweizens: *ibidem* t. 40.

Fig. 1. 2. 3.

des Dinkels: *Moris hist.* 3. Sect. 8.

tab. 6. f. 1.

Bauh. theat. 412. t. 414.

Triticum repens. Quackengras.

Abbildung: *Schreb. Gräser* 2. t. 126.

Leers Flor. Herborn t. 12. f. 3 & 4.

Nro. 2.

Schkuhr bot. Handb. t. 20. f. 3.

gebr: die Wurzel.

Hordeum vulgare. Gemeine Gerste.

Abbildung: *Blackwell Herb.*

Phalaris canariensis. Kanariengras.

Abbildung: *Plenk Icon. med.* t. 41.

Leers Flor. Herb. t. 7. f. 3.

Host. Gram. 2. p. 28. t. 33.

gebr: die Saamen.

Vierte Klasse.

Scabiosa succisa. Teufels - Abbiß.

Abbildung: *Oeder Flor. Danic.* t. 279.

Blackwell Herb. t. 412.

gebr: die Wurzel.

Scabi

Der abgebildeten Handels-Pflanzen. 191

Scabiosa arvensis. Aker = Scabiose.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 447.

Schkuhr botan. Handb. t. 22. No. 1. 2.

gebr: Blumen und Kraut.

Asperula odorata. Waldmeister, Sternleberkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 562.

Schkuhr bot. Handb. t. 23.

gebr: die Blätter.

Galium verum. Wahres Labkraut. Unserer lieben
Frauen Bettstroh.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1146.

Schkuhr bot. Handb. t. 23.

gebr: die Blätter und Blüten.

Rubia tinctorum. Krapp.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 23.

Blackwell Herbar. 326.

Catesbæa spinosa.

Abbildung: Catesb. Carol. 2. p. 100. t. 200.

gebr: die Rinde.

Penæa mucronata.

Abbildung: Weudland bot. Beobacht. t. 1. f. 7.

gebr: der aus den Sträuchen fließende
Saft.

D o 2

Pe-

Penæa sarcocolla.

Abbildung: Pluk. Mant. t. 446. f. 6.

gebr: der nämliche Saft.

Plantago major. Großer breiter Wegerich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 461.

Schkuhr bot. Handb. t. 23. No. 251.

gebr: die Wurzel und der Saamen.

Plantago lanceolata. Spitzer Wegerich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 437.

gebr: Blätter, Wurzel und Saamen.

Plantago psyllium. Fibbisaamenkraut.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 412.

Zorn Ic. plant. t. 115.

gebr: die Saamen.

Krameria.

Abbildung: Ruiz & Pavon Flor. Peruv. t. p. 61.
tab. 93.

gebr: die Wurzel.

Sanguisorba officinalis. Wiesenknopf, falsche
Wibernelle, Blutkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 97.

Schkuhr botan. Handb. t. 24. No. 261.

gebr: die Wurzel.

Alchemilla vulgaris. Einau. Frauenmantel.

Abbil

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 693.

Blackwell Herb. t. 72.

Schkuhr bot. Handb. t. 26. No. 275.

gebr: die Wurzel und Blätter.

Parietaria officinalis. Glaskraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 521.

Blackwell Herbar. t. 136.

gebr: die Blätter.

Dorstenia contrayera.

Abbildung: Jacquin Icon. rar. t. 614.

Blackwell Herb. t. 579.

Römer Archiv f. d. Bot. 1 B. 1 St. t. 8.

gebr: die Wurzel.

Dorstenia drakena.

- *brasiliensis*,

- *houstoni*.

Abbildung: Schröder Journ d. Bot. 1800. p. 3. f. 1.

gebr: die Wurzel.

Fagara octandra. Schwammholzbaum.

Abbildung: Jacq. amer. 105. t. 71.

gebr: das Harz, unter dem Namen

Tacamahaca.

Santalum album. Weißer Santelbaum.

Abbildung: Rumph amboin 2. p. 42. t. 11.

Breya

Breyt Icon. 94. t. 5. f. 1.

gebr: das Holz.

Cuscuta euro. pa. Großes Seidenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 199.

Schkuhr bot. Handb. t. 27.

gebr: die ganze Pflanze.

Cuscuta epithimum. Kleine Flachseide oder
Seidenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 437.

gebr: die ganze Pflanze.

Ilex aquifolium. Stechpalme.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 508.

Schkuhr bot. Handb. t. 28.

gebr: die Blätter und Beeren.

Fünfte Klasse.

Lithospermum officinale. Steinhirse.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1084.

Schkuhr bot. Handb. t. 29. No. 304.

gebr: der Saamen.

Anchusa officinalis. Gemeine Ochsenzunge.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 572.

Schkuhr bot. Handb. t. 29. No. 307.

gebr: die Wurzel.

Ar-

Achusa tinctoria. Rorche Schenckjunge.

Abbildung: Zorn. Icon. pl. t. 446.

gebr: die Wurzel.

Cynoglossum officinale. Hundszunge.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1147.

Schkuhr bot. Handb. t. 30.

gebr: Wurzel und Blätter.

Pulmonaria officinalis. Lungenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 482.

Schkuhr botan. Handb. t. 30.

Blackwell Herbar. t. 376.

gebr: die Blätter.

Symphitum officinale. Beinwell.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 664.

Schkuhr bot. Handb. t. 30.

gebr: Wurzel, Blätter und Blumen.

Borago officinalis. Wortsch, Boragen.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 36.

Schkuhr bot. Handb. t. 31.

gebr: Blätter und Blumen.

Cordia myxa. Schwarzer Brustbeerenbaum.

Abbildung: Rheed. malab. 4. p. 77. t. 37.

Blackwell Herb. t. 398.

Cordia sebestena.

Abbil.

Abbildung: Dillen. Ettham. p. 341. t. 255. f. 331.

gebr: von beyden die Früchte unter dem
Namen: Sebostenæ, schwarze Brust-
beere.

Primula veris. Schlüsselblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 433.

Schkuhr bot. Handb. t. 33.

gebr: Kraut, Blätter und Blumen.

Cyclamen europæum. Schweinebrod.

Abbildung: Jacquin austr. t. 401.

Schkuhr bot. Handb. t. 35.

gebr: die Wurzel.

Menyanthes trifoliata. Bitterklee.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 541.

Schkuhr botan. Handb. t. 35.

gebr: die Blätter.

Lysimachia vulgaris. Gemeiner gelber Weiderich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 689.

Blackwell Herb. t. 278.

gebr: Blätter und Blumen.

Lysimachia numularia. Pfennigkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 394.

Schkuhr bot. Handb. t. 36.

gebr: die Blätter.

Ana-

Anagallis arvensis. Gauchheil, Vernunftkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 88.

Schkuhr bot. Handb. t. 30.

gebr: die Blätter.

Plumbago europæa. Bleiwurz.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 36.

Sabb. hort. 2. t. 39. & 40.

gebr: die Wurzel.

Convolvulus Scammonia. Purgirwinde.

Abbildung: Miller Diction. t. 102.

Zorn. plant. med. t. 214.

gebr: der getrocknete Saft aus der Wurzel.

Convolvulus mechoecanna. Weiße Jalappa.

gebr: die Wurzel.

Convolvulus turpithum. Turpithwinde.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 397.

gebr: die Wurzel.

Convolvulus Jalappa. Schwarze Jalappa.

Abbildung: Rerner t. 28.

gebr: die Wurzel.

Convolvulus scoparius, Besenwinde.

gebr: Stamm und Wurzel.

Convolvulus soldanella. Meerfohl.

Abbildung: Lobel. Icon. 602.

gebr: die Blätter.

Pflanzenreich IX. Th.

P p

Bon-

Bonplandia trifoliata.

Abbildung: Humb. et Bonpland plant. æquin. 2.
p. 59. tab. 97.

gebr: die Rinde unter dem Namen Cort.
angusturæ.

Cinchona officinalis. Wahrer Chinabaum.

Abbildung: Humb. plant. æquin. oct. 1. p. 33. t. 10.
gebr: die Rinde.

Cinchona coriacea. Chinabaum mit glänzenden
Blättern.

Abbildung: Ruiz et Pav. Flor. peruv. Vol. 2.
p. 50. tab. 191.

gebr: die Rinde.

Cinchona serobiculata. Chinabaum mit grubigen
Blättern.

Abbildung: Humb. et Bonpl. plant. æquin. 1.
p. 165. t. 47.

gebr: die Rinde.

Cinchona cordifolia. Chinabaum mit haarigen
Blättern. Offizineller Ch. B.

Abbildung: Flor. peruv. 2. t. 195.

gebr: die Rinde.

Cinchona grandifolia. Großblättriger Chinas-
baum.

Abbil

Abbildung: Flor. peruv. 2. t. 196.

Alibert des Fièvres atax. t. 2.

gebr: die Rinde.

Cinchona caribæa. Caralibischer Chinabaum.

Abbildung: Jacquin Observ. botan. 2. p. 27. t. 47.

gebr: die Rinde.

Cinchona corymbifera. Doldentrauben tragender
Chinabaum.

Abbildung: ist keine vorhanden.

gebr: die Rinde.

Cinchona floribunda. Berg-Chinabaum.

Abbildung: Uster. Magazin d. Botanik. p. 96. t. 3.

gebr: die Rinde.

Cinchona angustifolia. Schmalblättriger Chinabaum.

Abbildung: Lambert. Genus Cinch. pag. 29. t. 9.

gebr: die Rinde.

Cinchona grandiflora. Großblumiger Chinabaum.

Abbildung: Ruiz & Pavon. Fl. peruv. vl. 2. t. 198.

gebr: die Rinde.

Gardenia gummifera.

Abbildung: Thunb. Diss. de Gard. No. 4. t. 2. f. 3.

gebr: das aus den Rissen der Rinde und

Blätter schwigende Harz.

Nauclea gambir.

Abbildung: Hunter Transact. Linn. 9. p. 218. t. 22.

gebr: das Harz.

Cephaelis ipecacuana. Brasilsche Brechpflanze.

Abbildung: Berliner Jahrbuch der Pharmacie

1804 tab. 2.

gebr: die Wurzel.

Psychotria emetica. Grenadische Brechpflanze.

Abbildung: Humboldt & Bonpland plant. æquin.

pag. 142. tab. 126.

gebr: die Wurzel.

Coffea arabica. Kaffeebaum.

Abbildung: Juss. Act. 1713. p. 388.

Blackwell Herb. tab. 337.

gebr: die Saamen i e. Kaffeebohnen.

Verbascum thapsus. Wolfkraut, Königskerze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 631.

Schkuhr bot. Handb. t. 42.

gebr: die Blätter und Blumen.

Datura stramonium. Stechapfel.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 236.

Schkuhr bot. Handb. t. 43.

gebr: die Blätter und der Saame.

Hyosциamus niger. Schwarzes Bilsenkraut.

Abbil:

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 44.

Blackwell Herb. tab. 550.

gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.

Nicotiana tabacum. Gemeiner Taback.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 44.

Blackwell Herb. t. 146.

gebr: die Blätter.

Atropa Belladonna. Tollkraut, Wolfskraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 758.

Schkuhr bot. Handb. t. 45. No. 469.

Blackwell Herb. t. 564.

gebr: Wurzel und Blätter.

Atropa mandragora. Austraum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 364.

Lobel Icon. 267.

gebr: die Wurzel.

Physalis Alkekengi. Judenfirschen.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 45.

Blackwell Herb. t. 161.

gebr: die Beeren.

Solanum dulcamara. Bittersüß.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 607.

Bulliard Herb. f. 23.

gebr: die Stengel.

Cap-

Capsicum annum. Spanischer Pfeffer.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 47.

Blackwell Herb. t. 129.

gebr: die Frucht.

Ceratonía siliqua. Johannisbrod-Baum.

Abbildung: Lamark illustr. Gen. t. 859.

gebr: die Frucht.

Rhamnus Catharticus. Kreuzdorn.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 850.

Blackwell Herb. t. 135.

gebr: die Beeren.

Rhamnus Frangula. Faulbaum, Zapfenholz.

Abbildung: Oeder Flor. Danica. t. 278.

Schkuhr bot. Handb. t. 46. No. 489.

gebr: die Rinde.

Rhamnus Ziziphus. Gemeiner Brustbeerenbaum.

Abbildung: Duham Arb. 2. p. 378. t. III.

gebr: die Früchte.

Ribes rubrum. Rother Johannisbeertrauben.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 367.

Schkuhr bot. Handb. t. 48.

gebr: die Beeren.

Ribes nigrum. Schwarze Johannisstrauben.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 556.

Black-

Blackwell Herb. t. 285.

gebr: die Stengel und Beeren.

Hedera helix. Ephen.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 107.

Schkuhr bot. Handb. t. 49.

Blackwell Herb. t. 188.

gebr: Blätter, Holz und Beeren.

Vitis vinifera. Weinstock.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 154.

Schkuhr bot. Handb. t. 49.

gebr: die Beeren.

Strychnos nux vomica. Krähenaugenbaum.

Abbildung: Rheed. Malab. 1. p. 67. t. 37.

Blackwell Herb. t. 395.

gebr: die Saamen.

Strychnos colubrina. Schlangenholzbaum.

Abbildung: Rheed. Malab. 7. p. 10. t. 5.

Blackwell Herbar. t. 403.

gebr: das Holz der Wurzel.

Ignatia amara. Ignatius-Baum.

Abbildung: Camelli in philos. transact. Vol. 21.

tab. 1. Fig. 4 — 6.

gebr: die Saamen, genannt Ignatius-

Bohnen.

Neri-

Nerium antidysentericum. Ruhrstillender Oleander.
Abbildung: Rheed. Malab. 1. t. 47.

gebr: die Rinde.

Vinca minor. Wintergrün.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 51. No. 526.

Curtis Flor. Londinens. t. 172.

gebr: die Blätter.

Viola odorata. Märzen-Weilchen.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 309.

Lobel. Icon. 610.

gebr: Wurzel, Blätter, Blumen und
Saamen.

Viola tricolor. Drenfarbiges Weilchen.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 623.

Blackwell Herb. t. 44.

gebr: die Blätter.

Viola Ipecacuanana. Brech-Viole.

Abbildung: Vandelli Fascic. pl. p. 7. t. 1.

gebr: die Wurzel.

Lobelia syphilitica. Virginianische Lobelia.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 368.

gebr: die Wurzel.

Spigelia anthelmia. Wurmwidrige Spigelle.

Abbildung: Linn. Amoenitat. academic. V. t. 2.

Zorn

Zorn Icon. plant. t. 469.

gebr: die Blätter.

Spigella marilandica. Mariländische Spigelle.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 37.

Caresb. Carol. p. 78. t. 78.

gebr: die Blätter.

Gentiana Centaurium. Tausendgulden-Kraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 617.

Blackwell Herb. t. 452.

gebr: die Blätter.

Cynanchum Arghel. Arguel-Sennastrauch.

Abbildung: Nectoux Voyage dans la haute Egypte en dessus des Cataractes; avec des observations sur les diverses, Espèces de Séné qui sont repandues dans le commerce. Paris 1808. p. 20. t. 3.

gebr: die Blätter.

Asclepias vincetoxicum. Schwalbenwurzelpflanze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 849.

Schkuhr botan. Handb. t. 55. No. 542.

gebr: die Wurzel.

Gentiana lutea. Enzian.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 257.

gebr: die Wurzel.

Herniaria glabra. Bruchkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 529.

Schkuhr bot. Handb. t. 56.

gebr: die Blätter.

Chenopodium bonus Henricus. Guter Heinrich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. tab. 579.

Schkuhr bot. Handb. t. 56.

gebr: die Blätter.

Chenopodium ambrosioides. Wohlriechender
Gänsefuß.

Abbildung: Bresl. Samml. A. 1717. p. 443.

gebr: die Blätter.

Chenopodium botrys. Traubenkraut.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 114.

gebr: die Blätter und Saamen.

Salsola kali. Gemeines Salzkrout.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 818.

Salsola tragus. Langblättriges Salzkrout.

Abbildung: Jacquin Hort. t. 68.

Salsola sativa. Dickblättriges Salzkrout.

Abbildung: Jussieu Aekt. paris. 1715. pag. 74.

gebr: verbrannt liefern sämtliche genannte

Salsola-Arten die Soda oder Natron.

Ulmus campestris. Ulme, Rüster.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 632.

Schkuhr bot. Handb. t. 57. fig. a.

gebr: die mittlere Rinde.

Eryngium campestre. Mannstreu.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 554.

Schkuhr bot. Handb. t. 59.

gebr: die Wurzel.

Por-

Pordylium officinale. Cretischer Bergkummel.

Abbildung: Zorn Icon. pl. t. 278.

gebr: der Saame.

Heracleum sphondylium. Unächte Bärenklaue.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 67.

Blackwell Herbar. t. 540.

gebr: die Wurzel und Blätter.

Peucedanum officinale. Haarstrang.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 63.

gebr: die Wurzel.

Ferula Ferulago.

Abbildung: Moris sect. 8. t. 15.

gebr: das Harz.

Ferula orientalis. Orientalisches Steckenkraut.

Abbildung: Tournef. Voyage au Levant. 2, 154.

Jakson account on Marocco. t. 7.

gebr: das Harz, welches vermuthlich das

Gummi amoniacum liefert.

Anethum graveolens. Dill.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 77.

gebr: der Saame.

Ferula assafœtida. Stinkendes Steckenkraut.

Abbildung: Kämpfer Amœnitat. exotic. t. 536.

gebr: der aus der eingeschnittenen Wurzel
fließende Saft.

Ferula persica. Persisches Steckenkraut.

gebr: Pflanze und Saamen.

Fernla opoponax.

Abbildung: Gouan. illustr. pag. 19. t. 13.

gebr: die Pflanze.

Pastinaca sativa. Wilder Pastinak.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 76.

gebr: Wurzel und Saamen.

Athamanta creoselinum. Grundheil, Vielgut.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 64.

Jacq. Flor. Austr. t. 68.

gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.

Angelica Archangelica. Angelika.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 206.

gebr: die Wurzel.

Angelica silvestris. Wald-Angelika, wilde Angelika.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 68.

gebr: die Wurzel.

Imperatoria ostruthium. Meisterwurzpflanze.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 74.

gebr: die Wurzel.

Laserpitium latifolium. Weißer Enzian.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 67.

Jacquin Flor. Austr. t. 146.

gebr: die Wurzel.

Cicuta virosa. Wasserschierling.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 208.

Schkuhr bot. Handb. t. 71.

Blackwell Herb. t. 564.

gebr: die Blätter.

Cori-

Coriandrum sativum. Coriander.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 72.

gebr: der Saame.

Agasyllis galbanum oder *Eubon galbanum.*

Abbildung: Pluken Phyt. t. 12. fig. 2.

gebr: die Pflanze, aus welcher die Meisten das Mutterharz, Gummi galbanum, herleiten.

Agasyllis gummifera oder *Eubon gummiferum.*

Abbildung: Comm. Hort. 2. pag. 115. t. 58.

gebr: die Pflanze.

Daucus carota. Gelbe Rübe.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 723.

Schkuhr botan. Handb. t. 61.

gebr: Wurzel.

Daucus gummifer.

Abbildung: Bocco. Mus. I. t. 20.

gebr: die Pflanze.

Sanicula europæa. Sanikel.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 283.

Schkuhr bot. Handb. t. 60.

Blackwell Herbar. t. 63.

gebr: die Blätter.

Cuminum cyminum. Römischer Kümmel.

Abbildung: Rivin. Pentapetal. t. 40.

gebr: der Saame.

Athamanta cretensis. Cretischer Mohrenkümmel.

Abbildung: Jacquin flor. Austr. t. 62.

gebr: der Saame.

Am-

- Ammi copticum* oder *Bunium copticum*.
Abbildung: Jacquin hort. Vol. II. tab. 196.
gebr: der Saame.
- Charophyllum silvestre*. Wilder Kälberkopf.
Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 73.
Jacquin Flor. Austr. t. 149.
gebr: die Blätter.
- Scandix cerefolium*. Gemeiner Krbel.
Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 78.
Jacquin Flor. Austr. Vol. 4. t. 390.
Blackwell Herb. t. 236.
gebr: die Blätter und Saamen.
- Carum carvi*. Gemeiner Kümmel.
Abbildung: Oeder. Flor. Danic. t. 1091.
Schkuhr bot. Handb. tab. 77.
Jacquin Flor. Austr. t. 393.
gebr: der Saame.
- Aethusa meum* oder *Ligusticum meum*.
Abbildung: Jacquin. Flor. Austr. t. 303.
gebr: die Wurzel.
- Anethum foeniculum*. Fenchel.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 288.
gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.
- Apium petroselinum*. Petersilie.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 172. a
gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.
- Apium graveolens*. Selleri.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 790.
Schkuhr

Schkuhr bot. Handb. t. 78.

gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.

Pimpinella saxifraga. Stein-Pimpinella.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 78.

Jacquin Flor. Austr. t. 395.

gebr: die Wurzel.

Pimpinella anisum. Anis.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 374.

gebr: der Saame.

Phelandrium aquaticum. Wasser-Fenchel.

Abbildung: Oeder. Flor. Danic. t. 1154.

Schkuhr bot. Handb. t. 71.

gebr: der Fenchel, sage der Saame.

Conium maculatum. Gefleckter Schierling.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 62.

Jacquin Flor. Austr. t. 156.

gebr: die Blätter.

Bupleurum rotundifolium. Durchwachs.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 95.

gebr: die Blätter und der Saamen.

Ligusticum levisticum. Liebstüchel.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 68.

Blackwell Herb. t. 275.

gebr: die Wurzel.

Ammi majus. Großer oder gemeiner Ammey.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 477.

gebr: der Saame.

Seme-

Semecarpus Anacardium. Ostindischer Anacardien-Baum.

Abbildung: Roxb. Coromand. I. t. 12.
gebr: die Frucht.

Rhus coriaria. Gerber-Baum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 486.

Zorn Icon. pl. t. 510.

gebr: der Saamen.

Rhus copallinum. Copal-Baum.

Abbildung: Pluckeu. alm. 318. t. 56. f. 1.

gebr: das Harz.

Rhus toxicodendron. Giftsumach.

Abbildung: Cornut. canad. 97.

Du Hamel arbr. 2. t. 98.

gebr: die Blätter.

Sambucus ebulus. Mirtel.

Abbildung: Oeder Flor. Dan. t. 1156.

Schkuhr bot. Handb. t. 83.

gebr: Wurzel, Blätter, Blumen u. Beere.

Sambucus nigra. Hohlunder.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 545.

Blackwell Herb. t. 151.

gebr: die Blüthen und Beeren.

Tamarix germanica. Deutsche Tamariske.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 234.

Schkuhr bot. Handb. t. 85.

gebr: die Rinde.

Alsina media. Vogelmiere.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 525.

Schkuhr bot. Handb. t. 85.

gebr: die Blätter.

Parnassia palustris. Weiße Leberblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 584.

Schkuhr bot. Handb. t. 86.

gebr: die Blätter und Blumen.

Linum usitatissimum. Lein, Flach.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 160.

gebr: der Saame.

Linum catharticum. Purgtlein.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 851.

Schkuhr bot. Handb. t. 87.

Blackwell Herb. t. 368.

gebr: die Blätter.

Sechste Klasse.

Allium victorialis. Allermannsharnisch.

Abbildung: Jacquin Flor. Austr. t. 216.

Blackwell Herb. t. 544.

gebr: die Wurzel.

Allium sativum. Knoblauch.

Abbildung: Haller Helv. II. p. 4. t. 15. f. 9.

Kerner öekon Pflanzen B. 2. Pl. 130.

gebr: die Wurzel.

Allium cepa. Gemeine rote und weiße Zwiebel.

Abbildung: Lobel Icon. t. 150. fig. 2.

Pflanzenreich IX. Th.

R r

Tour-

Tournefort Instit. p. 382. t. 205.

gebr: die Wurzel.

Lilium candidum. Gemeine weiße Lilie.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 11.

Zorn Icon. plant. t. 462.

gebr: Wurzel und Blumen.

Scilla maritima. Meerzwiebel.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 59r.

Redout. liliae Vol. 2. t. 116.

gebr: die Wurzel.

Asparagus officinalis. Spargel.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 96.

Blackwell Herb. t. 332.

gebr: Wurzel und Saame.

Convallaria majalis. Mayblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 854.

Blackwell Herb. t. 70.

gebr: die Blumen.

Convallaria polygonatum. Weiß- oder Schminke-
wurzelpflanze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 377.

Blackwell Herb. t. 251.

gebr: die Wurzel.

Aloë fruticosa oder *arcorescens*. Strauch- oder
baumartige Aloe.

Abbildung: De Candolle plant. succulent. t. 38.

Aloë perfoliata. Mäusenförmige Aloe.

Abbildung: De Candolle plant. succulent. t. 99.

Aloë

Aloë commelini.

Aloë spicata. Nehrenförmige Aloe.

gebr: diese 4 Pflanzen sollen das seit den
ältesten Zeiten her übliche Medicament,
die Aloe, liefern.

Aloë succotrina. Succotrinische Aloe.

Abbildung: De Candolle plant. succulent. t. 85.

gebr: die Pflanze, zu Fertigung der am
häufigsten gebrauchten Aloë succotr.

Aloë officinalis. Gemeine Aloe.

Abbildung: De Candolle plant. succulent. t. 27.

gebr: die Pflanze zur Aloë hepatica oder
Leber-Aloe.

Acorus calamus. Gemeiner Kalmus.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1148.

Schkuhr bot. Handb. t. 97.

gebr: die Wurzel.

Calamus rotang. Steinrotang.

Abbildung: Rumph. Amboin. 5. t. 151.

gebr: der Saft der Frucht.

Calamus rudentum oder rotang.

Abbildung: Rumph. Amb. 5. p. 102. t. 53.

Calamus draco oder rotang. Drachenrotang.

gebr: ut supra zum Drachenblut.

Dracæna draco.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 358.

gebr: von diesem Baume kommt die beste
Sorte Drachenblut.

Berberis vulgaris. Sauerdorn, Saurachstrauch.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 904.

Schkuhr bot. Handb. t. 99.

gebr: die Beeren.

Oryza sativa. Gemeiner Reis.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 579.

Catesb. Carol. I. p. 14. t. 14.

Plenk. Icon. med. tab. 278.

gebr: der Saame.

Rumex patientia. Englischer Spinat.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 489.

gebr: die Wurzel.

Rumex acutus. Gemeine Grindwurzelpflanze.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 491.

Curtis Flor. Lond. t. 181.

gebr: die Wurzel.

Rumex alpinus. Mönchs-Rhabarbar.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 262.

gebr: die Wurzel.

Rumex acetosa. Sauerampfer.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 230.

gebr: das frische Kraut, und der Saame,
die Wurzel selten.

Veratrum album. Weiße Nieswurzelpflanze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1120.

Zorn Icon. pl. t. 295.

Blackwell Herb. t. 74.

gebr: die Wurzel.

Vera-

Veratrum sabadilla. Sabadillpflanze.

Abbildung: Retz obser. bot. pars I. p. 31. No. 107.

gebr: die Saamen.

Colchicum autumnale. Zeitlose; nackte Hure u.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 101.

Blackwell Herbar. t. 566.

gebr: die Wurzel.

Alisma plantago. Wasserwegerich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 561.

Schkuhr bot. Handb. t. 102.

gebr: Wurzel und Blätter.

Siebente Klasse.

Aesculus hippocastanum. Kofkastanie.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 107.

Zorn Icon. plant. t. 97.

gebr: die Rinde der Aeste.

Achte Klasse.

Amyris kataf. Arabischer Balsamstrauch.

gebr: das Harz, wovon Gummi myrrhae.

Amyris kapal. Arabischer Weihrauchbaum.

gebr: das Harz, wovon Gummi olibanum.

Amyris gileadensis. Gileadischer Balsambaum.

Abbildung: Berliner Jahrbuch der Pharmacie
1795. tab. I.

Amyris opobalsamum. Meccabalsam = Strauch.

Abbildung: Alp. Aegyptiae, 48. t. 60.

gebr: das Gewächs.

Amy-

- Amyris elemifera*. Occidentlicher Elemibaum.
Abbildung: Catesb. Carol. Vol. 2. t. 33. fig. 3.
gebr: das Harz.
- Amyris ambrosiaca*. Siebenblättriger Balsambaum.
Abbildung: Aublet Gujan. 337. t. 130.
gebr: das Harz.
- Amyris zeylanica*. Orientalischer Elemibaum.
gebr: das Harz.
- Lausonia inermis*. Indianische Ochsenzunge, ro-
thes Mundholz.
Abbildung: Rheed. hort. Malab. 4. p. 117. t. 57.
gebr: die Wurzel, wahre Radix alcana.
- Bursera gummifera*. Carannabaum.
Abbildung: Jacq. americ. pict. p. 49. t. 96.
gebr: das Harz.
- Vaccinium myrtillus*. Heidelbeere.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 974.
Blackwell Herb. t. 463.
Plenk Icon. pl. t. 295.
gebr: die Beeren.
- Daphne mezereum*. Seidelbast, Kellerhals.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 268.
Plenk Icon. med. t. 302.
Blackwell Herb. t. 585.
gebr: die Rinde.
- Polygonum bistorta*. Schlangenkraut.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 421.
Blackwell Herb. t. 254.
gebr: die Wurzel.

Polygonum hydropiper. Wasserpfeffer.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 108.

Blackwell Herb. t. 119.

gebr: die Blätter.

Coccoloba uvifera. Seetraube.

Abbildung: Catesb. Carol. 2. t. 96.

gebr: das Harz.

Paris quadrifolia. Einbeer, Wolfsebeer, Pariskraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 139.

Schkuhr bot. Handb. t. 109.

Blackwell Herb. t. 286.

gebr: die Blätter und Beeren.

Neunte Klasse.

Laurus cinomomum. Zellanischer Zimmetbaum.

Abbildung: Stein Handb. der Naturgesch. fig. 163.

Plenk Icon. med. t. 312.

Jacquin Stirp. Amer. t. 117.

Blackwell Herb. t. 354.

gebr: die Rinde.

Laurus cassia. Sinesischer Zimmetbaum.

Abbildung: Lamark illustr. t. 321. f. 2.

Blackwell Herb. t. 391.

Plenk Icon. med. t. 313.

Burmam Zeyl. t. 28.

gebr: die Rinde.

Laurus malabratum. Mutter-Zimmetbaum.

Abbildung: Rheed. Hort. Malabar 5. t. 53.

Lobel Icon. t. 308.

gebr: die Rinde.

Lau-

Laurus camphora. Kampferbaum.

Abbildung: Stein Handb. der Naturg. fig. 104.

Kæmpfer amoen. exot. t. 771.

Plenk Icon. med. t. 314.

Blackwell Herb. tab. 347.

gebr: die zerschnittenen Theile des Baums.

Laurus calilaban. Cullabanbaum.

Abbildung: Rumph Amboin. 2. t. 14.

gebr: die Rinde.

Laurus nobilis. Lorbeerbaum.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 110.

Plenk Icon. med. t. 315.

Blackwell Herb. t. 175.

gebr: die Blätter und Beeren.

Laurus sassafras. Sassafrasbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 267.

Catesb. Carol. Vol. I. t. 55.

Plenk Icon. med. t. 316.

gebr: Holz und Rinde.

Laurus myrrha. Myrrhenstrauch.

Abbildung: Pluck. Amalth. 52. t. 381. f. 2.

gebr: Pflanze und Wurzel.

Laurus pichurim. Pichurimbaum.

Anacardium occidentale. Westindischer Anacardienbaum.

Abbildung: Lamark illustr. t. 322.

Blackwell Herb. t. 369.

Jacquin plant. amer. t. 124.

gebr: die Nüsse.

Rhe-

Rheum palmatum. Rhabarbar mit handsförmigen
Blättern.

Abbildung: Philos. transact. Vol. 55. t. 12 et 13.

Plenk Icon. med. t. 322.

Zorn Icon. pl. t. 255.

gebr: die Wurzel.

Rheum undulatum. Rhabarbar mit krausen Blättern

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 110.

Plenk Icon. med. t. 321.

Zorn Ic. plant. t. 418.

Rheum rhaponticum. Rhapontische Rhabarbar.

Abbildung: Alpin de Rhapontico I. t. I.

Rheum compactum. Rhabarbar mit dichten Blättern.

Abbildung: Miller Diction. t. 218.

Rheum hybridum. Bastard-Rhabarbar.

Abbildung: Murray Comment. Goetting. 1779.

pag. 7. t. I.

Zehnte Klasse.

Hymenæa Courbaril. Heuschreckenbaum.

Abbildung: Lamark illustr. gen. tab. 330. fig. I.

Jacquin plant. americ. pict. pag. 63.

tab. 264. fig. 95.

gebr: das Hätz.

Cassia fistula. Röhren-Cassie.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 381.

Lamark illustr. gen. t. 332.

- Plenk Icon. med. t. 327.
gebr: die Frucht.
- Cassia lanceolata*. Orientalische Senna; Berg-
oder Mekka-Senna.
Abbildung: Nectoux voyage dans la haute Egypte
etc. avec des observations sur les
diverses espèces de Séné etc. Paris
1808. Tab. 2.
gebr: die Blätter und Hülsen.
- Cassia senna*. Italienische Senna, wilde Senna.
Abbildung: Nectoux l. c. Tab. 3.
Moris. Hist. Sect. 2. t. 24. f. 2.
gebr: die Blätter.
- Cassia auriculata*. Geröhrte Cassie.
Abbildung: Plukenet. Alm. t. 314. f. 4.
gebr: die Rinde.
- Myrospermum peruvianum*. Peruvianischer Balsam-Baum.
Abbildung: Hernandex mex. p. 53.
gebr: der Balsam.
- Guilandina moringa*. Wehennußbaum.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 386.
gebr: der nußartige Saamen.
- Hæmatoxylon campechianum*. Campechenbaum.
Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 340.
Blackwell Herb. t. 493.
Catesb. Carol. II. tab. 66.
Plenk Icon. med. t. 329.
gebr: das Holz.

Abbildung: Roxb. et Stakh. Extr. of Bruce p. 19.
tab. 3.

Coleb. Asiat. res. v. 9. p. 377.

Berlin. Jahrb. der Pharmacie 1818.

gebr: die Körner.

Ledum pallustre. Wilder oder Sumpf-Rosmarin.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1031.

Schkuhr bot. Handb. t. 117.

Plenk Icon. med. t. 337.

gebr: die Blätter.

Rhododendron chrysanthum. Sibirische Schneerose.

Abbildung: Gmelin Sibiric. t. 54.

Plenk Icon. med. t. 339.

Pallas Flor. rossic. t. 30.

gebr: die Blätter.

Rhododendron ferrugineum. Rostfarbige Alpenrose.

Abbildung: Jacquin Flor. austr. t. 255.

Zorn Icon. plant. t. 200.

gebr: die Blätter.

Arbutus uva ursi. Bärentraube.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 33.

Blackwell Herb. t. 592.

Plenk Icon. med. t. 340.

Schkuhr botan. Handb. t. 118.

gebr: die Blätter.

Pyrola umbellata. Harnkraut.

Abbildung: Gmelin Flor. Badens. T. II. tab. 2.

gebr: die Blätter.

Sty-

Styrax officinale. Storaxbaum.

Abbildung: Cavanill diss. monadelph. Vol. 6.
t. 188. fig. 2.

Lamark illustr. gener. t. 369.
gebr: das Harz.

Styrax benzoin. Wahrer Benzoebaum.

Abbildung: Houttuyn in Act. Harlem 21. p. 265
tab. 7.

Dryand in Act. anglic. 77. p. 308. t. 12.
Plenk Icon. med. t. 342.
gebr: das Harz.

Croton benzoë. Falscher Benzoebaum.

Abbildung: Jacquin Hort. Vindobon. 3. t. 100.
gebr: das Harz.

Mirobolanus chebula. Großer Myrobolanenbaum.
gebr: die Früchte.

Mirobolanus bellirica.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 849. f. 3.
Blackwell Herb. t. 401. f. 1. (schlecht)

Mirobolanus citrina.

Abbildung: Gärtner de seminib. et fruct. plantar.
2. p. 91. t. 97.
Lamark illustr. gener. t. 849. f. 5.

Aquilaria ovata. Adlerholzbaum.

Abbildung: Berlin. Jahrb. der Pharmac. 1796. t. 2.
gebr: das Holz.

Dictamnus albus. Diptam; Praxinelle.

Abbildung: Sehkubr bot. Handb. t. 114.

Jac^o

- Jacquin Flor. Austr. t. 428.
 gebr: die Wurzel.
- Ruta graveolens. Gärtnerraute, Weinraute.
 Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 115.
 Blackwell Herb. t. 7.
 gebr: die Blätter.
- Saxifraga granulata. Weißer Steinbrech.
 Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 119.
 Blackwell Herb. t. 214.
 gebr: die Wurzel.
- Saponaria officinalis. Seifenkraut.
 Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 543.
 Schkuhr bot. Handb. t. 121.
 Blackwell Herb. t. 113.
 gebr: die Wurzel.
- Sedum acre. Mauerpfeffer.
 Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 123.
 Blackwell Herb. t. 252.
 gebr: die Blätter.
- Oxalis acetosella. Sauerklee Meluluja.
 Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 980.
 Schkuhr bot. Handb. t. 123.
 gebr.: die Blätter.

Fiffte Klasse.

- Asarum europæum. Haselwurzelpflanze.
 Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 633.
 Schkuhr bot. Handb. t. 127.
 gebr: die Wurzel.

Gar-

Garcinia cambogia. Sündische Gummi-Guttae-
Baum.

Abbildung: Rheed. Malab. I. p. 41. t. 24.

Blackwell Herb. t. 392.

gebr: der ausfließende Saft.

Garcinia morella. Zeylanischer Gummi-Guttae-
Baum.

Abbildung: Gärtner de fructib. et seminib. plant.

Vol. 2. p. 106. t. 105.

gebr: der ausfließende Saft.

Canella alba. Weißer Zimmtbaum.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 399.

Swarz. in Act. Soc. Lin. Lond. Vol. I.

p. 96. t. 8.

Gärtner de fructib. et seminib. plant.

Vol. I. p. 373. t. 77. f. 2.

Brown Jam. p. 215. t. 37. f. 3.

Pluk. Phytogr. t. 160. f. 7.

gebr: die Rinde.

Lythrum salicaria. Rother Weiderich.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 671.

Schkuhr bot. Handb. t. 128.

gebr: die Blätter.

Agrimonia eupatoria. Spermennig.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 588.

Schkuhr bot. Handb. t. 128.

Blackwell Herb. t. 21.

gebr: die Blätter.

Eu-

Euphorbia officinarum. Offizinelle Euphorbie.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 349. f. 2.

Commel. hort. I. p. 21. t. 11.

Decandolle plantes grasses No. 77.

gebr: der getrocknete Saft.

Euphorbia antiquorum. Wahre Euphorbie.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 339.

Commel Hort. Mal. I. p. 23. t. 12.

gebr: der ausfließende Saft.

Euphorbia lathyris. Spring. od. Purgirkörnerkraut.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 123.

Oeder Flor. Danic. t. 23.

gebr: die Saamen.

Euphorbia esula. Gemeine Euphorbie oder
Wolfsmilch.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 163. f. 1. 2.

gebr: die Rinde der Wurzel.

Sempervivum tectorum. Gemeine Hauswurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 601.

Blackwell Herbar. t. 366.

gebr: die frischen Blätter.

Zwölfte Klasse.

Caryophyllus aromaticus. Gewürznelkenbaum.

Abbildung: Rumph Amboin. 2. t. 1-3.

Blackwell Herb. t. 338.

Steins Handb. der Naturg. fig. 107.

gebr: die noch geschlossenen Blumen und
die unreifen Beeren.

Myr-

Myrtus communis. Gemeine Myrte.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 114.

Duham. Arb. ed. nov. t. 43.

Lamarck illustr. gener. t. 419.

gebr: die Blätter und Beeren.

Myrtus pimenta. Nelkenpfeffer.

Abbildung: Sloan. Jam. 2. t. 191. fig. 1.

Blackwell Herb. t. 355.

gebr: die unreifen Beeren.

Myrtus caryophyllata. Nelkenmyrte.

Abbildung: Pluck. Almag. t. 155. f. 3.

Jacquin amer. pict. t. 76.

gebr: die Rinde.

Eucalyptus resinifera. Neuholländischer Kinobaum.

Abbildung: White Itin. p. 31.

gebr: der Gummi.

Punica granatum. Granatapfelbaum.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 131.

Blackwell Herbar. t. 97.

Lamarck illustr. gener. t. 415.

gebr: die Blumen u. Schalen der Frucht.

Amygdalus persica. Pfirsichbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 101.

Kerner ökon Pflanzen l. Pl. 101.

Pfleger arb. et frut. Badens.

gebr: die Blumen und Kerne.

Amygdalus communis. Mandelbaum.

Abbildung: Miller Icon. t. 28. f. 1.

Pflanzenreich IX. Th.

L t

Black-

Blackwell Herb. t. 105.

Zorn Icon. pl. t. 301.

gebr: die Saamen.

Prunus padus. Schwarze Traubenkirsche, Ahlkirsche, Eisenbeerstrauch.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Oeder Flor. Danic. t. 205.

Willden. arbor. 237 t. 4. f. 2.

gebr: die Rinde.

Prunus cerasus. Weichsel-Kirschenbaum, Amarellen-Kirschenbaum.

Abbildung: Pfleger arb. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 449.

gebr: die Früchte.

Prunus avium. Vogel-Kirschenbaum, süßer Kirschenbaum, Wald-Kirschenbaum.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 425.

gebr: die Früchte.

Prunus domestica. Gemeiner Zwetschenbaum, Pflaumenbaum.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 305.

gebr: die Früchte.

Prunus spinosa. Schlehdorn, Schwarzdorn.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Oeder Flor. Danic. t. 296.

Schkuhr bot. Handb. t. 132.

gebr: Blumen und Früchte.

Sor.

Sorbus aucuparia. Ebereschen: Vogelbeer-Baum.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Oeder Flor. Danic. t. 1034.

Schkuhr bot. Handb. t. 133.

Blackwell Herb. t. 73.

gebr: die Beeren.

Pyrus malus. Apfelbaum.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Oeder Flor. Danic. tab. 1011.

Schkuhr bot. Handb. t. 133.

Lamark illustr. gener. t. 435.

gebr: die Früchte.

Pyrus cydonia. Quittenbaum.

Abbildung: Jacquin Flor. Austr. t. 342.

Dubam. Arbor. Vol. I. p. 202. t. 83.

Blackwell Herb. t. 137.

gebr: die Früchte und Saamen.

Mesembryanthemum chrystallinum. Eispflanze.

Abbildung: Dillen. Elth. 231. t. 180. f. 221.

gebr: die Blätter.

Spiraea aruncus. Waldgeißbart, Waldbocksbart.

Abbildung: Pallas rossic. t. 36.

Cam. rar. hort. 26. t. 9.

gebr: Wurzel, Blätter und Blumen.

Spiraea filipendula. Rother Steinbrech.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 635.

Blackwell Herb. tab. 467.

Lamark illustr. t. 439. f. 1.

gebr: die Wurzel und Blätter.

Spiræa ulmaria. Wiesenbocksbart, Wiesenknigin.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 547.

Curtis Flor. Lond. t. 340.

Blackwell Herbar. t. 465.

gebr: Wurzel, Blätter und Blumen.

Rosa centifolia. Hundertblättrige Rose, Gartenrose.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 78.

Zorn Icon. plant. t. 600.

gebr: die Blumenblätter.

Rosa gallica. Essigrose, rothe oder Apothekerrose.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 82.

Dubam. Arb. II. t. 53.

gebr: die Blumenblätter.

Rosa alba. Weiße Rose.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Bad.

Besser Eyst. Vern. 6. t. 3. f. 1.

Blackwell Herb. t. 73.

Oeder Flor. Danic. t. 1215.

gebr: die Blumenblätter.

Rosa canina. Gemeine Heckenrose, Hundrose.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herb. t. 8.

Oeder Flor. Danic. t. 555.

Cramer Forstw. t. 36.

gebr: die Blumen.

Ru-

Rubus idæus. Himbeerstaude.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Oeder Flor. Danic. t. 788.

Blackwell Herbar. t. 289.

gebr: die Blätter und Früchte.

Rubus chamæmorus. Norwegische Brombeere.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1.

Linn. flor. lapponic. 208. t. 5. f. 1.

Till Absens. 47. t. 159.

gebr: die Beeren.

Fragaria vesca. Erdbeerpflanze.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 135.

Blackwell Herb. t. 77.

gebr: Wurzel, Blätter und Beere.

Potentilla anserina. Gänserich, Silberblatt.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 544.

Blackwell Herb. t. 6.

gebr: Wurzel und Blätter.

Potentilla reptans. Fünffingerkraut.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 136.

Blackwell Herbar. t. 454.

Oeder Flor. Danic. t. 1164.

gebr: Wurzel und Blätter.

Tormentilla erecta. Blut- oder Ruhrwurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 589.

Blackwell Herb. t. 445.

Schkuhr bot. Handb. t. 136.

gebr: die Wurzel.

Genra

Geum urbanum. Benediktenwurz, Nelkenwurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 672.

Blackwell Herbar. t. 253.

Schkuhr bot. Handb. t. 137.

gebr: die Wurzel.

Dreyzehnte Klasse.

Capparis spinosa. Kapperstrauch.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 417.

Lamark illustr. gener. t. 446.

gebr: die Rinde der Wurzel.

Chelidonium majus. Schöllkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 676.

Blackwell Herbar. t. 91.

Schkuhr bot. Handb. t. 140.

gebr: Wurzel und Blätter.

Papaver rhoeas. Klatschrose, rothe Kornrose.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 2.

Curtis Flor. Londinens. t. 215.

gebr: die Blumen.

Papaver somniferum. Schlafmacher Mohn.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 482. 83.

Zorn Icon. plant. t. 371.

Sibthorp. Flor. Græc. t. 491.

gebr: Saamentapseln, Saamen, Saft,
Blätter.

Nymphaea alba. Große weiße Seeblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 602.

Black-

der abgebildeten Handels-Pflanzen. 335

Blackwell Herbar. t. 498. 499.

Schkuhr bot. Handb. t. 142.

gebr: Wurzel und Blumen.

Bixa orleana. Orleanbaum.

Abbildung: Sloan. hist. Jam. 2. p. 52. t. 181. f. 1.

Commel. hort. 1. pag. 65. fig. 33.

gebr: der die reifen Saamen umgebende
Teig.

Tilia europæa. Lindenbaum.

Abbildung: Pfleger arbor. et frutic. Badens.

Blackwell Herbar. t. 469.

Oeder Flor. Danic. t. 553.

Schkuhr bot. Handb. t. 141.

gebr: die Blüthen, die mittlere Rinde und
die Kohlen des Holzes.

Stalagnitis cambogioides oder *Guttifera vera*.

Stamischer Gummi-Guttaebaum.

gebr: von diesem Baume wird ebenfalls
das bey der Gattung *Garcinia* bes-
schriebene Gummi guttæ erhalten.

Calophyllum inophyllum. Großes Schönblatt.

Abbildung: Rumph Amboia. Vol. 2. t. 71.

Burmann Zeylon. t. 60.

Rheed. Hort. Malab. 4. t. 38.

gebr: das Gummi.

Thea bohea. Theestrauch.

Abbildung: Breyn cent. t. 112.

Blackwell Herbar. t. 352. 351.

Kämpfer Japon. t. 606.

gebr: die Blätter.

Ci-

Cistus creticus. Cretische Eistenrose.

Abbildung: Jacquin Icon, rar. t. 95.

Blackwell Herbar. t. 197.

Sibthorp Flor. græc. t. 495.

gebr: das aus den Blättern und Zweigen
schwizende Gummi.

a. *Cistus ladaniferus*. Ladancistenrose.

Abbildung: Commel. hort. l. p. 39. t. 20.

b. *Cistus ledon*. Ledoncistus.

Abbildung: Duhamel arbor. l. t. 66.

Tabernæ mont. Icon. 1064.

c. *Cistus laurifolius*. Lorbeerblättrige Eisturrose.

Abbildung: ist keine vorhanden.

d. *Cistus cyprius*. Cyprische Eisturrose.

Diese 4 Arten von *Cistus* liefern gleichfalls
Gummi laudanum.

Pæonia officinalis. Sictrose, Pfingstrose.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 65.

Kerner ækon. Pflanz. 3. t. 239.

gebr: die Wurzel, Blumen und Saamen.

Delphinium consolida. Rittersporn.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 683.

Blackwell Herbar. t. 26.

gebr: Blätter und Blumen.

Delphinium staphisagria. Stephanekraut, Käusekraut

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 145.

Blackwell Herbar. t. 265.

gebr: die Saamen.

Aco-

Aconitum vulgare. Gemeiner Eisenhut.

Abbildung: Clusius Histor. 2. p. 96. f. 2.

Kœlle de Aconit.

Sturm Flor. germanic. sub nom. A.

Napelli.

Sprengel Geheimnisse der Natur, 1.

p. 278. t. 15. f. 26 & 35. t. 24.

f. 12 — 14.

gebr: die Blätter.

Aconitum napellus. Wahrer Eisenhut, Sturmhut, Mönchekappe.

Abbildung: Clusius Histor. 2. p. 96. fol. 1.

Jacq. Flor. Austr. 4. p. 42. t. 38r.

Aconitum intermedium. Mittlerer Eisenhut.

Aconitum tauricum. Taurischer Eisenhut.

Aconitum paniculatum. Rispenförmiger Eisenhut.

Abbildung: Störk libellus de Aconit.

Clus. Histor. 2. p. 97. f. 1.

Aconitum rostratum. Geschnäbelter Sturmhut.

Abbildung: Clusius Hist. 2. p. 97. fol. 2.

Drimis winteri. Winter-Rindenbaum.

Abbildung: Commentat. Gœtting. Vol. 9. t. 7.

Lamark illustr. gener. t. 494.

gebr: die Rinde.

Aquilegia vulgaris. Akeley.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 665.

Pflanzenreich IX. T. 9.

u u

Black-

Blackwell Herb. t. 409.

gebr: Blätter, Blumen und Saame.

Nigella sativa. Schwarzkümmel.

Abbildung: Mill. diction. t. 187. f. 1.

Zorn icon. pl. t. 119.

gebr: der Saamen.

Illicium anisatum. Sternanisbaum.

Abbildung: Kämpfer Amœnit. exot. 880. t. 881.

gebr: der Saame.

Anemone hepatica. Edelleberkraut, Osterblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 610.

Blackwell Herb. t. 207.

Schkuhr bot. Handb. t. 150.

gebr: Blätter und Blumen.

Anemone pratensis. Wiesenküchenschelle.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 611.

Schkuhr bot. Handb. t. 150.

gebr: die Blätter.

Anemone pulsatilla. Gemeine Küchenschelle.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 153.

Bulliard Herb. t. 48.

Clematis erecta. Brennende Waldrebe.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 291.

Jacquin. Flor. Austr. t. 291.

gebr: die Blätter.

Ranunculus ficaria. Felswarzenkraut, Kleines
Schöllkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 499.
Blackwell Herb. t. 51.

gebr: Wurzel und Blätter.

Helleborus niger. Schwarze Nieß- oder Christwurz.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 506, 507.
Jacquin Flor. Austr. t. 201.
Kerner ökonom. Pflanz. I. t. 28.

gebr: die Wurzel.

Helleborus foetidus. Stinkende Nießwurz.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 57.
Bulliard Herb. t. 71.

gebr: die Blätter.

Helleborus officinalis. Offizinelle oder orientals-
che Nießwurz.

Abbildung: Sibthorp Flor. græc. t. 523.
gebr: ehemals die Wurzel.

Vierzehnte Klasse.

Ajuga pyramidalis. Pyramidenförmiger Günsel.
Gulden- oder Steingünsel.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 155.
Oeder Flor. Danic. t. 185.

gebr: die Blätter, doch selten.

Ajuga chamæpitys. Schlagkraut, Harzkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 733.

Blackwell Herb. t. 528.

Plenk Icon. med. t. 475.

gebr: die Blätter.

Teucrium cretioum. Cretischer Gamander.

Abbildung: Alpin. exot. t. 102. pag. 103.

gebr: die Blätter und Blüthe.

Teucrium marum. Amberkraut, Katzenkraut,

Mastkraut.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 47.

Plenk Icon. med. t. 474.

gebr: die Blumen.

Teucrium scordium. Lachen-Knoblauch.

Abbildung: Oeder Flor. Dan. t. 593.

Blackwell Herb. t. 475.

gebr: die Blätter.

Teucrium chamædrys. Gamander, Edelgamander.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 180.

Schkuhr bot. Handb. t. 155.

gebr: die Blätter.

Satureja hortensis. Bohnenkraut, Gartensaturey.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 156. No. 1562.

Blackwell Herb. t. 419.

gebr: die Blätter.

Hysopus officinalis. Hysop; Diop.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 296.

Jacquin Flor. Austr. t. 254.

gebr: die Blätter.

Nepeta cataria. Katzenminze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 580.

Blackwell Herb. t. 287.

gebr: die Blätter, doch selten.

Lavendula spica. Gemeiner Lavendel.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 157.

Blackwell Herb. t. 294. 295.

gebr: die Blumen, Lavendelblätche genannt.

Lavendula stoechas. Schopf-Lavendel.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 241.

Lobel. Icon. 429.

Bl. Borellier Icon. 301.

gebr: die Blumen, doch selten.

Sideritis hirsuta. Gliedkraut, Bernkraut.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 388.

Cavanille Icon. 4. p. 1. t. 302.

gebr: die Blätter, doch selten.

Mentha crispa. Krauseminze.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 290.

Plenk Icon. med. t. 467.

Rivin. monop. irregular. t. 50.

gebr: die Blätter.

Men-

Mentha sylvestris. Pfeffermünze, Rossmünze.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 484.

Blackwell Herb. t. 292.

Lob. Icon. 509. t. 603.

gebr: die Blätter.

Mentha piperita. Pfeffermünze.

Abbildung: Woodville med. bot. t. 169.

Blackwell Herb. t. 291.

Zorn Icon. plant. t. 56.

Plenk Icon. med. plant. t. 468.

gebr: die Blätter.

Mentha pulegium. Poley.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 302.

Zorn Icon. plant. t. 490.

Plenk Icon. med. plant. t. 469.

gebr: die Blätter.

Glechoma hederacea. Gudelrebe, Gundermann.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 159.

Oeder Flor. Danica. t. 789.

Blackwell Herbar. t. 225.

gebr: die Blätter.

Lamium album. Weiße Laubnessel, weißer Bienenfang.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 594.

Schkuhr bot. Handb. t. 159.

Blackwell Herbar. t. 33.

gebr: die Blumen.

Beto-

Betonica officinalis. Betonien, Wiesenbetonien.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 726.

Schkuhr bot. Handb. t. 168.

Blackwell Herb. tab. 56.

gebr: die Blätter.

Stachys recta. Beschreibkraut, Abnehmkraut.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 361.

Jacquin Flor. Austr. t. 359.

gebr: die Blätter.

Marrubium vulgare. Weißer Andorn, gemeiner
Dorn.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1036.

Blackwell Herb. t. 479.

Schkuhr bot. Handb. t. 162.

gebr: die Blätter.

Origanum creticum. Spanischer Hopfen.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 164.

gebr: die blühenden Spitzen der Pflanze.

Origanum dictamnus. Candische Dosten.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 462.

Zorn Icon. plant. t. 542.

gebr: die Blätter.

Origanum vulgare. Gemeine Dosten, Wohlgemuth.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 638.

Blackwell Herb. t. 280.

Schkuhr bot. Handb. t. 165.

gebr: die Blätter.

Ori-

- Origanum majorana. Majoran.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 310.
 Zorn Icon. pl. t. 41.
 gebr: die Blätter.
- Thymus serpyllum. Wilder Thymian, Quendel.
 Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1165.
 Blackwell Herb. t. 418.
 Schkuhr botan. Handb. t. 164.
 gebr: die Blätter.
- Thymus vulgaris. Thymian, Garten-Thymian.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 211.
 Schkuhr bot. Handb. t. 164.
 gebr: die Blätter.
- Thymus calamintha oder Melissa calamintha.
 Berg-Calaminthe, Berg-Melisse.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 166.
 Bulliard Herb. t. 201.
 gebr: die Blätter.
- Melissa officinalis. Garten- oder Citronen-Melisse.
 Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 164.
 Blackwell Herbar. t. 27.
 gebr: die Blätter.
- Melissa nepeta. Poley- Feld-Melisse.
 Abbildung: Blackwell Herb. t. 167.
 gebr: die Blätter.
- Meli-

Melitis melissophyllum. Bienen-Honig-Melisse,
Melissenblatt.

Abbildung: Jacquin flor. Austr. t.
Schkuhr bot. Handb. t. 166.

gebr: die Blätter.

Dracocephalum moldavica. Türkische Melisse.

Abbildung: Lobel Icon. t. 515.
Blackwell Herb. t. 551.
Schkuhr bot. Handb. t. 165.

gebr: die Blätter.

Ocimum basilicum. Gemeines Basilienkraut,
Basilicum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 104.
Lobel Icon. 503.
Rheed. Mal. 10. p. 269. t. 85.

gebr: die Blätter.

Prunella vulgaris. Gemeine Prunelle, Braunheil,

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 910.
Blackwell Herb. t. 24.
Schkuhr bot. Handb. t. 168.

gebr: die Blätter.

Verbena officinalis. Eisenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 628.
Blackwell Herbar. t. 41.
Schkuhr bot. Handb. t. 3.

gebr: die Blätter, doch selten.

- Euphrasia officinalis.* Augentrost.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 525.
 Blackwell Herb. t. 427.
 Schkuhr bot. Handb. t. 169.
 gebr: die Blätter, selten mehr.
- Pedicularis palustris.* Sumpfläusekraut.
Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 171.
 Oeder Flor. Danic. t. 225.
 Bulliard Herb. t. 129.
 gebr: die Blätter.
- Antirrhinum linaria.* Gelbes Leinkraut, gemeines
 Schwemmanl.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 982.
 Blackwell Herbar. t. 115.
 Bulliard Herbar. t. 261.
 gebr: die Blätter.
- Scrophularia nodosa.* Knotige Braunwurz.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1167.
 Blackwell Herbar. t. 87.
 gebr: Blätter und Wurzel.
- Scrophularia aquatica.* Wasser-Braunwurz.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 507.
 Blackwell Herb. t. 86.
 Schkuhr bot. Handb. t. 73.
 gebr: die Blätter.
- Digitalis purpurea.* Großer purpurrother Fingerhut.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 74. Black-

der abgebildeten Handels-Pflanzen. 347

Blackwell Herb. t. 16.

Schkuhr bot. Handb. t. 174.

gebr: die Blätter.

Vitex agnus castus. Reuschlammstrauch, Abrahamsbaum.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 177.

Blackwell Herb. t. 139.

gebr: die Früchte, unter dem Namen
Wuchspfeffer.

Fünfzehnte Klasse.

Lepidium sativum. Gartentresse.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 23.

Schkuhr bot. Handb. t. 180.

Lobel. Icon. 212.

gebr: Kraut und Saame.

Thlaspi bursa pastoris. Läschelkraut, Hirtentasche.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 729.

Blackwell Herb. t. 5.

Bulliard Herb. t. 223.

gebr: die Blätter.

Cochlearia officinalis. Löffelkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 135.

Blackwell Herb. t. 227.

Plexk Icon. med. t. 512.

gebr: das frische Kraut.

Æ 2

Coch-

Cochlearia armoracia. Meerrettig.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 415.

Schkuhr bot. Handb. t. 181.

Plenk Icon. med. t. 513.

gebr: die Wurzel.

Cardamine pratensis. Wiesenkreffe.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1039.

Blackwell Herbar. t. 223.

Zorn Icon. plant. t. 51.

gebr: die Blätter.

Sisymbrium nasturtium. Brunnenkreffe.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 690.

Blackwell Herb. t. 260.

Schkuhr bot. Handb. t. 186.

gebr: die Blätter.

Erysimum officinale. Wegsenf.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 560.

Blackwell Herb. t. 28.

Bulliard Herb. t. 259.

gebr: Blätter und Saamen.

Cheiranthus cheiri. Gelbe Viole, Goldlack.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 179.

Bulliard Herb. t. 349.

gebr: die Blumenblätter.

Brassica napus. Rübsaat, Rebe.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 224.

Lobel Icon. 200.

gebr: die Saamen.

Brassica rapa. Weiße Rübe.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 226.

Zorn Icon. plant. t. 582.

gebr: die frische Wurzel.

Sinapis nigra. Schwarzer Senf.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 446.

gebr: die Saamen.

Raphanus sativus. Rettig.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 87.

Lobel Icon. 202.

gebr: die frische Wurzel.

Sechzehnte Klasse.

Tamarindus indica. Tamarindenbaum.

Abbildung: Rumph. Amboin. 2. t. 23.

Blackwell Herbar. t. 201.

Jacquin Pl. Amer. t. 13.

gebr: die Frucht.

Geranium robertianum. Storchschnabel, Rus-

prechtskraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 694.

Blackwell Herbar. t. 480.

Zorn Icon. plant. t. 100.

gebr: die Blätter, doch selten.

Al-

Althea officinalis. Elbisch, Althee.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 530.

Blackwell Herbar. t. 90.

Schkuhr bot. Handb. t. 192.

gebr: Wurzel, Blätter, Blüthe u. Saamen.

Alcea rosea. Pappelrose, Halsrose.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 191.

Blackwell Herb. t. 54.

Cavanill. dissert. 2. p. 91. t. 28. f. 1.

gebr: die Blumen.

Malva rotundifolia, Käsepappel.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 192.

Blackwell Herb. t. 22.

Oeder Flor. Danic. tab. 721.

Plenk Icon. med. t. 541.

gebr: Blätter und Blumen.

Malva silvestris. Pferdewappel, Waldmalve.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 721.

Blackwell Herb. t. 22.

Cavanill. dissert. 2. p. 78. t. 26. f. 2.

gebr: die Blätter.

Gossypium herbaceum. Baumwollenstaude.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 357.

Cavanill. dissert. 6. p. 310. t. 164. f. 2.

gebr: die Wolle.

Hibiscus abelmoschus. Bismarckstrauch.

Abbildung: Rumph. Amb. T. 4. p. 38. t. 15.

Rheed.

Rheed. Hort. Malab. II. p. 71. t. 38.

Cavanill. dissert. 3. p. 167. t. 62.

gebr: die Saamen.

Mimosa catechu. Catechu-Acazie.

Abbildung: Plukenet. Alm. t. 329. f. 2.

Roxb. Coromand. II. p. 40. t. 175.

gebr: dieser Baum liefert auch die sogenante japanische Erde, gleich den beyden folgenden Arten.

Mimosa leucophea. Nichtgraue Acazie.

Abbildung: Roxb. Coromand. II. p. 27. t. 150.

Mimosa arabica. Arabische Acazie.

Abbildung: Plucken. Alm. 3. t. 251. f. 1.

Mimosa nilotica. Wahre Acazie.

Abbildung: Vesling de plant. Aegypt. p. 8.

Blackwell Herb. t. 377.

J. Bauh. Histor. 1. p. 429.

gebr: das aus dem Stamm fließende Gummi.

Mimosa senegal. Senegal-Acazie.

Abbildung: Prosp. Alpin. de plant. Aegypt. ed.

Vesling p. 15.

Blackwell Herb. t. 345.

gebr: ingleichem das Gummi.

Mimosa gumifera. Gummi-Acazie.

Abbildung: ist keine vorhanden.

gebr: ingl. das Gummi.

Inga

Inga sassa. Mimosa sassa. Sassa gummifera;
auch Acacia myrrhifera. Myrrhen-
Acacie.

Abbildung: Bruce Hin. Edit. germ. Vol. 5. p. 39.
tab. 4 & 5.

gebr: der aus dem Baum fließende Saft.

Siebenzehnte Klasse.

Fumaria bulbosa. Hohlwurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 605.

Blackwell Herbar. t. 534.

gebr: die Wurzel.

Fumaria officinalis. Gemeiner Erdrauch, Lat-
bentropf.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 940.

Blackwell Herb. t. 237.

Lobel. Icon. p. 757.

gebr: die Blätter.

Polygala vulgaris. Gemeine Kreuzblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 316.

Jacquin Flor. Austr. V. t. 413.

gebr: Wurzel und Blätter.

Polygala amara. Bittere Kreuzblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1169.

Jacquin Flor. Austr. V. t. 412.

gebr: Wurzel und Blätter.

Poly-

Polygala senega. Senegalpflanze, Klapperschlangengewürz.
gen: Wurzel.

Abbildung: Neues Verh. Jahrb. der Pharm. 1804.

II. S. 8. 113. t. 3.

Linn. Amœnit. academ. 2. p. 139. t. 2.

gebr: die Wurzel.

Pterocarpus santalinus. Rother Santelbaum.

Abbildung: ist keine vorhanden.

gebr: das Holz.

Baryosma tongo. Tonkobaum.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 601.

Aublet Gujan. 3. p. 740. t. 296.

gebr: die Kerne der Frucht.

Geoffræa inermis. Wehrloser Wurmlindenbaum.

Abbildung: Act. Lond. Vol. 67. p. 512. t. 10.

gebr: die Rinde.

Geoffræa surinamensis. Surinamischer Wurmlindenbaum.

Abbildung: Bondt. Dissert. de Cortice geoffrææ

Surinam. c. tab. Lugd. Bat. 1788.

Plenk Icon. med. t. 576.

gebr: die Rinde.

Butea frondosa. Dichtbelaubter Buteabaum.

Abbildung: Rheed. Malab. 6. t. 16. 17.

gebr: der von dem Baum gezogene Gummilack.

Butea superba. Schöner Buteabaum.

Abbildung: Roxb. Coromand. I. p. 21. t. 21.

gebr: wie der vorige.

Spartium scoparium. Pflriemen, Besenginstler.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 313.

Blackwell Herb. t. 244.

Schkuhr bot. Handb. t. 195.

gebr: Blätter, Blüthe und Saamen.

Ononis spinosa. Stachelige Hauhechel, Dachsenbrech

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 783.

Blackwell Herbar. t. 301.

Zorn Icon. plant. t. 132.

gebr: Wurzel und Blätter.

Dolichos pruriens. Juckende Fasel, Kuhfräse.

Jacquin americ. 201. tab. 122.

Rumph Amboin. 5. p. 393. t. 142.

gebr: die Hülsenfrucht.

Dolichos urens. Brennende Fasel.

Abbildung: Plum. americ. 92. t. 107.

Jacquin americ. 202. t. 182. f. 84.

Plukenet. t. 213. f. 2.

gebr: die Borsten der Hülse.

Cicer arietinum. Richeererbse.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 202.

Blackwell Herb. t. 577.

Lamark illustr. gener. t. 632.

gebr: die Saamen.

Liquiritia officinalis. Glatte Süßholzpflanze.

Abbildung: Plenck Icon. med. t. 570.

Blackwell Herbar. t. 495.

Lamark illustr. t. 605. f. 2.

gebr: die Wurzel.

Gly-

Glycyrrhiza echinata. Stachelichte Süßholz-pflanze.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 205.

Lobel Icon. 2. p. 85.

Jacquin hort. Vind. I. p. 41. t. 95.

gebr: die Wurzel.

Indigofera anil. Anilindigo, Anilpflanze.

Abbildung: Rumph Amboin. 5. p. 220. t. 80.

gebr: die Pflanze.

Indigofera tinctoria. Gemeine Indigopflanze;

Färber: Indigo.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 596.

Rumph Amboinens. t. 80.

Zorn Icon. plant. t. 183.

gebr: die Pflanze.

Galega officinalis. Geißraute.

Abbildung: Sturm Deutschlands Flora 1. 6.

Schkuhr bot. Handb. t. 208.

Blackwell Herbar. t. 92.

gebr: die Blätter.

Astragalus exscapus. Schaftloser Astragalus.

Abbildung: Jacquin Icon. rar. t. 561.

Pallas Astrag. t. 64.

Girtaner von der ven. Krankh. mit der

Abbildung des Astrag. exscapus.

gebr: die Wurzel.

Astragalus creticus. Cretischer Traganthstranch.

Abbildung: Sibthorp Flor. Græc. t. 736.

Decand Astragal. p. 196. t. 33.

Tournef. Voyage en Levant. 1. t. 21.

gebr: der Gummi-Traganth.

292

Astra-

Astragalus sempervirens. Immergrüner Tragantstrauch.

Abbildung: Sibthorp Flor. græc. t. 735.
Pallas Astragal. pag. 3. t. 3.
gebr: ut supra.

Astragalus gummifer. Unächter Tragantstrauch.

Abbildung: Labillard Journ. Phys. 1790. p. 53. t. 1.
gebr: ingleichen.

Trifolium melilotus officinal. Stencklee, Meliloten.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 934.

Blackwell Herb. t. 80.

Zorn Icon. plant. t. 204.

gebr: Blätter und Blumen.

Trigonella foenum græcum. Griechisches Hen.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 211.

Blackwell Herb. t. 384.

gebr: die Saamen.

Achtzehnte Klasse.

Theobroma cacao. Cacaobaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 373.

Catesb. Carol. III. p. 6. t. 6.

Zorn Icon. plant. t. 308.

gebr: die Saamen.

Citrus medica. Citronenbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 361. 362.

Plenk Icon. plant. med. t. 579.

Zorn Icon. plant. t. 495.

gebr: die Früchte.

Citrus aurantium. Pomeranzen- oder Drangenbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 349.

Plenk Icon. med. t. 579.

Lamark illustr. gener. t. 639. f. 2.

gebr: Blüten, Blätter, unreifen Früchte,
und Schalen der reifen Früchte.

Melaleuca leucadendron. Cajeputbaum.

Abbildung: Houttuyn Pflanzensyst. 2. t. 15.

Blackwell Herbar. t. 584. 585.

Rumph amboin. 2. p. 72. t. 16.

gebr: das aus den Blättern bereitete Del.

Hypericum bacciferum. Beerentragender Gummiguttibaum.

Abbildung: Marcgr. Bras. 96. fig. 1.

gebr: das Gummi.

Hyperic. sessilifolium. Unächter Gummiguttibaum.

Abbildung: Aublet Flor. Gujan. 4. t. 312. f. 2.

Hypericum perforatum. Gemeines Johannis-
kraut, Hartheu.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1043.

Blackwell Herb. tab. 15.

Zorn Icon. plant. t. 31.

gebr: die Blätter und Blüten.

Neunzehnte Klasse.

Tragopogon pratense. Gelber Wiesenbocksbart.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 906.

Schkuhr bot. Handb. t. 214.

Lamark illustr. gener. t. 646.

gebr: die Wurzel.

Scor-

Scorzonera hispanica. Garten-Scorzonere; Hasfer- oder Schwarzwurz.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 406.

Zorn Icon. pl. t. 405.

gebr: die Wurzeln.

Lactuca virosa. Betäubender Lattig, Giftlattig.

Abbildung: Schkuhr botan. Handb. t. 217.

gebr: die Blätter.

Lactuca scariola. Wilder Lattig.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1227.

Moris Histor. 3. p. 58. Sect. 7. t. 2. f. 16.

gebr: die Blätter.

Leontodon taraxacum. Löwenzahn, Pfaffenröblein.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 219.

Blackwell Herb. t. 1. et 501.

Oeder Flor. Danica. t. 574.

gebr: die Wurzel und Blätter.

Cichorium intybus. Wegwart, Cichorien, Hundläufte.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 907.

Blackwell Herb. t. 183.

Schkuhr bot. Handb. t. 226.

gebr: die Wurzel.

Arctium lappa. Gemeine Klette. Unter diesem Namen sind eigentlich nach Gmelin (Flora Badens. T. III. p. 353 et seq.) drey Arten begriffen, nämlich:

Arctium tomentosum. Spinnenklette.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 217.

Schkuhr bot. Handb. t. 227.

Oeder Flor. Danic. t. 642.

Ar-

Arctium majus. Große gemeine Klette.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 117.

Schkuhr bot. Handb. t. 227.

Arctium minus. Kleine Klette.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 227.

gebr: von sämtl. die Wurzel, ohne Untersch.

Carduus marianus. Mariendistel.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 79.

Schkuhr bot. Handb. t. 228.

Zorn Icon. plant. t. 130.

gebr: Wurzel, Blätter und Saamen.

Carlina acaulis. Ederwurz, Roswurz; wilde
Artischocke.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 222.

Blackwell Herbar. t. 532.

Zorn Icon. plant. t. 168.

gebr: die Wurzel.

Carthamus tinctorius. Saflor.

Abbildung: Lamark illustr. gen. tab. 661. fig. 3.

Zorn Icon. plant. t. 140.

gebr: die Blumen.

Tanacetum vulgare. Gemeiner Rheinfarn,
Wurmkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 871.

Blackwell Herb. t. 464.

Zorn Icon. plant. t. 246.

gebr: Blumen und Saame.

Artemisia judaica. Jüdischer Beyfuß.

Zorn Icon. plant. t. 367.

Pluk. Alm. t. 73. f. 1.

Ar-

- Artemisia contra.* Persischer Beyfuß.
Abbildung: Handb. der pharm. Bot. Bl. LXXIV.
f. 355.
- Artemisia santonica.* Wurmwidriger Beyfuß.
Abbildung: Gmelin Sibiric. 2. t. 51.
Zorn Icon. pl. t. 240.
- Artemisia palmata.* Handsförmiger Beyfuß.
- Artemisia abrotanum.* Stabkraut, Eberraute.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 555.
- Artemisia pontica.* Römischer Beyfuß.
Abbildung: Jacquin Flor. austr. t. 99.
Blackwell Herb. t. 527.
gebr: die Blätter.
- Artemisia absinthium.* Wermuth.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 17.
Zorn Icon. plant. t. 34.
Lamark illustr. gener. t. 695.
Gmelin. Sibir. 2. p. 129. t. 63.
gebr: die Blätter und blühenden Spitzen.
- Artemisia vulgaris.* Gemeiner Beyfuß.
Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1176.
Blackwell Herbar. t. 431.
Lamark illustr. gener. t. 695.
gebr: die Blätter.
- Artemisia dracunculus.* Dragant, Kaisersalat.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 116.
Gmelin Sibir. 2. p. 126. t. 59. 60. f. 1.
Zorn Icon. plant. t. 297.
gebr: die Blätter.

Gnaphalium arenarium. Gelbe Kagenpfdchen,
gelbes Ruhr-Motten- oder Schabenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 641.

Blackwell Herbar. t. 524.

Zorn Icon. plant. t. 352.

gebr: die Blätter.

Gnaphalium dioicum. Rothe oder weiße Kagen-
pfdchen, rothe Mäusbröchen, Engels-
blümchen.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1228.

Bulliard Herb. t. 325.

gebr: die Blumen.

Tussilago farfara. Huflattig, Hossfuß.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 204.

Schkuhr bot. Handb. t. 242.

Oeder Flor. Danic. t. 595.

gebr: Wurzel, Blätter und Blüthen.

Tussilago petasites. Großblättriger Huflattig,
Pestilenzwurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 842.

Blackwell Herb. t. 222.

Schkuhr bot. Handb. t. 242.

gebr: die Wurzel.

Senecio sarracenicus Hendnischs Kreuzkraut.

Sarazenisches Kreuzkraut.

Abbildung: Jacquin Flor. Austr. t. 186.

Zorn Icon. plant. t. 410.

gebr: die Blätter.

Solidago virgaurea. Goldruth, heydn. Wundkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 663.

Blackwell Herb. t. 169.

Zorn Icon. plant. t. 383.

gebr: die Blätter.

Inula helenium. Mant, Mantwurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 728.

Blackwell Herbar. t. 473.

Zorn Icon. plant. t. 475.

gebr: die Wurzel.

Arnica montana. Falkkraut, Wolberley.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 63.

Schkuhr botan. Handb. t. 248.

Blackwell Herb. t. 595.

Zorn Icon. plant. t. 30.

gebr: Wurzel, Blätter und Blumen.

Bellis perennis. Maekiben, Gänseblümlein.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 503.

Schkuhr bot. Handb. t. 251.

Blackwell Herb. t. 200.

gebr: Blätter und Blumen.

Chrysanthemum luccanthemum. Große Maekibe,
große Gänseblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 994.

Blackwell Herb. t. 42.

Zorn Icon. plant. t. 483.

gebr: Blätter und Blumen.

Matricaria parthenium. Mutterkraut, Metram.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 674.

Black-

Blackwell Herbar. t. 192.

Zorn Icon. plant. t. 162.

gebr: Blätter und Blumen.

Matricaria camomilla. Wahre Kamille, gemeine Kamille.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 2536.

Zorn Icon. plant. t. 139.

Blackwell Herb. t. 298.

gebr: die Blumen.

Anthemis nobilis. Römische Kamille, edle Kamille.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 161.

Blackwell Herb. t. 526.

gebr: die Blumen.

Anthemis pyrethrum. Bertram; Bertramwurze; Speichelwurze.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 683. f. 4.

Zorn Icon. plant. t. 205.

Blackwell Herbar. t. 300.

gebr: die Wurzel.

Achillea ptarmica. Wiesenbertram; weißer Rheinfarn; deutscher Bertram.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 643.

Lamark illustr. t. 683. f. 2.

Blackwell Herb. t. 276.

gebr: Wurzel, Blätter und Blumen.

Achillea millefolium. Schaafgarbe, Schaafrippe, Garbentraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 737.

Blackwell Herb. t. 18.

Schkuhr bot. Handb. t. 255.

Zorn Icon. plant. t. 29.

gebr: die Blätter und Blumen.

Achillea nobilis. Edle Schaafergarbe.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 255.

Zorn Icon. plant. t. 279.

gebr: Blätter und Blumen.

Centaurea cyanus. Blaue Kornblume, Flockenblume.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 993.

Blackwell Herbar. t. 270.

Zorn Icon. plant. t. 433.

gebr: die Blumen.

Centaurea benedicta. Kardobenedikten.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 476.

Zorn Icon. plant. t. 122.

Gärtner de fructib. 2. p. 385. t. 162. f. 5.

gebr: die Blätter und Saamen.

Calendula officinalis. Ringelblume.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 106.

Zorn Icon. plant. t. 58.

gebr: Blätter und Blumen.

Zwanzigste Klasse.

Orchis bifolia. Zweyblättriges Knabenkraut;

weiße Stendelmurz.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 235.

Schkuhr bot. Handb. t. 271.

Black-

Blackwell Herbar. t. 588.

Haller Histor. plant. II. p. 146. No.

1285. t. 35.

gebr: die Wurzel.

Orchis morio. Weibliches Knabenkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 253.

Haller Histor. plant. t. 33.

Vaill. Paris. t. 31. f. 13. 14.

Zorn Icon. plant. t. 267.

Schkuhr bot. Handb. t. 271.

gebr: die Wurzel, Salepwurzel genannt.

Orchis mascula. Männliches Knabenkraut.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 53.

Haller loc. cit. t. 33.

Oeder Flor. Danic. t. 457.

Schkuhr bot. Handb. t. 271.

gebr: die Wurzel.

Orchis pyramidalis. Pyramidenförmiges Knabenkraut.

Abbildung: Jacquin flor. Austr. t. 266.

Haller loc. cit. t. 35. die Figur zur linken Seite.

Orchis militaris. Großes Knabenkraut.

Abbildung: Jacquin Icon. rar. 3. t. 598.

Haller Histor. II. p. 140. No. 1277. t. 28.

Epidendrum vanilla. Vanillenwinde.

Abbildung: Catesb. Carol. 3. t. 7.

Black-

Blackwell Herbar. t. 590.

Zorn Icon. plant. t. 288.

gebr: die Schoten.

Aristolochia serpentaria. Schlangen-Osterluzey.

Abbildung: Catesb. Carol. Vol. I. t. 29.

Pluk. alm. 50. t. 148. f. 5.

gebr: die Wurzel.

Aristolochia rotunda. Rinde Osterluzey.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 256.

Zorn Icon. plant. t. 125.

gebr: die Wurzel.

Aristolochia longa. Lange Osterluzey.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 257.

Zorn Icon. plant. t. 201.

gebr: die Wurzel.

Aristolochia clematitis. Gemeine Osterluzey.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 276.

Blackwell Herb. t. 255.

Bulliard Herb. t. 39.

gebr: die Wurzel.

Ein und zwanzigste Klasse.

Carex arenaria. Sandriedgras, Sandsegge, deutsche Saffaparille.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 286. B. No. 6.

gebr: die Wurzel.

Phyllanthus emblica. Kleiner Mirobalanenbaum.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 347.

Blackwell Herb. t. 400. 401.

Rumph

Rumph Amboin 7. p. I. t. I.

gebr: die Früchte.

Morus nigra. Schwarzer Maulbeerbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 126.

Zorn Icon. plant. t. 173.

gebr: die Früchte.

Elate sylvestris.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 893.

gebr: die Körner.

Sagus vinifera. Wein-Sagopalme.

Abbildung: Lamark. illustr. gener. t. 771.

gebr: die Körner.

Sagus farinifera. Mehl-Sagopalme.

Abbildung: Gärtner de fruct. et seminib. plantar.

Vol. II. p. 186. t. 120. f. 3.

gebr: die Körner.

Juglans regia. Gemeiner Nußbaum, Wallnußbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 347.

Zorn Icon. pl. t. 517.

gebr: die unreifen Nüsse oder auch nur die
grünen Schalen, die Saamen.

Quercus robur. Gemeine Eiche.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 487.

gebr: die Rinde und die reifen Früchte.

Quercus suber. Korkeiche, Pantoffelholzbaum.

Abbildung: Duhamel arbor. II. t. 80.

Zorn Icon. plant. t. 518.

Blackwell Herb. t. 193.

gebr: die Rinde,

Quer-

Quercus cerris. Zerreiche, Galleiche.

Abbildung: Kerner oekonom. Pflanz. t. 734.

Du Roi Baumz. 2. t. 5. f. 1.

gebr: die Galläpfel.

Quercus infectoria. Wahrer oder niederer Galläpfelbaum.

Abbildung: In Oliviers Werk: Voyage dans l'empire Othomann l'Egypte et la Perse.

8. An IX.

gebr: die Galläpfel.

Quercus esculus. Süße oder italienische Speise-Eiche.

Abbildung: Kerner oekon. Pflanz. t. 712.

Quercus ægylops. Ziegenbarts-Eiche.

Abbildung: Miller Diction. t. 215.

gebr: von diesen beyden Eicharten werden ebenfalls Galläpfel gesammelt.

Liquidambar styraciflua. Westindischer Storaxbaum

Abbildung: Blackwell Herb. t. 485.

Michaux arbres Vol. 3. t. 4.

Lamarck illustr. gener. t. 783.

gebr: der Storax.

Arum maculatum. Gefleckter Aron.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 228.

Oeder Flor. Danic. t. 505.

Plenk Icon. plant. t. 75.

gebr: die Wurzel.

Areca catéchu. Areka-Palme.

Abbildung: Rumph. Amb. T. I. t. 4.

Black-

der abgebildeten Handels-Pflanzen. 369

Blackwell Herb. t. 388.

Rheed. Mal. I. t. 5. 6. 7. 8.

Zorn Icon. plant. t. 287.

gebr: das Extract der Früchte.

Pinus sylvestris. Gemeine Fichte.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 308.

Blackwell Herb. t. 190.

Zorn Icon. plant. t. 526.

gebr: die jungen Sprossen, das Nesh, das
gemeine weiße Harz, der gemeine
Terpentin.

Pinus pumilia. Krummholz, Krummholz-Fichte.

Abbildung: Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. 2:

p. 160. t. 149.

Lamb. Monogr. t. 2.

gebr: der Balsam.

Pinus pinea. Pinolenbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 189.

Regn. Botan. t. 276.

Duham. Arbor. Vol. II. p. 127. t. 27.

gebr: die Saamen.

Pinus larix. Lerche, Lerchenbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 477.

Lamark illustr. gen. t. 785. No. 2.

Pallas Flor. rossic. t. 1.

Duham. Arb. I. p. 332. No. 1. t. 107.

Zorn Icon. plant. t. 89.

Lambert pin. t. 29.

gebr: der Terpentin.

Pflanzenreich IX. 29.

N a a

P 5

Pinus picea. Weißtanne, Edeltanne.

Abbildung: Lambert pin. t. 30. p. 46.

Pallas Flor. ross. Vol. I. p. 7 t. r. f. F.

gebr: der harzige Balsam.

Pinus abies. Rothe Tanne, Schwarz-Tanne.

Abbildung: Lambert Descript. of Pin. p. 37. t. 25.

Blackwell Herb. t. 198.

Oeder Flor. Danic. t. 193.

gebr: siehe *Pinus sylvestris.*

Pinus balsamea. Balsam-Tanne.

Abbildung: Lambert Descript. of Pin. p. 48. t. 37.

Pluken. Almag. 2. t. 121. f. 1.

gebr: der Balsam.

Altingia excelsa. Ostindischer Storaxbaum.

Abbildung: ist keine vorhanden.

gebr: der Storax.

Thuja articulata. Gegliederter Lebensbaum, atlantischer Sandarakbaum.

Abbildung: Vahl Symb. 2. t. 48.

Despont. atl. Vol. 2. p. 353. t. 252.

gebr: das Harz.

Croton eluteria. Cascarill-Corton.

Abbildung: Sloan. Histor. 2. No. 30. t. 174. f. 2.

gebr: die Rinde.

Croton cascarrilla. Cascarillenstrauch.

Abbildung: Blackwell Herbar. t. 577.

Zorn Icon. plant. t. 595.

Ca-

Catesb. Carol. 46. tab. 46.

Burm. amer. t. 240. f. 1.

gebr: die Rinde.

Croton tinctorium. Lackmuskraut, Tournefol.

Abbildung: Burm. ind. t. 62. f. 1.

gebr: die daraus bereitete blaue Farbe.

Croton tiglium. Purgirholzbaum.

Abbildung: Burm. Zeyl. t. 90.

Rheed. Malab. 2. t. 33.

gebr: die Saamen und das Holz.

Jatropha curcas. Amerikanischer Brechnußbaum.

Abbildung: Zorn Icon. plant. t. 404.

Jacquin Hort. Vindob. III. t. 63.

gebr: der Saame.

Jatropha multifida. Purgirnußstrauch.

Abbildung: Dill. Hort. Eltham. t. 173. f. 213.

Burm. ind. t. 63. f. 2.

gebr: die Früchte.

Ricinus communis. Gemeiner Wunderbaum.

Abbildung: Rumph amboin. 4. t. 41.

Blackwell Herb. t. 148.

Zorn Icon. plant. t. 131.

Hungerbyhler de Oleo Ricini, Fri-
burgi 1780. cum Icone.

gebr: der Saame.

Siphonia elastica. Federharzbaum.

Abbildung: Rich. Journal de Phys. 1785. August.
p. 229. t. 2.

U a a 2

La

- Lamarck illustr. gener. t. 790.
 gebr: der aus dem Stamm des Baumes
 fließende Saft.
- Cytisus hypocistis*. Gewöhnlicher Hypociste.
 Abbildung: Lamarck illustr. gener. t. 737.
 Cavanilles Icon. 2. p. 55. t. 171.
 gebr: der eingedickte Saft der Pflanze.
- Momordica balsamina*. Gemeiner Balsamapfel,
 Wunderapfel.
 Blackwell Herb. t. 539.
 Zorn Icon. plant. t. 45.
 gebr: die Frucht.
- Momordica elaterium*. Eselskürbis.
 Abbildung: Blackwell Herb. t. 108.
 Zorn Icon. plant. t. 444.
 gebr: die Früchte.
- Cucurbita lagenaria*. Flaschenkürbis.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 522.
 Zorn Icon. plant. t. 597. 598.
 gebr: die Saamen.
- Cucurbita anguria*. Wassermelone.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 157.
 Zorn Icon. plant. t. 253.
 gebr: die Saamen.
- Cucumis colocyntis*. Coloquinten-Gurke.
 Abbildung: Blackwell Herbar. t. 441.
 Zorn Icon. plant. t. 478.
 gebr: die Früchte. Cu-

Cucumis melo. Melone.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 329.

Zorn Icon. plant. t. 360.

gebr: der Saame.

Cucumis sativus. Gemeine Gurke.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 4.

Zorn Icon. plant. t. 247.

gebr: die Saamen.

Bryonia alba. Zaunrübe.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 813.

Blackwell Herb. t. 55.

Lamarck illustr. gener. t. 796.

gebr: die Wurzel.

Zwey und zwanzigste Klasse.

Salix pentandra. Lorbeerweide, fünfmännige

Weide.

Abbildung: Gmelin Sibir. Vol. I. p. 153. t. 34. f. 1.

Oeder Flor. Dan. t. 943.

Flor. lappon. 370. t. 8. f. 3.

gebr: die Rinde.

Salix fragilis. Bruchweide, Glasweide.

Abbildung: Hofm. Salices t. 31.

Flor. lapponic. 349. t. 8. fig. B.

gebr: die Rinde.

Salix alba. Weiße Weide.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 327.

Hofm.

Hofm. Salices I. t. 7. 8. & 24. f. 3.

Schkuhr bot. Handb. t. 417. b. No. 7.

gebr: die Rinde.

Ficus carica. Gemeiner Feigenbaum.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 861.

Blackwell Herbar. t. 125.

Zorn Icon. plant. t. 479.

gebr: die Früchte.

Viscum album. Mistel, Kleister.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 184.

Lamark illustr. gener. t. 807.

Gärtner de fructib. et seminib. plant.

I. p. 131. t. 27. f. 1.

Zorn Icon. plant. t. 547.

gebr: die holzigen Aeste, der Keim.

Pistacia vera. Wahrer Pistazien- oder Pimper-
nussbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 461.

Lamark illustr. gener. t. 118.

gebr: der Samen.

Pistacia terebinthus. Terpentih- Pistazie.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 478.

gebr: der Terpentih.

Pistacia lentiscus. Gemeiner Mastixbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 195.

Zorn Icon. plant. t. 580

gebr: das aus dem Baume fließende

Harz.

Pi-

Pistacia atlantica. Atlantischer Mastixbaum.

Abbildung: ist keine vorhanden.

gebr: ut antea.

Canabis sativa. Gemeiner Hanf.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 322.

gebr: die Blätter.

Humulus lupulus. Gemeiner Hopfen.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 536. a & b.

Schkuhr bot. Handb. t. 326.

Lamarck illustr. gener. t. 815.

Zorn Icon. plant. t. 522 & 541.

gebr: die Früchte.

Smilax sassaparilla. Falsche Sassaaparillpflanze.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 393.

Zorn Icon. plant. t. 580.

gebr: die Wurzel, mehr von nachbeschriebenen Arten der Gattung *Smilax*.

Smilax syphilitica. Wahre Sassaaparillpflanze.

Smilax officinalis. Offizinelle Sassaaparillpflanze.

Smilax china. China-Smilax.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 433.

Kämpfer Amoenit. exot. t. 782.

S. G. Gmelin Reise durch Rußland, III. Th. t. 6.

gebr: die Wurzel, Chinawurzel, Pockenwurzeln genannt.

Borassus flabelliformis. Fächerförmige Palme.

Abbildung: Rumph amboin. Vol. I. p. 45. t. 10.

Rheed.

- Rheed. Malab. Vol. I. p. 13. t. 18.
Masc. p. 11. t. 9. Femina.
gebr: die Früchte.
- Borassus gomutus. Arenga: Palme.
Abbildung: Rumph amboin. Vol. I. p. 57. t. 13.
gebr: das Mark des Stammes.
- Hyphenæ cuciphæra seu crinita, Douma thebaica.
Abbildung: Poiret in Duham arbr. ed. nov. vol. 4.
p. 47. t. 1. 2. 3. unter dem falschen
Namen Phoenix dactylifera.
gebr: die Früchte.
- Phoenix dactylifera. Dattel: Palme.
Abbildung: Kämpfer Amœnit. exot. t. 1. f. 2.
Lamark illustr. gener. t. 893.
Blackwell Herbar. t. 202.
gebr: die Früchte.
- Phoenix farinifera. Niedrige Mehl: Palme.
Abbildung: Roxb. Coromand. I. p. 55. t. 74.
gebr: der Sago, so von dieser Pflanze ge-
wonnen wird.
- Populus balsamifera. Balsam: Pappel.
Abbildung: Gmelin. Sibiric. I. t. 33.
Trew. Ehret. t. 46.
Pallas ross. Vol. I. t. 41.
gebr: das Harz.
- Mercurialis annua. Einjähriges Bingelkraut.
Abbildung: Blackwell Herbar. t. 162.
Schkuhr

Schkuhr botan. Handb. t. 332.

Zorn Icon. plant. t. 103. 104.

gebr: die Blätter.

Menispermum cocculus. Fischdörnerstrauch.

Abbildung: Rumph amboin. 5. t. 25. f. 1.

Blackwell Herb. t. 389.

Zorn Icon. plant. t. 584.

gebr: die Beeren.

Menispermum palmatum oder *Cocculus palmatus*.

Abbildung: Berry in asiat. research. Vol. 10:

p. 385. t. 5. die männliche Pflanze.

gebr: die Wurzel.

Menispermum peltatum.

Abbildung: Burm Zeyl. p. 218. t. 101.

Plucken. t. 24. f. 6.

Rheed. malab. 7. p. 93. t. 49.

Cycas circinalis. Wahre Sagopalme.

Abbildung: Rumph amboin. 1. t. 22. 23.

Jacquin Act. helvet. Vol. III. 59. t. 2:

Cycas revoluta. Japanische Sagopalme.

Abbildung: Rumph amboin. 1. t. 24.

gebr: von beyden Bäumen der Sago.

Juniperus sabina. Sadebaum, Sevenbaum.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 214.

Zorn Icon. plant. t. 525.

Duhamel arbor. 2. p. 242. t. 62:

gebr: die Blätter.

Pflanzenreich IX, Th. B b b Ju-

Juniperus communis. Gemeiner Wachholderstrauch.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1119.

Blackwell Herb. t. 187.

Duham. Arbor. I. p. 321. t. 127.

Zorn Icon. plant. t. 178.

gebr: das Holz und die Beeren.

Von nachfolgenden Arten der Gattung *Juniperus* soll das aus denselben schwitzende Harz das sogenannte Huil de Cade heißen, das nach Gmelin Flor. Badens. T. III. p. 769. ein vorzuziehendes Mittel gegen die Schaafstunde ist.

Juniperus oxycedrus. Cedern-Wachholder.

Abbildung: Duhamel Arbor. I. t. 128.

Juniperus hispanica. Spanischer Wachholder.

Juniperus bermudiana. Bermudischer oder Bahamischer Wachholder.

Abbildung: Herrm. Lugd. t. 347.

Juniperus phoenicea. Phönizischer Wachholder.

Abbildung: Duhamel Arbor. I. t. 52.

Juniperus lycia. Lycischer Wachholder.

Abbildung: Lobel. Icon. 2. 221.

Taxus baccata. Taxusbaum, Eichenbaum.

Abbildung: Schkuhr bot. Handb. t. 339.

Duhamel Arbor. 2. p. 302. t. 86.

Blackwell Herb. t. 572.

Zorn Icon. plant. t. 539.

gebr: die Blätter und Beeren.

Cis-

Cissampelos pareira. Offizinelle Grieswurzel,
brasilianische Waldrebe.

Abbildung: Plum. americ. 78. t. 93.

gebr: die Wurzel.

Excoecaria agallocha.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 805. f. 1. 2.

Rumph amboin. Vol. 2. pag. 237.

tab. 79. 80.

gebr: das Holz.

Alchornea latifolia. Breitblättriger Mcornoque-
Baum.

Abbildung: Swarz Flor. 2. p. 1154.

gebr: die Rinde.

Myristica moschata. Muskatennuß-Baum.

Abbildung: Lamark illustr. gener. t. 832.

Rumph amboin. II. t. 4. 5.

Plenk Icon. med. t. 425.

Blackwell Herb. t. 353.

gebr: die Saamendecke, die Saamen.

Drey und zwanzigste Klasse.

Lycopodium clavatum. Bärlapp, Johannisk-
gürtel.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 535.

Dillen histor. muscor. t. 58. f. 1.

Zorn Icon. Cent. I. t. 54.

B b b 2

Oe-

- Oeder Flor. Danic. t. 126.
gebr: die Saamen.
- Polypodium vulgare.* Engelsfuß.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 215.
Oeder Flor. Danic. t. 1060.
Zorn Icon. plant. officin. Cent. 1.
t. 46.
Lamark illustr. gener. t. 866. f. 2.
gebr: die Wurzel.
- Polypodium filix mas.* Männliches Farnkraut.
Abbildung: Berlin. Jahrb. der Pharmac. 1807. t. 1.
Lobel. Icon. 812.
gebr: die Wurzel.
- Polypodium adiantiforme* oder *Tectaria calahuala?*
Abbildung: Turpin Flor. medic. t. 86.
Schkuhr Crypt. 50. t. 50.
gebr: die Wurzel.
- Asplenium trichomanes.* Haarkraut, Methon.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 370.
Oeder Flor. Danic. t. 119.
Bolton Filic. t. 18.
gebr: die Blätter, doch selten mehr.
- Asplenium ruta muraria.* Mauerrante.
Abbildung: Blackwell Herb. t. 219.
Bolton Filic. t. 16.

Oeder Flor. Danic. t. 190.

gebr: die Blätter, doch selten.

Asplenium scolopendrium. Hirschzunge.

Abbildung: Blackwell Herb. t. 138.

Zorn Icon. plant. t. 47.

Bolton Filic. t. 11.

Plumier tab. & fig. 4.

Joh. Bauhin Histor. plant. Vol. 3.

p. 748.

gebr: die Blätter.

Adiantum capillus veneris. Frauenhaar.

Abbildung: Jacquin. Miscell. Vol. 2. p. 7.

Bolton. Filic. t. 29.

Weber & Mohr Taschenbuch, t. 3.

fig. 5.

Blackwell Herb. t. 367.

Zorn Icon. plant. t. 332.

gebr: die Blätter.

Polytrichum commune. Grünen Wiederthon.

Abbildung: Weber & Mohr Taschenb. t. 8. f. 8.

Blackwell Herb. t. 375.

Oeder Flor. Danic. t. 295.

Hedwig Fund. I. t. 9. f. 62.

gebr: die Pflanze.

Lichen parietinus. Wandflechte.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1005.

Hofm,

Hofm. Enumer. Lichen. t. 18. f. 1.

gebr: die Rinde.

Lichen islandicus. Isländisches Moos.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 153. 879.

Jacquin Col. 4. t. 8. f. 1.

Hofmann Plant. Lichen T. 9. f. 1.

gebr: das Moos.

Lichen pulmonarius. Lungen-Moos.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 1007.

Hofmann Plant. Lichen t. 1. f. 2.

gebr: das Moos.

Lichen caninus. Hundemoos, Erdleberkraut.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 767. f. 2.

Dillen. Histor. muscor. t. 27. f. 102.

Jacquin Collect. 4. t. 14. f. 1.

gebr: das Kraut.

Lichen roccella. Orseille.

Abbildung: Dillen. Histor. muscor. t. 17. f. 39.

Rumph amboin. t. 76. f. A. B. C.

gebr: die Pflanze.

Lichen pyxidatus. Büchsenmoos, Bechermoos.

Abbildung: Dillen. Histor. muscor. t. 14. f. 14.

Vaill. Bot. Par. t. 21. f. 7.

gebr: das Moos.

Li-

Lichen cocciferus. Scharlachfarbened Moos.

Abbildung: Dill. Histor. muscor. t. 14. f. 7.

Vaill. Bot. Par. t. 21. f. 4.

Fucus helmintochorton. Wurmmoos, Wurmtang, Wurmfenserbe.

Abbildung: Latour. Journ. de Phys. Vol. 20. t. 1.

Hæm. Dissert. Erlangæ 1792. cum

Icon.

Jaum. Plant. Franc. t. 4. f. 1. 2.

gebr: das Moos.

Amanita muscaria, P. oder Agaricus muscarius, L.

Fliegenchwamm, Mückenchwamm.

Abbildung: Schæffer Fang. t. 27.

Bull. Herb. t. 122.

gebr: die Wurzel.

Boletus laticis. Lerchenschwamm.

Abbildung: Jacquin Misc. Austr. 2. p. 164-210.

t. 20. 21.

Bull. Herb. p. 353. t. 296.

Michel gen. p. 119. t. 61. f. 1.

gebr: unter dem Namen Agaricus.

Boletus ignarius. Feuer- oder Zunderschwamm.

Abbildung: Oeder Flor. Danic. t. 953.

Schæffer t. 137. 138.

Tournefort Icon. 330.

gebr: unter dem Namen Ag. quernus
præparatus.

Tre=

384 Uebersicht der abgeh. Handels-Pflanzen.

Tremella seu Peziza auricula. Hollunderschwamm.

Abbildung: Hofm. Crypt. 31. t. 6. f. 4.

Blackwell Herb. t. 334.

Mich. gen. t. 66. f. 1.

Gleditsch Fung. p. 39. t. 2.

gebr: auch unter dem Namen Judasohr.

Lycoperdon bovista. Bovist.

Abbildung: Bull. Champ. p. 156. t. 430.

Schaeffer Fung. t. 190.

gebr: auch unter dem Namen Wolfsrauch,

Kugelschwamm.

Lycoperdon cervinum. Hirschbrunst.

Abbildung: Mich. gen. pl. p. 220. t. 99. f. 4.

Lobel Icon. 276.

gebr: bloß von gemeinen Leuten.

Regis