

Beschreibung
der
Arzneigewächse.

I. Tafel.

Lungenkraut. Pl. G. 194.
5 Klasse.
Geflecktes Lungenkraut.
Linne Pflanzensystem, 5 Th.
S. 426.

- a. Der sechsigte und zähniigte Kelch.
b. Die aufgeschnittene einblättrige, trichterförmige Krone, mit halb spaltiger Mündung, und denen in dem Schlunde feststehenden 5 Staubfäden.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Die 4 Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe.

Blüht im April und Mai an schattigten Gehägen, und wird ohngefähr $\frac{3}{4}$ Fuß hoch.

2. Tafel.

Löffelkraut. Pl. G. 865. 15 Klasse.
Gemines Löffelkraut.
Linne Pfl. S. 8. Th. S. 232.

- a. Der 4blättrige Kelch mit den 6 Staubfäden und dem Stempel.
b. Die vierblättrige Krone, nebst dem Kelch und den Geschlechtstheilen.

Descriptio
Plantarum medicinalium.

Tab. I.

Pulmonaria officinalis. Cl. V.
Pulmonaria foliis radicalibus ovato cordatis scabris.
L. 158. 2.

Pulmonaria maculosa f. latifolia.
Symphytum maculosam.

Pulmonaria Italarum ad buglossum accedens.

- a. Perianthium pentagonum, quinque dentatum.
b. Corolla monopetala, infundibuliformis, secundum longitudinem dissecta, quae limbum habet semiquinquesidum, et stamina quinque faucibus inserta.
c. Stamen cum anthera, seorsim exhibitum.
d. Germina quatuor cum stylo et stigmatibus.

Floret Aprili et Maio in sepius umbrosis, altitudo eius $\frac{3}{4}$ pedum.

Tab. 2.

Cochlearia officinalis. Cl. XV.
Cochlearia foliis radicalibus cordato subrotundis, caulinis longis subsinuatis. L. 491. 1.
Cochlearia folio subrotundo.

- a. Perianthium tetraphyllum, cum staminibus sex et pistillo.
b. Corolla tetrapetala, cum calice et partibus genitalibus.

¶

¶ Sta



- c. Die 6 Staubfäden, deren 4 länger, die 2 entgegengesetzten aber etwas kürzer sind, nebst dem Stempel.
- d. Ein vergrößerter Staubfaden.
- e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe, etwas vergrößert.
- f. Die zweifächerige herzförmige Frucht mit den 4 Saamen.
- g. Ein Saamenkorn.
- Blüht im Mai, wächst an schattigen nassen Orten und wird ohngefähr $\frac{3}{4}$ Fuß hoch.
- c. Stamina sex, quorum quatuor longiora, et duo opposita breviora.
- d. Stamen, magnitudine sub microscopio aucta.
- e. Germen cum stylo et stigmate, naturali magnitudine aliquantum aucta.
- f. Fructus cordatus, bilocularis, cum quatuor seminibus.
- g. Semen.
- Floret Maio; et crescit in locis umbrosis et aquis altitudine $\frac{3}{4}$ pedum.

3. Tafel.

Zeiland. Pl. G. 524. 8 Klasse.
Kellerhals. Linne Pl. 3. Th.
S. 459.
Seidelbast.

- a. Die einblättrige trichterförmige, mit an der Mündung in 4 Lappen zertheilte Krone.
- b. Eben dieselbe aufgeschnitten, mit den 8 Staubfäden, deren 4 kürzer sind, und dem Fruchtknoten.
- c. Ein absonderter Staubfaden.
- d. Der Fruchtknoten mit dem kurzen Griffel und der Narbe.
- e. e. e. Eben dieser entzwei geschnitten nebst dem abgesonderten Keim.
- f. Unzeitige.
- g. Zeitige Beeren.

Tab. 3.

- Daphne mezereum Cl. VIII.
Daphne floribus sessilibus ternis
caulinis foliis lanceolatis
deciduis. L. 307. 1.
Laureola folio deciduo, flore
purpureo.
Coccognidium.
Mezereum.
- a. Corolla monopetala, infundibuliformis, limbo quadrifido.
- b. Eadem dissecta, ubi apparent octo stamina, quorum quatuor reliquis breviora, cum germine.
- c. Stamen, seorsim exhibitum.
- d. Germen, cum stylo brevi et stigmate.
- e. e. e. Germen in medio dissectum, cum rudimento futuri seminis.
- f. Bacca in matura.
- g. Bacca matura.

Floret

Blüht im März und April
an Gebirgen auf sandigen Bo-
den, 4 bis 5 Fuß hoch.

4. Tafel.

Pflaumen. Pl. G. 675. 12 Klasse.
Schlehdorn. Linne Pfl. S.
I Th. S. 753.

- a. Der einblättrige, 5fach gespal-
tene, glockenförmige Kelch,
mit dem Stempel.
b. Die 5blättrige Krone mit
den Geschlechtstheilen von
oben.
c. Eben diese von unten, nebst
dem Kelch.
d. Ein Kelchblätchen, mit dar-
auf stehenden Staubfäden.
e. e. Der Fruchtknoten mit dem
Griffel und der Narbe, ver-
größert.
f. Die Frucht.
Blüht im April und Mai, an
trocknen besonders bergichten
Gebirgen, 5 bis 8 Fuß hoch.

5. Tafel.

Windkluene. Pl. G. 750. 13.
Klasse.
Linne Pfl. S. 7. Th. S. 230.
Erdlebertraut.

- a. b. Der 3blättrige Kelch mit
den Geschlechtstheilen, den
zahlreichen Staubfäden und
Staubwegen.
c. c. Zween abgeronderte Staub-
fäden von beiden Seiten,
vergrößert.
d. Ein Kronblatt.

Floret Martio et Aprili in
sepibus, solo arenoso; altitudo
eius 4-5 pedum.

Tab. 4.

- Prunus spinosa. Cl. XII.
Prunus pedunculis solitariis fo-
liis lanceolatis glabris, ramis
spinosis. L. 386. 13.
Acacia nostras s. germanica.
Prunus sylvestris
a. Perianthium monophyllum,
quinquefidum, campanula-
tum, cum pistillo.
b. Corollae petala quinque, et
partium genitalium pars supe-
rior.
c. Partium genitalium pars infe-
rior, cum calice.
d. Portio calycis, cum filamen-
tis ei insertis.
e. e. Germen cum stylo et stig-
mate, magnitudine sub mi-
croscopio aucta.
f. Fructus.
Floret Aprili et Maio, locis
ficcis et montosis, in sepibus;
frutex 5-8 pedalis.

Tab. 5.

- Anemone hepatica. Cl. XIII.
Anemone foliis trilobis integer-
rimis L. 424. 1.
Hepatica nobilis.
Ranunculus tridentatus vernus
flore coeruleo simplici.
a. b. Involverum perianthio si-
mili, triphyllum, cum parti-
bus genitalibus, sc. stamini-
bus et pistillis numerosis.
c. c. Duo stamina, seorsim, ab
utroque latere, magnitudine
microscopio aucta.
d. Petalum.
A 2 e. Ger-

e. Die zahlreichen Fruchtknoten.

Blüht im April und Mai, in Wäldern und an dürren Gehägen, wird nicht über einen halben Fuß hoch.

6. Tafel.

Erdbrauch. Pl. G. 917 17 Klasse.
Linne Pf. C. 8 Th. C. 467
Gemeine runde Osterluzei oder
Holwurz.
Falsche Holwurz.

- a. a. Die 2 Theile des Schlundes
des
b. Der geöffnete Schlund mit
den Geschlechtsheilen Die
zween Staubfäden sind an
den Stempel angeschlossen.
c. c. Die beiden Staubfäden
von dem Stempel getrennt,
mit den 3 Staubbeu-
teln.
d. Der Fruchtknoten mit dem
Griffel und der runden Nar-
be.
e. Der geöffnete Fruchtknoten
mit den Saamen.
f. Der ganze
g. Der entzweigeschnittene, in-
nen hohle Zwiebel oder Knol-
len der Wurzel.

Blüht im April, in Wäldern und Gärten als Unkraut, ohne sehr 1 halben Fuß hoch.

7. Tafel.

Schlüsselblume Pl. G. 208.
5 Klasse.
Linne Pf. C. 5. Th. 456. C.

e. Germina numerosa.

Floret Aprili et Maio, in silvis et in aridis sepibus; altitudinem dimidii pedis non excedit.

Tab. 6.

Fumaria bulbosa. Cl. XVII.
Fumaria caule simplici, bracteis longitudine florum. L. 529. 3.

Aristolochia fabacea.
Aristolochia bulbosa, radice caeva major.

- a. a. Faux, in duas partes divisa.
b. Faux aperta, cum genitalibus, ubi duo stamina pistillo adhaerentia apparent.
c. c. Stamina duo a pistillo separata, cum tribus antheris in singulo stamine.

d. Germen cum stylo, et stigmate orbiculato.

e. Germen apertum, cum rudimentis seminum.

f. Bulbus radice integer.

g. Idem in medio dissectus, ut cavitas interior appareat.

Floret Aprili; crescit in silvis, et sponte etiam in hortis, altitudine circiter semipedali.

Tab. 7.

Primula veris. Cl. V.
Primula foliis dentatis rugosis. L. 162. I.
Faralyfis officinarum.

a. In-

- a. Die Blumenhülle.
- b. Die einblättrige, röhrige, fünfzählige Blumendecke.
- c. Eben diese aufgeschnitten, nebst der Krone.
- d. Die Krone aufgeschnitten, mit denen in derselben eingefügten 5 Staubfäden und dem Stempel.
- e. Ein Staubbeutel vergrößert.
- f. Der Fruchtknoten, mit dem Griffel und der Narbe.
Blüht im Mai, auf trocknen Wiesen an Hügeln, 1 halben Fuß hoch.

- a. Involucrum floris.
- b. Perianthium monophyllum, tubulatum, quinque-dentatum.
- c. Perianthium dissectum, cum corolla.
- d. Corolla dissecta, cum quinque staminibus ei insertis, et pistillo.
- e. Arthera, magnitudine microscopio aucta.
- f. Germen, cum stylo et stigmate.
Floret Maio in pratis fideis et collibus; altitudo eius semipedalis

8. Tafel.

Weil. W. G. 1026. 19. Klasse.
Blaue Viole.
Merzviole.
Linne Pf. S. 10. Th. S. 80.

Tab. 8.

Viola odorata. Cl. XIX.
Viola acaulis foliis cordatis stolonibus reptantibus. L. 663.
8.

Viola martia, purpureo flore simplici odoro.
Violariae herba.

- a. Die ausgebreitete Blume.
- b. Die 5blättrige Blumendecke, mit den zusammenhängenden Geschlechtstheilen, den 5 Staubfäden und dem Stempel.
- c. Das oberste Kronblatt, mit dem daran hangenden hornförmigen Honigbehälter.
- d. Ein Kronblatt, mit daran hangenden Staubfaden.
- e. Ein Staubfaden, mit dem Staubbeutel, vergrößert.
- f. Der Fruchtknoten, mit dem hakenförmigen Griffel.
- g. Die Saamenkapsel, mit den Saamen, geöffnet.
Blüht im Mai, an Gebegen und in Baumgärten, in der Größe der Abbildung.

- a. Flos expansus.
- b. Perianthium pentaphyllum, cum partibus genitalibus connexis, sc. staminibus quinque et pistillo.
- c. Petalum corollae superius, quod infra definit nectarium corniculatum.
- d. Petalum cum ei adhaerentibus staminibus.
- e. Stamen cum anthera magnitudine microscopio aucta.
- f. Germen cum stylo hamato.

g, Capsula feminalis, aperta.

Floret Maio in sepibus et arboreis; magnitudo in iconé naturalis.
Tab.



9. Tafel.

Mälertraut. Pl. G. 631. 10. Klasse.

Linne Pf. S. 6 Th. 644 S.

Sauerklee.

Buchampfer.

- a. Die 5theilige Blumendecke.
- b. Die 5theilige Krone von vornen.
- c. Eben diese von hinten.
- d. Die 10 Staubfäden, deren die 5 außern kürzer sind
- e. 2 abge sonderte Staubfäden.
- f. Der Fruchtknoten, mit den 5 fadenförmigen Griffeln und deren Narben.
- g. Ein abge sondertes Blumenblatt

Flüht im April und Mai, in Waldern, nicht viel grösser als die Abbildung.

10. Tafel.

Einbeer Pl. G. 540. 8 Klasse.

Wolfsbeere.

Linne Pf. S. 6 Th. S. 463.

- a. Die 4blättrige Blumendecke.
- b. Die 4blättrige Krone.
- c. Die 8 Staubfäden in jeder Blume.
- d. Der Kruchtknoten, mit den 4 Griffeln und den spitzigen Narben.
- e. Eben dieser nach der Länge.
- f. Nach der Quere durch schnitten.
- g. Die zeitige Beere.
- h. Diese geöfnet, nebst den Saamen.

Tab. 9.

Oxalis acetosello. Cl. X.

Oxalis scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis radice dentata. L. 360. 1.

Acetosella. Alleluja.

Trifolium acetosum.

Oxys flore albo.

a. Perianthium quinquepartitum.

b. Corolla quinquepartita a latere anteriori.

c. — — — — a latere posteriori.

d. Stamina decem, quorum quinque exteriora breviora.

e. Duo Stamina separate.

f. Germen cum stylis quinque filiformibus, et totidem stigmatibus.

g. Petalum separatum.

Floret Aprili et Maio in filvis; magnitudo naturalis paulo maior, quam in icone.

Tab. 10.

Paris quadrifolia. Cl. VIII.

Paris quadrifolia. L. 315.

Herba Paris.

Solanum quadrifolium.

a. Perianthium tetraphyllum.

b. Corolla tetrapetala.

c. Stamina octo in singulo flore.

d. Germen cum stylis quatuor et stigmatibus eorum acutis.

e. Germen perpendiculariter dissectum.

f. Idem horizontaliter dissectum.

g. Bacca matura.

h. Haec aperta praeter Semen.

A. Flos

A. Die ausgebreitete Blume von unten.

B. Dieselbe von oben.

Blüht im Mai, an Gebirgen in der Größe der Abbildung.

II. Tafel.

Günsel. Pl. G. 761. 14 Klasse.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 385.

Güldenünsel.

Güldenwundkraut.

a. Die einblättrige halb 5spaltige haarige Blumendecke.

b. Die einblättrige rachenförmige Krone mit den Geschlechtsheilen.

c. Eben diese aufgeschnitten, mit den 4 Staubfäden deren 2 kürzer und 2 länger in der Krone eingefügt sind.

d. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.

Blüht im Mai auf allen etwas feuchten Wiesen, jezuweilen noch so hoch, als die Abbildung.

12. Tafel.

Lauch. Pl. G. 439. 6 Klasse.

Linne Pl. S. 11 Th. S.

Allermansharnisch.

Lauge Siegwurzel.

a. Die gemeinschaftliche Scheide.

A. Flos expansus a latere inferiori.

B. — — a latere superiori.

Floret Maio in sepibus, magnitudo in icone naturalis.

Tab. II.

Ajuga reptans Cl. XIV.

Ajuga tetragono pyramidalis villosa foliis radicalibus maximis. L. 438.

Consolida media pratensis coerulea.

Bugula.

a. Perianthium monophyllum, femiquinquefidum, villosum.

b. Corolla monopetala, ringens, cum partibus genitalibus.

c. Corolla dissecta, ut appareant filamenta quatuor, ea inserta, quorum duo breviora, et duo longiora.

d. Germen cum stylo, et stigmate bifido.

Floret Maio in omnibus pratis subhumidis; magnitudo naturalis interdum duplo major, quam in icone.

Tab. 12.

Allium Victorialis. Cl. VI.


Allium caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis foliis ellipticis. L. 266. 5.

Victoralis longa.

Allium montanum latifolium maculatum.

a. Spatha communis.

b. Co-



- b. Die blättrige Krone mit den Geschlechtszweigen
 c. Die 6 Staubfäden, sie ragen über die Krone hervor.
 d. Ein vergrößerter Staubfaden.
 e. Der zehnjährige Fruchtknoten mit dem Griffel und der spitzigen Narbe.
 f. Der Fruchtknoten von oben, ohne die Griffel.
 g. Die häutige nehartige Wurzel.
- Blüht im Mai, ohngefähr 2 Fuß hoch, auf den Bergen in leetigten Boden.

- b. Corolla hexapetala cum partibus genitalibus.
 c. Stamina sex, corolla longiora.
 d. Stamen, magnitudine microscopio aucta.
 e. Germen trigonum cum stylo et stigmate cuto.
 f. Germen a parte superiori, absque stylo.
 g. Radix membranacea, reticulata.
- Floret Maio; crescit in montibus, solo argilloso, altitudine circiter 2 pedum.

13. Tafel.

Zottenblume. Pl. G. 213. 5 Klasse.
 Biberklee. Bitterklee.
 Fieberklee.
 Linne Pf. S. 5 Th. S. 481.

- a. Der einblättrige 5theilige Kelch mit dem Stempel.
 b. Die einblättrige trichterförmige, an der Mündung fünfspaltige, und zottige Krone.
 c. Die 5 Staubfäden, an der Krone festsetzend.
 d. Ein vergrößerter Staubfaden.
 e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.

Blüht im Mai einen halben Fuß hoch, auf nassen Wiesen.

14. Tafel.

Erdbrauch. Pl. G. 917. 17 Klasse.
 Taubenkropf.
 Linne Pf. S. 8 Th. S. 467.

Tab. 13.


- Menyanthes trifoliata. Cl. V.
 Menyanthes foliis ternatis. L. 164. 3.
 Trifolium fibrinum s. palustre.
 Menyanthes palustro latifolium et arphyllum.
- a. Perianthium monophyllum, quinquepartitum, cum pitillo.
 b. Corolla monopetala, infundibuliformis, limbo quinquefido, hirsuto.
 c. Stamina quinque corollae adnata.
 d. Stamen, magnitudine microscopio aucta.
 e. Germen cum stylo, et stigmate bifido.

Floret Maio; crescit in pratis humidis, circiter semipedalis.

Tab. 14.

- Fumaria officinalis. Cl. 17.
 Fumaria pericarpis monospermis racemosis caule diffusis.
 L. 529. 7.
 Fumiterra,

a. Peri-



- a. Die 2blättrige Blumendecke.
- b. Die rachenförmige Krone.
- c. Die Oberlippe nebst dem Honigbehältniß d.
- e. Die Unterlippe.
- f. Der 2spaltige Schlund mit den zusammenhängenden Geschlechtstheilen.
- g. Die 2 Staubfäden, von einander getrennt.
- h. Ein abgesonderter, mit den 3 Staubbeuteln.
- i. Der Fruchtknoten, mit dem Griffel und der Narbe.
- k. Die runden Schötgen.

Blüht im Mai ohngefehr 3/4 viertel Fuß hoch in Gärten als Unkraut, und auf Aekern.

- a. Perianthium diphyllum.
- b. Corolla ringens.
- c. Labium corollae superius, cum nectario, d.
- e. Labium eiusdem inferius.
- f. Faux corollae bifida, cum partibus genitalibus connexis.
- g. g. Stamina duo, ab invicem separata.
- h. Stamen, cum suis tribus antheris, seorsim exhibitum.
- i. Germen, cum stylo et stigmate.
- k. Siliculae subrotundae.

Floret Maio; crescit in agris, sponte etiam provenit in hortis; altitudo eius circiter tres quartas partes unius pedis adaequat.

15 Tafel.

Grünling, Pl. G. 689. 12 Klasse.
Gänserich.
Silberkraut.
Linne Pf. S. 7 Th. S. 145.

Tab. 15.

Potentilla anserina. Cl. XII.
Potentilla foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris.

Anserina. Argentina.
Potentilla.
Pentaphylloides argenteum alatum.

- a. Der einblättrige 10spaltige Kelch, davon 5 Spalten um die Helfte wechselsweise kleiner sind.
- b. Die 5blättrige Krone.
- c. 20 Staubfäden um die zahlreichen Fruchtknoten herum, in den Kelch eingefügt.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Die zahlreichen Griffel in den Fruchtknoten f. eingefügt.
- g. Ein abgesonderter Griffel.

Blüht im Mai und Junius an trockenen Wegen, in der abgebildeten Größe.


- a. Perianthium monophyllum, decemfidum, laciniis alternis dimidio minoribus.

- b. Corolla pentapetala.
- c. Stamina viginti, germina numerosa cingentia, calyci inserta.
- d. Stamen, seorsim exhibitum.
- e. Styli numerosi, lateri germinum f. inserti.
- g. Stylus seorsim exhibitus.

Floret Maio et Iunio ad vias ficas; magnitudo in icone naturalis.

B

Tab.



16. Tafel.

Kresse. Pl. G. 863. 15 Klasse.
Gartenkresse.
Linne Pf. C. 8 Th. C. 215.

- a. Die 4blättrige Blumendecke mit den 4 Kronblättern von unten.
- b. Diese von oben, mit den 6 Staubfäden.
- c. Die Blumendecke mit den 6 Staubfäden, deren 2 äußerste kürzer als die andern sind.
- d. Ein abgezonderter Staubfaden.
- e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe.
- f. Die Schötzen.
Blüht im Junius 1 Fuß hoch, wird in Gärten gezogen.

17. Tafel.

Quendel. Pl. G. 783. 14 Klasse
Feldkümmel. Feldpolei.
Linne Pf. C. 7 Th. C. 529.

- a. Die einblättrige Blumendecke mit 5 Zähnen, deren 2 tiefer, 3 aber höher stehen.
- b. Die rachenförmige Krone, aufgeschnitten.
 - a. Die Oberlippe, von einandergetrennt.
 - β. Die 3spaltige Unterlippe. In dieser die 4 Staubfäden, deren 2 länger, 2 aber kürzer sind.
- c. Ein abgezonderter Staubfaden.
- d. Der Fruchtknoten, mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.


Tab. 16.

- Lepidium sativum. Cl. XV.
Lepidium floribus tetradynamis foliis oblongis multifidis. L. 490 8.
Nosturtium hortense.
a. Perianthium tetrabyllum, cum corolla tetrapetala, a latere inferiori.
b. Eaedem partes, a latere superiori, cum sex staminibus.
c. Perianthium, cum sex staminibus, quorum duo exteriora reliquis breviora sunt.
d. Stamen seorsim exhibitum.
e. Germen, cum stylo et stigmate.
f. Siliculae.
Floret Junio; colitur in hortis; altitudo pedalis.

Tab. 17.

- Thymus Serpillum. Cl. 14.
Thymus floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. L. 452.
Serpillum vulgare minus.
a. Perianthium monophyllum, quinquedentatum, dentibus duobus inferioribus, tribus superioribus.
b. Corolla ringens, aperta.
α. α. Labium superius diductum.
β. Labium inferius trifidum; in quo quatuor stamina, quorum duo sunt longiora, et duo breviora.
c. Stamen seorsim exhibitum.
d. Germen cum stylo, et stigmate bifido.

Flo-



Blüht im Junius und Julius, ohngefehr 1 halben Fuß hoch, auf trockenen Wiesen

18. Tafel.

Affodill. Pl. G. 452. 6 Klasse.
Goldwurz.

Linne Pl. S. Th. S.

- a. Die 1blättrige, bis an die Basim gespaltene 6theilige Krone.
- b. Das gebogene Honigbehältniß, an jedes Kronblatt angefügt.
- c. Ebendasselbe von vornen.
- d. Die 6 Staubfäden, welche auf den Honigbehältnissen stehen, und deren 3 kürzer sind.
- e. Einer der kürzern, von der Seite.
- f. Von vornen.
- g. Der Fruchtknoten, mit dem Griffel und der Narbe.
- h. Die Frucht nebst den Samen.

Blüht im Junius 3-4 Fuß hoch, einen ganzen Monat durch, wird bey uns in Gärten gezogen

Gleditsch gibt diese für die Officinelle an. (Sie hat auch gelbe Wurzeln,) die meisten andern aber den Asphodelum ramosum. L.

19. Tafel.

Euphorbie. Pl. G. 663. 11 Klasse
Springförmner.

Purgierförmner.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 33.

Floret Junio et Julio in pratis siccis; altitudo circiter semipedalis.

Tab. 18.

Asphodelus luteus. Cl. VI.
Asphodelus caule folioso, foliis triquetris striatis. L. 272. I.

- a. Corolla monopetala, ad basin usque sexpartita.
- b. Nectarium inflexum, singulo petalo adnatum.
- c. Idem a latere anteriori.
- d. Stamina sex, nectarium inferta, quorum tria breviora.
- e. Vnum e staminibus brevioribus a latere.
- f. Idem a parte anteriori.
- g. Germen cum stylo et stigmate.
- h. Capsula cum seminibus.

Floret Junio per totum mensem; altitudo eius 3-4 pedum; colitur apud nos in hortis.

Cl. Gleditsch hanc speciem (cuius radices pariter sunt luteae,) pro officinali habet; plurimi reliquorum scriptorum vero Alphodelum ramosum.

Tab. 19.

Euphorbia lathyris. Cl. XI.
Euphorbia umbella quadrifida, dichotoma foliis oppositis integerrimis. L. 375. 36.


Cataputia minor.

Lathyris major.

Thytymalus latifolius.

B 2

a. Peri-



- a. Der Kelch, eine dünne weiße Haut, deren obere 5 Spitzen, wenn der Kelch ausgebreitet wird, sich einwärts biegen; er umschließt die Geschlechtstheile.
- b. Die 4 Kronblätter, so Mondförmig und mit den Nägeln in den Kelch eingefügt sind.
- c. Die ganze Blume von oben, mit den hervorbrechenden Geschlechtstheilen.
- d. Eben diese von der Seite.
- e. Die 14 Staubfäden mit dem Stempel.
- f. Der Fruchtknoten mit 6 Streifen, auf einen Stiele, mit den 3 zweispaltigen Narben.
- g. Die Frucht nebst den Samen
- Blüht im Junius und Julius ohngefehr 2 Fuß hoch; wird in Gärten gezogen
- a. Perianthium, quod constituit membrana tenuis alba, cuius apices quinque, sub expansione floris, introrsum flectuntur; et genitalia comprehendit.
- b. Corolla constans petalis quatuor, lunatis; et anguibus callici infertis.
- c. Flos integer a parte superiori, cum partibus genitalibus emergentibus.
- d. Idem a latere.
- e. Stamina quatuordecim, cum pistillo.
- f. Germen, sex striis notatum, pedicello infidens, cum tribus stigmatibus bifidis.
- g. Capsula cum seminibus.
- Floret Iunio et Iulio; colitur in hortis; altitudo eius circiter bipedalis.

20. Tafel.

Lysimachie, Pl. G. 216. 5 Klasse.
 Perringkraut.
 Chlangenkraut.
 Linne Pl. S 5 Th. S. 495.

- a. Die 5theilige Blumendecke.
- b. Die einblättrige 5theilige Krone.
- c. Die 5 Staubfäden.
- d. Der Fruchtknoten, mit dem Griffel und der Narbe.
- Blüht im Junius und Julius auf Wiesen und in Baumgärten; in der Größe der Ausbildung.

Tab. 20.

Lysimachia nummularia, Cl. V.
 Lysimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente L. 164. 10.
 Nummularia. Centummorbia.
 Lysimachia humifusa folio rotundiore flore luteo.

a. Perianthium quinque partitum.

b. Corolla monopetala, quinque partita.

c. Stamina quinque.

d. Germen cum stylo et stigmatate.

Floret Iunio et Iulio in pratis et arboretis; magnitudo in icone naturalis.

Tab.