

Wird bei uns in Gewächshäusern gezogen, obngefehr 2 Fuß hoch, blüht im August und September.

61. Tafel.

Hyssop. Pl. G. 765. 14. Klasse.
Hyssop.
Linne Pl. S. Th. S.

- Die einblättrige 5 jähnigte Blumendecke.
 - Die einblättrige rachenförmige Krone aufgeschnitten, mit den 4 Staubfäden, deren 2 länger, 2 kürzer sind.
 - Der 4theilige Fruchtknoten mit dem fadenformigen Griffel und der 2spaltigen Narbe.
 - Eine Abänderung mit fleischfarber und
 - mit weißer Blüthe.
- Wird bei uns in Gärten gezogen, blüht im August, wird $\frac{1}{2}$ Fuß obngefehr hoch.

Hospitatur apud nos in Caldariis, altitudine circiter bipedali, floret Augusto et Septembris.

Tab. 61.

- Hyssopus Officinalis.* Cl. XIV.
Hyssopus spicis secundis, foliis lanceolatis. L. 441. 1.
Hyssopus officinarum coeruleav. spicata.
- Perianthium monophyllum acute 5 dentatum.*
 - Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus 4, quorum 2 longiora, 2 breviora.*
 - Germen 4dripartitum, cum stylo filiformi et stigmate bifido.*
 - Varietas flore carneo, et*
 - Flore albo.*

Colitur apud nos in hortis, floret Augusto, altitudine circiter sekquipedali.

62. Tafel.

Sandbeere. Pl. G. 595. 10. Klasse.

Bärentraube. Wolfsbeere.

Linne Pl. S. 3. Th. S. 578.

- Die 5theilige gefärbte Blumendecke.
 - Die einblättrige, Eirunde, an der Mündung 2spaltige Krone, deren Lappen zurückgerollt sind.
 - Eben diese aufgeschnitten, mit den 10 in sie eingefügten Staubfäden.
- d. Ein

Tab. 62.

- Arbutus uva ursi.* Cl. X.
Arbutus caulinis procumbentibus, foliis integerrimis. L. 340. 4.
Uva ursi.
- Perianthium 5 partitum coloratum.*
 - Corolla monopetala, ovata, ore 5 fido, lacinii revolutis.*
 - Eadem aperta, cum staminibus 10, corollae insertis.*
- d. Sta-

- d. Ein abgesonderter vergrößter Staubfaden.
 e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe.
 f. Zeitige Beere.

Wächst auf den Bergen der Schweiz und anderer wärmerer Gegenden. Blüht im Merz und April; die Stauden kriechen sehr lange auf dem Boden fort.

Tab. 63.

Dill. Pl. G. 392. 5 Klasse.
 Henchel.
 Linne Pl. S. Th. S.

- a. Die allgemeine Dolde.
 b. Die besondere Dolde.
 c. Die besondere Krone (vergrößert) sie ist 5 blättrig, die Blattgen eingerollt, sehr kurz.
 d. Die 5 Staubfäden mit den rundlichen Staubbeuteln.
 e. Der Fruchtknoten, er ist unter der Blume, die 2 Griffel stehen dicht aneinander, und spitzen sich mit den 2 Narben zu.
 f. Der Fruchtknoten entzweigeschnitten mit dem Reim. Wird bei uns in Gärten gezogen, blüht im August, wird 4-5 Fuß hoch.

64. Tafel.

Nossk. Pl. G. 1026. 19.
 Klasse.
 Husflattich. Brandlattich.
 Linne Pl. S. Th. S.

- a. Der walzenförmige schupfige Kelch.

b. Die

- d. Stamen separatum magnitudine auctum.
 e. Germen cum stylo et stigmate.
 f. Baccae muturae.
 Crescit in Alpibus Helvetiae aliorumque regionum calidiorum, floret Martio et Aprili; fructices longissime repentes sunt;

Tab. 63.

Anethum foeniculum. Cl. V.
 Anethum fructibus ovatis. L. 722. 3.

- Foeniculum vulgare.
 a. Umbella universalis.
 b. Umbella partialis.
 c. Corolla propria, (magnitudine aucta) petalis 5, involutis, brevissimis.
 d. Stamina 5 cum antheris subrotundis.
 e. Germen inferum; styli duo approximati, cum duobus stigmatibus, acuti sunt.
 f. Germen cum embryone in 2 partes divisum, colitur apud nos in hortis, floret Augusto, altitudine 4-5 pedali.

Tab. 64.

Tussilago farfara. Cl. XIX.
 Tussilago scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulis denticulatis. L. 629. 5.
 Farfara. Tussilago vulgaris.
 a. Calyx cylindraceus, squamulosus.

b. Co-

- b. Die zusamengesetzte Krone.
 c. Ein Jungenformiges weibliches Krönchen aus dem Strahle.
 d. Ein besonderes Zwitterkrönchen, mit 5spaltiger Mündung.
 e. Die 5 zusammenhängende, aufgeschnittene Staubfäden aus demselben.
 f. Der Fruchtknoten.
 g. Der Griffel mit der Narbe.
 h. Der Fruchtknoten des weiblichen Kröngens.
 i. Der Griffel und Narbe des selben. Die Blätter werden nach der Blühezeit 4-5 mal grösser.
 Wächst auf thonigem trockenem Boden, an Ufern &c. blüht in den ersten Frühlingstagen, ohngefehr in dieser Größe.

65. Tafel.

Traubenfarn. Pl. G. 1282,
 24. Klasse.
 Mondrauten. Mondskraut.
 St. Walpurgiskraut.
 Linne Pf. S. Th. S.

Wächst in schattigten Wäldern, ohngefehr in dieser Größe.

66. Tafel.

Habnenfuß. Pl. G. 755. 13.
 Klasse.
 Scharbockskraut. Feigwurz-zenkraut. Klein Schells-
 kraut. Wildlöffelkraut.
 Linne Pf. S. Th. S.

a. Der

- b. Corolla composita.
 c. Corollula foeminea ligulata ex disco.

- d. Corollula propria hermaphrodita, ore 5fido.

- e. ejus stamina 5, coalita, expanda,

- f. Germen,

- g. Stylus cum stigmate.

- h. Germen corollulae foemineae.

- i. ejus stylus cum stigmate.

Folia, deflorato flore, 4-5 plo
 majora crescunt.

Crescit in terris siccis argillo-
 sis, ad ripas floret primo vere,
 hac circiter magnitudine,

Tab. 65.

Osmunda lunaria. Cl. XXIV.
 Osmunda scapo caulinō solitario, fronde pinnata solitaria.
 L. 779. 2.

Lunaria racemosa minor.

Ruta lunaria. Lunaria botrytis.
 Crescit in sylvis umbrosis,
 hac circiter magnitudine.

Tab. 66.

Ranunculus ficaria. Cl. XIII.
 Ranunculus foliis cordatis angulatis, petiolatis, caule unifloro. L. 422. 9.
 Chelidonium minus.
 Chelidonia rotundifolia.
 Ranunculus vernus rotundifolius minor.

S

a. Ca-

- a. Der zblättrige Kelch, viele haben auch 4 Blätter.
 b. Ein abgesondertes Kelchblatt.
 c. Die viel (meist 9-10) blättrige Krone.
 d. Ein Kronblatt woran unten das Honigbehältniß ein ausgeschnittenes Schüppchen welches abgesondert darneben steht, besondrich ist.
 e. Ein abgesonderter Staubfaden, deren Menge in der Blume zu sehen sind.
 f. Die vielen Fruchtknoten ohne Griffel, mit den kleinen Narben.
 g. Eingedrückter Saamen.
 Blüht im Merz und April, auf nassen Wiesen, ohngefehr in dieser Größe.

67. Tafel.
 Sinngrün. Pl. G. 320. 5.
 Klasse.
 Wintergrün. Ingrün.
 Linne Pf. S. Lh. S.

- a. Die 5theilige aufrechte Blumendecke.
 b. Die einblättrige präsentiertellerförmige, 5theilige Krone.
 c. Eben diese aufgeschnitten, mit den 5 eingekrümmten kurzen Staubfäden.
 d. Ein abgesonderter Staubfaden.
 e. Die 2 Fruchtknoten, mit den an der Seite anliegenden 2 Körpergen.

f. Der

- a. Calyx triphyllus, in nonnullis 4phyllus.
 b. Calycis folium separatum.
 c. Corolla polypetala, in plurimis 9-10.
 d. Peralum cum nectario, squalma emarginata, quae conspicitur separata.
 e. Stamen separatum; multitudine horum staminum in flore conspicitur.
 f. Germina numerosa absque stylis, cum stigmatibus parvis,
 g. Semen depresso.
 Floret Martio et Aprili in pratis humidis, hac circiter magnitudine.

Tab. 67.

- Vinca minor. Cl. V.
 Vinca caulis procumbens, foliis lanceolatis ovatis floribus pedunculatis, L. 593. I.
 Vinca per vinca.
 Clematis Daphnoides.
 Pervinca vulgaris angustifolia, flore coeruleo.
 a. Perianthium 5partitum erectum,
 b. Corolla monopetala, 5partita, limbo horizontali.
 c. eadem aperta cum staminibus 5 inflexis brevissimis.
 d. Stamen separatum.
 e. Germina 2, cum corpusculis 2, lateribus adiacentibus.
 f. Sty-

- f. Der Griffel mit den 2 Narben, davon die obere
g. ganz faserig ist.
Blüht in Gehegen im Merz und April, 8-10 Zoll hoch.

- f. Stylus cum 2 Stigmatibus, quorum superius.
g. totum fimbriatum est.
Floret circa sepes, Martio et Aprili, altitudine 8-10. pollicum.

68. Tafel.

Kochhuf. Pl. G. 1026. 19. Klasse.

Pestilenzwurz. Schweißwurz. Neunkrautwurz. Linne Pf. S. Th. S.

- a. Der gemeinschaftliche walzenförmige, schuppige Kelch.
b. Die zusammengesetzte Krone.
c. Ein Zwitterkrönchen, trichterförmig mit 5 spaltiger Mündung.
d. Die 5 Staubfäden, welche walzenförmig den Griffel umgeben.
e. in dem Zwitterkrönchen umgebend.

Blüht in den ersten Frühlingstagen an feuchten, thornigsten Orten, Bächen &c. in dieser Größe.

Tab. 68.

- Tussilago petasites. Cl. XIX.
Tussilago thyrso ovato, flocculis foemineis nudis paucis. L. 629. 9.
Petasites major, vulgaris rubens, rotundiore folio.
a. Calyx communis cylindraceus squamosus.
b. Corolla composita.
c. Propria hermaphrodita, infundibuliformis, ore 5fido.
d. Stamina 5, forma cylindracea, stylum.
e. Circundantia.

Floret primo vere, in locis humidis, argillosis, ad rivulos, magnitudine iconis.

69. Tafel.

Münchkopf. Pl. G. 985. 19. Klasse.

Löwenzahn. Pfaffenröhlein. Kühlblume. Butterblume. Linne Pf. S. Th. S.

- a. Der gemeinschaftliche Kelch, dessen untere Blättchen zurückgeschlagen sind.
b. Die zusammengesetzte Krone.
c. Ein besonders Krönchen mit den Geschlechtstheilen.
d. Die

Tab. 69.

- Leontodon Taraxacum. Cl. XIX.
Leontodon calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis, denticulatis laevibus. L. 596. 1.
Taraxacum. Dens leonis.
a. Calyx communis, squamis exterioribus reflexis.
b. Corolla composita.
c. Corollula propria cum partibus genitalibus.
d. Sta-

F 2

- d. Die 5 zusammenhängende Staubfäden.
e. Der Fruchtknoten mit dem langen Griffel und den 2 zurückgerollten Narben.
f. Der rauhe Saamen mit der gestielten haarigen Krone.
g. Der Kern.
Wächst häufig an Weegen, trockenen Wiesen, blüht im Frühling und Herbst ohngefähr einen halben Fuß hoch.

70. Tafel.
Ampfer. Pl. G. 483. 6. Klasse.
Sauerampfer.
Linne Pfl. S. Th. S.

- Männliche Blüthe:
a. Der zblättrige Kelch von unten, mit den 3 hervorragenden Kronblättern.
b. Der Kelch und die Kronblätter von oben.
c. Der Kelch mit den 6 Staubräden.

- Weibliche Blüthe an der nemlichen Pflanze.
d. Der Kelch, die Krone, nebst den 3 Griffeln und dem Fruchtknoten.
e. Ein abgesonderter Griffel.
f. Die 3 Kronblätter mit den 3 Griffeln abgesondert.

Alle Theile vergrössert.

Dieser ist in Gärten gezogen und wird durch die Kultur in seinen Bestandtheilen verbessert. Er blüht im Junius oder Julius, ohngefähr 1 Fuß hoch.

- d. Stamina 5 Coalita.
e. Germen cum stylo longo et 2 stigmatibus revolutis.
f. Semen scabrum, cum papo stipitato plumoso.
g. embryo nucleus.
Crescit copiosissime ad vias, in pratis siccis, floret vere ac autumno, altitudine prope semipedali.

Tab. 70.

Rumex acetosa. Cl. VI.
Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. L. 284.

24.
Acetosa. Oxalis.
Acetosa hortensis.
Masculus flos.
a. Perianthium triphyllum à parte inferiore, cum 3 petalibus corollae prominentibus.
b. Perianthium cum corolla à parte superiore.
c. Calyx cum staminibus sex.

Foemineus flos in eadem planta.

- d. Perianthium, Corolla, cum 3 stylis et germine.
e. Stylus separatus.
f. Petala 3 Corollae, cum 3 stylis, separata.
Omnes partes magnitudine aucta.

Varietas haec in horris colitur, ejus partes essentiales cultura meliorantur, floret Junio vel Julio, altitudine circiter pedali.

71. Ta-

Tab.

71. Tafel.

Brembeere. Pl. G. 687. 12.

Klasse.

Wortenbeere. Müstebeere.

Linne Pf. S. Th. S.

a. Die Blumendecke mit den vielen Staubfäden, oder die männliche Blüthe.

b. Die Krone mit der männlichen Blüthe.

c. Die Blumendecke mit den vielen Fruchtknoten oder die weibliche Blüthe.

d. Die Krone mit der weiblichen Blüthe.

e. Die zusammengesetzte Beere.

f. Saamen.

Aus einer und eben derselben Wurzel entspringt die männliche und weibliche Blüthe. Sie wächst häufig in Schweden und Norwegen, an sumpfigen Orten.

72. Tafel.

Erd scheiben. Pl. G. 212. 5.

Klasse.

Schweinsbrod. Erdäpfel.

Waldrüben. Saubrot.

Linne Pf. S. Th. S.

a. Die halb 5 spaltige Blumendecke.

b. Die einblättrige, tief 5 spaltige Krone, mit zurückgeschlagenen Lappen.

c. Die sich zusammenneigende 5 Staubfäden.

d. 2 Abgesonderte von innen und außen.

e. Der dicke runde Fruchtknoten nebst dem Griffel und der spitzen Narbe.

Wächst

Tab. 71.

Rubus Chamaemorus. Cl. XII.

Rubus foliis simplicibus lobatis,
caule inermi unifloro. L. 395.
12.

a. Perianthium cum staminibus
numerosis vel flos masculus.

b. Corolla cum flore masculo.

c. Perianthium cum germinibus
numerosis vel flos foemineus.

d. Corolla cum flore femineo.

e. Baccia composita.

f. Semina.

Ex una eademque radice ori-
tur et flos masculus et foemineus.
Abunde crescit in locis
paludosis Sueciae et Norwegiae,

Tab. 72.

Cyclamen europaeum. Cl. V.

Cyclamen corolla retroflexa. L.

415. I.

Archanira. Panis porcinus.

Cyclamen orbiculato folio in-
ferne purpurascente.

a. Perianthium semiquinquedau-
dum.

b. Corolla monopetala, limbo
profunde 5 partito, laciniis
retroflexis.

c. Stamina 5 cum antheris con-
niventibus.

d. Stamina 2 separata a parte
interna et externa.

e. Germen subrotundum cras-
sum, cum stylo et stigmate
acuto.

F 3

Sponte

Wächst in Oestreich und andern wärmeren Gegenden, in schattigen Wäldern, wild. Blüht im April oder May, ohngefähr in dieser Größe.

Sponte crescit in Austriae et aliorum regionum calidiorum, silvis umbrosis. Floret Aprili vel Majo, hac circiter magnitudine.

73. Tafel.

Gundelrebe. Pl. G. 771. 14.
Klasse.

Gunderman. Hundedrage.
Linne Pf. S. Th. S.

Tab. 73.

Glecoma hederacea, Cl. XIV.
Glecoma foliis reniformibus cre-

natis. L. 445. 1.

Hedera terrestris.

Chamaelema.

Calamintha humilior, rotun-

diore folio.

a. *Perianthium monophyllum*, tubulatum ore fido.

b. *Corolla ringens aperta cum staminibus 4, quorum 2 lon-*

giora, 2 breviora.

c. *Stamina 2 separata, singulum par connivens in formam crucis*.

d. *Germen 4drifidum cum stylo longo et stigmate bifido*.

Crescit ad sepes et arbores &c., altitudine propemodum pedali, floret Aprili.

74. Tafel.

Haselwurz. Pl. G. 640. 11.
Klasse.

Linne Pf. S. Th. S.

Tab. 74.

Asarum Europaeum, Cl. XI.

Asarum foliis reniformibus ob-

tusis binis. L. 367. 1.

Nardus sylvestris. Vulvago.

a. *Perianthium monophyllum*, semitrisidum pilosum; laci-

nium anterius absclissum est.

b. *Stamina 12, pistillum cir-*

curdantia.

c. *Germen cum stylo cylindra-*

ceo, et stigmate stellato sex-

partito.

d. *Sti-*

a. Die einblättrige, halb 3 spaltige, haarige Blumen-
decke, davon ein Lappen ab-
geschnitten ist.

b. Die 12 Staubfäden um den
Stempel stehend.

c. Der Fruchtknoten, mit dem
walzenförmigen Griffel und
der sternförmigen 6theiligen
Narbe.

- d. Der obere Theil der Narbe.
 e. die 6facheige Saamenkas-
 psel nebst den Saamen.
 Wächst an Gehegen, in die-
 ser Größe, blüht im April.

- d. Stigmatis pars superior.
 e. Capsula gloccularis cum se-
 minibus.
 Crescit ad sepes, iconis ma-
 gitudine, floret Aprili.

75. Tafel.

Aron. Pl. G. 1113. 20. Klasse.
 Pfaffen Pint. Deutscher Ing-
 ber. Zehrwurz.
 Linne Pfl. S. Th. S.

- a. Die oben eingeneigte Schei-
 de unten zusammengerollt.
 b. Der keulenförmige Kolben
 mit purpurfarbenem Mehle
 bestreut.
 c. Die Honigbehältnisse.
 d. Die Staubfäden, sizen alle
 fest am Kolben verwachsen.
 e. Ein abgesonderter.
 f. Die Fruchtknoten.
 Wächst an schattigten Ge-
 hegen, oder an Bergen, blü-
 het im April, ohngefähr in die-
 ser Größe.

Tab. 75.

- Arum maculatum. Cl. XX.
 Arum acaule, foliis hastatis in-
 tegerrimis, spadice clavato.
 L. 690. 12.
 Barba Aronis. Serpentaria mi-
 nor.
 Dracuncula minor. Lapha.
 Arum vulgare maculatum et
 non maculatum.
 a. Spatha apice connivens, basi
 convoluta.
 b. Spadix clavatus, farina pur-
 purascente confpersus.
 c. Nectaria.
 d. Stamina, omnia spadice sel-
 filia.
 e. Stamen separatum.
 f. Germina.
 Crescit circa sepes umbrosas,
 vel in montibus, floret Aprili,
 hac circiter magnitudine.

76. Tafel.

Windblume. Pl. G. 750. 13.
 Klasse.
 Küchenschelle.
 Linne Pfl. S. Th. S.

- a. Die 6blättrige Krone.
 b. Die zahlreichen Staubfä-
 den.
 c. Ein abgesonderter mit der
 2knöpfigen Narbe.

d. Die

Tab. 76.

- Anemone pulsatilla. Cl. XIII.
 Anemonae pedunculo involu-
 crato, petalis rectis, foliis
 bipinnatis. L. 424. 5.
 Pulsatilla folio crassiore et ma-
 jore flore.
 a. Corolla hexapetala.
 b. Stamina numerosa.
 c. Stamen separatum, cum an-
 thera didyma.

d. Ger-

- d. Die zahlreichen Fruchtknoten, in ein Köpfchen gehäuft.
e. Ein abgesonderter.
Wächst an trockenen sonnenreichen Hügeln, blüht im April, ohngefähr von dieser Größe.

77. Tafel.

Erdbeere. Pl. G. 683. 12. Klasse.

Linne Pf. S. Th. S.

- a. Die halb 10 spaltige Blumendecke mit den 20 Staubfaden.
b. Die 5blättrige Krone von oben,
c. von unten.
d. Ein abgesonderter Staubfaden.
e. Die zahlreichen Fruchtknoten in ein Köpfchen gehäuft.
f. Ein abgesonderter Fruchtknoten.
g. Zeitige Beere.

Wächst an schattigten Schegen, auf Bergen &c. ohngefähr in dieser Größe; blüht im Mai.

78. Tafel.

Krausbeere. Pl. G. 301. 5.

Klasse.

Rothe Johannisbeere.

Linne Pf. S. 3. Th. 295. S.

- a. Die einblättrige, bauchige, halbfünffspaltige Blumendecke.
b. Eben dieselbe, ausgebrettet, vergrößert; man sieht darinnen die 5 kleine stumpe Kronblätter in dieselbe eingefügt, nebst den 5 Staubfaden.

- d. Germina numerosa in capitulum collecta.
e. Germen separatum.
Crescit in collibus siccis apri-
cis, floret Aprili, magnitu-
dine prout icon dat.

Tab. 77.

Fragaria vesca. Cl. XII.

Fragaria flagellis reptantibus.

L. 396. I.

Fragula. Fragaria vulgaris.

a. Perianthium semidecemfi-
dum, cum 20 staminibus.b. Corolla pentapetala a supe-
riore.

c. ab inferiore parte.

d. Stamen separatum.

e. Germina numerosa in capi-
tulum collecta.

f. Germen separatum.

g. Baccae maturae.

Crescit ad sepes umbrosas, in
montibus &c. altitudo est ico-
nis, floret Majo.

Tab. 78.

Ribes rubrum. Cl. V.

Ribes inerme racemis glabris
pendulis, floribus planiuscu-
lis. L. 201. I.Grossularia multiplici acino, sive
non spinosa, hortensis rubra.a. Perianthium monophyllum,
ventricosum, semiquinque-
fidum.b. idem expansum, magnitudo
ne auctum; in illo conspi-
ciuntur petala 5, obtusa, mar-
gine illius innata, cum sta-
minibus 5.

c. Sta-

- c. 2 abgesonderte Staubfäden.
 d. Der Fruchtknoten mit dem
 2 spaltigen Griffel und den
 stumpfen Narben.
 e. Die zeitige, genabelte
 Frucht.
 f. Eine geöffnete Beere.
 g. Saamen.
 Wird bei uns in Gärten ge-
 zogen, blüht im Mai.
- c. Stamina 2 separata.
 d. Germen cum stylo bifido, et
 stigmatibus obtusis,
 e. Fructus matus umbilicatus,
 f. Bacca dissecta.
 g. Semen.
 Colitur apud nos in hortis,
 floret Majo.

79. Tafel.

Linne. Pl. G. 833. 14. Klasse
 se.

Linne Pf. S. Th. S.

- a. Die doppelte Blumendecke,
 die untere ist 4 blättrig, klein,
 die obere einblättrig, 5 thei-
 lig, aufrecht.
 b. Einblättrige 5 theilige
 Krone.
 c. Eben diese geöffnet mit den
 2 längern und 2 kürzern
 Staubfäden.
 d. Der Fruchtknoten, ist un-
 ten von dem untern Kelch
 umgeben.
 e. Der Griffel mit der Narbe.
 f. Die 2 Saamen.
 Wächst in Schweden wild &c.

80. Tafel.

Bienensang. Pl. G. 772, 14.
 Klasse.
 Weisse Laubnessel. Todter-
 nessel.

Linne Pf. S. Th. S.

a. Die

G

a. Pe-

Tab. 79.

- Linnaea Borealis, Cl. XIV.
 L. 478. 1.
 Linnaea borealis floribus gemi-
 natis.
 Campanula serpyllifolia,
 Linn, mater. med. pag. 157.
 a. Perianthium duplex, inferum
 tetraphyllum, parvum, supe-
 rum monophyllum, 5 parti-
 tum, erectum,
 b. Corolla monopetala, 5-par-
 tita,
 c. eadem aperta cum staminibus
 quorum 2 longiora, 2 bre-
 viora.
 d. Germen inferum, perianthio
 inero testum,
 e. Stylus cum stigmate.
 f. Semina bina,
 Crescit sponte in Suecia &c.

Tab. 80.

- Lamium album. Cl. XIV.
 Lamium foliis cordatis acumi-
 natis ferratis perfolatis, ver-
 ticillis vigintifloris. L. 446. 5.
 Urtica mortua. Galeoplis.
 Lamium vulgare album sive Ar-
 changlica flore albo.
 Urtica iners floribus albis,

G

a. Pe-

- a. Die einblättrige, 5zähnigte,
röhrligte Blumendecke.
b. Die einblättrige rachenförmige Krone aufgeschnitten,
mit den 2 längern und 2 kürzeren Staubfäden.
c. Ein abgesonderter Staubfaden.
d. Der 4spaltige Fruchtknoten, mit dem langen Griffel
und der 2spaltigen Narbe.
e. Die 4 Saamen im Kelch
eingeschlossen.
f. Ein abgesonderter 3seitig.
Wächst an Gehegen obngefehr 1 Fuß hoch, blüht im May
und Junius.

Tab. 81.

Prenzelbeere. Pl. G. 522. 8.
Klasse.
Heidelbeere. Bilbeere.
Linne Pf. S. 3. Th. S. 413.

- a. Die einblättrige kleine Blumendecke mit glattem Rand.
b. Die einblättrige Glockenformige Krone mit zurückgezollten Lappen.
c. Die 8 Staubfäden in ihrer natürlichen Stellung.
d. Ein abgesonderter.
e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der stumpfen Narbe.
f. Die zeitige Beere.
g. Saamen.
Wächst in Wäldern und auf dünnen Heiden, obngefehr 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im Mai.

82. Tab.

Tab.

- a. Perianthium 5-dentatum, tubulatum.
b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus quorum 2 longiora, 2 breviora.
c. Stamen separatum.
d. Germen 4-drifidum, cum styllo longo et stigmate bifido.
e. Semina 4 perianthio inclusa.
f. tale separatum triquetrum.
Crescit ad sepes, altitudine circiter pedali, floret Majo ac Junio.

Vaccinium myrtillus. Cl. VIII.
Vaccinium pedunculis unifloris,
foliis ferratis ovatis deciduis
caule angulato. L. 300. 1.
Myrtilli.
Vitis idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante.

- a. Perianthium monophyllum parvum integerrimum.
b. Corolla monopetala, campanulata, laciinis revolutis.
c. Stamina 8 in situ naturali.
d. Stamen separatum.
e. Germen cum styllo et stigma obtuso.
f. Baccae maturae.
g. Semina.
Crescit in sylvis et locis aridis desolatis, altitudine circiter sesquipedali, floret Majo.