

- a. Die einblättrige, 5zählige, röhrigte Blumendecke.
- b. Die einblättrige rachenförmige Krone aufgeschnitten, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der 4spaltige Fruchtknoten, mit dem langen Griffel und der 2spaltigen Narbe.
- e. Die 4 Saamen im Kelch eingeschlossen.
- f. Ein abgesonderter 3seitig. Wächst an Gehägen ohngefähr 1 Fuß hoch, blüht im May und Junius.
- a. Perianthium 5-dentatum, tubulatum.
- b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus quorum 2 longiora, 2 breviora.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen 4-drifidum, cum stylo longo et stigmate bifido.
- e. Semina 4 perianthio inclusa.
- f. tale separatum triquetrum. Crescit ad sepes, altitudine circiter pedali, floret Majo ac Junio.

81. Tafel.

Preuselbeere. Pl. G. 522. 8. Klasse.

Heidelbeere. Bilbeere.

Linne Pl. C. 3. Th. C. 413.

- a. Die einblättrige kleine Blumendecke mit glattem Rand.
- b. Die einblättrige Glockenförmige Krone mit zurückgerollten Lappen.
- c. Die 8 Staubfäden in ihrer natürlichen Stellung.
- d. Ein abgesonderter.
- e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der stumpfen Narbe.
- f. Die zeitige Beere.
- g. Saamen.

Wächst in Wäldern und auf durren Heiden, ohngefähr 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im Mai.

Tab. 81.

Vaccinium myrtillus. Cl. VIII. Vaccinium pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis caule angulato. L. 300. 1.

Myrtilli.

Vitis idaea foliis oblongis cre-natis fructu nigricante.

- a. Perianthium monophyllum parvum integerrimum.
- b. Corolla monopetala, campanulata, laciniis revolutis.
- c. Stamina 8 in situ naturali.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen cum stylo et stigmate obtuso.

f. Baccae maturae.

g. Semina.

Crescit in sylvis et locis aridis desolatis, altitudine circiter sesquipedali, floret Majo.

82. Tafel

Tab.

82. Tafel.

Megerkraut. Pl. G. 127. 4.
 Klasse.
 Waldmeister. Sternleberkraut.
 Herzfreund. Waldedel.
 Meserich.
 Linne Pf. C. Th. C.

- a. Die kleine 4zählige Blumendecke nebst dem Fruchtknoten, und dem 2spaltigen Griffel.
 b. Die einblättrige, trichterförmige stark 4theilige Krone, mit den 4 eingefügten Staubfäden.
 c. Die Frucht.
 Wächst in schattigten Wäldern obngefehr in dieser Grösse, blüht im Mai.

Tab. 82.

Asperula odorata, Cl. IV.
Asperula foliis octonis lanceolatis florum fasciculis pedunculatis, L. 125. 1.
Matrifylva, *Hepatica stellata*.
Aparine latifolia humilior montana.
 a. Perianthium parvum 4-dentatum, cum germine et stylo bifido.
 b. Corolla monopetala, infundibuliformis, profunde 4-drparita, cum staminibus 4 illae infertis.
 c. Baccae.
 Crescit in umbrosis locis sylvarum, hac circiter magnitudine, floret Majo.

83. Tafel.

Kamfel. Pl. G. 218. 17.
 Klasse.
 Bitter Kreuzblume.
 Linne Pf. C. Th. C.

- a. Die 3blättrige Blumendecke.
 b. Die Schmetterlingsförmige Krone, geöffnet.
 c. Die Fahne.
 d. Eben diese geöffnet, mit 8 Staubfäden, die in 2 Parthien verwachsen sind.
 e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.
 Wächst auf feuchten Wiesen in dieser Grösse, blüht im Mai.

Tab. 83.

Polygala amara, Cl. XVII.
Polygala floribus crystatis racemosis, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus L. 531. 3.
Ambarvalis.
 a. Perianthium triphyllum.
 b. Corolla papilionacea aperta.
 c. Vexillum.
 d. Idem apertum, cum staminibus 8, in 2 partes connatis.
 e. Germen cum stylo et stigmate bifido.
 Crescit in pratis humidis, magnitudine iconis, floret Majo.

84. Tafel

C 2

Tab. 84.



84. Tafel.

Bilsen. Pl. G. 263. 5. Klasse.
Schlacktraut.
Linne Pl. S. Th. C.

- a. Die einblättrige, röhrigte, spaltige sehr haarigte Blumendecke.
- b. Die einblättrige, trichterförmige, an der Mündung halb spaltige Krone, mit den 5 Staubfäden.
- c. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel, und der knöpfigen Narbe.
- d. Die Saamentapsel.
- e. Die Scheidewand in derselben.
- f. Die Saamen welche diese umgeben.

Wächst an rauhen steinigten Orten, ohngefähr 1 Fuß hoch, blüht im Mai oder Junius.

Tab. 84.

Hyoscyamus niger. Cl. V.
Hyoscyamus foliis amplexicaulis sinuatis floribus sessilibus, L. 184. 1.

- Faba suilla*.
- a. *Perianthium monophyllum tubulosum, 5fidum, pilosissimum*.
 - b. *Corolla monopetala, infundibuliformis, ore semiquinquesido, cum 5 staminibus*.
 - c. *Germen cum stylo filiformi et stigmatibus capitato*.
 - d. *Capsula seminalis*.
 - e. *ejusdem dissepimentum*.
 - f. *Semina illud circumdantia*.

Crescit in locis rudis, lapidosis, altitudine circiter pedali, floret Majo et Junio.

85. Tafel.

Sinnat. Pl. G. 175. 4. Klasse.

Löwenfuß, Frauenmantel.
Grosser Sanikel.
Linne Pl. S. Th. C.

- a. Die einblättrige röhrigte Blumendecke mit 8theiliger Mündung.
- b. Eben diese ausgebreitet, mit den 4 auf der Mündung derselben sitzenden Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der Eirunde Fruchtknoten mit dem Griffel und der eunden Narbe.

Wächst an Gehegen, an Wäldern etc. ohngefähr 1 Fuß hoch, blüht im Mai.

Tab. 85.

Alchemilla vulgaris. Cl. IV.
Alchemilla foliis lobatis. L. 139. 1.
Alchemilla major. Pes leonis. Leontopodium.

- a. *Perianthium monophyllum, tubulatum, ore 8-partito*.
- b. *idem expansum, cum staminibus 4 ori impositis*.
- c. *Stamen separatum*.
- d. *Germen ovatum, cum stylo et stigmatibus globoso*.

Crescit juxta sepem, sylvas &c. altitudine circiter pedali, floret Majo.

86. Tafel.

Tab.

86. Tafel.

Sauerrach. Pl. G. 475. 6.
Klasse.

Erbfeien. Weinnägelein.

Berberizen. Sauerborn.

Linne Pf. S. 3. Th. S. 385.

a. Die 6blättrige gefärbte
Blumendecke, 3 Blättgen
sind kleiner.

b. Die 6blättrige Krone mit
den 6 Staubfäden.

c. Ein Kronblatt mit den Ho-
nigbehältnissen.

d. Ein abgesonderter Staub-
faden, mit den 2 Staubbeu-
teln.

e. Der walzenförmige Frucht-
knoten mit der kraisrunden
Narbe.

f. Die zeitige Frucht.

g. Eben diese geöffnet mit den
2 Saamen.

Eine Staude die häufig an
Gebegen wächst, blüht im
Mai und Junius.

Tab. 86.

Berberis vulgaris. Cl. VI.

Berberis pedunculis racemosis.
L. 282. 1.

Oxyacantha. Berberis dume-
rorum.

a. Perianthium hexaphyllum
coloratum, petalis alternis
minoribus.

b. Corolla 6-petala cum stami-
nibus 6.

c. Petalum cum nectariis.

d. Stamen separatum cum an-
theris 2.

e. Germen cylindraceum cum
stigmatate orbiculato.

f. Baccae maturae.

g. una earum dissecta eum 2
feminibus.

Frutex copiose in sepibus
crescens, floret Majo et Junio.

87. Tafel.

Preuselbeere. Pl. G. 522. 8.
Klasse.

Gemeine Preuselbeere.

Linne Pf. S. 3. Th. S. 419.

a. Die 8 Staubfäden nebst dem
Stempel.

b. Ein abgesonderter, mit dem
2 hörnigten Staubbeutel.

c. Die zeitige Beere.

d. Eben diese entzweigefchnitten

e. Saamen.

Wächst an Bergen und in
Wäldern, blüht im Mai und
Junius.

Tab. 87.

Vaccinium vitis idaea. Cl. VIII.

Vaccinium racemis terminali-
bus nutantibus foliis obova-
tis revolutis integerrimis sub-
tus punctatis. L. 301. 10.

Vitis idaea foliis subrotundis
non crenatis baccis rubris.
Linnaei mat. med. p. 103.

a. Stamina 8 cum pistillo.

b. Stamen separatum, cum an-
thera bicorni.

c. Baccae maturae.


d. una earum aperta.

e. Semen.

Crescit circa montes et in
sylvis, floret Majo et Junio.

③ 3

Tab.



88. Tafel.

Wegerich. Pl. G. 149. 4. Klasse.
Spiziger Wegerich. Hunde-
Rippe. Schmales Wegebrett.
Linne Pl. C. Th. C.

- a. Die 4theilige Blumendecke.
- b. Die einblättrige, röhrigte,
oben 4theilige Krone.
- c. Die 4 langen Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter.
- e. Der Eirunde Fruchtnoten,
mit dem fadenförmigen Griffel
und der einfachen Narbe.
Wächst häufig auf allen
Wiesen, nicht viel höher als die
Abbildung, blüht im Mai.

89. Tafel.

Fichte. Pl. G. 1170. 21. Klasse.
Lerchenbaum.

Linne Pl. C. 2. Th. C. 359.

- a. a. Männliche Blüthen.
- b. b. Weibliche Blüthen.
- c. c. 2 abgesonderte Staubfäden,
von beeden Seiten, aus
der männlichen Blüthe.
- d. d. Die 2 blüthige Schuppen
der weiblichen Blüthe von
beeden Seiten.
- e. Der in der mitten durch
schnittene Zapfen.
- f. Saamen.

Wächst häufig auf den Tirol-
ser Gebürgen und andern wär-
men Gegenden, blüht im Mai.

90. Tafel.

Schmerb.l. Pl. G. 335. 5.
Klasse.

Guter Heinrich. Stolzher Hein-
rich.

Linne Pl. C. Th. C.

- a. Die

Tab. 88.

Plantago lanceolata. Cl. IV.
Plantago foliis lanceolatis, spi-
ca subovata nuda, scapio an-
gulato. L. 131. 6.

Plantago angustifolia.

Quinquenervia minor.

- a. Perianthium 4-drifidum.
- b. Corolla monopetala, tubu-
losa, limbo 4-drifido.
- c. Stamina 4 longissima.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen ovatum, cum stylo
filiformi et stigmate simplici.

Crescit abunde in pratis, ico-
ne paulo plus altior; floret Ma-
jo.

Tab. 89.

Pinus larix. Cl. XXI.

Pinus foliis fasciculatis obtusis.
L. 719. 7.

- a. a. Flores masculi.
- b. b. flores feminei.
- c. c. 2 Stamina separata ab utra-
que parte, ex flore masculino.

d. d. Squamae biflorae, floris
foeminei, ab utraque parte.

e. Strobilus per medium disse-
ctus.

f. Semen.


Crescit copiose in montibus
Tyrolensibus, aliisque regi-
onibus calidioribus, floret Majo.

Tab. 90.

Chenopodium bonus henricus
Cl. V.

*Chenopodium foliis triangulari
sagittatis integerrimis*, spicis
compositis aphyllis, axillari-
bus. L. 216. 1.

Ro-



- a. Die 5 blättrige Blumendecke.
 b. Die 5 Staubfäden.
 c. Ein abgesonderter mit der
 2 knöpfigen Narbe.
 d. Der runde Fruchtknoten mit
 dem 2 theiligen Griffel.

Wächst an Häusern, Mau-
 ren etc. blüht im Mai, wird
 oft 2 Fuß hoch, so daß die Blät-
 ter 3-4 mal größer als die hier
 abgebildeten sind.

91. Tafel.

Hederich. Pl. G. 376. 18. Klasse.
 Knoblauchkraut. Läusekraut.
 Linne Pf. S. Th. S.

- a. Die 4 blättrige Blumendecke.
 b. Die 4 blättrige kreuzförmige
 Krone.
 c. Die 6 Staubfäden deren 4
 länger, 2 kürzer sind.
 d. Ein abgesonderter Staub-
 faden.
 e. Die 4 eckigte, 2 fächerige
 Schote.

Wächst an schattigten Gebir-
 gen, ohngefähr 1 und ein hal-
 ben Fuß hoch, blüht im Mai
 oder Junius.

92. Tafel.

Knöterich. Pl. G. 535. 8.
 Klasse.
 Schlangen - Ratter - Wurm,
 Wurzel.
 Linne Pf. S. Th. S.

a. Die

Bonus Henricus. Lappatum un-
 ctuosum. Tota bona.

- a. Perianthium pentaphyllum.
 b. Stamina 5.
 c. Stamen separatum, cum an-
 thera didyma.
 d. Germen orbiculatum, cum
 stylo bifido.

Crescit ad aedes, muros &c.
 floret Majo, soepe altitudinem
 bipedalem attingit, ita ut folia
 magnitudinem icone exhibitam,
 3 vel 4 superare videantur.

Tab. 91.

Erysimum alliaria. Cl. XIV. XV
 Erysimum foliis cordatis. L.
 499. 3.

- Alliaria. Alliastrum.
 a. Perianthium tetraphyllum.
 b. Corolla 4-petala crucifor-
 mis.
 c. Stamina 6, quorum 4 longi-
 ora, 2 breviora.
 d. Stamen separatum.
 e. Siliqua tetragona, bilocularis.

Crescit ad sepes umbrosas,
 altitudine circa sesquipedali, flo-
 ret Majo et Junio.

Tab. 92.

Polygonum bistorta. Cl. 8.
 Polygonum caule simplicissimo
 monostachio, foliis ovatis in
 petiolum decurrentibus. L.
 311. 2.
 Bistorta. Serpentaria vulgaris
 rubra.
 Colubrina. Bistortaradice mi-
 nus intorta.

a. Pe-

- a. Die stheilige Blumendecke oder vielmehr Krone, mit den 8 Staubfäden.
 b. Ein Deckblätigen.
 c. Ein abgesonderter Staubfaden.
 d. Der Fruchtknoten mit den 3 fadenförmigen Griffeln.
 e. e. Eine neue Blumenknospe, unter der erstern.
 Wächst auf feuchten Wiesen bis 1 und ein halben Fuß hoch, blüht im Mai und Junius.

- a. Perianthium 5-partitum, (vel potius corolla) cum staminibus 8.
 b. Bractea.
 c. Stamen separatum.
 d. Germen cum stylis tribus filiformibus.
 e. e. Gemma novae floris, sub priore latens.
 Crescit in pratis humidis, altitudine propemodum sesquipedali floret Majo et Junio.

93. Tafel.

Rlee. Pl. G. 965. 17. Klasse.
 Wiesenkle. Mettenbrodt.
 Linne Pf. S. Th. S.

- a. Die einblättrige, röbrigte, 5zählige Blumendecke.
 b. Die einblättrige, stheilige Krone.
 c. Eben diese geöffnet mit den in 2 Parthien verwachsenen Staubfäden, 1 einfachen, und 1 neunspaltigen.
 d. Die abgesonderte 9spaltige Staubfaden.
 e. Der einfache.
 f. Der Eirunde Fruchtknoten, nebst dem pfriemenförmigen Griffel, und der einfachen Narbe.

Wächst häufig auf allen Wiesen, ohngefehr 1 Fuß hoch, blüht im Mai, Junius und Julius.

94. Tafel.

Raufen. Pl. G. 457. 6. Klasse.
 Maibenblumen.
 Linne Pf. S. Th. S.

a. Die

Tab. 93.

- Trifolium pratense. Cl. XVII.
 Trifolium spicis globosis subvillosis, cinctis, stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis, L. 572, 19.
 a. Perianthium monophyllum, tubulatum, 5-dentatum.
 b. Corolla monopetala 5-partita.
 c. eadem aperta cum staminibus in 2 partes connatis, simpli- et Novemfido.
 d. Stamina 9 connata separata.
 e. Simplex.
 f. Germen ovatum, stylo subulato, et stigmati simplici.

Copiose crescit in pratis, pedali circiter altitudine, floret Majo, Junio, ac Julio.

Tab. 94.

- Convallaria majalis. Cl. VI.
 Convallaria scapo nudo. L. 275. I.
 Lilium convallium.

a. Co-

a. Die einblättrige, glockenförmige, an der Mündung 6-spaltige Krone, mit denen in dieselbe eingefügten 6 Staubfäden.

b. Ein abgesonderter Staubfaden.

c. Der runde Fruchtknoten mit dem Griffel und der zackigten Narbe.

Wächst in Gärten und Wäldern, ohngefähr von dieser Größe, blüht im Mai.

95. Tafel.

Streifenfaru. Pl. G. 1283. 24. Klasse.

Koher Wiederthron.

Linne Pf. S. Th. C.

a. Die Befruchtungstheile auf dem untern Theil des Blatts.

Wächst an alten Mauern, Felsen &c. ohngefähr in dieser Größe.

96. Tafel.

Pflaumen. Pl. G. 675. 12. Klasse.

Kirschlorber. Mandelblätter. Linne Pf. S. 1. Th. C. 737.

a. Die einblättrige glockenförmige, 5-spaltige Blumendecke.

b. Die 5blättrige Krone von oben.

c. von unten.

d. Eben diese mit dem Kelch, und denen in denselben eingefügten 20 Staubfäden.

e. Ein abgesonderter Staubfaden mit der 2 knöpfigen Narbe.

a. Corolla monopetala, campanulata, limbo 6-fido, cum staminibus 6 illi insertis.

b. Stamen separatum.

c. Germen globosum cum stylo et stigmate trigono.

Crescit in hortis, sylvisque, iconis circiter magnitudine, floret Majo.

Tab. 95.

Asplenium Trichomanoides. Cl. XXIV.

Asplenium frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis. L. 784. 19.

Adiantum rubrum. Polytrichum offic.

a. Fructificatio in parte inferiore foliorum.

Crescit ad parietes murium et rupium &c. circiter magnitudine figuræ.

Tab. 96.

Prunus lauro cerasus. Cl. XII.

Prunus floribus racemosis, foliis sempervirentibus, dorsis biglandulosis. L. 386. 5.

Cerasus folio laurino.

a. Perianthium monophyllum, campanulatum 5-fidum.

b. Corolla pentapetala a parte superiore,

c. ab inferiore.

d. eadem cum calyce, et staminibus 20 illae insertis.

e. Stamen separatum cum anthera didyma.

f.

f. Co-

- f. Ein abgefondertes eingebogenes Kronblatt.
 g. Der rundlichte Fruchtknoten, mit dem Griffel und der kreisrunden Narbe.
 h. Die zeitige Frucht.
 i. geöffnet.
 k. Der Kern.
 l. die 2 an dem untern Theil jeden Blatts befindliche Drüsen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, blüht im Mai oder Juni.

- f. Corollae petalum concavum separatum.
 g. Germen subrotundum cum stylo et stigmatate orbiculato.
 h. Drupa matura.
 i. aperta.
 k. Nux.
 l. duae glandulae in parte inferiore folii residentes.

Colitur apud nos in hortis, floret Majo vel Junio.

97. Tafel.

Wavie. Pl. G. 495. 7. Klasse.
 Wilde Kastanien. Roßkastanien.

Linne Pf. S. 1. Th. S. 438.

- a. Die einblättrige, 5theilige Blumendecke.
 b. Die 5blättrige Krone.
 c. Ein abgefondertes Kronblatt.
 d. Die 7 niedergebogene Staubfäden.
 e. Der rundlichte Fruchtknoten mit dem pfriemenförmigen Griffel und der spizigen Narbe.

Dieser Baum wird nun überall zu Alleen gezogen, blüht im Juni.

98. Tafel.

Osterluzey. Pl. G. 1105. 20. Klasse.

Lange Osterluzey.

Linne Pf. S. 1. Th. S.

- a. Die einblättrige, röhrigte Krone von oben.
 b. von unten.

c. Eben

Tab. 97.

Aesculus hippo-castanum. Cl. VII.

Aesculus floribus heptandris. L. 290. 1.

Castanea equina folio multifido.

a. Perianthium monophyllum, 5-dentatum.

b. Corolla pentapetala.

c. Petalum corollae separatum.

d. Stamina 7 declinata.

e. Germen subrotundum cum stylo subulato et stigmatate acuminato.

Arbor hic ubique colitur ad conficienda ambulacra, floret Junio.

Tab. 98.


Aristolochia longa. Cl. XX.

Aristolochia foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusifolius, caule infirmo, floribus solitariis. L. 687. 19.

a. Corolla monopetala tubulosa a parte superiore.

b. ab inferiore.

c. eaq-



- e. Eben diese geöffnet.
 d. Der Fruchtknoten mit der kugelrunden Narbe, auf dieser sind oben die 5 Staubbeutel angewachsen.
 e. Ein abgesonderter Staubbeutel.
 f. Die Narbe mit den 5 Staubbeuteln, von oben.
- Wächst in warmen Gegenden wild, blüht bei uns im Junius, wird über 2 Fuß hoch.
- c. eadem aperta.
 d. Germen cum stigmatе globoſo, cui antherae 5 adnatae ſunt.
 e. Anthera ſeparata.
 f. Stigma cum 5 antheris a parte ſuperiore.
- Sponte creſcit in regionibus calidioribus, floret apud nos Junio, altitudine bipedali.

99. Tafel.

Tab. 99.

Ampfer. Pl. G. 483. 6. Klaſſe.
 Rundblättrichter Sauerampfer.
 Linne Pl. S. Th. S.

Rumex ſcutatus. Cl. VI.
 Rumex floribus hermaphoditis foliis cordato haſtatis, caule tereti. L. 285. 18.
 Acetoſa rotundifolia. Linn. mat. med. pag. 99.

- a. Die 3blättrige Blumendecke.
 b. Die 3blättrige Krone mit den 3 Stempeln.
 c. Die 6 Staubfäden.
 d. Ein abgesonderter mit der knöpfigten Narbe.
 e. Der Fruchtknoten mit den haarförmigten Griffeln und zerstückten Narben.
- a. Perianthium triphyllum.
 b. Corolla tripetala cum 3 pistillis.
 c. Stamina 6.
 d. Stamen ſeparatum cum anthera didyma.
 e. Germen cum ſtylis filiformibus et ſtigmatibus laciniatis.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst in Frankreich und andern warmen Gegenden wild. Blüht im Junius, wird ohngefehr 1 und ein halben Fuß hoch.

Colitur apud nos in hortis, ſponte creſcit in Gallia aliisque regionibus calidioribus. Floret Junio, altitudine circiter ſeſquipedali.

100. Tafel

§ 2

Tab.

Storchschnabel Pl. G. 896.
16. Klasse.

Ruprechtskraut. Gottesgnad:
Nothblausenfraut.

Stinkender Storchschnabel.
Linne Pl. S. Th. S.

Geranium Robertianum, Cl.
XVI.

Geranium pedunculis bifloris,
calycibus pilosis decemangu-
latis. L. 515. 45.

Gratia Dei. Herba Ruperti.
Geranium Robertianum pri-
mum rubens.

a. Die 5blättrige Blumen-
decke.

a. Perianthium pentaphyllum.

b. Die 5blättrige Krone von
oben

b. Corolla pentapetala a parte
superiore.

c. von unten.

c. ab inferiore.

d. Ein abgesondertes Kron-
blatt.

d. Petalum corollae separatum.

e. Die 10 Staubfäden in ei-
nem Tropp verwachsen.

e. Stamina 10 connata.

f. Ein abgesonderter.

f. Stamen separatum.

g. Der seckigte Fruchtknoten,
mit dem pfriemensförmigen
Griffel und den 5 Narben.

g. Germen 5-angulare, cum
stylo subulato et stigmati-
bus 5.

h. Die 5knöpfige Frucht in
die Quere durchschnitten.

h. Fructus pentacoccus trans-
versim dissectus.

Wächst an feuchten, steinig-
ten Orten, ohngefehr 1 und ein
halben Fuß hoch, blüht im Ju-
nius.

Crescit in locis humidis lapi-
dosis altitudine prope sesquipe-
dali, floret Junio.

