FLORE

MÉDICALE.

FLORE

MÉDICALE.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0002-4
DFG

FLORE MÉDICALE,

DÉCRITE

PAR F. P. CHAUMETON,

DOCTEUR EN MÉDECINE,

PEINTE

PAR Mme. E. P....., ET PAR P. J. F. TURPIN.

Nous avons pensé que le moyen de ne pas nous égarer, consistait à prendre pour guide le Dictionaire des sciences médicales.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, *page xiv.*

TOME SECOND.

PARIS,

C. L. F. PANCKOUCKE, EDITEUR

DU DICTIONAIRE DES SCIENCES MÉDICALES,

Rue et hôtel Serpente, n°. 16.

1815.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0003-9

DFG

FLORE
MÉDICALE,

PAR

P. P. CHAUMETON,

DOCTEUR EN MÉDECINE,

PEINTE

PAR Mme. E. P....., ET PAR P. J. F. TURPIN.

Nous n'avons pensé que le moyen de ne pas être égaré, consistait à prendre pour guide le Dictionnaire des sciences médicales.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page xlv.

TOME SECOND.

PARIS,

C. L. F. PANCKOUCKE, ÉDITEUR,

LIBRAIRE DU DICTIONNAIRE DES SCIENCES MÉDICALES,

Rue et Hôtel Serpente, n°. 16.

1815.

BAUME DU PÉROU.

a. l. l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0006-7
DFG

LIX.

BAUMIER DU PÉROU.

Latin . . . . . { PERUIFERA [illegible], *Materia medica*, ed. Salerne; appellation [illegible]. / MYROSPERMUM PEDICELLATUM; Lamarck? / [illegible], Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.

Italien . . . . . [illegible] BALSAMO PERUVIANO.
Français . . . . [illegible] DU PÉROU.
Anglais . . . . [illegible] BALSAM-TREE.
Allemand . . . . [illegible], Hagen; PERUBAUM, Planer; PERUVIANISCHER [illegible].

Les [illegible] les voyageurs, les recherches des naturalistes [illegible] nous encore fait connaître exactement le végétal [illegible] le baume du Pérou. Il semblerait pourtant que [illegible] eût dû en déterminer parfaitement les caractères botaniques, d'après un échantillon garni de feuilles et de fleurs, que lui avait envoyé le célèbre Mutis. M. Turpin juge la description du *myroxylon peruiferum*, inexacte, en ce que Linné lui assigne des feuilles ailées sans impaire; il ajoute que les folioles se détachant communément dans les herbiers, on aura pu se tromper en recomposant les feuilles. M. Lamarck indique une autre différence; il observe que le fruit du *myroxylon peruiferum* n'étant point portée sur un [illegible] pédicule, il doit être rapporté au *myrospermum* [illegible] et non au *pedicellatum*. Cependant, comme M. Turpin a séparé ce dernier, qu'il croit être le vrai baumier du Pérou, je vais décrire cette espèce, en prévenant toutefois le lecteur de regarder comme très-incertain ce qui, aux yeux de ce collaborateur, est en quelque sorte une vérité [illegible].

[illegible] docteur Joseph de Jussieu des renseignements sur le myrosperme pédicellé, qui croît naturellement au Pérou; les habitans de ce pays le nomment en Espagnols *saumerio*. C'est un grand arbre, [illegible] de nombreux rameaux et couronné d'un feuillage [illegible] couvert jusqu'à deux pieds de diamètre. [illegible] blanchâtre dans les couches extérieures, tandis que [illegible] il est d'un rouge obscur tirant sur le noir.

[illegible] ailées avec une impaire, composées de folioles ovales, entières, quelquefois [illegible] dentées, glabres en dessus, légèrement cotonneuses en dessous, alternes, soutenues par de courts pétioles, [illegible] coriaces, relevées en dessous d'une [illegible]

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0008-9
DFG

LIX.

BAUMIER DU PÉROU.

Latin . . . . . PERUIFERA ; Linné, *Materia medica*, ed. Schreber ; appendix : *resinæ*.
MYROSPERMUM PEDICELLATUM ; Lamarck ?
MYROSPERMUM ; Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses?*
Italien . . . . . ALBERO DEL BALSAMO PERUVIANO.
Français. . . . BAUMIER DU PÉROU.
Anglais . . . . PERUVIAN BALSAM-TREE.
Allemand. . . BALSAMBAUM, Hagen ; PERUBAUM, Planer ; PERUVIANER BALSAMBAUM, C.

Les observations des voyageurs, les recherches des naturalistes ne nous ont point encore fait connaître exactement le végétal qui fournit le baume du Pérou. Il semblerait pourtant que Linné fils aurait dû en déterminer parfaitement les caractères botaniques, d'après un échantillon garni de feuilles et de fleurs, que lui avait envoyé le célèbre Mutis. M. Turpin juge la description du *myroxylon peruiferum*, inexacte, en ce que Linné lui assigne des feuilles ailées sans impaire; il ajoute que les folioles se détachant communément dans les herbiers, on aura pu se tromper en recomposant les feuilles. M. Lamarck indique une autre différence; il observe que la gousse du *myroxylon peruiferum* n'étant point portée sur un long pédoncule, il doit être rapporté au *myrospermum frutescens*, et non au *pedicellatum*. Cependant, comme M. Turpin a figuré ce dernier, qu'il croit être le vrai baumier du Pérou, je vais décrire cette espèce, en prévenant toutefois que je regarde comme très-incertain ce qui, aux yeux de mon habile collaborateur, est en quelque sorte une vérité démontrée.

Nous devons au docteur Joseph de Jussieu des renseignemens complets sur le myrosperme pédicellé, qui croît naturellement au Pérou; les habitans de ce pays le nomment *quina-quina*, et les Espagnols *saumerio*. C'est un grand arbre, dont le tronc, garni de nombreux rameaux et couvert d'une écorce cendrée, acquiert jusqu'à deux pieds de diamètre. Son bois, très-dur, est blanchâtre dans les couches extérieures, tandis qu'à l'intérieur il est d'un rouge obscur tirant sur le noir.

Les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire, composées de sept à quinze folioles ovales, entières, quelques-unes un peu pointues, mais la plupart légèrement échancrées au sommet. Ces folioles sont alternes, soutenues par de courts pétioles, vertes, fermes, coriaces, relevées en dessous d'une

côte médiane saillante, de laquelle naissent latéralement des nervures grêles, obliques, parallèles, peu sensibles.

Les fleurs sont pédicellées, nombreuses, disposées sur les rameaux en jolis épis droits, longs d'environ six pouces. Chaque fleur offre : un calice campanulé, pubescent, dont le bord est armé de cinq dents peu proéminentes ; une corolle blanche, papilionacée, composée de cinq pétales, dont l'un, plus ample et presque cordiforme, représente l'étendard ; deux autres figurent les ailes, et les deux derniers, connivens par leur bord postérieur, forment la carène ; dix étamines, dont les filamens libres portent des anthères jaunes, droites, oblongues, biloculaires ; un ovaire supérieur, pédiculé, surmonté d'un style et d'un stigmate, lesquels figurent une faucille à pointe très-acérée.

Le fruit est une gousse oblongue, comprimée, obtuse, mucronée supérieurement, élevée du fond du calice sur un pédicule de quatre à six lignes : cette gousse est mince, glabre, jaunâtre, longue de deux à quatre pouces, ayant au sommet un renflement ovale, rugueux, qui ne renferme qu'une seule graine, fauve, presque réniforme.

La dureté considérable du bois de myrosperme, le rend très-propre à la construction des édifices, des moulins à sucre et généralement des ouvrages de charpente. Jussieu et Lamarck, qui nous transmettent ces renseignemens (1), ne disent point que l'écorce soit imprégnée du suc résineux balsamique, qui, selon les pharmacologistes, distille du baumier du Pérou (2). Dans le myrosperme, au contraire, c'est la graine qui contient le baume ; l'arbre doit même son nom à cette particularité (3). Ainsi, nous ne possédons, comme je l'ai déjà observé, que des notions très-insuffisantes, très-incomplettes sur le végétal qui produit le baume du Pérou, et sur la manière d'en retirer ce suc aromatique. La plupart des auteurs s'accordent à dire qu'on suit les mêmes procédés que pour l'extraction du baume de la Mecque. Je ne répéterai point ici l'énumération de ces procédés, que j'ai soigneusement détaillés en décrivant le balsamier, *amyris opobalsamum*.

(1) *Encyclopédie méthodique : Botanique*, tome 4, page 192.

(2) Geoffroy, *Traité de la matière médicale*, tom 3 (1743), p. 389.
Goulin, *Dictionaire raisonné-universel de matière médicale*, tome 1 (1773), page 485.
Spielmann, *Institutiones materiæ medicæ* (1784), page 320.
Fourcroy, dans l'*Encyclopédie méthodique : Médecine*, tom. 3, p. 648.

(3) Μυρον, parfum, baume ; σπερμα, graine, semence : μυροσπερμον, graine parfumée, graine embaumée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0010-8
DFG

Les sophistications par lesquelles on dénature le baume de la Mecque, s'exercent peut-être plus fréquemment encore sur celui du Pérou, en sorte que nous l'obtenons très-rarement *vierge*. Le commerce nous en offre deux espèces ou variétés, distinguées et dénommées d'après leur couleur:

1°. Le baume du Pérou blanc, est le plus pur, le plus précieux, le plus rare. Il exhale une odeur suave, qui se rapproche beaucoup de celle du benjoin. Plus limpide et moins consistant que la térébenthine, il s'épaissit, se durcit, et constitue alors, *dit-on*, le baume du Pérou sec, ou baume en coque (4).

2°. Le baume du Pérou noir, ou plutôt brun, est plus épais que le blanc, inflammable comme lui, et d'une odeur très-analogue à celle de la vanille.

Ces deux sortes de baume déposent au fond des vases où ils ont été longtemps renfermés, et fournissent par la distillation, des cristaux qui ne diffèrent pas sensiblement des fleurs de benjoin; ils se combinent facilement à l'alcool et aux huiles essentielles, refusent de se mêler aux huiles grasses, et ne s'unissent à l'eau que par l'intermède d'un mucilage ou d'un jaune d'œuf.

La saveur du baume du Pérou est piquante, aromatique; ses vertus, célébrées jadis avec enthousiasme, sont à peine mentionnées par les thérapeutistes modernes. Il a été prodigieusement vanté par Hernandez, Monardes, Pison; Kirkland prétend avoir calmé des convulsions terribles, et Van Swieten avoir guéri des coliques extrêmement violentes, en administrant le baume du Pérou, joint au sucre, à la dose d'un demi-gros, et même d'un gros, répétée plusieurs fois par jour, et continuée pendant un certain temps. Hofmann surtout s'est montré le panégyriste outré de ce suc balsamique; il le recommande dans une foule d'affections variées: c'est, à l'en croire, un excellent stomachique, un merveilleux cordial, un puissant béchique, et même un antiphthisique; il convient parfaitement aux maladies de la poitrine et des voies urinaires; il possède le rare avantage de réunir et de consolider les plaies récentes sans suppuration et sans cicatrice! Quel dommage de ne retrouver ces admirables propriétés que dans l'imagination exaltée du célèbre professeur de Halle!

Parmi les préparations pharmaceutiques dans lesquelles

(4) D'autres croient avec plus de vraisemblance que le baume en coque est une substance particulière, *naturellement* jaune-dorée, sèche et cassante.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0011-3

entre le baume du Pérou, il suffira de citer le sirop balsamique de Fréderic Hofmann, les pilules balsamiques de Morton, le baume de Locatelli, le baume apoplectique, l'emplâtre stomachique de Tacamahaca, l'essence de benjoin composée.

HOFMANN (fréderic), *De balsamo peruviano*, *Diss. med. inaug. resp. Imman. Lehmann*; in-4°. *Halæ*, 12 *jan.* 1703. — *Id.* 1706, etc.
LEHMANN (jean-chrétien), *De balsamo peruviano nigro*, *Diss. inaug. resp. Sigism. Schneider*; in-4°. *Lipsiæ*, 1707.
HADLEY (henri), *De balsamo peruviano*, *Diss.* in-4°. *Lugduni Batavorum*, 1718.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 59.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Calice cotonneux, campanulé, quinqué-denté, duquel on voit sortir l'ovaire pédiculé, courbé en faucille, et dix étamines libres entre elles, insérées intérieurement et au bas du calice.
2. Calice ouvert, dans lequel on voit l'étendard, qui est grand et échancré au sommet, plus quatre autres pétales, dont les deux plus voisins de l'étendard remplissent le rôle d'ailes, et les plus éloignés celui de carène : ces pétales sont blancs.
3. Fruit ou légume monosperme, pédiculé, et garni d'une aile membraneuse dans toute sa longueur ; il est représenté de grandeur naturelle.
4. Partie inférieure du même fruit, dont on a enlevé une valve, afin de mettre à découvert la graine. Cette graine est remplie d'un suc résineux qui paraît ne différer en rien du baume du Pérou des boutiques.

La plante décrite par Linné fils, sous le nom de *myroxylon peruiferum*, n'a jamais été figurée, et n'existe dans aucun des nombreux herbiers que j'ai visités. Celle que j'ai représentée se trouve dans l'herbier du Pérou de M. Joseph de Jussieu, oncle du célèbre Antoine Laurent de Jussieu, qui a bien voulu me la communiquer. (T.)

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0012-9
DFG


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0013-5
DFG

Turpin. P. Lambert Sc. sculp.

BECCABUNGA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0014-1
DFG

LX.

BECCABUNGA.

Grec . . . . . ; *C.*

Latin . . . ANAGALLIS AQUATICA MAJOR, FOLIIS SUBROTUNDO; Bauhin, Hist. [illegible], sect. 1.

VERONICA AQUATICA MAJOR, FOLIIS SUBROTUNDO; Tournefort, *infundibuli formâ.*

BECCABUNGA; *racemis lateralibus, foliis ovatis, caule repente*: Linné, clas. 2, *diandrie monogynie*, Jussieu, clas. 8, ord. 2, *pédiculaires.*

Italien . . . ANAGALLIDE ACQUATICA; BECCABUNGIA.

Espagnol . . . BECCABUNGA.

Français . . . BECCABUNGA; BECCABONGA; VÉRONIQUE AQUATIQUE, Gilibert; VÉRONIQUE CRESSONNÉE, Lamarck.

Anglais . . . BROOKLIME; GREATER WATER SPEEDWELL.

Allemand . . . BACHBUNGEN; WASSERBUNGEN; BACHBOHNEN.

Hollandais . . . BEKKEBOOM.

On trouve cette plante vivace sur le bord des ruisseaux et des fontaines, quelquefois même plongée dans leur onde limpide (1). Elle habite à la fois les ardentes régions de l'Afrique, le climat tempéré de la France, et les froides contrées de la Lithuanie.

La racine est blanche-verdâtre, fibreuse, traçante.

La tige, cylindrique, couchée, rougeâtre et stolonifère inférieurement, se redresse ensuite, prend une teinte verte, et devient jusqu'à la hauteur de huit à douze pouces.

Les feuilles opposées, soutenues par de courts pétioles, sont ovales, glabres, un peu charnues, denticulées à leur contour.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales axillaires et pédonculées. Chaque fleur, portée sur un pédicelle très-grêle et garni à sa base de deux bractées, étroites, présente un calice persistant à quatre divisions; une corolle bleue monopétale et rotacée dont le limbe est partagé en quatre lobes ovales; des étamines insérées au tube court de la corolle, et dont les filets sont terminés par des anthères oblongues, subsagittées; un ovaire supérieur, comprimé latéralement, surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate simple, comme tronqué.

Le fruit est une capsule presque cordiforme, à deux loges, renfermant beaucoup de petites graines arrondies et noirâtres.

Pierre Forskael, Hermann Boerhaave, Simon Pauli, Rodolphe Augustin Vogel, célèbrent à l'envi les propriétés du

(1) Telle est l'origine du mot *beccabunga*, imité de *Bachbungen* et de *beekboom*, qui désignent une plante rivulaire. *Bach*, en allemand, et *beek* en hollandais, signifient *ruisseau*.

BECCABUNGA.

LX.

BECCABUNGA.

Grec. . . . . . αναγαλλις ενυδρα, C.

Latin . . . . . ANAGALLIS AQUATICA MAJOR FOLIO SUBROTUNDO; Bauhin, Πιναξ, lib. 7, sect. 1.
VERONICA AQUATICA MAJOR, FOLIO SUBROTUNDO; Tournefort, clas. 2, *infondibuliformes*.
VERONICA BECCABUNGA; *racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente*: Linné, clas. 2, *diandrie monogynie*. Jussieu, clas. 8, ord. 2, *pédiculaires*.

Italien . . . . . ANAGALLIDE ACQUATICA; BECCABUNGIA.

Espagnol . . . BECABUNGA.

Français . . . . BECCABUNGA; BECCABONGA; VÉRONIQUE AQUATIQUE, Gilibert; VÉRONIQUE CRESSONNÉE, Lamarck.

Anglais . . . . BROOKLIME; GREATER WATER SPEEDWELL.

Allemand . . . BACHBUNGEN; WASSERBUNGEN; BACHBONEN.

Hollandais . . BEEKEBOOM.

On trouve cette plante vivace sur le bord des ruisseaux et des fontaines, quelquefois même plongée dans leur onde limpide (1). Elle habite à la fois les ardentes régions de l'Afrique, le climat tempéré de la France, et les froides contrées de la Lithuanie.

La racine est blanche-verdâtre, fibreuse, traçante.

La tige, cylindrique, couchée, rougeâtre et stolonifère inférieurement, se redresse ensuite, prend une teinte verte, et parvient jusqu'à la hauteur de huit à douze pouces.

Les feuilles opposées, soutenues par de courts pétioles, sont ovales, glabres, un peu charnues, denticulées à leur contour.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales axillaires étalées. Chaque fleur, portée sur un pédicelle très-grêle et garni à la base de deux bractées, étroites, présente : un calice persistant, à quatre divisions; une corolle bleue monopétale en roue, dont le limbe est partagé en quatre lobes ovales; deux étamines insérées au tube court de la corolle, et dont les filamens sont terminés par des anthères oblongues, subsagittées; un ovaire supérieur, comprimé latéralement, surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate simple, comme tronqué.

Le fruit est une capsule presque cordiforme, à deux loges, renfermant beaucoup de petites graines arrondies et noirâtres.

Pierre Foreest, Hermann Boerhaave, Simon Pauli, Rodolphe Augustin Vogel, célèbrent à l'envi les propriétés du

(1) Telle est l'origine du mot *beccabunga*, imité de *Bachbungen* et de *beekboom*, qui désignent une plante rivulaire. *Bach*, en allemand, et *beek* en hollandais, signifient *ruisseau*.

beccabunga. Le prudent Murray n'ajoute pas grande confiance aux vertus de cette plante (2), et plusieurs thérapeutistes modernes lui accordent, pour ainsi dire, à regret une place parmi les substances médicamenteuses (3). Je partageais cette dernière opinion; le beccabunga, que j'avais constamment trouvé sans odeur et presque sans saveur, me semblait pouvoir être banni des officines pharmaceutiques; je pensais qu'il figurerait mieux sur nos tables, où il se mange crû et cuit, de même que le pourpier, le cresson et les épinards; enfin je le rangeais, avec Willemet, au nombre des plantes fourragères. Les observations du docteur Guersent tendent à rétablir la réputation vacillante du beccabunga.

« Dès le premier printemps, lorsqu'il commence à pousser, et vers la fin de l'été pendant la fructification, le beccabunga est seulement aqueux ou astringent et peu sapide; mais lorsque la plante est développée et prête à fleurir, elle offre, dans toutes ses parties, une saveur légèrement acerbe et amère, puis âcre et piquante comme celle du cresson, d'où lui est venu le nom de *véronique cressonnée*. Ces qualités physiques sont beaucoup plus prononcées dans les plantes qui croissent sur le bord des ruisseaux et exposées au soleil, que sur les individus qui plongent en entier dans l'eau et qui végètent à l'ombre. Quelle que soit au reste son exposition, le beccabunga a bien moins d'analogie, sous le rapport médical, avec les véroniques qu'avec la famille des crucifères; il lui appartient par son principe huileux, piquant et volatil, et il ne diffère des autres plantes de cette même famille que parce qu'il est moins âcre et un peu astringent: c'est par cette raison qu'on le préfère quelquefois à des stimulans plus actifs, lorsqu'on craint qu'ils ne portent trop d'irritation et de chaleur, et qu'alors on l'ajoute aux sucs des crucifères, pour en modérer les effets. Le beccabunga agit néanmoins de la même manière que ces végétaux qu'on désigne en général sous le nom d'*antiscorbutiques*, quoiqu'il ne paraisse pas posséder plus particulièrement cet avantage que beaucoup d'autres. C'est à cause de ses propriétés excitantes et légèrement toniques qu'il convient dans certaines affections dartreuses et scorbutiques; il a paru être utile aussi dans quelques espèces de phthisie pulmonaire et dans des engorgemens atoniques des viscères abdominaux, qui avaient succédé à la goutte irrégulière (4).

On recommande le beccabunga pilé, pour mondifier les

(2) *Titubare incipit hujus herbæ laus, nec immeritò.*
Apparat. medic., tome 2 (1794), page 247.
(3) Cullen, Swediaur, Schwilgué, Peyrilhe.
(4) *Dictionaire des sciences médicales*, tome 3, page 66.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0018-5
DFG

ulcères de mauvaise nature, dissiper les engorgemens hémorroïdaux, guérir les panaris et les brûlures (5). Intérieurement, on administre pour l'ordinaire le suc exprimé à la dose de deux à quatre onces, soit seul, soit mêlé à ceux de cresson, de cochléaria, soit uni au lait ou au petit-lait. La conserve et le sirop de beccabunga sont aujourd'hui complétement abandonnés.

(5) Willemet, *Phytographie encyclopédique*, tome 1 (1805), p. 20.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 60.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière.
2. Corolle ouverte, pour faire voir l'insertion des deux étamines.
3. Calice et pistil.
4. Fruit.
5. Le même, grossi, coupé horizontalement.
6. Graines de grosseur naturelle.
7. Graine isolée et grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0019-3 DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp

BELLADONE.

a. b. c.

LXI.

BELLADONE.

Grec . . . . . , Dioscoride.
. . . . . vulg.
. . . . . ; Bauhin, Hist., lib. 3, sect. 1.
. . . . . FOLIIS ET FLORIBUS, Tournefort,
Latin . . . . . , *campaniformes*.
. . . . . *caule herbaceo, foliis ovatis, in-*
. . . . . *linnæi, dist. 7, pentandria monogynia, fam. nat. 8, solanees.*

. . . . . Origan.

. . . . . DEADLY DWALE.

. . . . . SCHWARZ KIRSCHBAUM.

. . . . . , commune dans les climats chauds et tem-
. . . . . sur les montagnes, dans les fossés ombragés, le
. . . . . nacs, dans les bois taillis.

La racine, vivace, est épaisse, longue, rameuse, fauve.

La tige, herbacée, cylindrique, tomenteuse, branchue, s'élève de trois à cinq pieds.

Les feuilles sont geminées, grandes, ovales, entières, molles, souvent inégales.

Les fleurs, pendantes, soutenues par un pédoncule axillaire, subéreux, présentent : un calice d'une seule pièce, profondément en cinq découpures pointues; une corolle rouge-brunâtre, monopétale, campanulée, un peu velue, dont le limbe est partagé en cinq lobes; cinq étamines courtes, dont les filamens s'insèrent à la base de la corolle, et portent des anthères obrondies; un ovaire supérieur, sphéroïde, surmonté d'un style un peu incliné, et terminé par un stigmate

. . . . est une baie globuleuse, noirâtre, pulpeuse, couronnée à sa base par le calice persistant, divisée intérieurement en deux loges, et contenant plusieurs graines réniformes, fixées à un placenta.

La seule lugubre, sombre de la belladone suffirait en quelque sorte pour annoncer une plante suspecte. Elle exhale, de toutes ses parties, une odeur, faible à la vérité, mais pourtant assez profonde. La racine, la tige, les feuilles et les baies, ont d'abord une saveur d'abord fade, qui ne tarde pas à devenir nauséeuse et un peu âcre. Toutefois, ces qualités physiques peu prononcées ont soin de faire pressentir les accidens graves que cause la belladone. Les historiens, les observateurs, les toxicographes citent des faits qui ne portent pas toujours le

BELLADONE.

LXI.

BELLADONE.

Grec..... στρυχνος μανικος, Dioscoride.

Latin..... SOLANUM FURIOSUM; vulg.
SOLANUM μελανοκεφαλος; Bauhin, Πινακ, lib. 5, sect. 1.
BELLADONA MAJORIBUS FOLIIS ET FLORIBUS, Tournefort, clas. 1, *campaniformes*.
ATROPA BELLADONNA; *caule herbaceo, foliis ovatis, integris;* Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie*. Jussieu, clas. 8, ord. 8, *solanées*.

Italien..... BELLADONNA.
Espagnol... BELLADAMA, Ortega.
Français.... BELLADONE.
Anglais.... DEADLY NIGHT-SHADE; DEADLY DWALE.
Allemand.. DOLIKRAUT.
Hollandais.. DOLKRUID; DOLLE NACHTSCHADE.

Cette plante, commune dans les climats chauds et tempérés, croît sur les montagnes, dans les fossés ombragés, le long des haies, dans les bois taillis.

La racine, vivace, est épaisse, longue, rameuse, fauve.

La tige, herbacée, cylindrique, tomenteuse, branchue, s'élève de trois à cinq pieds.

Les feuilles sont géminées, grandes, ovales, entières, molles, souvent inégales.

Les fleurs, penchées, soutenues par un pédoncule axillaire, pubescent, présentent : un calice d'une seule pièce, divisé profondément en cinq découpures pointues; une corolle rouge-brunâtre, monopétale, campanulée, un peu ventrue, dont le limbe est partagé en cinq lobes; cinq étamines courtes, dont les filamens s'insèrent à la base de la corolle, et portent des anthères obrondes; un ovaire supérieur, sphéroïde, surmonté d'un style un peu incliné, et terminé par un stigmate capité.

Le fruit est une baie globuleuse, noirâtre, pulpeuse, entourée à sa base par le calice persistant, divisée intérieurement en deux loges, et contenant plusieurs graines réniformes fixées sur un placenta.

La teinte luride, sombre de la belladone suffirait en quelque sorte pour annoncer une plante suspecte. Elle exhale, de toutes ses parties, une odeur, faible à la vérité, mais pourtant nauséabonde. La racine, la tige, les feuilles et les baies, ont une saveur d'abord fade, qui ne tarde pas à devenir nauséeuse et un peu âcre. Toutefois, ces qualités physiques peu prononcées sont loin de faire pressentir les accidens graves que cause la belladone. Les historiens, les observateurs, les toxicographes citent des faits qui ne portent pas toujours le

caractère de l'authenticité. Buchanan dit (1) que les Danois ayant envahi l'Ecosse, les habitans de cette contrée mêlèrent du suc des fruits de belladone à la boisson de leurs ennemis. Ceux-ci tombèrent dans un sommeil léthargique, pendant lequel ils furent massacrés.

Souvent il arrive que des enfans séduits par la figure des baies de belladone et par leur goût douceâtre, en mangent des quantités plus ou moins considérables. Bientôt se manifestent des symptômes alarmans : une véritable ivresse, des vertiges, un délire assez communément gai (2), une soif intense et pénible, des nausées douloureuses, des convulsions, des grincemens de dents, la dilatation et l'immobilité des pupilles, la rougeur et le gonflement de la face, la contraction spasmodique des mâchoires. A ce désordre général succède un état soporeux, accompagné de soubresauts des tendons, d'une pâleur effrayante ; le pouls devient petit, dur et fréquent ; un froid universel s'empare du corps, quelquefois même l'enfant meurt victime de son imprudence. Je crois devoir observer qu'il faut un certain nombre de baies pour produire une altération notable dans les fonctions ; car des médecins zélés et des personnes imprévoyantes ont mangé, sans le plus léger inconvénient, une, deux, trois, quatre baies de belladone (3) : j'ajouterai que cette plante, nuisible à l'homme, est recherchée par divers animaux ; les limaçons en rongent avidement les feuilles (4) ; on assure qu'elles sont broutées par les moutons, les lapins et les cochons (5).

« Les moyens efficaces de remédier à l'empoisonnement par la belladone diffèrent suivant les circonstances. Est-on appelé peu de temps après le développement des premiers accidens, on doit recourir sur-le-champ au tartrate antimonié de potasse, et même exciter, par l'introduction d'une plume, des vomissemens prompts : ce moyen secondaire est d'autant plus utile que l'estomac est alors frappé d'insensibilité, et l'on a souvent donné jusqu'à huit ou neuf décigrammes d'émétique sans produire aucun effet. Les acides végétaux conviennent particulièrement pour boisson. Mais s'il s'était écoulé

(1) *Rerum scoticarum historiæ libri* XX ; *Edinburgi*, 1582.

(2) MARNORF (jean-jacques), *De maniacis nuperis Giessensibus à solano furioso*, *Diss.* in-4°. *Giessæ*, 1691.

GIRAUDY (ch.-fr.-s.), Le délire causé par la belladone a-t-il un caractère qui lui soit propre ? (*Diss. inaug.*) ; in-8°. Paris, 14 nivose an x.

(3) Gilibert, *Démonstrations élémentaires de botanique*, 1796, tom. 1, pag. 244.

Haller, *Historia stirpium Helvetiæ indigenarum*, 1768, *Bernæ*, n° 579.

(4) Ray, *Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium*, 1660, *page* 157.

(5) Willich, *The domestic encyclopedia*, 1802, tome 3, page 267.

un ou plusieurs jours et qu'il se manifestât des signes d'inflammation, il faudrait chercher à provoquer les vomissemens par des liquides chauds et des moyens mécaniques seulement; il serait trop dangereux d'introduire un émétique dans l'estomac; on doit, dans ce cas, insister sur les boissons d'abord mucilagineuses, émulsionnées, puis acides, et enfin légèrement toniques (6). »

Le principe vénéneux de la belladone (7) modifié par une main habile, devient un remède utile, bien qu'il ne justifie pas les éloges fastueux qui lui ont été prodigués. C'est principalement le pasteur Muench et ses deux enfans qui ont célébré la belladone avec une exagération ridicule. On formerait une petite bibliothèque avec les écrits publiés par ces trois Allemands sur la manière de cultiver, de récolter, d'administrer les diverses parties de ce végétal dans une foule de maladies de l'homme et des autres animaux. Parmi ces ouvrages, il suffira de mentionner les plus marquans, et j'épargnerai au lecteur la fastidieuse et incohérente énumération nosologico-thérapeutique.

En suivant la méthode de l'illustre professeur Pinel, je dirai que l'usage de la belladone n'est point applicable à la classe nombreuse des fièvres. Dans celle des phlegmasies, la dysenterie est la seule contre laquelle on ait employé ce végétal avec une apparence de succès. La famille intéressante des névroses est en quelque sorte le champ de triomphe de la belladone. En effet, un végétal narcotique et comme stupéfiant doit calmer l'agitation, l'éréthisme, le spasme du système nerveux. Aussi a-t-on publié des milliers d'observations, des mémoires, des traités spéciaux sur la propriété dont jouit la belladone de guérir l'épilepsie, l'hypocondrie, la mélancolie, la manie (8). On l'a de toutes parts proclamée tantôt comme un puissant moyen curatif, tantôt comme le vrai spécifique de la rage (9). Malgré ces louanges si fas-

(6) Guersent, dans le *Dictionaire des sciences médicales*, tom. 3, p. 71.

(7) Le savant chimiste Vauquelin, auquel nous devons une excellente analyse de la belladone, observe que cette plante narcotique, et toutes celles qui produisent des effets analogues, sont riches en charbon, en hydrogène et en azote, tandis que les substances très-oxigénées produisent des effets contraires.

(8) MUENCH (Jean-Henri), *Dissertatio inauguralis medica sistens observationes practicas circà usum belladonæ in melancholiâ, maniâ et epilepsiâ*; in-4°. *Gottingæ*, 23 *decembr.* 1783.

LUDWIG (Jac.-Fr.), *De belladonâ, ejusque usu in vesaniâ*, *Diss.* in-4°. *Ienæ*, 1789.

(9) MUENCH (Burcard-Fréderic), *De belladonnâ efficaci in rabie caninâ remedio*, *Diss inaug.* in-4°. *Gottingæ*, 11 *octobr.* 1781.

—*Praktische Abandlung von der Belladonna und ihrer Anwendung*,

tueuses, si multipliées, je doute qu'on puisse citer une seule guérison bien authentique d'hydrophobie, d'épilepsie, ou de manie, opérée par la belladone. Le docteur Marc l'a trouvée plus réellement efficace contre la coqueluche, dont elle a terminé le cours avec une étonnante sapidité (10).

D'après la remarque faite d'abord par Ray, que les applications de la belladone sur les paupières déterminent la dilatation de la pupille, Jean-Albert-Henri Reimarus, Paul-Fréderic-Hermann Grasmeyer, Charles Himly, et d'autres, ont recommandé ce topique pour préparer les yeux à l'opération de la cataracte,

Combien n'a-t-on pas exalté les vertus anticancéreuses de la belladone (11)? et cependant je vois les assertions de prôneurs obscurs (12) réfutées par des médecins célèbres (13).

On a presque renoncé à l'usage des baies, avec lesquelles Conrad Gesner préparait un sirop. Les racines et les feuilles sont aujourd'hui les seules parties employées. Il faut, selon Muench et Murray, choisir les racines de deux ans, et les faire sécher, ainsi que les feuilles, à l'ombre, sans le secours du feu. On les administre alors pulvérisées, à la dose d'un à six grains par jour, suivant l'âge, le tempérament, la nature et l'intensité de la maladie; le suc épaissi des feuilles est donné sous le nom d'extrait. Les praticiens peuvent en outre

besonders zur Vorbauung und Heilung der Wuth nach dem Bisse von tollen Hunden; c'est-à-dire, Traité pratique de la belladone, et de son emploi comme moyen prophylactique et thérapeutique de la rage; in-8°. fig. color. Gottingue, 1785.

MUENCH (jean-henri), *Kurze Anleitung, wie die Belladonna sowohl bey den Menschen als auch bey den Thieren im tollen Hundsbiss anzuwenden ist, mit der Anweisung wie diese Pflanze auch in Gœrten anzuziehen und zu warten, wie ihre Wurzeln und Blætter zum wirksamen Gebrauche muessen zubereitet werden*; c'est-à-dire, Courte instruction sur l'emploi de la belladone dans la rage de l'homme et des autres animaux, avec la manière de cultiver cette plante dans les jardins, de récolter et de préparer, pour l'usage médical, les racines et les feuilles; in-8°. Gottingue, 1783.

(10) *Dictionaire des sciences médicales*, tome 3, page 75.

(11) CTINGER (fréderic-chrétien), *De belladonnâ tanquam specifico in cancro, imprimis occulto, Diss. inaug. præs. Mich. Alberti*; in-4°. *Halæ*, 1739.

(12) LAMBERGEN (tibère), *Lectio inauguralis sistens ephemeridem persanati carcinomatis*; in-4°. *Groningæ*, 1754.

COSTE (césar), *Utrùm in cancro belladonnæ usus tùm internus tùm externus? affirm. Quæst. med. inaug. præs. Flor. Car. Bellot*; in-4°. *Parisiis*, 1760.

TIMMERMANN (théodore-gerard), *Periculum medicum belladonnæ, Progr.* in-4°. *Rinteliæ*, 1765.

(13) Heister, Van Doeveren, Haller, de Haen, Schmucker, Schmalz-

prescrire la belladone digérée, infusée, dans l'eau, dans la bière, dans le vin, dans l'alcool; elle entre dans la composition du baume tranquille. Les Italiennes croient l'eau distillée de cette plante propre à entretenir la blancheur et l'éclat de leur teint (14). Les peintres en miniature préparent un fort beau vert avec le suc de ses baies, qui, selon Willich, empreint le papier d'une jolie couleur pourpre.

FABER (Jean-Mathias), *Strychnomania, explicans strychni manici antiquorum, vel solani furiosi recentiorum, historiæ monumentum, indolis nocumentum, antidoti documentum, etc.*, in-4°. fig. *Augustæ Vindelicorum*, 1677.

SICELIUS (christophe-conrad), *Diatribe botanico-medica de belladonná, sive solano furioso*; in-8°. fig. *Ienæ*, 1724.

DARIES (pierre-jean-andré), *De atropá belladonná, Diss. inaug. præs. Anton. Gul. Plaz*; in-4°. *Lipsiæ*, 1776. — Insérée dans le tome 2 du *Sylloge selectiorum opusculorum* de Baldinger.

(14) Chacun voit ici l'origine du mot *belladone* (*bella donna*). Des étymologies aussi claires ont à peine besoin d'être signalées; celle du mot générique n'est pas moins évidente; mais, au lieu de rappeler l'idée enchanteresse de la beauté, elle offre le spectacle hideux de la mort. La *belladone* conservait la fraîcheur et les grâces de la jeunesse; elle devient, sous le nom de *atropa*, une parque inexorable (Atropos), qui tranche le fil de nos jours.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 61.

(*La Plante est représentée aux deux tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Racine réduite.
2. Corolle ouverte, à la base de laquelle s'insèrent cinq étamines.
3. Pistil.
4. Fruit coupé horizontalement, dans lequel on voit deux loges remplies de pulpe, et d'un grand nombre de petites graines réniformes attachées sur un gros placenta.
5. Graine grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0029-8 DFG

Turpin P. Lambert F. sculp

BELLADONE MANDRAGORE.

a. l. l.

LXII.

BELLADONE MANDRAGORE.

Grec..... μανδραγορας.

DRAGORA VERUM SECUNDO; Bauhin, Hist., lib. 5 sect. 1. Tournefort, clas. 1, *campaniformes*.

Latin..... HERBA MANDRAGORA; *acaulis, scapis unifloris*; Linné, class. 5, *pentandrie monogynie*.

MANDRAGORA; Jussieu, clas. 8, ord. 8, *solanées*.

Italien..... MANDRAGORA.

Espagnol..... MANDRAGORA.

Français..... MANDRAGORE; BELLADONE SANS TIGE.

Anglais..... MANDRAKE.

Allemand..... ALRAUN.

Hollandais..... ALRAUN, MANDRAGORA; MANDRAGORA KRUYD.

Polonais..... MANDRAGORA, POMERZYK ZIELE.

Connue et célébrée depuis un temps immémorial, la mandragore a été l'objet des opinions les plus contradictoires, des hypothèses les plus frivoles, des fables les plus absurdes (1). Elle a inspiré au fameux Macchiavelli une comédie très-ingénieuse, et fourni à divers écrivains le sujet de savantes monographies. Resserré, et pour ainsi dire enchaîné dans de justes limites, forcé à regret de jeter un coup-d'œil trop rapide, ou même de passer sous silence une foule de détails étrangers à la médecine, j'indiquerai du moins les sources auxquelles on pourra puiser les renseignemens qui me manqueront.

Dans le beau climat de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie, la mandragore se plaît; elle refuse de croître sur les bords du Rhin, et se cultive même difficilement dans nos jardins, où elle préfère les lieux sombres, tels que l'entrée des cavernes (2).

(1) Pour s'amuser à expliquer pourquoi les anciens voyaient dans la mandragore la cause de certains prodiges éclatans; pourquoi ils la regardaient comme un philtre puissant et comme une herbe magique qui devait rendre heureux celui qui la posséderait, de lui donner la faculté de féconder les femmes, de présager la bonne ou mauvaise fortune, de mettre en fuite les sorciers, de ramollir l'ivoire et de le rendre malléable, et pourquoi, en un mot, ils lui attribuaient toutes les autres merveilles, (Granier, *Diss. botan. histor. sur la mandragore*, 1788).

mandragore, de μανδρα, étable, caverne, antre, gîte, repaire, honneur. Cette étymologie, quelque peu mutable, que la mandragore est désignée par le nom de *mandegloire*. (Charles Etienne, *Maison rustique*, 1549, pag. 49).

d.

BELLADONA MANDRAGORA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0034-3
DFG

LXII.

BELLADONE MANDRAGORE.

Grec..... μανδραγορας.
Latin..... MANDRAGORA FRUCTU ROTUNDO; Bauhin, Πιναξ, lib. 5, sect. 1. Tournefort, clas. 1, *campaniformes*.
ATROPA MANDRAGORA; *acaulis*, *scapis unifloris*; Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie*.
MANDRAGORA; Jussieu, clas. 8, ord. 8, *solancées*.
Italien..... MANDRAGOLA.
Espagnol... MANDRAGORA.
Français.... MANDRAGORE; BELLADONE SANS TIGE.
Anglais.... MANDRAKE.
Allemand... ALRAUN.
Hollandais.. ALRUIN; MANDRAGORA; MANDRAGERS-KRUID.
Polonais.... MANDRAGORA; POKRZYR ZIELE.

Connue et célébrée depuis un temps immémorial, la mandragore a été l'objet des opinions les plus contradictoires, des hypothèses les plus frivoles, des fables les plus absurdes (1). Elle a inspiré au fameux Macchiavelli une comédie très-ingénieuse, et fourni à divers écrivains le sujet de savantes monographies. Resserré, et pour ainsi dire enchaîné dans d'étroites limites, forcé à regret de jeter un coup-d'œil trop rapide, ou même de passer sous silence une foule de détails étrangers à la médecine, j'indiquerai du moins les sources auxquelles on pourra puiser les renseignemens qui me sont interdits.

C'est dans le beau climat de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie, que se plaît la mandragore; elle refuse de croître sur notre sol; on la cultive même difficilement dans nos jardins; toutefois, elle préfère les lieux sombres, tels que l'entrée des tanières et des cavernes (2).

(1) « On cherche vainement à expliquer pourquoi les anciens voyaient dans la mandragore la cause de certains prodiges éclatans; pourquoi ils la regardaient comme un philtre puissant et comme une herbe magique qui avait la propriété de rendre heureux celui qui la possédait, de lui faire trouver de l'argent, de féconder les femmes, de présager la douceur ou l'âpreté des hivers, de mettre en fuite les sorciers, de ramollir l'ivoire au point de le rendre malléable, et pourquoi, en un mot, ils lui attribuaient une foule d'autres merveilles. » (Granier, *Diss. botan. histor. sur la mandragore*; 1788).

(2) Telle est l'origine du mot *mandragore*: de μανδρα, étable, caverne, tanière, repaire, et γερας, ornement, gloire, honneur. Cette étymologie me paraît d'autant plus vraisemblable, que la mandragore est désignée par certains auteurs sous le nom de *mandegloire*. (Charles Etienne, *De latinis et græcis nominibus arborum*, etc., 1547, pag. 49).

La racine, épaisse, longue, fusiforme, tantôt simple, tantôt bifurquée (3), ou divisée en trois, fauve extérieurement, blanchâtre à l'intérieur, jette çà et là quelques fibrilles.

Les feuilles sortent du collet de la racine: elles sont grandes, ovales, pointues, vertes, glabres, ondulées en leurs bords, et disposées en un large faisceau.

Entre ces feuilles, naissent plusieurs pédoncules simples, courts, portant chacun une fleur, dont la corolle est campanulée, retrécie vers sa base en forme de cône renversé, un peu velue en dehors, blanchâtre, légèrement teinte de violet.

Le fruit est une baie sphérique, ressemblant à une petite pomme, jaunâtre dans sa maturité, molle, charnue, pleine d'une pulpe qui contient des graines réniformes, placées sur un seul rang.

Rapprochée de la belladone par ses caractères botaniques, la mandragore s'en rapproche également par ses qualités physiques et ses propriétés médicamenteuses; il faut pareillement une quantité assez considérable de baies pour déterminer des accidens: car le professeur Hernandez, désirant prouver l'innocuité de ce fruit, en mangea une entière devant ses élèves, pendant plusieurs jours de suite, avant de commencer sa leçon, et n'en fut jamais incommodé. Toutefois, cette expérience ne serait pas sans doute renouvelée impunément par une personne délicate et irritable. La plupart des traducteurs et glossateurs de la Bible ne croient pas la *pomme* de mandragore vénéneuse, puisqu'ils la regardent comme le *dudaïm* de Rachel. J'ai déjà dit dans ce volume (page 195), et ailleurs (4), combien me paraissait plus judicieuse l'opinion du savant naturaliste Virey, que j'exposerai en parlant de l'orchis.

Les médecins de l'antiquité, Hippocrate, Dioscoride, Celse, Galien, connaissaient parfaitement l'action narcotique, stupéfiante de la mandragore; ils la recommandaient pour provoquer le sommeil, pour calmer les douleurs, surtout avant les graves opérations chirurgicales; cette qualité sopo-

(3) On ne s'est pas contenté de voir dans cette bifurcation purement accidentelle les cuisses d'un homme. Par une légère incision supérieure de chaque côté se développent des bras, si l'on en croit Blankaart: rien de plus facile, selon lui, que de figurer une tête qui se recouvre d'une sorte de chevelure, en y semant quelques grains d'orge ou de millet! C'est alors que la mandragore prend la forme humaine, et mérite le nom de ανθρωπομορφος, que lui donne Pythagore.

(4) *Biographie universelle*, tome 11, 1814, page 253.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0036-4 DFG

rifique était même devenue proverbe (5). Si les praticiens de nos jours n'ont pas renoncé à l'usage de cette plante, ils l'ont du moins considérablement limité : aussi la trouve-t-on fréquemment *tombante* de vétusté et rongée par les vers dans les officines pharmaceutiques (6). Je ne serais pas éloigné de penser avec Peyrilhe que cet abandon n'est point une véritable perte pour la thérapeutique. « En effet, ce que la mandragore a de médicamenteux et d'utile se rencontre dans les narcotiques qui croissent spontanément autour de nous. » Je me bornerai donc à citer quelques témoignages consacrés par des noms célèbres. Boerhaave appliquait *avec succès* des cataplasmes de feuilles de mandragore bouillies dans le lait, sur les tumeurs scrophuleuses. Hoffberg et Swediaur préfèrent la racine, et assurent avoir dissipé, à l'aide de ce topique, des indurations écrouelleuses, squirreuses et siphilitiques de la parotide, du testicule, des glandes inguinales. Deux observations, dit Gilibert, sont favorables à l'usage interne de la poudre de la racine pour la goutte, dont les douleurs ont été calmées et les accès retardés. La dose est de trois à six grains. Les feuilles peuvent se donner desséchées et pulvérisées à la même dose, ou infusées, à celle d'un scrupule, dans un demi-litre d'eau.

CATELAN (Laurent), Rare et curieux discours de la plante appelée *mandragore ;* in-12. Paris, 1639.

THOMASIUS (Jacques), *De mandragorâ, Diss. philol. inaug. resp. Joan. Schmid ;* in-4°. *Lipsiæ*, 1655. —*Ibid.* 1669. —*Ibid.* 1671. —*Id.* in-4°. *Halæ*, 1739.

L'auteur fait de vains efforts pour démontrer que la mandragore est réellement le *dudaïm* de la Bible.

DEUSING (Antoine), *De mandragoræ pomis, vulgò* pisse-diefies ; in-12. *Groningæ*, 1659.

Le savant professeur batave a reproduit cet opuscule dans son *Fasciculus dissertationum selectarum*, in-4°. 1660 : il prétend que les *pommes* de mandragore sont à tort prises pour le *dudaïm*, qui, selon lui, est le petit melon de Perse odorant, *cucumis dudaim*, L.

HOLZBOM (André), *De mandragorâ, Diss. med. bot. inaug. præs. Ol. Rudbeck ;* in-8°. fig. *Upsaliæ*, 1702, etc.

(5) *Languidi et in suis negotiis torpidi mandragoram ingessisse vel sub mandragorâ dormitasse dicebantur* (Hoffmann, Granier, Murray).

(6) Murray, *Apparatus medicaminum*, tome I, page 653.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 62.

(*La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Fleur entière.
2. Pistil.
3. Corolle ouverte, dans laquelle on voit cinq étamines à filets velus à leur base.
4. Fruit entier accompagné de son calice.
5. Graine isolée.

(*Tous ces détails sont de grandeur naturelle*)

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0038-6
DFG



BEN.

BEN.

Grec. ... Κάρυον ἰνδικὸν ; Καρυα αιγυπτια.

... Canhim, Clusii, lib. xi, sect.

... A ; vermis, foliis septimatis, ...

Latin ... foribus terminis ; Linné, clas. 10, ...

... ia.

... ; Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.

... INGA GLABRATA ; Lamarck.

Italien ... CREBO ... BEN ; GHIANDA UNGUENTARIA.

Espagn. ... BEN.

Portug. ... ; Lamarck ; MORINGA ; MORINGOT ;

... ; BEZAR TREE, Knowles.

... BAUMEN, Hagen.

... BALSEM NOOTENBOOM.

... plaît au Malabar (1), dans l'île de Ceilan, sur le ... bords ou l'Euphrate. On la cultive difficile... nos climats, même avec le ... ars ... ser... Cet arbre, suivant Rumph, s'élève jusqu'à vingt... de hauteur ; le tronc acquiert environ cinq pieds de circonférence : il est assez droit, recouvert d'une écorce ... jaunâtre, les rameaux sont d'un ... blanchâtre (2), enveloppé ... d'une écorce verte.

... feuilles sont deux ou trois fois ailées, composées de ... folioles opposées, qui portent chacune cinq à neuf folioles ... s'en joignent même parfois d'accessoires ou surnu... ovoïdes, inégales, vertes, glabres, petites, sou... un court pétiole.

... fleurs, blanchâtres, disposées en panicules au sommet ... rameaux, présentent un calice monophylle, profondément ... fide ; une corolle formée de cinq pétales semblables ... visions du calice ; dix étamines, dont cinq sont ... stériles, tandis que les cinq autres fertiles ont ... minés par des anthères jaunes orbiculaires ... ur, oblong, légèrement stipité, pubescent, ... surmonté d'un style filiforme, dont l'extrémité est un stigmate ...

(1) *Dr... ...ghar batrée hanuta colonis.*

KNOWLES.

(2) ... cette couleur blanchâtre, et surtout dans ... les fleurs, l'origine du mot *ben*, qui signifie *blanc* en langue malaise. ... pareillement à cet idiome que nous avons emprunté le terme spécifique *moringa*. Quant à la dénomination générique, elle rappelle un ... naturaliste ... Melchior Guilandinus, professeur de botanique à l'université de Padoue.

BEN.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0042-7
DFG

LXIII.

BEN.

Grec . . . . . Ϛαλανος ; Ϛαλανος μυρεψικη ; Ϛαλανος αιγυπτια.

Latin . . . . . GLANS UNGUENTARIA ; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 2.
GUILANDINA MORINGA ; *inermis*, *foliis subpinnatis*, *foliolis inferioribus ternatis* ; Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*.
MORINGA ; Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.
MORINGA OLEIFERA ; Lamarck.

Italien . . . . . ALBERO DEL BEEN ; GHIANDA UNGUENTARIA.

Espagnol . . . ARBOL DEL BEEN.

Français. . . . BEN ; BEN OLÉIFÈRE, Lamarck ; MORINGA ; MORINGOU ; MOURINGOU.

Anglais . . . . BEN-TREE ; MORINGA-TREE ; BEZAR-TREE, Knowles.

Allemand . . . BENBAUM ; ŒLNUSSBAUM, Hagen.

Hollandais . . BENBOOM ; BALSEM NOOTENBOOM.

Le ben se plaît au Malabar (1), dans l'île de Ceilan, sur le sol sablonneux et brûlant de l'Egypte. On le cultive difficilement dans nos climats, même avec le secours des serres chaudes. Cet arbre, suivant Rumph, s'élève jusqu'à vingt-cinq pieds de hauteur ; le tronc acquiert environ cinq pieds de circonférence : il est assez droit, recouvert d'une écorce brunâtre ; les rameaux sont d'un bois blanchâtre (2), enveloppé d'une écorce verte.

Les feuilles sont deux ou trois fois ailées, composées de pinnules opposées, qui portent chacune cinq à neuf folioles (auxquelles s'en joignent même parfois d'accessoires ou surnuméraires) ovoïdes, inégales, vertes, glabres, petites, soutenues par un court pétiole.

Les fleurs, blanchâtres, disposées en panicules au sommet des rameaux, présentent : un calice monophylle, profondément quinquéfide ; une corolle formée de cinq pétales semblables aux divisions du calice ; dix étamines, dont cinq sont alternativement stériles, tandis que les cinq autres fertiles ont leurs filamens terminés par des anthères jaunes orbiculaires ; un ovaire supérieur, oblong, légèrement stipité, pubescent, surmonté d'un style filiforme, dont l'extrémité est un stigmate très-simple.

(1) *Dives alit Malabar batavis habitata colonis.*
KNOWLES.

(2) Faut-il voir dans cette couleur blanchâtre, et surtout dans celle des fleurs, l'origine du mot *ben*, qui signifie *blanc* en langue malaise ? C'est pareillement à cet idiome que nous avons emprunté le terme spécifique *moringa*. Quant à la dénomination générique, elle rappelle un célèbre naturaliste prussien, Melchior Guilandinus, professeur de botanique à l'université de Padoue.

Le fruit est une gousse, ou plutôt une sorte de silique, longue d'un pied et même plus, de la grosseur du pouce, obtusément triangulaire, pointue, uniloculaire, s'ouvrant en trois valves distinctes. La substance intérieure de chaque valve, dit Lamarck, est blanchâtre, et comme fongueuse; les graines sont des espèces de noix ovoïdes, garnies de trois ailes membraneuses, qui s'en détachent aisément, et insérées au nombre de dix-huit ou vingt sur un seul rang; sous l'écorce dure et cartilagineuse de chaque noix est une amande blanchâtre.

L'écorce de la racine du ben a, comme celle du tronc, une odeur et une saveur analogues à celle du raifort; aussi la râcle-t-on de même pour l'employer à titre d'assaisonnement. Rumph prétend avoir observé qu'un usage continu et modéré de la décoction de la racine de moringou préserve les marins du scorbut et de diverses autres cachexies particulières aux marins (3). Les feuilles chaudes sont regardées par les Malais comme propres à résoudre les tumeurs, même siphilitiques, du testicule; leur suc est, suivant eux, mondificatif et antipsorique. Les pigeons aiment beaucoup les fleurs de ben, qui exhalent, surtout au coucher du soleil, une odeur très-agréable. Les Indiens font cuire les siliques encore jeunes et tendres avec les alimens, dont elles relèvent le goût. Les fruits renfermés dans ces enveloppes, et nommés spécialement Βαλανος μυρεψικη, *glans unguentaria*, *noix du ben*, tenaient une place distinguée dans l'ancienne thérapeutique. Dioscoride, Galien, Avicenne prescrivaient ces noix en substance, ou l'huile qu'on en extrait, soit contre diverses maladies cutanées, soit pour provoquer de copieuses évacuations alvines. Cependant ils s'étaient aperçus que ce remède porte le trouble dans l'appareil gastrique. Si l'on ajoute à cette observation, que nous possédons une foule de cathartiques plus communs et plus sûrs, on ne sera pas surpris de voir cette graine complétement bannie des Pharmacopées modernes. Mais si l'huile de ben est abandonnée des médecins, elle est en revanche très-recherchée des parfumeurs, qui lui trouvent le précieux avantage de ne point rancir en vieillissant, ce qui la rend très-propre à extraire et à conserver l'arome des fleurs, dont elle n'altère point le parfum, étant elle-même inodore.

Le bois néphrétique est-il fourni par l'arbre dont je viens de tracer l'histoire? Cette opinion du célèbre Linné me paraît

(3) *Utilis est multùm radix decocta moringæ.*
KNOWLES.

peu vraisemblable. En effet, les naturalistes qui ont visité le Malabar ne font aucune mention du bois néphrétique. Celui-ci nous est, au contraire, apporté du nouveau-monde, et ne présente pas d'ailleurs exactement les caractères du bois de ben. Toutefois, le problème n'étant pas irrévocablement résolu, il m'a semblé convenable d'indiquer au moins les meilleures notices à consulter (4), et particulièrement les traités spéciaux (5).

HEISTER (Laurent), *De nuce been, Diss. inaug. resp. U. F. B. Brueckmann ;* in-4°. *Helmestadii*, 1750.

(4) MURRAY, *Apparatus medicaminum*, tome 2, 1794, page 521. *Dictionaire des sciences naturelles*, tome 5, 1804, page 87.

(5) CAMERARIUS (Rodolphe-Jacques), *Schematismi colorum infuso ligni nephritici propriorum, Diss. inaug. resp. Brotbeq ;* in-4°. *Tubingæ*, 1689. — *Ibid.* 1717.

— *Continuatio tentaminum circà lignum nephriticum ;* in-4°. *Tubingæ*, 1690.

CARTHEUSER (Jean-Fréderic), *De ligno nephritico, colubrino, et semine santonico, Diss. inaug. resp. S.-B. Wolf ;* in-4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1749.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 63.

(*La plante est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle*)

1. Calice ouvert, dans lequel on voit le pistil, dont l'ovaire est légèrement stipité, plus l'insertion de dix étamines, dont cinq sont alternativement avortées et ne présentent qu'un simple filet.
2. Un pétale.
3. Fruit ou gousse triangulaire, à trois battans, représenté moitié de grandeur naturelle.
4. Le même, coupé horizontalement.
5. Graine tri-ailée, sur laquelle on distingue l'ombilic placé latéralement près de sa base.
6. Amande dépouillée de son enveloppe.

Une plante qui donne pour fruit un légume trivalve à graines ailées ne pouvait être longtemps confondue avec les espèces du genre *guilandina*, qui ont toutes des fruits bivalves et des graines nues : aussi Vahl en a-t-il fait un nouveau genre, sous le nom de *hyperanthera*. (T.)

Cette figure présente une réduction fidèle de celle que M. Turpin a dessinée, en 1797, à Saint-Domingue.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0045-4 DFG

Mme E. Panckoucke P. Lambert Sr. sculp.

BERBERIS.

a. l. l.

LXV.

BERBERIS.

Grec. ..... ὀξυακάνθα ; Galien.

Latin ..... BERBERIS PUMILA VERUM ; Ranhin, *Hist.* [illegible] sect. 2. Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés* (1).
BERBERIS VULGARIS ; *pedunculis racemosis*, Linné, clas. 6, *hexandria monogynia*. Jussieu, clas. 13, ord. 18, *vinetiers*.

Italien ..... BERBERI ; BERBERO ; CRISPINA ; CRESPINO ; CRESPIGNO.

Espagnol ..... AGRACHO.

Anglais ..... BARBERRIS ; PIPPIS-VINEGERS ; VINEGERS.

Allemand ..... BERBERITZ, BERBERIS ; BERRIDOR-BUSH.

Flamand ..... BERBERISBAUCH ; SAUERDORN ; SAURACH ; SAURACH.

Hollandais ..... BERBERIS ; BARBARISEN ; ZUERDOORN ; ZWEERDOORN.

Cet arbuste [illegible] fleurit printanièrement avant dans presque tous les climats du nouveau comme de l'ancien monde ; on le trouve principalement le long des bois et des haies, sur les terrains sablonneux, au voisinage des forêts.

La racine est ligneuse, jaunâtre, rampante, rameuse.

Les tiges parviennent jusqu'à la hauteur de six à huit pieds ; elles sont, en peu pliantes, elles produisent des rameaux diffus recouverts d'une écorce glabre, mince, grisâtre, et sont armées à leur base quelquefois d'une, et bien plus communément de trois épines de grandeur inégale, mais toutes fort aiguës.

Les feuilles, généralement ramassées par paquets alternes, sont ovales, rétrécies en pétiole vers leur insertion, obtuses ou sommet, dentées en scie à leur contour.

Les fleurs sont disposées latéralement dans l'aisselle des feuilles, en grappes pendantes, simples, allongées. Chaque fleur est composée d'un calice légèrement coloré en jaune, à six folioles ovales-obtuses, concaves, accompagnées en dehors de trois petites écailles ; une corolle composée de six pétales jaunes, arrondis, dont chacun porte deux glandes à sa base ; six étamines opposées aux pétales ; un ovaire simple, cylindrique, surmonté d'un stigmate large, sessile, persistant.

(1) Le mot *berberis*, que les Latins ont emprunté des Arabes, se trouve dans divers Lexiques et Pharmacologies grecs barbares et grecs modernes : βερβερις, αμπερις.

Quant aux dénominations vulgaires, *vinettier* et *épine-vinette*, elles sont dues à ce que les fruits de ces arbrisseaux épineux ont l'agréable acidité de l'oseille, qui portait presque généralement autrefois, et porte encore, dans plusieurs départemens, le nom de vinette.

BERBERIS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0050-1
DFG

LXV.

BERBERIS.

Grec..... οξυακανθα; Galien.

Latin..... BERBERIS DUMETORUM; Bauhin, Πινακ, lib. 12, sect. 1. Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés* (1).
BERBERIS VULGARIS; *pedunculis racemosis*; Linné, clas. 6, *hexandrie monogynie*. Jussieu, clas. 13, ord. 18, *vinettiers*.

Italien..... BERBERI; BERBERO; TRISPINA; CRESPINO; CRESPIGNO.
Espagnol... AGRACEJO.
Français.... BERBERIS; ÉPINE-VINETTE; VINETTIER.
Anglais.... BERBERRY; BARBERRY; PIPERIDGE-BUSH.
Allemand... BERBERSTRAUCH; SAUERDORN; SAURACH; SAURAUCH.
Hollandais.. BERBERIS; BARBARISSE; ZUURDOORN; KWEEKDOORN.

Cet arbuste à fleur printanière croît dans presque tous les climats du nouveau comme de l'ancien monde; on le trouve principalement le long des bois et des haies, sur les terrains sablonneux, au voisinage des fermes.

La racine est ligneuse, jaunâtre, rampante, rameuse.

Les tiges parviennent jusqu'à la hauteur de six à huit pieds: droites, un peu pliantes, elles produisent des rameaux diffus recouverts d'une écorce glabre, mince, grisâtre, et sont armées à leur base quelquefois d'une, et bien plus communément de trois épines de grandeur inégale, mais toutes fort aiguës.

Les feuilles, généralement ramassées par paquets alternes, sont ovales, rétrécies en pétiole vers leur insertion, obtuses au sommet, dentées en scie à leur contour.

Les fleurs sont disposées latéralement dans l'aisselle des feuilles, en grappes pendantes, simples, allongées. Chaque fleur présente: un calice légèrement coloré en jaune, à six folioles ovales-obtuses, concaves, accompagnées en dehors de trois bractées; une corolle composée de six pétales jaunes, arrondis, dont chacun porte deux glandes à sa base; six étamines opposées aux pétales; un ovaire simple, cylindrique, surmonté d'un stigmate large, sessile, persistant.

(1) Le mot *berberis*, que les Latins ont emprunté des Arabes, se retrouve dans divers Lexiques et Pharmacologies grecs-barbares et grecs-modernes: βερβερι, βερβερης.

Quant aux dénominations vulgaires, *vinettier* et *épine-vinette*, elles sont dues à ce que les fruits de cet arbrisseau épineux ont l'agréable acidité de l'oseille, qui portait presque généralement autrefois, et porte encore, dans plusieurs départemens, le nom de *vinette*.

Le fruit est une baie ovoïde, oblongue, d'abord verte, puis rouge à l'époque de la maturité, marquée d'un point noir au sommet, contenant, dans une seule loge, deux graines osseuses ressemblant à des pepins.

« Tel est, dit M. Poiret, le sort de tous les êtres qui nous environnent. S'ils ne flattent pas également nos sens, s'ils en offensent quelques-uns, nous les repoussons, nous les éloignons, quelles que soient d'ailleurs leurs propriétés. On pardonne ses aiguillons à l'aubépin, en considération de l'agréable parfum de ses fleurs, qui sont introduites jusque dans nos appartemens; mais l'épine-vinette ne peut trouver grace pour son armure piquante, à cause de l'odeur forte et désagréable qu'elle répand à l'époque de la floraison (2) : nous la tenons dans nos bosquets, mais dans les lieux les moins fréquentés; nous lui abandonnons le soin de hérisser et de défendre par des haies nos possessions agrestes (3), mais non pas celles de nos jardins de plaisance; nous l'éloignons même de nos moissons par un de ces préjugés que l'étude de la nature peut aisément détruire; *nous l'accusons très-injustement d'être en* partie la cause de cette nielle funeste qui infecte nos semences céréales (4). »

Aucune partie du berberis n'est dépourvue d'utilité. L'écorce de la racine, qui est jaune et amère, purge légèrement. Gilibert la regarde comme un bon fondant indiqué dans les embarras du foie et de la rate. Cette racine est employée, ainsi que la tige, pour teindre en jaune la laine, le coton, le fil, pour colorer les ouvrages de menuiserie, et donner du lustre au cuir corroyé. Les feuilles, légèrement acides, sont broutées par les vaches, les chèvres et les moutons, négligées par les chevaux et les cochons : leur décoction miellée a réussi dans le scorbut, et dans quelques espèces de dysente-

(2) La frappante analogie qui existe entre l'odeur du pollen produit par les fleurs d'un assez grand nombre de végétaux, tels que l'épine-vinette, le châtaignier, l'*orontium aquaticum*, tous les palmiers, notamment le dattier, etc., et la liqueur spermatique des animaux, aurait, ce me semble, suffi pour conduire à l'importante et belle découverte des sexes, et conséquemment de la fécondation dans les végétaux. Je suis même porté à croire que, lorsque dans certaines fleurs, telles que la rose et l'œillet, cette odeur spermatique ne se trouve pas, c'est qu'elle est agréablement masquée par un arôme plus fort et plus séduisant. (T.)

(3) Le vinettier aigret honorant les cloisons
Des vergers écartés des rustiques maisons.

PAUL CONTANT.

(4) *Encyclopédie méthodique*: *Botanique*, tome 8, page 617.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0052-2
DFG

rie (5). Les fleurs présentent un phénomène curieux, observé surtout et décrit avec un soin scrupuleux par le docteur Descemet : les étamines sont tellement irritables, douées, pour ainsi dire, d'une telle motilité, qu'au plus léger attouchement elles se contractent, et se portent rapidement sur le pistil, où elles demeurent fixées pendant un certain temps.

Toutefois, ce sont les fruits du vinettier que réclame principalement l'économie domestique. Ces baies, encore vertes, peuvent remplacer les capres : quand elles sont devenues, par la maturation, d'un beau rouge de corail, leur pulpe, composée des acides citrique et malique adoucis par un corps muqueux sucré, offre la saveur et les avantages réunis de la groseille et du limon. Les pharmaciens en préparent un rob, un sirop, une gelée, des pastilles (6). On confit, pour l'usage de nos tables, des grappes d'épine-vinette dans le sucre. C'est pour cet objet, dit M. Guersent, que cet arbrisseau est cultivé dans plusieurs contrées, et l'on recherche de préférence les fruits des vieux pieds, qui ne contiennent point de graines, mais sont en général moins succulens. Les baies, fermentées avec de l'eau miellée, fournissent un vin aigrelet, qui dépose un sel analogue au tartre. Les Polonais font, avec le suc de berberis, de la limonade et du punch qui ne le cèdent point à ceux dont le citron est la base.

Plus commune en Allemagne qu'en France, l'épine-vinette y est aussi plus fréquemment employée. Les médecins la prescrivent avec succès dans les fièvres inflammatoires, bilieuses et putrides. Les Egyptiens préfèrent la limonade de berberis à tout autre remède pour calmer, et même dissiper *leur* fièvre pestilentielle, dont le symptôme dominant est une diarrhée bilieuse. L'efficacité de cette méthode simple, agréable, économique, est confirmée par le témoignage de Prosper Alpini et de Simon Pauli, que cette boisson a guéris d'une maladie semblable.

(5) Gilibert, *Démonstrations élémentaires de botanique*, tome 3; 1796, page 471.

(6) Pour extraire le suc destiné à ces divers usages, Théodore Ankarcrona donne la description et la figure d'une machine particulière (Mémoires de l'Académie des sciences d'Upsal, 1749).

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0053-8 DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE 65.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Grappe de fleurs.
2. Fleur entière détachée.
3. Calice et pistil. Le calice est composé de six folioles, trois grandes intérieures, et trois petites extérieures.
4. Un pétale détaché, à la base duquel sont deux glandes oblongues, et vis-à-vis duquel est représentée une étamine.
5. Fruit coupé longitudinalement, dans lequel on distingue deux graines attachées à la base de la cavité.
6. Le même, coupé horizontalement.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0054-4
DFG

Turpin. P. Lambert. F. sculp.

BERCE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0056-6
DFG

LXVI.

BERCE

Très-commune le long de nos bois, de nos champs, et dans nos prés dont elle détériore les foins, la berce est encore plus abondante et acquiert plus de développement dans les climats froids.

La racine, vivace, fusiforme, charnue, blanchâtre, est imprégnée d'un suc jaunâtre.

La tige, qui, sur un sol favorable, parvient à hauteur d'homme, est droite, cylindrique, cannelée, creuse, velue, rougeâtre.

Les feuilles [illegible] grandes, amplexicaules, [illegible], à folioles lobées et crénelées, velues en dessus, d'un vert pâle en dessous.

Les fleurs, disposées en ombelles terminales, sont généralement blanches, quelquefois rougeâtres; l'ombelle universelle est vaste, formée de nombreux rayons; les ombellules [illegible] pour collerette trois à sept folioles linéaires, semblables aux fleurs dont celles de la circonférence sont irrégulières, plus grandes que celles du centre.

[illegible] Les dénominations générique, spécifique et vulgaire de cette plante sont extrêmement obscures et incertaines. L'on en désignoit sous le nom de *heracleum*, parce qu'elle a été employée par Hercule, ou parce qu'on lui a supposé des vertus prodigieuses? Doit-elle le nom de *sphondylium* aux articulations renflées de sa tige, que M. Thèis trouve fort ressemblantes à des vertèbres, *sphondyli*, *sphondylium*, *spondylium*; ou bien à la racine en forme de fuseau, *sphondylus*; ou enfin à son odeur analogue à celle d'un insecte, *sphondylis*, *sphondylium*, comme le dit Bauhin, d'après Pena?

Le mot *berce* vient-il du polonais *barszcz*?

BERCE.

LXVI.

BERCE (1).

Grec	σφονδύλιον.
Latin	SPHONDYLIUM VULGARE HIRSUTUM ; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 5. Tournefort, clas. 7, *ombellifères*.
	HERACLEUM SPHONDYLIUM ; *foliolis pinnatifidis ;* Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères*.
Italien	SFONDILIO ; BRANCORSINA GERMANICA.
Espagnol	ESFONDILIO ; BRANCA URSINA ALEMANA.
Français	BERCE ; FAUSSE BRANCURSINE ; BRANCURSINE DES ALLEMANDS.
Anglais	COW-PARSNEP.
Allemand	BARTSCH ; DEUTSCHER BÆRENKLAU ; BÆRENKLAU DER DEUTSCHEN.
Hollandais	DUITSCH BEERENKLAAUW.
Polonais	BARSZCZ, Sennert, Bernitz; NIEDZWIEDZIA; RAZDZENIECZ, Erndtel.

Très-commune le long de nos bois, de nos champs, et dans nos prés dont elle détériore les foins, la berce est encore plus abondante et acquiert plus de développement dans les climats froids.

La racine, vivace, fusiforme, charnue, blanchâtre, est imprégnée d'un suc jaunâtre.

La tige, qui, sur un sol favorable, parvient à hauteur d'homme, est droite, cylindrique, canelée, creuse, velue, rameuse.

Les feuilles sont alternes, grandes, amplexicaules, ailées, à folioles lobées et crénelées, vertes en dessus, d'un vert pâle en dessous.

Les fleurs, disposées en ombelles terminales, sont généralement blanches, quelquefois rougeâtres : l'ombelle universelle est vaste, formée de nombreux rayons ; les ombellules, qui ont pour collerette trois à sept folioles linéaires, soutiennent des fleurs dont celles de la circonférence sont irrégulières et plus grandes que celles du centre.

(1) Les étymologies des dénominations générique, spécifique et vulgaire de cette plante sont extrêmement obscures et incertaines. L'a-t-on désignée sous le titre de *heracleum*, parce qu'elle a été employée par Hercule, ou parce qu'on lui a supposé des vertus prodigieuses ? Doit-elle le nom de *sphondylium* aux articulations renflées de sa tige, que M. Théis trouve fort ressemblantes à des vertèbres, σπονδυλος, σφονδυλος, σφονδυλιος ; ou bien à sa racine en forme de fuseau, σπονδυλιον ; ou enfin à son odeur analogue à celle d'un insecte, σφονδυλη, σπονδυλη, comme le dit Bauhin, d'après Pena ?

Le mot *berce* vient-il du polonais *barszcz* ?

Le fruit consiste en deux graines ovoïdes, comprimées, glabres, appliquées l'une contre l'autre.

Les diverses parties de la berce ont des qualités très-dissemblables et même opposées. La racine et l'écorce sont assez âcres pour enflammer et ulcérer la peau. Dépouillés de cette enveloppe corticale, les tiges et les pétioles des feuilles, concassés et abandonnés quelques jours sur des claies, fournissent un suc mucilagineux sucré. Accumulez ces tiges et ces pétioles brisés, dans un tonneau; versez-y une quantité d'eau suffisante pour recouvrir le tout; après un mois vous retirerez une masse d'un goût acidule assez agréable. Si vous saisissez le moment de la fermentation vineuse du suc saccarin, soumettez ce marc à la distillation, il vous donnera un esprit ardent plus actif que celui de grains (2).

Les habitans du Nord regardent la berce comme une de leurs plus précieuses plantes alimentaires; ils en fabriquent de l'eau-de-vie et de la bière; les Kamtschadales la mangent fraîchement écorcée; les paysans russes et polonais en préparent un mets aigrelet, qui fait en quelque sorte une partie essentielle de leur nourriture journalière, et qui, sous le nom de *barszcz*, est à peu près pour eux ce que le sauerkraut est pour les Allemands (3).

Divers animaux, tels que les vaches, les chèvres, les moutons, les lapins, les cochons et les ânes, broutent la berce; elle est négligée par les chevaux.

Dans certaines parties de la Suède on regarde la berce comme un remède familier contre la dysenterie; ailleurs on emploie la décoction en bain et en lavemens, que l'on suppose carminatifs, apéritifs, antispasmodiques. Ici on applique les feuilles ou la racine pilées sur les callosités; là, c'est avec le suc qu'on espère prévenir ou détruire la vermine. Plusieurs médecins prétendent que la berce est un des plus puissans moyens curatifs de la plique polonaise; d'autres soutiennent au contraire qu'elle doit être rangée parmi les causes productrices de cette maladie singulière. Au milieu de ces incertitudes, le sage observateur suspendra son jugement; il répétera les expériences cliniques: elles seules peuvent dissiper les doutes, et fixer les propriétés réelles de la berce, qui, certes, n'est point une plante inefficace.

(2) Gilibert, *Démonstrations élémentaires de botanique*, tome 2; 1796, page 437.

(3) Les gens aisés font le *barszcz* avec le son ou la farine de froment, le bouillon de viande et la betterave rouge (Erndtel, *Warsavia physicè illustrata*, 1730, page 139).

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0060-6
DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE 66.

(La plante est réduite au quart de sa grandeur naturelle)

1. Feuille entière.
2. Fleur régulière du centre de l'ombellule, grossie.
3. Fleur irrégulière de la circonférence de l'ombellule, grossie.
4. Fruit de grosseur naturelle, vu de face.
5. Le même, vu de côté.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0061-2
DFG

Turpin P. Lambert. F. sculp

BERLE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0064-0
DFG

BERLE.

Grec . . . . . ΣΙΟΝ.

Latin . . . . . SIUM, *sium aquum palustre, folii oblongis* ; Tournefort. inst. R. H. 308, t. 154. Tournefort. clas. 7, *ombellif. vera*, SIUM ANGUSTIFOLIUM ; *foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, seminibus universali pinnatifidis* Linné, clas. 5, *pentandria digynia*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères*.

Italien . . . . . SIO; SEDANO SELVATICO.

Espagnol . . . . SIO; SIUM.

Français . . . . BERLE; CRESSON D'EAU.

Anglais . . . . . WATER-PARSNEP; NARROW-LEAVED WATER-PARSNEP, WILD; WATER-CARAWAY, &c.

Allemand . . . . WASSER-PASTINAKE; WASSERSENF.

Hollandois . . . WATER-PASTINAAK; WATER-ETHE.

Cette plante vivace, très-commune dans les climats chauds et tempérés, se plaît dans les ruisseaux, les fontaines, les fossés aquatiques, sur le bord des étangs.

La racine est blanche, fibreuse, rampante, noueuse.

La tige, droite, cylindrique, rameuse, s'élève à la hauteur d'un pied et demi.

Les feuilles sont alternes et simplement ailées : les inférieures composées de treize ou quinze folioles ovales serretées, les supérieures plus petites, plus profondément dentées, quelquefois presque laciniées.

Les fleurs sont disposées en ombelles pédonculées, qui sortent des aisselles supérieures des feuilles, et leur sont opposées. La collerette universelle est formée de cinq ou six folioles lancéolées, inégales, la plupart pinnatifides. Les cinq pétales sont blancs, subcordiformes; les cinq étamines portent à l'extrémité de leurs filamens des anthères arrondies; l'ovaire inférieur est chargé de deux styles courts.

Le fruit est sphéroïde, strié, composé de deux graines demi-convexes, appliquées l'une contre l'autre.

Contenue dans la même famille que l'ache, la berle se rapproche également de cette plante par ses qualités physiques et ses propriétés médicamenteuses; aussi l'appelle-t-on communément ache d'eau. Les feuilles, dit Macquart, ont une légère acreté qui n'empêche pas de les manger en salade. Leur suc et leur décoction, rarement employés, passaient pour antiscorbutiques, fébrifuges, apéritifs, emménagogues, diurétiques, et même lithontriptiques (1). Les graines ont

(1) Certains étymologistes font provenir dans cette vertu l'origine du mot *sium*, que Pline je crois, fait dériver de *sitis*, soif, chasse la pierre; d'autres y voient

DERLE

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0066-2
DFG

LXVII.

BERLE.

Grec . . . . . σιον.

Latin . . . . . SION, *sive apium palustre, foliis oblongis;* Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 4. Tournefort, clas. 7, *ombelliferes.*
SIUM ANGUSTIFOLIUM; *foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido;* Linné, clas. 5, *pentandrie digynie.* Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombelliferes.*

Italien . . . . . SIO; GORGOLESTRO.

Espagnol . . . SIO; SION.

Français . . . . BERLE; ACHE D'EAU.

Anglais . . . . UPPER WATER-PARSNEP; NARROW-LEAVED SKIRRET, Willich; WATER-SMALLAGE, C.

Allemand . . . WASSER-PASTINAKE; WASSEREPPICH.

Hollandais . . WATER-PASTINAKE; WATER-EPPE.

Cette plante vivace, très-commune dans les climats chauds et tempérés, se plaît dans les ruisseaux, les fontaines, les fossés aquatiques, sur le bord des étangs.

La racine est blanche, fibreuse, rampante, noueuse.

La tige, droite, cylindrique, rameuse, s'élève à la hauteur d'un pied et demi.

Les feuilles sont alternes et simplement ailées : les inférieures composées de treize ou quinze folioles ovales serretées, les supérieures plus petites, plus profondément dentées, quelques-unes presque laciniées.

Les fleurs sont disposées en ombelles pédonculées, qui sortent des aisselles supérieures des feuilles, et leur sont opposées. La collerette universelle est formée de cinq ou six folioles lancéolées, inégales, la plupart pinnatifides. Les cinq pétales sont blancs, subcordiformes; les cinq étamines portent à l'extrémité de leurs filamens des anthères arrondies; l'ovaire inférieur est chargé de deux styles courts.

Le fruit est sphéroïde, strié, composé de deux graines plano-convexes, appliquées l'une contre l'autre.

Comprise dans la même famille que l'ache, la berle se rapproche également de cette plante par ses qualités physiques et ses propriétés médicamenteuses : aussi l'appelle-t-on communément *ache d'eau.* Les feuilles, dit Macquart, ont une légère âcreté qui n'empêche pas de les manger en salade. Leur suc et leur décoction, rarement employés, passaient pour antiscorbutiques, fébrifuges, apéritifs, emménagogues, diurétiques, et même lithontriptiques (1). Les graines ont

(1) Certains étymologistes aperçoivent dans cette vertu l'origine du mot *sium*, σειω λιθον, je remue, je chasse la pierre : d'autres y voient

l'odeur aromatique et la saveur piquante qui distinguent la plupart des ombellifères.

Parmi les autres espèces du genre *sium*, il en est plusieurs qui méritent d'être signalées : telles sont principalement la berle des potagers, *sium sisarum*, plus connue sous le nom de *chervi*, et à laquelle je consacrerai un article ; et la berle de la Chine, *sium ninsi*, dont je parlerai en traitant du ginseng.

l'agitation perpétuelle de la plante elle-même par l'effet des vents et des ondes. Théis aime mieux y reconnaître le terme celtique *siw*, eau. Quant à moi, je regarde tout simplement σιον comme une dénomination grecque *radicale*.

M. Théis fait pareillement venir *berle* du celtique *beler* ou *veler*, cresson ou plante analogue. Peu de personnes adopteront cette étymologie.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 67.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Feuille radicale, au trait.
2. Fleur entière, grossie.
3. Fruit de grosseur naturelle.
4. Le même, grossi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0068-4 DFG

Turpin P. Lambert Jr sculp.

BETEL.

LXVIII.

BETEL.

Latin . . . . . { BETRE *sive* TAMBUL : Rumph., Herb. Amb. lib. II, pag. 3 (1). PIPER BETLE : *foliis ovatis, oblongiusculis, acuminatis, septinerviis, petiolis brevioribus* : Linn., class. 2, *dandria trigynia*. Jussieu, class. 25, ord. 3 : ortiés.

Français . . . . BETRE.

Les Indes orientales sont la patrie du betel, qui croît de préférence sur les bords de la mer.

Les tiges, pliantes, lisses et striées, s'appuient et se fixent sur les corps voisins.

Les feuilles, alternes, assez grandes, subcordiformes, acuminées, glabres, marquées de sept nervures d'inégale longueur, sont soutenues par des pétioles canaliculés à leur base, et munis supérieurement de deux dents.

Les fleurs sont disposées en un épi cylindrique, étroit, grêle, pendant vers la terre à l'extrémité d'un long pédoncule opposé aux feuilles : autour de l'axe de cet épi sont rangées alternativement de petites écailles ; dans l'aisselle de chacune est placée une fleur composée de deux squammules calicinales, contenant deux étamines courtes, et un ovaire sphérique surmonté de trois styles en alêne, légèrement plumeux.

Le fruit consiste en petites baies globuleuses, verdâtres, monospermes, fixées et comme agglomérées le long de l'épi, spadice ou chaton, qui ressemble à la queue d'un lézard (2).

Si le betel préfère généralement les plages maritimes, on le voit prospérer, à l'aide de la culture, dans l'intérieur des terres, bocagères comme la vigne, il exige à peu près les mêmes soins, grimpe également le long des échalas ou des arbres. On le marie parfois à l'arec, avec lequel il forme de [illegible] agréables tonnelles. Cette union, d'ailleurs, [illegible] en quelque sorte d'avance, deux plantes, qui, dans l'[illegible] ordinaire de la vie, ne sont presque jamais employées l'une [illegible] l'autre. En effet, les Indiens mâchent continuellement [illegible] préparation qu'ils désignent sous le nom de *betel*.

(1) Les mots *betel*, *bettle*, *betre*, adoptés par les Européens, sont empruntés, [illegible] littéralement copiés de l'idiome malais, comme ceux de *tembac* et *sambod* le sont de l'arabe.

(2) Toutes les [illegible] de la fructification du betel sont tellement exiguës, qu'il faut une forte lentille pour les bien observer ; encore cela ne peut-il se faire que sur le vivant.

Le dessin qui représente ce végétal exotique est de grandeur naturelle.

(F.)

BIGEL.

LXVIII.

BETEL.

Latin..... BETRE SIVE TEMBUL; Bauhin, Πιπαξ, lib. 11, sect. 3 (1). PIPER BETEL; *foliis ovatis, oblongiusculis, acuminatis, septinerviis, petiolis bidentatis*: Linné, clas. 2, *diandrie trigynie*. Jussieu, clas. 15, ord. 3, *orties*.

Français.... BETEL.

Les Indes orientales sont la patrie du betel, qui croît de préférence sur les bords de la mer.

Les tiges, pliantes, lisses et striées, s'appuient et se fixent sur les corps voisins.

Les feuilles, alternes, assez grandes, subcordiformes, acuminées, glabres, marquées de sept nervures d'inégale longueur, sont soutenues par des pétioles canaliculés à leur base, et munis supérieurement de deux dents.

Les fleurs sont disposées en un épi cylindrique, étroit, serré, pendant vers la terre à l'extrémité d'un long pédoncule opposé aux feuilles: autour de l'axe de cet épi sont rangées alternativement de petites écailles; dans l'aisselle de chacune est placée une fleur composée de deux squamules calicinales, contenant deux étamines courtes, et un ovaire sphérique surmonté de trois styles en alêne, légèrement plumeux.

Le fruit consiste en petites baies globuleuses, verdâtres, monospermes, fixées et comme agglomérées le long de l'épi, spadice ou chaton, qui ressemble à la queue d'un lézard (2).

Si le betel préfère généralement les plages maritimes, on le voit prospérer, à l'aide de la culture, dans l'intérieur des terres. Sarmenteux comme la vigne, il exige à peu près les mêmes soins, grimpe également le long des échalas ou des arbres. On le marie parfois à l'arec, avec lequel il forme de jolis berceaux, d'agréables tonelles. Cette union, d'ailleurs, associe, en quelque sorte d'avance, deux plantes, qui, dans l'usage ordinaire de la vie, ne sont presque jamais employées l'une sans l'autre. En effet, les Indiens mâchent continuellement une préparation qu'ils désignent sous le nom de *betel*,

(1) Les mots de *betel*, *betle*, *betre*, adoptés par les Européens, sont empruntés, et presque littéralement copiés de l'idiome malais, comme ceux de *tembul* ou *tamboul* le sont de l'arabe.

(2) Toutes les parties de la fructification du betel sont tellement exiguës, qu'il faut une forte lentille pour les bien observer; encore cela ne peut-il se faire que sur le vivant.

Le dessin qui représente ce végétal exotique est de grandeur naturelle. (T.)

bien que les feuilles brûlantes de ce poivre en forment à peine le quart ; la chaux vive y entre dans la même proportion, tandis que la noix d'arec constitue la moitié de ce masticatoire, qui est devenu, pour les habitans des contrées équatoriales, un objet de première nécessité. On mâche du betel pendant les visites ; on en tient à la main ; on s'en offre en se saluant et à toute heure ; lorsqu'on se quitte pour quelque temps, on se fait présent de betel, renfermé dans une bourse de soie. On n'ose parler aux grands sans avoir du betel dans la bouche. Les femmes, et surtout les femmes galantes, sont passionnées pour cette drogue, qui, suivant elles, dispose merveilleusement aux plaisirs de l'amour (3).

« Ce masticatoire donne à la salive et aux autres liquides animaux une couleur rouge de brique, qui se transmet aux excrémens : il stimule fortement les glandes salivaires et les organes digestifs, diminue la transpiration cutanée, et prévient ainsi les affections atoniques qui résultent, dans les pays chauds, de cette évacuation trop abondante. Le betel est si irritant, qu'il corrode par degrés la substance dentaire, au point que les personnes qui en mâchent habituellement sont privées, dès l'âge de vingt-cinq à trente ans, de toute la partie des dents qui est hors des gencives ; mais cet inconvénient n'empêche pas que son usage soit universellement répandu dans toutes les îles de la mer des Indes. Il semble que les habitans de ces ardens climats soient invités par la nature à faire usage des aromates et des épices qui croissent abondamment sous leurs pas : de là, sans doute, l'usage de ces cariks d'une excessive âcreté, que l'on sert sur la table du prince et sur celle de l'esclave (4). »

Les docteurs Hallé et Nysten pensent, avec Peron, que les Européens, à leur arrivée dans les pays chauds, n'ont pas de moyen plus puissant, pour conserver leur santé, que de se soumettre à l'emploi du betel, ou d'un autre stimulant analogue. Après avoir tracé avec autant de fidélité que d'énergie le tableau des accidens auxquels expose le passage subit d'une température modérée à une chaleur dévorante, MM. Hallé et Nysten condamnent *notre* obstination à repousser les habitudes des peuples étrangers, lors même qu'elles nous deviennent le plus nécessaires.

J'attache le plus grand prix aux témoignages de ces méde-

(3) Ray, *Historia plantarum*, 1716.
Macquart, dans l'*Encyclopédie méthodique : Médecine ;* tome 3, page 704.
(4) Hallé et Nysten, dans le *Dictionaire des sciences médicales*, tome 3, page 92.

cins illustres, sans néanmoins adopter leur prédilection pour le betel. Cette substance, extrêmement âcre, porte sur l'appareil digestif une irritation vive et perpétuelle, une phlegmasie permanente qui se propage jusqu'aux extrémités du tube alimentaire. Ce canal, irrité sans cesse, épuise en quelque sorte sa tonicité; son mouvement péristaltique, d'abord accéléré outre mesure, se ralentit et s'altère; une faiblesse indirecte se déclare, des vices organiques se manifestent; souvent une phthisie gastrique porte le dernier coup à la machine, dont le principal ressort a été miné par l'abus des stimulans. Je viens, sans m'en apercevoir, d'ébaucher l'histoire de Peron lui-même, mort dans un état de consomption épouvantable, au printemps de son âge, peu de temps après son retour des terres australes; tandis que l'illustre Adanson dut à la tisane émolliente de baobab, ainsi qu'à l'abstinence du vin, la santé dont il jouit pendant son séjour au Sénégal, et qu'il conserva inaltérable jusqu'à près de quatre-vingts ans.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0075-2 DFG

Turpin. P. Lambert Jr. sculp

BETOINE.

LXIX.

BÉTOINE.

Grec . . . . . ΒΗΤΤΙΣ ; ΑΙΘΙΟΡΙΣ ; ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΣ ; ΣΤΑΧΥΣ.

Latin . . . . . BETONICA PURPUREA ; Haudin. Hesæ, lib. 6, sect. 5.
Tournefort, clas. 4, *Labiatæ*.
BETONICA OFFICINALIS ; *spicâ interruptâ, corollarum labii lacinià intermedià emarginatâ* ; Linné, clas. 14, *didynamia gymnospermia*. Jussieu, clas. 8, ord. 6, *Labiées*.

Italien . . . . . BETTONICA.
Espagnol . . . . . BETONICA.
Allemand . . . . . BETONIE.
Anglais . . . . . BETONY.
Français . . . . . BETOINE ; BETOINE ; BETTERAVE, Reges.
Hollandais . . . . . BETONY.
Polonais . . . . . BETWNICA, Ernfried.

On trouve communément cette plante vivace dans les endroits ombragés, les taillis, les prairies : les Grecs ayant observé qu'elle croissait de préférence dans les lieux les moins échauffés par les rayons solaires, la désignaient quelquefois sous le nom de Διοσκορίδος (1).

La racine, grosse à peine comme le doigt, est coudée, fibreuse, chevelue, brunâtre.

Les tiges, qui s'élèvent jusqu'à un pied et demi de hauteur, sont simples, droites, quadrangulaires, légèrement velues.

Les feuilles sont opposées, en cœur oblong, ridées, crénelées, portées sur des pétioles qui, très-longs dans les feuilles inférieures, diminuent, et finissent en quelque sorte par disparaître à mesure qu'elles approchent du sommet de la tige.

Les fleurs, purpurines, sont disposées en épis terminaux, chacune d'elles presente : un calice monophylle, tubulé, dont le bord est divisé en cinq dents aiguës ; une corolle monopetale, dont le tube est cylindrique, courbé, le limbe partagé en deux lèvres, la supérieure plane, entière, droite, obtuse, l'inférieure plus large, divisée en trois lobes, dont l'intermédiaire est légèrement échancré ; quatre étamines didynames, un ovaire supérieur quadrisulqué, au centre duquel s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, brunes, situées au fond du calice persistant, qui leur sert d'enveloppe.

Les qualités physiques de la bétoine sont généralement assez

(1) Divers, froid, sauvage, nourriture.

BEPOINE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0080-8
DFG

LXIX.

BÉTOINE.

Grec. . . . . . κεστρον ; κεστρων ; ψυχοτροφον ; Cετονικη.

Latin . . . . . BETONICA PURPUREA ; Bauhin, Πινακ, lib. 6, sect. 5. Tournefort, clas. 4, *labiées.*
BETONICA OFFICINALIS ; *spicâ interruptâ, corollarum labii laciniâ intermediâ emarginatâ ;* Linné, clas. 14, *didynamie gymnospermie.* Jussieu, clas. 8, ord. 6, *labiées.*

Italien . . . . . BETTONICA.
Espagnol . . . BETONICA.
Français . . . . BÉTOINE.
Anglais . . . . BETONY.
Allemand . . . BETONIK ; BETONIE ; ZEHRKRAUT, Hagen.
Hollandais . . BETONY.
Polonais . . . . BUKWIKA, Erndtel.

On trouve communément cette plante vivace dans les endroits ombragés, les taillis, les prairies : les Grecs ayant observé qu'elle croissait de préférence dans les lieux les moins échauffés pas les rayons solaires, la désignaient quelquefois sous le nom de ψυχοτροφον (1).

La racine, grosse à peine comme le doigt, est coudée, fibreuse, chevelue, brunâtre.

Les tiges, qui s'élèvent jusqu'à un pied et demi de hauteur, sont simples, droites, quadrangulaires, légèrement velues.

Les feuilles sont opposées, en cœur oblong, ridées, crénelées, portées sur des pétioles qui, très-longs dans les feuilles inférieures, diminuent, et finissent en quelque sorte par disparaître à mesure qu'elles approchent du sommet de la tige.

Les fleurs, purpurines, sont disposées en épis terminaux ; chacune d'elles présente : un calice monophylle, tubulé, dont le bord est divisé en cinq dents aiguës ; une corolle monopétale, dont le tube est cylindrique, courbé, le limbe partagé en deux lèvres, la supérieure plane, entière, droite, obtuse, l'inférieure plus large, divisée en trois lobes, dont l'intermédiaire est légèrement échancré ; quatre étamines didynames ; un ovaire supérieur quadripartite, au centre duquel naît un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, brunes, situées au fond du calice persistant, qui leur sert d'enveloppe.

Les qualités physiques de la bétoine sont généralement assez

(1) ψυχος, froid ; τροφη, nourriture.

faibles, et différentes selon la partie de la plante qu'on examine. Les racines ont une saveur amarescente, nauséeuse; les feuilles joignent à cette amertume peu prononcée un goût âpre et comme salé. Les fleurs exhalent une odeur à peine sensible. Plusieurs pharmacologistes assurent pourtant que ceux qui récoltent la bétoine éprouvent des étourdissemens, des vertiges, une sorte d'ivresse.

Peu de plantes ont joui d'une réputation plus brillante et moins méritée : Dioscoride et Galien exaltent ses vertus puissantes et variées ; elle est offerte par Antonius Musa, ou plutôt par Lucius Apulée (2), comme un remède infaillible contre quarante-six maladies, dont plusieurs sont extrêmement graves, et d'autres absolument incurables, telles que la paralysie, la rage, la phthisie purulente. Cette énumération aussi ridicule que fastueuse, est précédée d'un début apologétique véritablement curieux : *animas hominum et corpora custodit, et nocturnas ambulationes à maleficiis et periculis, et loca sancta et busta etiam à visibus metuendis tuetur et defendit, et omni rei sancta est.* Des médecins judicieux ne retrouvant aucune analogie thérapeutique entre notre inerte bétoine et la merveilleuse bétoine des anciens, ont pensé que nous avions faussement appliqué la dénomination antique (3). J'aime mieux croire qu'ici, comme dans beaucoup d'autres cas, nos bons aïeux ont donné une carrière trop libre à leur imagination poétique; car la description tracée par Dioscoride et par Apulée, bien que courte et incomplette, peut très-bien se rapporter à notre bétoine. J'ajouterai que l'enthousiasme des Grecs s'est transmis en quelque sorte aux Espagnols et aux Italiens. Ces derniers ont regardé longtemps la bétoine comme une panacée, comme un trésor, et cette opinion favorable, ou plutôt exagérée, conserve encore chez eux de nombreux partisans (4). Les médecins anglais, allemands et français n'ont point été séduits par ce concert de louanges. Cullen la juge indigne de figurer parmi les substances médicamenteuses (5); Hildenbrand ne lui accorde pas même les

(2) J.-C.-G. Ackermann, *Parabilium medicamentorum scriptores antiqui*; 1788, page 128.

(3) Murray, *Apparatus medicaminum*, tome 2; 1794, page 191.

(4) Pour signaler une personne ou une chose douées de qualités rares, on dit proverbialement : *ha più virtù che bettonica* Un second proverbe également usité et non moins expressif est celui-ci :

Vende la tonica,
E compra la bettonica.

(5) *A treatise of the mat. med.*, tome 2; 1789, page 98.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0082-0
DFG

honneurs de la citation, dans sa Pharmacologie; Spielmann ne la cite que pour en déconseiller l'usage. Murray, un peu plus indulgent, n'ose révoquer en doute les observations de Scopoli, qui tendent à établir l'emploi avantageux de la bétoine dans les affections muqueuses, dans les catarrhes atoniques. Tels sont aussi les cas dans lesquels le docteur Gilibert a éprouvé l'utilité de cette plante; mais, en revanche, il n'ajoute guère de confiance à la propriété émétique et purgative de la racine, et, sur ce point, il est d'accord avec M. Bodard. Celui-ci ne considère la bétoine que comme un sternutatoire susceptible de remplacer le tabac, dont toutefois elle est loin d'égaler l'activité.

Le fameux emplâtre de bétoine, vanté jadis pour la guérison des plaies de tête (6), et même pour consolider les fractures du crâne, est avec raison banni de nos dispensaires. L'eau distillée, le vin (7), le sirop et la conserve, sont pareillement tombés en désuétude, sans que la thérapeutique y ait rien perdu. Les tanneurs ont aussi renoncé à l'usage de la bétoine, qui n'est point assez astringente : elle s'est montrée plus utile à l'art tinctorial; elle communique une couleur brune, belle et solide aux laines préalablement imprégnées d'une faible solution de bismuth.

La bétoine blanche est une simple variété de celle dont je viens d'exposer l'histoire. Quelques espèces sont cultivées dans les jardins d'agrément: telles sont la bétoine velue, l'orientale et la grandiflore.

BLEECK (jean), *De betonicâ*, *Diss. inaug. præs. Joan.-Phil. Eysel*; in-4°. *Erfordiæ*, 1716.

(6) «Pline rapporte que le nom de *betonica* ou *vetonica* vient des Vetons, peuples qui habitent aux pieds des Pyrénées, et qui les premiers la mirent en usage. C'est une erreur, dit M. Théis : *bentonic* est le vrai nom de la bétoine, en langue celtique; il vient de *ben*, tête, et *ton*, bon : chacun connaît les qualités céphaliques de cette plante. »

L'étymologie donnée avec tant d'assurance par M. Théis me semble aussi peu admissible que celle proposée par Pline, adoptée par Bauhin, Tournefort, Ventenat.

(7) *Betonicam ex duro prodest assumere baccho.*

SERENUS SAMMONICUS.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 69.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière.
2. Calice coupé verticalement par la moitié, dans lequel on voit quatre ovaires entourés d'un bourrelet, et du centre desquels s'élève un style divisé au sommet en deux lames d'inégale longueur.
3. Corolle vue de face.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0084-2
DFG

Turpin. P. Lambert P. sculp

BETTE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0088-5
DFG

LXX.

BETTE.

Grec . . . . . τευτλον ; ευτλον.

Latin . . . . . BETA ; Bauhin, Πιναξ, lib. 3, sect. 5. Tournefort, clas. 15, *fleurs apétales*.
BETA VULGARIS ; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 6, ord. 6, *arroches*.

Italien . . . . . BIETA ; BIETOLA.
Espagnol . . . ACELGA ; REMOLACHA, Ortega.
Français . . . . BETTE ; POIRÉE.
Anglais . . . . BEET.
Allemand . . . BETE ; MANGOLD.
Hollandais . . BEET ; BIET.
Polonais . . . . CWIKLA, Erndtel.

On assigne à la bette pour patrie primitive les plages maritimes des climats méridionaux. Olivier de Serres nous apprend qu'elle fut apportée d'Italie en France vers la fin du seizième siècle. Toutefois elle croît spontanément depuis un grand nombre d'années sur le sol des pays tempérés, et même froids de l'Europe ; car je la trouve dans les Flores d'Angleterre (1), de Zélande (2) et de Pologne (3).

La racine, bisannuelle, dure, blanche-grisâtre, fusiforme, grosse à peu près comme le pouce, jette çà et là des ramuscules, garnis eux-mêmes de fibrilles capillaires.

La tige, droite, feuillée, cannelée, glabre, munie supérieurement de nombreux rameaux grêles, s'élève à la hauteur d'environ trois pieds.

Les feuilles, alternes, ont une figure très-diverse suivant leur position. Larges, subcordiformes-obtuses inférieurement, elles s'allongent en se rétrécissant et s'appointissant ; leurs pétioles se raccourcissent et disparaissent à mesure qu'elles deviennent supérieures ; elles sont verdâtres, lisses, molles et succulentes.

Les fleurs sont petites, sessiles, ramassées trois ou quatre ensemble dans les aisselles des feuilles supérieures, formant de longs épis grêles et peu serrés. Chaque fleur présente : un calice profondément quinquéfide, cinq étamines courtes, opposées aux divisions du calice, et dont les filamens portent des anthères arrondies ; un ovaire surmonté de deux styles fort courts, terminés par des stigmates simples et aigus.

(1) Ray, *Synopsis methodica stirpium britannicarum* ; 1724.
(2) Pelletier, *Plantarum in Walachriâ, Zeelandiæ insulâ, nascentium, synonymia* ; 1610, page 62.
(3) Erndtel, *Viridarium Warsaviense* ; 1730, page 21.

Le fruit est une graine réniforme (4), renfermée dans la substance de la base du calice persistant, qui lui tient lieu de capsule.

Elevée dans nos jardins, la bette a éprouvé des modifications très-remarquables. La culture a créé en quelque sorte deux familles qui, provenues de la même souche, suivant l'opinion générale, se divisent l'une et l'autre en plusieurs variétés. La première famille comprend les bettes ou poirées proprement dites; la seconde renferme les betteraves. La couleur des feuilles détermine les variétés de la bette blanche, blonde et rouge. Ce sont les côtes de la blonde que l'on mange sous le nom de *cardes*, comme celles du cardon de Tours et d'Espagne, dont j'ai parlé en traitant de l'artichaut. Les feuilles de la bette blanche et de la rouge peuvent aussi être destinées à l'usage culinaire : elles fournissent, à la vérité, un aliment fade, moins propre à être mangé seul, qu'à corriger l'acidité de l'oseille. Ramollies à la flamme ou avec un fer chaud, et couvertes de beurre, elles sont un topique familier pour panser les cautères, les vésicatoires, certaines plaies, certains ulcères, et même la teigne (5).

Outre ces propriétés, que possèdent également les feuilles de la betterave, elle offre une racine très-volumineuse, qui doit être placée au premier rang de nos plantes potagères. Cette racine constitue, par sa couleur, trois variétés : la blanche, la jaune et la rouge. Celle-ci est la plus grosse et la plus commune; la jaune est plus sucrée; la blanche, quoique tendre, est la moins savoureuse. Cuites à la chaleur du four ou de la braise, et coupées par tranches, elles deviennent un mets agréable, qui pourtant a besoin d'être bien assaisonné, comme Martial en avait déjà fait la remarque :

Ut sapiant fatuæ, fabrorum prandia, betæ,
O quam sæpe petet vina piperque cocus!

Soumise à la fermentation acéteuse, et réduite en pulpe, la betterave est le principal ingrédient du barszcz des Polonais,

(4) Cette graine imite *grossièrement* le β des Grecs, et la plante doit probablement à cette ressemblance le nom de *beta*, ainsi que l'exprime Columella.

Nomine tum graio, ceu littera proxima primæ,
Deprimitur folio viridis, pede candida beta.

M. Théis préfère dériver ce mot du celtique *bett*, rouge. L'invraisemblance de cette étymologie saute aux yeux : en effet, toutes les racines des bettes, proprement dites, sont blanches.

(5) Lorry, *De morbis cutaneis*, page 441.
Murray, *Opuscula*, tome 2, page 245.

regardé par le docteur Gilibert comme un aliment salubre, préservatif du scorbut et des fièvres putrides.

Le professeur Scherer prétend avoir fabriqué de bonne bière en substituant la racine de betterave à l'orge.

Un des produits les plus importans de cette racine est la matière sucrée qu'elle fournit assez abondamment, sinon pour entrer en concurrence avec la canamelle, du moins pour la suppléer en cas de besoin. L'énumeration des procédés employés pour l'extraction de ce sucre indigène serait ici déplacée ; mais je crois utile d'indiquer aux agronomes, aux manufacturiers, à tous les dignes appréciateurs de nos richesses nationales, les meilleures sources auxquelles ils peuvent puiser (6). C'est dans les mêmes vues d'utilité que je vais dire un mot sur la culture de la betterave, en suivant pour guide le professeur André Thouin (7).

« Aux environs de Paris, on est dans l'usage de semer en avril dans les terres chaudes, et en mai dans les froides. Les racines de betterave, au lieu d'avoir besoin d'être buttées, comme celles de beaucoup d'autres plantes, doivent être déchaussées, parce qu'elles grossissent davantage lorsqu'elles s'élèvent un peu audessus de terre, ce qui a engagé les Allemands à les mêler dans un champ avec des espèces de choux qu'il faut butter : la terre qu'on retire des betteraves est portée au pied des choux. Aussitôt que les racines sont assez fortes, on enlève les feuilles pour les bêtes à cornes, et même pour les moutons. La betterave peut, dans un bon terrain, donner quatre récoltes de feuilles. Si l'on compare cette plante avec les navets, les pommes de terre et les choux, on voit qu'aucune ne donne des fanes aussi avantageuses. »

(6) Le célèbre chimiste Margraf présenta, en 1747, à l'Académie de Berlin, du sucre qu'il avait retiré de la betterave. La quantité n'en était point assez considérable pour donner l'espoir de remplacer avantageusement le sucre de canne par celui des végétaux indigènes. François-Charles Achard, perfectionnant le procédé de son prédécesseur, parvint à fabriquer en grand du sucre de betterave, qu'il assure être aussi bon et moins cher que celui des colonies. L'Institut national de France accueillit favorablement les travaux de cet académicien, qui en consigna le résultat dans divers Mémoires, et plus récemment dans un gros ouvrage écrit en allemand, dont M. D. Angard a donné une traduction française abrégée, avec des notes du pharmacien Derosne ; in-8°. Paris, 1812.

Parmi les autres opuscules publiés en France, il suffira de distinguer les deux suivans :

CALVEL (étienne), De la betterave et de sa culture ; in-8°. Paris, 1811.

HUET DE LA CROIX (P.-A.-J.), Notice sur la betterave considérée principalement sous le rapport des bénéfices que sa culture doit procurer au cultivateur ; in-8°. Paris, 1812.

(7) *Dictionaire des sciences naturelles*, tome 4 ; 1805, page 374.

Le suc si doux de la betterave exerce pourtant, ainsi que la poudre, une action errhine très-prononcée sur la membrane muqueuse des fosses nasales. Galien avait déjà fait cette observation, confirmée par les praticiens modernes, et notamment par Borrich, qui signale avec raison le danger de ce sternutatoire.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 70.

(*La plante est un peu plus petite que nature*)

1. Fleur entière grossie.
2. Agrégation de plusieurs fruits de grandeur naturelle.
3. Fruit isolé, grossi, entouré de son calice persistant.
4. Racine et feuille radicale réduite au quart de sa grandeur naturelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0092-8
DFG

Turpin P. *Lambert Jr. sculp.*

BOIS DE BRÉSIL.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0094-0
DFG

BOIS DE BRÉSIL.

Latin	PSEUDOSANTALUM RUBRUM, sive ARBOR BRASILIA; Bauhin, Πιναξ, lib. 21, sect. 3.
	CESALPINIA ECHINATA; *caule ramisque aculeatis, foliolis ovatis, obtusis, leguminibus echinatis*; Lamarck. Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*. Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.
Italien	LEGNO DEL BRASILE.
Espagnol	PALO DEL BRASIL.
Français	BOIS DE BRÉSIL; BOIS DE FERNAMBOUC; BRÉSILLET.
Anglais	BRASILETTO; BRASIL-WOOD.
Allemand	BRASILIEN-HOLZ; BRASILIENHOLZ.
Hollandais	BRASILIE-HOUT; BRASILIES-HOUT.

La dénomination de *bois de Brésil* est mauvaise, parce qu'elle convient à tous les végétaux ligneux de ce vaste pays: mais elle a, comme tant d'autres, le droit de figurer dans l'onomatologie botanique, puisqu'elle est consacrée par l'usage, *quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi* (1).

Cet arbre, qui devient fort gros et fort grand, croît surtout parmi les rochers: il est ordinairement tortu, raboteux et rempli de nœuds. L'aubier qui couvre le bois est si épais, que lorsqu'on l'a enlevé, le tronc, auparavant de la grosseur du corps d'un homme, est réduit à celle de la jambe; il est pesant, très-sec, et pétille beaucoup dans le feu, où il ne fait presque point de fumée. L'écorce est brune, armée de piquans courts et épars. Les rameaux sont diffus et d'une longueur considérable.

Les feuilles sont alternes, deux fois ailées, et portent des folioles ovales, obtuses, très-analogues à celles du buis.

Les fleurs, disposées en grappes simples, sont panachées de jaune et de rouge; chacune d'elles présente: un calice monophylle, à cinq divisions profondes, dont l'inférieure est plus ample; cinq pétales obtus, dix étamines libres, plus longues que les pétales; un ovaire supérieur, surmonté d'un style de la longueur des étamines, et terminé par un stigmate simple, capité.

Le fruit est une gousse brune, oblongue, comprimée, hérissée extérieurement de nombreux piquans, recourbée à son sommet en forme de pointe oblique, contenant dans une seule loge plusieurs graines lisses, arrondies, brunâtres.

(1) Le nom générique *Cesalpinia* rappelle un juste hommage rendu par Plumier à la mémoire de l'immortel André Cesalpino, qui enrichit de ses découvertes la botanique, l'anatomie et la physiologie.

BOIS DE BRESIL.

LXXII.

BOIS DE BRÉSIL.

Latin..... PSEUDOSANTALUM RUBRUM, sive ARBOR BRASILIA; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 1.
CÆSALPINIA ECHINATA; *caule ramisque aculeatis, foliolis ovatis, obtusis, leguminibus echinatis;* Lamarck. Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*. Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.

Italien..... LEGNO DEL BRASILE.

Espagnol.... LEÑO DEL BRASIL.

Français..... BOIS DE BRÉSIL; BOIS DE FERNAMBOUC; BRÉSILLET.

Anglais..... BRASILETTO; BRASIL-WOOD.

Allemand.... BRASILIENBAUM; BRASILIENHOLZ.

Hollandais... BRASILIEN-BOOM; BRASILIEN-HOUT.

La dénomination de *bois de Brésil* est mauvaise, parce qu'elle convient à tous les végétaux ligneux de ce vaste pays: mais elle a, comme tant d'autres, le droit de figurer dans l'onomatologie botanique, puisqu'elle est consacrée par l'usage, *quem penès arbitrium est et jus et norma loquendi* (1).

Cet arbre, qui devient fort gros et fort grand, croît surtout parmi les rochers: il est ordinairement tortu, raboteux et rempli de nœuds. L'aubier qui couvre le bois est si épais, que lorsqu'on l'a enlevé, le tronc, auparavant de la grosseur du corps d'un homme, est réduit à celle de la jambe; il est pesant, très-sec, et pétille beaucoup dans le feu, où il ne fait presque point de fumée. L'écorce est brune, armée de piquans courts et épars. Les rameaux sont diffus et d'une longueur considérable.

Les feuilles sont alternes, deux fois ailées, et portent des folioles ovales, obtuses, très-analogues à celles du buis.

Les fleurs, disposées en grappes simples, sont panachées de jaune et de rouge; chacune d'elles présente: un calice monophylle, à cinq divisions profondes, dont l'inférieure est plus ample; cinq pétales obtus, dix étamines libres, plus longues que les pétales; un ovaire supérieur, surmonté d'un style de la longueur des étamines, et terminé par un stigmate simple, capité.

Le fruit est une gousse brune, oblongue, comprimée, hérissée à l'extérieur de nombreux piquans, recourbée à son sommet en une pointe oblique, contenant dans une seule loge plusieurs graines lisses, arrondies, brunâtres.

(1) Le nom générique *cæsalpinia* rappelle un juste hommage rendu par Plumier à la mémoire de l'immortel André Cesalpino, qui enrichit de ses découvertes la botanique, l'anatomie et la physiologie.

Une odeur agréable s'exhale des fleurs du brésillet. Son bois, dont la saveur est douce et comme sucrée, prend bien le poli, et convient aux ouvrages du tour, de la menuiserie et de l'ébénisterie. Toutefois, c'est à l'art tinctorial qu'il est particulièrement destiné. L'importation en Europe est immense, et la ville de Fernambouc est le principal entrepôt de ce commerce. Cependant le brésillet ne donne qu'une fausse couleur rouge : elle a besoin d'être fixée par le tartre et l'alun; encore ces substances salines ne la rendent-elles pas parfaitement solide et durable. Outre les étoffes, on teint avec ce bois les meubles, les cuirs, les œufs de Pâques, les racines de guimauve pour nétoyer les dents; on en extrait une sorte de carmin à l'aide des acides; on en prépare des laques, en mêlant sa décoction avec de l'alun, et précipitant ce mélange par des alcalis; il forme la base des encres rouges, et de cette craie rougeâtre, nommée *rosette*, qui sert pour la peinture (2); enfin, il est regardé par les Hollandais comme un *excellent* moyen de colorer leurs *vins de fabrique*.

« La teinture de Fernambouc est employée en chimie pour colorer des papiers qui, suivant Bergman, passent au bleu par les alcalis, et qui servent avantageusement pour reconnaître dans les eaux ces bases salifiables. Cette propriété peut être utilisée dans la matière médicale; mais il faut observer que le bois de Fernambouc qui se vend en France n'a point offert à Guyton-Morveau le changement en bleu indiqué par Bergman (3). »

Les pharmacologistes ont rangé le bois de Brésil parmi les astringens, et ont supposé son infusion fébrifuge, stomachique, antophtalmique. Placé par Dale sur la même ligne que le santal, il est, en effet, doué, comme lui, d'une très-faible vertu médicamenteuse, et tombé dans une désuétude encore plus absolue.

(2) Lamarck, *Encyclopédie méthodique : botanique;* tome 1, page 461.
Jaume Saint-Hilaire, dans le *Dict. des sciences nat.*, tom. 5, pag. 334.
Hagen, *Lehrbuch der Apothekerkunst;* 1792, page 248.
(3) Fourcroy, dans l'*Encyclopédie méthodique : médecine;* tome 4, page 28.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 72.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Anthère grossie.
2. Pistil.
3. Fruit.
4. Graine isolée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0098-4
DFG

Turpin P. Lambert F. sculp

BOTRIS.

a.d.l.

BOTRYS.

Grec ..... *βοτρυς.*

Latin ..... BOTRYS AMBROSIOIDES VULGARIS; Bauhin, Pinax, lib. 4, sect. 2.
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES, *folio sinuato*; Tournefort, clas. 15, *fleurs apétales.*
CHENOPODIUM BOTRYS; *foliis oblongis, sinuatis, racemis nudis, multifidis*; Linné, clas. 5, *pentandria digynia.* Jussieu, clas. 6, ord. 6, *arroches.*

Italien ..... BOTRI.

Espagnol ..... HIERBA SANTA.

Français ..... ANSERINE BOTRIDE, Lamarck.

Anglais .....

Allemand ..... , TRAUBENKRAUT, BOTRYSKRAUT.

On ne trouve point cette plante annuelle parmi les anserines assez nombreuses des environs de Paris; elle se plaît sur les terrains secs, sablonneux, chauds, de la Grèce, de l'Italie, de la Provence.

La racine, peu volumineuse, charnue, grisâtre extérieurement, blanche à l'intérieur, s'enfonce perpendiculairement dans le sol, en s'amincissant par degrés, et jette quelques radicules déliées.

La tige, droite, ferme, rameuse, légèrement striée et anguleuse, parvient jusqu'à la hauteur d'un pied.

Les feuilles alternes, pétiolées, oblongues, sinuées, et presque pinnées, ont quelque ressemblance

le long de la tige, et jusqu'à

axillaires nues, verdâtres,

(1).

Le fruit

recommandables par le talent de l'observation

que le botrys mériterait d'être employé

fréquemment dans l'art de guérir; ils disent

que les qualités physiques de cette plante annoncent évidemment ses propriétés médicamenteuses. En effet, le botrys

(1) Tout le monde sait que les Grecs désignent une grappe sous le nom de βοτρυς, adopté par les Latins, *botrys*, *botrys*.
Murray, *Apparatus medicaminum*, tome 4 (1787), page 272.
, *Tableau méthod. d'un cours d'hist. nat. méd.*, 1804, page
Bi dans le *Dictionaire des sciences médicales*, tome 3, page 257.

BOTRIS.

BOTRYS.

Grec..... βοτρυς.

Latin..... BOTRYS AMBROSIOIDES VULGARIS; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 2.
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES, *folio sinuato*; Tournefort, clas. 15, *fleurs apétales*.
CHENOPODIUM BOTRYS; *foliis oblongis, sinuatis, racemis nudis, multifidis*; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 6, ord. 6, *arroches*.

Italien..... BOTRI.

Espagnol.... BIENGRANADA.

Français..... BOTRYS; PIMENT; ANSERINE BOTRIDE, Lamarck.

Anglais..... JERUSALEM-OAK.

Allemand... BOTRYSKRAUT, Hermann; TRAUBENKRAUT; MOTTENKRAUT; LUNGENKRAUT.

On ne trouve point cette plante annuelle parmi les anserines assez nombreuses des environs de Paris; elle se plaît sur les terrains secs, sablonneux, chauds, de la Grèce, de l'Italie, de la Provence.

La racine, peu volumineuse, charnue, grisâtre extérieurement, blanche à l'intérieur, s'enfonce perpendiculairement dans le sol, en s'amincissant par degrés, et jette quelques radicules déliées.

La tige, droite, ferme, rameuse, légèrement striée et tomenteuse, parvient jusqu'à la hauteur d'un pied.

Les feuilles, alternes, pétiolées, oblongues, sinuées, et pour ainsi dire semi-pinnées, ont quelque ressemblance avec celles du seneçon.

Les fleurs sont disposées tout le long de la tige, et jusqu'à son sommet, en petites grappes axillaires nues, verdâtres, qui se divisent et se subdivisent (1).

Le fruit est une graine lenticulaire, placée sur le réceptacle, dans le calice qui s'est refermé en devenant pentagone.

Des médecins recommandables par le talent de l'observation (2) pensent que le botrys mériterait d'être employé beaucoup plus fréquemment dans l'art de guérir; ils disent que les qualités physiques de cette plante annoncent évidemment ses propriétés médicamenteuses. En effet, le botrys

(1) Tout le monde sait que les Grecs désignent une grappe sous le nom de βοτρυς, adopté par les Latins, *botrus*, *botrys*.

(2) Murray, *Apparatus medicaminum*, tome 4 (1787), page 272.
Peyrilhe, *Tableau méthod. d'un cours d'hist. nat. méd.*, 1804, page 119.
Biett, dans le *Dictionaire des sciences médicales*, tome 3, page 257.

distille en quelque sorte le baume par tous ses pores. Frappées des rayons bienfaisans du soleil, ses feuilles sécrètent abondamment le suc balsamique qui les rend visqueuses, brillantes, aromatiques (3). On voit en outre effleurir à leur surface des petits cristaux blancs comme le nitre, et qui, comme lui, fusent, s'enflamment et détonnent sur les charbons ardens. Le botrys se rapproche encore des résines odorantes par une saveur légèrement âcre, piquante, amère; aussi le docteur Wauters n'hésite-t-il point à lui décerner la prééminence sur le baume du Pérou, de la Mecque, de Tolu, de Copahu, la térébenthine, la myrrhe et le styrax. J'avoue qu'il m'est impossible d'accorder une confiance aveugle aux assertions du médecin de Gand, bien qu'il invoque à leur appui une expérience de trente années. « N'a-t-il pas été beaucoup trop loin en assurant avoir guéri des phtisies confirmées, par l'usage du botrys? En examinant les faits sur lesquels il se fonde, on trouve que ces prétendues phtisies ne sont autre chose que des catarrhes pulmonaires dégénérés: le botrys agit dans ces cas d'une manière analogue à celle des baumes et des résines. C'est assez dire qu'il ne faut jamais l'employer ni dans la phtisie tuberculeuse, ni dans celles où il est dangereux d'exciter une sorte d'irritation vers la poitrine; on doit se borner à l'administrer dans les catarrhes pulmonaires chroniques désignés improprement par plusieurs pathologistes sous le nom de *phtisie muqueuse*, dans l'asthme humide, etc. »

En adoptant ces réflexions judicieuses de M. Biett, j'ajouterai que Dioscoride avait déja reconnu l'efficacité du botrys dans les maladies de la poitrine, et surtout dans l'orthopnée. Cette vertu béchique et antispasmodique semble confirmée par des praticiens célèbres, Mattioli, Foreest, Hermann, Vogel, Peyrilhe. Quelques hypocondriaques, dit Gilibert, ont trouvé un soulagement à leurs maux en prenant tous les matins une infusion théiforme de piment : il n'est pas moins utile dans les coliques venteuses, et l'anorexie due à la faiblesse de l'appareil gastrique. Les Vénitiennes l'emploient souvent à l'intérieur et à l'extérieur, pour combattre les affections hystériques. On peut faire digérer les feuilles et les sommités de botrys dans le vin, en préparer une eau distillée, une poudre, un électuaire, un sirop, des juleps, des lochs; on la donne en substance, à la dose d'un gros.

L'arome que répand le botrys a le double avantage de flatter notre odorat, et de préserver les étoffes de la piqûre

(3) Wauters, *Repertorium remediorum indigenorum*, 1810, page 22.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0104-1 DFG

des teignes, ce qui lui a valu le nom de *mottenkraut*, tandis que celui de *lungenkraut* indique ses propriétés pectorales.

Comme l'occasion ne se représentera plus de parler des chénopodes ou ansérines, je crois devoir signaler quelques espèces dont il serait injuste de ne pas faire du moins une légère mention. (J'ai consacré un article à l'ansérine anthelmintique, tome 1, page 99).

1°. Le bon Henri, ou l'ansérine sagittée, *chenopodium bonus Henricus*, L. ne mérite point l'oubli auquel il paraît condamné en France. Les habitans du Nord savent mieux apprécier cette plante tout à la fois potagère et médicamenteuse; ils mangent les jeunes tiges comme les asperges, et les feuilles en guise d'épinards : celles-ci partagent les qualités émollientes et dépuratives des feuilles de bette (4).

2°. L'ansérine rouge, *chenopodium rubrum*, L., produit un joli effet dans les jardins d'agrément, par le contraste de sa couleur avec celle des autres plantes (5). On ne sait pas trop pourquoi Linné la place dans sa Matière médicale, puisqu'elle est, selon lui, douteuse et superflue.

3°. L'ansérine du Mexique, ou ambroisie, *chenopodium ambrosioides*, L. est encore appelée *thé du Mexique* : elle doit ses dénominations à l'odeur agréable qu'elle exhale et à ses usages économiques. Son action thérapeutique est égale, peut-être même supérieure à celle du botrys (6).

4°. L'ansérine fétide, arroche puante, ou vulvaire, *chenopodium vulvaria*, L., est ainsi nommée à cause des émanations véritablement *animales* qui s'en échappent. Ces émanations ne déplaisent point aux femmes hystériques, aux personnes hypocondriaques; elles contribuent même à soulager leur malaise habituel, à diminuer les pandiculations, à calmer les spasmes dont ces individus sont si souvent et si douloureusement tourmentés : je parle ici d'après ma propre expérience!

5°. L'ansérine à balais, *chenopodium scoparia*, L., sert effectivement, en Italie, à nétoyer les meubles; on la cultive aussi dans les jardins : elle ressemble à un cyprès pyramidal, et reçoit le nom de *belvédère*.

(4) Murray, *Opuscula*, tome 2, page 392.
(5) Delaunay, *Le bon Jardinier*, 1814, page 291.
(6) Goritz, *De theâ romanâ, seu botry mexicanâ*. — *In Ephemer. natur. curios., Centur.* 7 et 8, obs. 15. — Et *in* Manget, *Biblioth. script. medic.*, part. 2 (1731), pag. 496.
Lochner, *De novis et exoticis theæ et coffeæ succedaneis, botry mexicanâ ambrosioide, ambrosiâ artemisiæ foliis*, etc. *Norimbergæ*, 1717.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0105-7

PENTSCH (théophile chrétien), *De bono Henrico, Diss. inaug. præs. Joan. Phil. Eysel;* in-4°. *Erfordiæ*, 1714.
CARTHEUSER (jean fréderic), *De chenopodio ambrosioïde, Diss. inaug. resp. Martini;* in-4°. *Francofurti ad Viadrum*, 1757.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 73.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Racine.
2. Fleur entière très-grossie et ouverte, afin de faire voir le pistil et l'insertion des étamines.
3. Fruit grossi entouré par le calice.
4. Graine de grosseur naturelle.
5. La même grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0106-3
DFG

Turpin P. Lambert F. sculp

BOUILLON BLANC.

LXXIV.

BOUILLON BLANC.

Grec ..... ΦΛΟΜΟΣ; ΦΛΟΜΟΣ.

Latin ..... VERBASCUM MAS LATIFOLIUM LUTEUM; Bauhin, Theatr., lib. 6, sect. 6. Tournefort, clas. 2, *infundibuliformes*. VERBASCUM THAPSUS; *foliis decurrentibus, utrinque tomentosis, caule simplici*; Linné, clas. 5, *pentandria monogynia*. Jussieu, clas. 8, ord. 8, *solanées*.

Italien ..... TASSO BARBASCO; VERBASCO.

Espagnol ..... VERBASCO.

Français ..... BOUILLON BLANC; BONHOMME; HERBE DE SAINT FIACRE.

Anglais ..... MULLEIN; HIGH TAPER; AARON'S LENGWORT.

Allemand ..... WOLLKRAUT, GEMEINES KÜHKRAUT, HIMMELBRAND, WERKE, Hagen.

Hollandais ..... WOLLE-KRUID.

Polonais ..... SWIRZAWKA, Ewalld.

Le docteur Gilibert pense, et je serais disposé à penser avec lui, que la molène est originaire des pays chauds : du moins elle y montre beaucoup plus de vigueur, et s'élève parfois jusqu'à la hauteur de six pieds, tandis que dans les contrées froides elle acquiert à-peine le tiers de cette élévation. Elle croît abondamment aux environs de Paris, dans les champs, dans les endroits pierreux et sablonneux, sur les grands chemins, dans les décombres.

La racine, blanchâtre, dure et comme ligneuse, s'enfonce assez profondément dans le sol, jetant çà et là des ramuscules.

La tige est droite, ordinairement simple, très-feuillée, cylindrique, grosse, ferme, couverte d'un duvet grisâtre extrêmement épais (1).

Les feuilles radicales sont très-amples, étalées à terre en rosette, et soutenues par de courts pétioles ; les caulinaires, moins volumineuses, sont peu ouvertes, sessiles, et même courantes sur la tige ; ces feuilles sont alternes, ovales-oblongues, très-lanugineuses ; elles ont l'épaisseur et le moelleux d'un morceau de drap (2).

Les fleurs forment autour de la tige, et jusqu'à son sommet,

(1) Le nom de *barbascum*, altéré, dit-on, de *barbaccum*, exprime la barbe, les poils, c'est presque toutes les parties de cette plante sont couvertes.

Rien n'atteste point cette étymologie, qui lui semble même ridicule.

(2) On puise l'origine des dénominations françaises, anglaise et allemande, *molène* ou *mollène*, *mullein*, *wolke*. Si je ne craignais de m'exposer au reproche d'une érudition intempestive, je donnerais ces mêmes étymologie de la plupart des termes étrangers.

BOUILLON BLANC

LXXIV.

BOUILLON BLANC.

Grec..... φλομος; φλοιος.

Latin..... VERBASCUM MAS LATIFOLIUM LUTEUM; Bauhin, Πιναξ, lib. 6, sect. 6. Tournefort, clas. 2, *infondibuliformes*. VERBASCUM THAPSUS; *foliis decurrentibus, utrinque tomentosis, caule simplici*; Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie*. Jussieu, clas. 8, ord. 8, *solanées*.

Italien..... TASSO BARBASSO; VERBASCO.

Espagnol.... GONDOLOBO; VERBASCO.

Français.... BOUILLON BLANC; MOLÈNE; BONHOMME; HERBE DE SAINT FIACRE.

Anglais..... MULLEIN; HIGH TAPER; COW'S LUNGWORT.

Allemand... WOLLKRAUT; KOENIGSKERZ; HIMMELBRAND; WELKE, Hagen.

Hollandais... WOLLE-KRUID.

Polonais.... DZIEWANNA, Erndtel.

Le docteur Gilibert pense, et je serais disposé à penser avec lui, que la molène est originaire des pays chauds : du moins elle y montre beaucoup plus de vigueur, et s'élève parfois jusqu'à la hauteur de six pieds, tandis que dans les contrées froides elle acquiert à peine le tiers de cette élévation. Elle croit abondamment aux environs de Paris, dans les champs, dans les endroits pierreux et sablonneux, sur le bord des chemins, dans les décombres.

La racine, blanchâtre, dure et comme ligneuse, s'enfonce assez profondément dans le sol, jetant çà et là des ramuscules.

La tige est droite, ordinairement simple, très-feuillée, cylindrique, grosse, ferme, couverte d'un duvet grisâtre extrêmement épais (1).

Les feuilles radicales sont très-amples, étalées à terre en rosette, et soutenues par de courts pétioles ; les caulinaires, moins volumineuses, sont peu ouvertes, sessiles, et même courantes sur la tige; ces feuilles sont alternes, ovales-oblongues, très-lanugineuses; elles ont l'épaisseur et le moelleux d'un morceau de drap (2).

Les fleurs forment autour de la tige, et jusqu'à son sommet,

(1) Le mot *verbascum*, altéré, dit-on, de *barbascum*, exprime la barbe, les poils, dont presque toutes les parties de cette plante sont couvertes.

Risler n'admet point cette étymologie, qui lui semble même ridicule.

(2) On voit ici l'origine des dénominations française, anglaise et allemande, *molène* ou *mollène*, *mullein*, *welke*. Si je ne craignais de m'exposer au reproche d'une érudition intempestive, je donnerais constamment l'étymologie de la plupart des termes étrangers.

un long et bel épi jaune, dense et comme thyrsoïde. Chaque fleur présente : un calice monophylle, à cinq divisions profondes, ovales, aiguës; une corolle monopétale en roue, dont le tube est très-court, le limbe évasé, presque plane, à cinq lobes légèrement inégaux, ovales, obtus; cinq étamines, dont trois sont un peu plus courtes que les deux autres (3); un ovaire supérieur, duquel s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule ovoïde, entourée par le calice, divisée en deux loges qui s'ouvrent par le haut, et sont remplies de graines menues et anguleuses.

Les qualités physiques du bouillon blanc sont en général assez faibles. L'odeur des feuilles fraîches a quelque chose de narcotique. La saveur est herbacée, avec une légère amertume, comparée à celle du raifort par Bergius, qui trouve l'arôme des fleurs desséchées analogue à celui de l'iris de Florence.

Les bestiaux refusent de brouter la molène, et si l'on jette des graines de cette plante dans un vivier, le poisson frappé d'étourdissement, se laisse prendre à la main. Les racines, au contraire, pilées et mêlées à la drèche, engraissent promptement la volaille (4).

Si les médecins négligent trop le bouillon blanc (5), il est en revanche un remède domestique employé de toutes parts et depuis un temps immémorial. Je l'ai vu mettre en usage sur les bords du Rhin, de la Vistule et du Tibre, comme sur ceux de la Seine et de la Loire; j'ai même été surpris de remarquer, *dans ce cas*, le discernement du vulgaire, généralement si bizarre dans ses jugemens, si fantasque dans ses choix, si aveugle dans sa confiance. Le docteur Gilibert s'est en quelque sorte montré l'interprète de la voix publique, le juste appréciateur de la molène. On pourrait tout au plus lui reprocher quelques expressions trop fastueuses. « Le bouillon blanc recèle un principe narcotique assez masqué pour n'en craindre aucun mauvais effet. La décoction des feuilles est *admirable* en lavement dans les ténesmes et la dysenterie; elle calme les douleurs du fondement causées par les hémorroïdes : l'infusion des fleurs

(3) Le genre *verbascum* est un de ceux qui forment le passage de la pentandrie à la didynamie angiospermie. Les étamines sont au nombre de cinq; mais, comme dans la didynamie, elles sont ordinairement inégales, et les lobes de la corolle sont irréguliers. — La corolle du genre *celsia* est parfaitement semblable à celle du *verbascum*, mais les étamines sont didynames. BOISSIEU.

(4) Bechstein, *Gemeinnuetzige Naturgeschichte.*

(5) Gilibert, *Démonstrations élém. de botanique;* 1796: tom. 1, pag. 444.

est le meilleur adoucissant des irritations de la membrane muqueuse intestinale; elle procure un soulagement notable dans les ardeurs de poitrine, les toux convulsives des enfans, les coliques, la dysurie, enfin dans toutes les maladies dont l'indication consiste à modérer les spasmes et l'érétisme. La conserve des fleurs de bouillon blanc appliquée sur les dartres rongeantes et sur les ulcères douloureux, diminue les démangeaisons. »

J'ai souvent eu occasion d'observer la vertu calmante des feuilles et des fleurs de molène, bouillies légèrement dans l'eau ou dans le lait, et employées en vapeur, en fomentation, et plus ordinairement sous la forme de cataplasme, sur des furoncles, des panaris, des brûlures, des hémorroïdes enflammées.

Les fermiers de la Carniole, de l'Irlande, de la Norwège regardent le bouillon blanc comme un moyen propre à combattre la toux des bestiaux et à prévenir la consomption (6).

Dans certains pays on recouvre de poix les longues et fortes tiges de cette plante pour en faire des torches, tandis que le coton qui les revêt peut remplacer l'amadou, comme le duvet de l'armoise, ou servir à la préparation du moxa.

Hochheimer assure que la molène chasse infailliblement des greniers les rats et les souris qui dévorent le blé. Dambourney, Bechstein, Willich la rangent parmi les plantes tinctoriales; Boissieu dit qu'elle communique aux laines une nuance de vigogne jaunâtre, et Risler la propose pour colorer les cheveux (7).

Le genre *verbascum* renferme, outre le *thapsus*, plusieurs espèces qu'il me paraît convenable de signaler.

1°. La molène noire, *verbascum nigrum*, L. est plus belle que le bouillon blanc, et possède sans contredit des qualités particulières, que discernent mieux que nous de chétifs insectes. En effet, les abeilles recherchent plus avidement le suc de ses fleurs que celui des autres espèces, et la chenille qui ronge la molène blanche n'attaque jamais la noire (8).

2°. Le petit bouillon blanc, ou la molène lychnite, *verbascum lychnitis*, L. doit sa dénomination spécifique aux anciens, qui en faisaient des mèches : λυχνιτης, *lucernarius*, qui appartient aux *lampes*, λυχνος. On regarde la fleur, et surtout la racine, comme antictériques (9).

(6) Risler, *De verbasco*, page 70.
Willich, *The domestic Encyclopædia*; 1802 : tome 3, page 244.
(7) *Verbascum lixivio immissum flavo colore capillos tingit.*
(8) Peyrilhe, *Tableau méthod., etc.* 1804, page 88.
(9) Risler, Durande, Gilibert, Peyrilhe.

3°. La blattaire, *verbascum blattaria*, L. chasse, dit-on, les insectes qui détruisent les étoffes, les livres, la farine; telles sont les teignes, les mites, les *blattes* : toutefois cette propriété *insectifuge* est révoquée en doute par Willemet, par Lamarck; quelques-uns même vont jusqu'à prétendre que la blattaire attire ces insectes, et favorise leur multiplication.

RISLER (jacques), *De verbasco, Diss. inaug. med. bot.; Argentorati*, 25 *jan.* 1754.

Cette Dissertation très-étendue (72 pages in-4°. fig.) et très-érudite, est placée avec raison par Haller dans le petit nombre des excellentes monographies. Elle contient pourtant certaines opinions équivoques ou exagérées, que ce n'est pas ici le lieu d'énumérer et de rectifier.

SCHRADER (henri adolphe), *Monographia generis verbasci, sectio* 1; in-4°. fig. *Gottingæ*, 1814.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 74.

(*La plante est moitié de grandeur naturelle*)

1. Calice et pistil.
2. Corolle ouverte dans laquelle on distingue cinq étamines, deux longues et trois courtes à filets velus.
3. Pistil.
4. Capsule ou fruit entouré du calice.
5. Fruit coupé transversalement pour faire voir les deux loges et le grand nombre de graines qu'elles renferment.
6. Graines de grandeur naturelle.
7. Graine grossie.

(*Tous ces détails sont réduits à la moitié de leur grandeur naturelle*)

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0114-7
DFG

Turpin P. Lambert F. sculp.

BOULEAU BLANC.

a. L. L.

LXXV.

BOULEAU.

Grec ..... αἴγειρος, σημύδα, Théophraste.

Latin ..... BETULA, Linné, *gen.* 1017; Jussieu, *gen.* 409; Tournefort, *cl.* 19, *sect.* 5, *tribus amentaceæ*.

Italien ..... BETULLA, BETULLO.

Espagnol ..... ABEDUL.

Français ..... BOULEAU, BOULEAU BLANC, BOULEAU COMMUN.

Anglais ..... BIRCH-TREE.

Allemand ..... BIRKENBAUM.

Hollandais ..... BEVERBOOM.

Polonais ..... BRZOZA.

Au milieu des arbres de nos forêts, dont l'écorce rembrunie offre à nos regards les rides de la vieillesse, le bouleau, *B. alba* Linné (1), s'annonce au loin paré d'un épiderme lisse, satiné, d'une blancheur éclatante.

Le tronc s'élève, dans les bons terrains, jusqu'à la hauteur de soixante à septante pieds; droit, cylindrique, sans difformités et sans nœuds, il ne pousse que vers son sommet des branches qui se divisent en rameaux souples, pendans, grêles.

Les feuilles sont alternes, ovales-pointues, presque triangulaires, doublement et comme serretées, vertes en dessus, d'un vert blanchâtre en dessous, portées sur des pétioles assez longs.

Les fleurs, petites, apétalacées, sont monoïques, c'est-à-dire mâles et femelles séparées sur le même pied: les chatons mâles, plus lâches, plus longs, se composent d'écailles ternées, qui tiennent lieu de calice, et renferment douze étamines, dont les anthères sont groupées par quatre; les chatons femelles, plus serrés, plus courts, sont formés d'écailles trilobées, dont chacune recouvre deux fleurs qui consistent en un petit ovaire surmonté de deux styles sétacés, réfléchis, et à stigmates simples.

Le fruit est une petite graine nue, bordée de deux petites ailes membraneuses (2).

(1) Encyclopédie méthodique, botanique, tome I, page 687.

(2) Mœnch, Methodus, pag. 340. Gærtner, de Fructibus et Seminibus plantarum, vol. II, pag. 61, tab. 87, fig. 1.

BOULEAU BLANC

LXXV.

BOULEAU.

Grec.....	σημος; σημυδα, Théophraste.
Latin.....	BETULA; Bauhin, Πινακξ, lib. 11, sect. 5. Tournefort, clas. 19, *arbres amentacés*.
	BETULA ALBA; *foliis ovatis, acuminatis, serratis;* Linné, clas. 21, *monœcie tétrandrie*. Jussieu, clas. 15, ord. 4, *amentacées*.
Italien.....	BETULA; BETULLA.
Espagnol....	ABEDUL.
Français....	BOULEAU; BOULEAU BLANC; BOULEAU COMMUN.
Anglais.....	BIRCH; BIRCH-TREE.
Allemand...	BIRKE; BIRKENBAUM.
Hollandais..	BERKENBOOM.
Polonais....	BRZOZA.

Au milieu des arbres de nos forêts, dont l'écorce rembrunie offre à nos regards les rides de la vieillesse, le bouleau, dit M. Poiret (1), s'annonce au loin paré d'un épiderme lisse, satiné, d'une blancheur éclatante.

Le tronc s'élève, dans les bons terrains, jusqu'à la hauteur de soixante à septante pieds; droit, cylindrique, sans difformités et sans nœuds, il ne pousse que vers son sommet des branches qui se divisent en rameaux souples, pendans, effilés.

Les feuilles sont alternes, ovales-pointues, presque triangulaires, denticulées et comme serretées, vertes en dessus, d'un vert blanchâtre en dessous, portées sur des pétioles assez longs.

Les fleurs, petites, amentacées, sont monoïques, c'est-à-dire mâles et femelles séparées sur le même pied : les chatons mâles, plus lâches, plus longs, se composent d'écailles ternées, qui tiennent lieu de calice, et renferment douze étamines, dont les anthères sont groupées par quatre; les chatons femelles, plus serrés, plus courts, sont formés d'écailles trilobées, dont chacune recouvre deux fleurs qui consistent en un petit ovaire surmonté de deux styles sétacés, persistans, et à stigmates simples.

Le fruit est une petite graine nue, bordée de deux petites ailes membraneuses (2).

(1) *Encyclopédie méthodique : botanique; supplément;* tome 1, page 686.

(2) *Aspice telluri data semina parva betullæ,*
Quæ, dum rura ferunt, flexilis arbor erunt.

« Peu délicat sur la nature du sol, le bouleau végète dans les terrains arides, pierreux, crétacés; il porte la fertilité et la vie dans ces contrées qui semblaient devoir être frappées d'une éternelle stérilité. Il est peu de végétaux moins susceptibles des impressions de l'air et de la rigueur du froid. On le retrouve dans les Alpes, audessus de ces régions où aucun autre arbre ne peut plus exister : il s'avance jusque vers les glaces du pole arctique; il est le dernier que produise le Groenland. Mais sur les montagnes glacées il n'est plus qu'un arbrisseau bas, tortueux, rabougri. A la vérité, il acquiert en dureté ce qu'il perd en hauteur, et son bois n'en est que plus propre à fabriquer divers ustensiles de ménage : il s'y forme des nœuds d'une substance rougeâtre, marbrée, très-recherchés des tourneurs (3). »

Les Suédois et les Lapons tirent un grand parti du bouleau. Son écorce, qui souvent survit longtemps à la destruction complette de l'intérieur de l'arbre, sert à la couverture des cabanes; on en fait des corbeilles, des chaussures nattées, des cordes, des filets, des bouteilles, des assiettes. Lorsqu'elle est encore remplie de ses sucs à demi résineux, elle fournit des torches qui éclairent bien; on en retire, à l'aide du feu, une huile poisseuse, qui donne aux cuirs de Russie une qualité supérieure et une odeur particulière. Enfin les Kamtschadales trouvent dans cette écorce un aliment et une boisson; ils la mêlent à leur caviar, et en préparent une sorte de bière. L'épiderme sert encore de papier à divers habitans du nord, comme il en servait plus généralement à nos ancêtres (4).

Avec des jeunes bouleaux courbés graduellement, on fait des jantes de roues; âgés de dix ans, ils donnent des cerceaux pour les futailles; un peu plus forts, on les emploie à relier les cuves, et les gros sont mis en œuvre par les sabotiers. Les menues branches sont employées depuis un temps immémorial à faire des balais et des verges; elles étaient la base des faisceaux qu'on portait devant les premiers magistrats de la république romaine. J'aime entendre M. Poiret s'écrier à ce sujet : Quand ne verrons-nous plus des maîtres ou des parens assez ignorans et assez barbares pour croire former la jeunesse à la vertu et aux sciences, par les moyens avec lesquels on punit le crime (5)?

(3) Poiret; *ibid.*

(4) Duchesne, dans le *Dictionaire des sciences naturelles*; tom. 5, pag. 261.

(5) *Emendat rigidos puerorum betula mores.*

Les Allemands, chez lesquels règne encore plus que chez nous la criminelle

Les expériences nombreuses et intéressantes de Dambourney assignent au bouleau une place éminente parmi nos végétaux colorans. Diversement apprêté, il communique aux étoffes une multitude de nuances : brune, jaune, noisette, fauve, mordorée. Ce n'est pas tout; il a le précieux avantage d'aviver et de fixer la couleur des bois de Campêche et de Fernambouc (6).

Je viens de tracer une longue, et pourtant très-incomplette énumération des usages économiques du bouleau, avant de parler des propriétés médicales. Celles-ci m'ont paru ne devoir occuper que le second rang, parcequ'elles sont beaucoup moins nombreuses et moins importantes. Toutefois elles ont été fastueusement célébrées par le docteur Leopold, et chantées par le poète Vanière :

Nec betulla fluet membris minus utilis ægris ;
Seu stomacho diros calor erupturus in ignes
Incubat, infestus renes seu calculus urit.

Ces trois vers élégans (7) peignent à merveille les principales vertus attribuées à la sève extrêmement abondante du bouleau (8). Salzmann, Riedlin, Pauli, Werg, la conseillent à titre de dépuratif contre les éruptions cutanées, dartreuses et psoriques; Mattioli, Tabernæmontanus, Charleton, Bartholin, Darel, la prescrivent comme diurétique et lithontriptique; Rosen et Bergius la disent vermifuge : on en fait prendre trois onces par jour aux enfans, et six à sept aux adultes.

L'huile de bouleau est employée à l'intérieur et à l'extérieur par le peuple russe pour guérir la blennorrhagie et les ulcères vénériens.

habitude de frapper les enfans, ont fait du vers de Lauterbach une sorte de proverbe :

Eine gute Birken-Ruth
Macht die bœsen Kinder gut.

Calepino et d'autres érudits voient dans ce coupable, mais fréquent usage du bouleau, l'origine de sa dénomination : *betula*, suivant eux, est une altération, une modification légère de *batula*, qui vient de *batuere*, battre. J'adopterais plus volontiers cette étymologie que celle proposée par Mattioli et par Bauhin (de la substance *bitumineuse* qu'on extrait de cet arbre). Théis, d'après Bullet, Menage, Littleton, dérive *betula* de betu, ou *betw*, nom celtique ou bas-breton du bouleau.

(6) *Recueil de procédés, etc.*, an 11 de la république; pages 51, 81 et 113.

(7) On a pu remarquer, en comparant mes citations, que les poètes ont modifié à leur gré la prosodie du mot *betula*, selon le besoin de la mesure.

(8) Les voyageurs et les agronomes décrivent la manière d'extraire ce suc, analysé d'abord par Marggraf, puis plus exactement par le professeur Vauquelin : Journal de la société libre des pharmaciens de Paris, 15 ventôse an VII, page 346.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0121-5
DFG

Bergius assure que l'épiderme du bouleau, porté dans les souliers, détermine infailliblement une sueur des pieds qui peut devenir salutaire dans plusieurs maladies chroniques. Les feuilles exercent pareillement une action sudorifique très-marquée; aussi les paysans suédois et moscovites couvrent-ils de ces feuilles leurs membres affectés de douleurs rhumatismales, arthritiques, ou gonflés par des infiltrations, des épanchemens séreux, lymphatiques.

La plupart des autres espèces de bouleau jouissent de propriétés analogues; j'en signalerai quelques-unes :

1°. Le bouleau noir, ou à canot, *betula nigra*, L. est recouvert d'une écorce presque incorruptible, avec laquelle les Canadiens font des pirogues. Les teinturiers et les peintres retirent des feuilles une belle couleur jaune.

2°. Le bouleau nain, *betula nana*, L. très-commun dans les marais de la Suède, couvre les Alpes de Laponie, qui sont sa véritable patrie. Il est presque le seul bois de chauffage pour les habitans de ces climats glacés. Les feuilles et les tendres rameaux sont broutés par les moutons; le lagopède se nourrit des chatons nouvellement éclos, et pendant tout le reste de l'année, des semences, qui sont aussi la principale nourriture du lemming.

3°. L'aune, ou vergne, *betula alnus*, L. était connu des anciens, qui savaient utiliser ses diverses parties. Du temps de Théophraste, l'écorce servait à teindre les cuirs. Pline et Vitruve disent que les pilotis d'aune sont d'une éternelle durée, et peuvent supporter des poids énormes : on l'employait alors, comme aujourd'hui, pour faire des conduits d'eau souterraine; mais il faut avoir soin de le préserver du contact de l'air, qui l'altère rapidement. Murray assure que les feuilles fraîches, appliquées chaudes sur les mamelles, sont le meilleur topique pour chasser le lait. Les propriétés fébrifuges de l'écorce indiquées par Fabregon, ont été confirmées par le docteur Roussille-Chamseru, qui ne connaît guère de meilleur succédané indigène du quinquina.

KOENIGSMANN (André Louis), *De antiquitate betulæ pentecostalis frondiumque sacrarum universæ*, *Diss.* in-4°. *Kiloniæ*, 1707.

LEOPOLD (jean dietrich), Σημολογια, *seu discursus medico-botanicus de betulâ*, *præs. El. Camerarius*; in-4°. *Tubingæ*, 28 *jul.* 1727.

KLASE (L. M.), *Betula nana*, *Diss. inaug. præs. Car. Linné*; in-4°. *Upsaliæ*, 30 *jun.* 1743.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 75.

(La plante est représentée de grandeur naturelle)

1. Rameau portant des fruits mûrs.
2. Rameau chargé d'un chaton mâle.
3. Chaton femelle au moment de sa floraison.
4. Écaille fructifère, détachée d'un chaton femelle, grossie.
5. Un des trois fruits ailés que l'on trouve sous chaque ecaille, grossi.
6. Écaille ternée, détachée d'un chaton mâle, sous laquelle on aperçoit les anthères grossies.
7. La même, vue en dessous, afin de faire voir les douze anthères groupées par quatre sur trois points différens.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0123-7 DFG

Turpin P. Lambert Jne sculp.

BOURRACHE.

a.l.l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0126-4

LXXVI.

BOURRACHE.

Originaire du Levant, et plus particulièrement des environs d'Alep, la bourrache est une plante annuelle que l'on cultive dans nos jardins, où elle se propage avec une extrême facilité. Elle est même devenue sauvage dans plusieurs provinces de France, et spécialement en Normandie (1).

La racine est à peu-près de la grosseur du doigt, longue, fusiforme, blanchâtre, pivotante, et garnie de fibres.

La tige s'élève jusqu'à la hauteur de deux pieds; elle est rameuse, anguleuse, cylindrique, creuse, armée de poils et piquans.

Les feuilles inférieures sont pétiolées, couchées sur la terre, larges, ovales; les supérieures plus étroites, sont sessiles, amplexicaules, presque ailées et les autres sont alternes, ridées, ouvertes, hérissées de poils rudes.

Les fleurs naissent au sommet de la tige et des branches, portées sur de longs pédoncules recourbés vers la terre. Leur couleur, d'abord purpurine dans les jeunes, passe successivement au plus beau bleu. Une variété se distingue par des fleurs entièrement blanches (2). Chaque fleur présente : un calice monophylle, divisé profondément en cinq découpures oblongues, inégales, persistantes; une corolle monopétale, dont le tube, plus court que le calice, forme à son orifice une petite couronne composée de cinq éminences qui en ferment l'entrée, et dont le limbe est partagé

(1) Duchesne, dans le *Dictionnaire des sciences naturelles*, tome 5, page 72.

(2) Ce changement de couleur, remarquable dans les corolles, est commun à presque toutes les fleurs des bourraches; il donne aux épis, par cette transition de couleurs, un aspect extrêmement agréable.

BOURRACHE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0128-6
DFG

BOURRACHE.

Grec..... βουγλωσσον, Dioscoride? πουραχιον, Myrepsius.

Latin..... BUGLOSSUM LATIFOLIUM, BORRAGO; Bauhin, Πιναξ, lib. 7, sect. 2.
BORRAGO; Tournefort, clas. 2, *infondibuliformes*.
BORAGO OFFICINALIS; *foliis omnibus alternis, calycibus patentibus*; Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie*. Jussieu, clas. 8, ord. 9, *borraginées*.

Italien..... BORRAGINE; BORRANA.
Espagnol... BORRAXA.
Français.... BOURRACHE; BOUROCHE.
Anglais..... BORAGE.
Allemand... BORETSCH; BURRETSCH.
Hollandais.. BERNAGIE; BERNAGE; BERNAZIE.
Polonais.... BORAK.

Originaire du Levant, et plus particulièrement des environs d'Alep, la bourrache est une plante annuelle que l'on cultive dans nos jardins, où elle se propage avec une extrême facilité. Elle est même devenue sauvage dans plusieurs provinces de France, et spécialement en Normandie (1).

La racine est à peu-près de la grosseur du doigt, longue, tendre, blanchâtre, pivotante, et garnie de fibres.

La tige s'élève jusqu'à la hauteur de deux pieds : elle est rameuse, succulente, cylindrique, creuse, armée de poils courts et piquans.

Les feuilles inférieures sont pétiolées, couchées sur la terre, larges, ovales; les supérieures plus étroites, sont sessiles, amplexicaules : les unes et les autres sont alternes, ridées, vertes, hérissées de poils rudes.

Les fleurs naissent au sommet de la tige et des branches, portées sur de longs pédoncules recourbés vers la terre. « Leur couleur, d'abord purpurine dans les jeunes, passe successivement au plus beau bleu. Une variété se distingue par des fleurs entièrement blanches (2). » Chaque fleur présente : un calice monophylle, divisé profondément en cinq découpures oblongues, hispides, persistantes; une corolle monopétale, dont le tube, plus court que le calice, forme à son orifice une petite couronne composée de cinq éminences qui en ferment l'entrée, et dont le limbe est partagé

(1) Duchesne, dans le *Dictionaire des sciences naturelles*; tome 5, page 271.

(2) Ce passage du rouge au bleu dans les corolles, est commun à presque toutes les fleurs des borraginées; il donne aux épis, par cette transition de couleurs, un aspect infiniment agréable. (T.)

en cinq divisions pointues, ouvertes en étoile; cinq étamines conniventes, dont les filamens soutiennent des anthères alongées, coniques, acuminées, qui forment une pyramide au milieu de la fleur; un ovaire supérieur, à quatre lobes, du centre desquels s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate simple (3).

Le fruit consiste en quatre petites graines nues, noirâtres dans leur maturité, ridées, ovoïdes, osseuses, scrobiculeuses.

Toute la plante, mais surtout la racine jeune, les tiges et les feuilles contiennent un suc visqueux, fade, très-abondant. On le retire par expression; mais il est si épais, si mucilagineux, que souvent pour l'obtenir on est obligé d'ajouter de l'eau. Ce suc défégué par le blanc d'œuf, et évaporé en consistance de sirop, donne du nitre en cristaux par le refroidissement. La chaleur en sépare une substance muqueuse qui paraît avoir de l'analogie avec la matière albumineuse. Fourcroy dit que l'on prépare un extrait avec ce suc épaissi, quand on ne peut se procurer la plante fraîche (4), et c'est en effet la méthode généralement usitée. Mais M. Couret s'est assuré que l'extrait fourni par la bourrache desséchée est plus homogène, et se conserve bien plus longtemps intact (5). D'un autre côté, M. Granet a trouvé le moyen d'avoir en tout temps du suc de bourrache, en délayant l'extrait dans une certaine quantité d'eau distillée (6).

Les médecins de tous les temps et de tous les lieux ont accordé à la bourrache une confiance que des praticiens judicieux et des hommes de génie n'ont pas craint de partager. Le suc nitré dont la bourrache est imprégnée, dit Gilibert, rend cette plante très-précieuse dans les maladies inflammatoires, toutes les fois qu'il faut tempérer, surtout dans les phlegmasies pulmonaires. La décoction miellée de bourrache, ou le suc clarifié, facilite l'expectoration, calme les ardeurs d'urine. On l'administre avec succès, ajoute Fourcroy, dans les fièvres ardentes et bilieuses, les embarras du foie, les affections fébriles éruptives, les maladies lentes de la peau. Ces propriétés médicamenteuses ont été révo-

(3) Quelques espèces de *borago*, telles que l'*officinalis* et l'*axiflora*, offrent un caractère dont les autres espèces du genre sont entièrement dépourvues: c'est un long appendice, prolongement du filet de l'étamine, en forme de cornet, et placé derrière l'anthère, c'est-à-dire entre celle-ci et la corolle. Je crois, d'après cette observation, qu'en refaisant le caractère du genre *borago*, on pourrait en établir un nouveau, composé des espèces à étamines simples. (T.)

(4) *Encyclopédie méthodique : médecine*; tome 4, page 151.

(5) *Journal de la Société libre des pharmaciens de Paris*; 15 thermidor an VI; page 230.

(6) Même Journal, page 350.

quées en doute, et même niées formellement par divers thérapeutistes : ils se sont particulièrement récriés sur la vertu stimulante, exhilarante, cordiale, attribuée aux fleurs presque inodores et insipides; ils ont vu avec surprise cette propriété imaginaire consacrée par un vers devenu proverbe (7), et la bourrache lui devoir jusqu'à son nom (8).

Je pense avec Murray que la bourrache pourrait être bannie sans inconvenient de la matière médicale : elle est employée dans plusieurs pays comme plante potagère; on sert les jolies fleurs en salade avec celles de la capucine. Toutefois cette brillante couleur bleue, qui semblerait si propre à enrichir l'art tinctorial, a trompé l'espoir de Dambourney; ce sont les végétaux les plus vils en apparence qui lui ont procuré les plus belles couleurs

Les abeilles recherchent avidement les fleurs de bourrache, d'autant plus précieuses sous ce rapport qu'elles continuent de s'épanouir jusque vers la fin de l'automne.

(7) *Dicit borrago : gaudia cordis ago.*

(8) *Borago* ou *borrago* est évidemment une modification, une altération de *corrago, corago, cor ago.*

EXPLICATION DE LA PLANCHE 76.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Calice et pistil, ovaire quadrilobé.
2. Corolle ouverte, à la base du tube de laquelle sont insérées cinq étamines à filets élargis, et se prolongeant en une espèce de languette.
3. Étamine pourvue de son appendice.
4. Fruit composé de quatre petites noix osseuses et scrobiculeuses.
5. Noix isolée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0131-1 DFG

BRYONE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0134-8
DFG

BRYONE.

Grec. . . . . ἀμπελος λευκη; βρυωνια.

Latin. . . . . BRYONIA ALBA, sive RUBRA, *baccis rubris*; Bauhin, Pinax, lib. 8, sect. 1. Tournefort, clas. 1, *campan. formes*.

BRYONIA ALBA β; *foliis palmatis, utrinque calloso-scabris*. Linné, clas. 21, *monoecia syngenesia*. Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cucurbitacées*.

BRYONIA DIOICA; Willdenow, Poiret.

Italien. . . . . BRIONIA, VITICELLA, ROMARINA.

Espagnol. . . . . NUEZA.

Français. . . . . BRYONE; NAVETTE; COULEUVRÉE.

Anglais. . . . . BRYONY.

Allemand. . . . . RABENRÜBE, GICHTRÜBE.

Hollandois. . . . ZWARTE WYNGAARD, Wouters.

Polonois. . . . . CHMIELOWA; Linsch.

Linné regarde la bryone dioïque comme une simple variété de la blanche, dont pourtant elle se distingue, selon M. Poiret, par des caractères spécifiques tranchés : en effet, les fleurs mâles et femelles ne se trouvent jamais sur le même pied (1), et les fruits sont constamment rouges.

Cette plante vivace, extrêmement commune dans presque tous les climats, croît principalement dans les haies.

La racine fusiforme, souvent rameuse, longue, charnue, blanche-jaunâtre, marquée de stries transversales superficielles, est ordinairement grosse comme le bras; mais elle peut acquérir un volume beaucoup plus considérable.

Les tiges, qui ont cinq ou six pieds de longueur, sont grêles, herbacées, sarmenteuses, grimpantes (2), cannelées, chargées de petits poils roides et distans.

Les feuilles sont alternes, palmées, à demi-divisées en cinq lobes anguleux, calleuses et rudes au toucher sur l'une et l'autre face, soutenues par des pétioles à la base de chacun desquels naît une longue vrille simple et roulée en spirale.

Les fleurs mâles, portées sur de longs pédoncules axillaires, sont disposées par bouquets, et présentent : un calice

(1) Cette prétendue aberration *forcée* d'une plante dioïque dans la monoecie est une monstruosité réelle, une irrégularité choquante du système linnéen; et pourtant ce système, malgré ses lacunes et ses imperfections, est encore le plus philosophique, le moins défectueux qu'on ait imaginé.

(2) Linné nomme dans sa prodigieuse végétation le titre de *bryone* : βρυειν, croître, pousser, naître. On le nomme *couleuvrée*, parce qu'elle rampe à la manière des serpens, et s'entortille comme eux.

BRYONE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0136-0
DFG

LXXVII.

BRYONE.

Grec.....	αμπελος λευκη; βρυωνια.
Latin.....	BRYONIA ASPERA, sive ALBA, *baccis rubris*; Bauhin, Πιναξ, lib. 8, sect. 1. Tournefort, clas. 1, *campaniformes*.
	BRYONIA ALBA β; *foliis palmatis, utrinque calloso-scabris*; Linné, clas. 21, *monœcie syngénésie*. Jussieu, clas. 15, ord. 2, *cucurbitacées*.
	BRYONIA DIOICA; Willdenow, Poiret.
Italien.....	BRIONIA; FESCERA; RORASTRO.
Espagnol...	NUEZA.
Français....	BRYONE; BRIOINE; COULEUVRÉE.
Anglais.....	BRYONY.
Allemand...	ZAUNRUEBE; GICHTRUEBE.
Hollandais..	BRYONIE; WILDE WYNGAERD, Wauters.
Polonais....	PRZESTAP; Erndtel.

Linné regarde la bryone dioïque comme une simple variété de la blanche, dont pourtant elle se distingue, selon M. Poiret, par des caractères spécifiques tranchés : en effet, les fleurs mâles et femelles ne se trouvent jamais sur le même pied (1), et les fruits sont constamment rouges.

Cette plante vivace, extrêmement commune dans presque tous les climats, croît principalement dans les haies.

La racine fusiforme, souvent rameuse, longue, charnue, blanche-jaunâtre, marquée de stries transversales superficielles, est ordinairement grosse comme le bras; mais elle peut acquérir un volume beaucoup plus considérable.

Les tiges, qui ont cinq ou six pieds de longueur, sont grêles, herbacées, sarmenteuses, grimpantes (2), canelées, chargées de petits poils roides et distans.

Les feuilles sont alternes, palmées, à demi-divisées en cinq lobes anguleux, calleuses et rudes au toucher sur l'une et l'autre face, soutenues par des pétioles à la base de chacun desquels naît une longue vrille simple et roulée en spirale.

Les fleurs mâles, portées sur de longs pédoncules axillaires, sont disposées par bouquets, et présentent: un calice

(1) L'intercalation *forcée* d'une plante dioïque dans la monœcie est sans doute un vice réel, une irrégularité choquante du système linnéen; et pourtant ce système, malgré ses lacunes et ses imperfections, est encore le plus philosophique et le moins défectueux qu'on ait imaginé.

(2) Cette plante doit à sa prodigieuse végétation le titre de *bryone* : βρυειν, végéter, pousser, croître. On la nomme *couleuvrée*, parce qu'elle rampe à la manière des serpens, et s'entortille comme eux.

court, monophylle, campanulé, à cinq dents aiguës; une corolle monopétale, en rosette, divisée en cinq lobes ovales d'un blanc sale, marqués de lignes verdâtres; trois étamines courtes, dont deux sont terminées par une double anthère, tandis que le filament de la troisième n'en porte qu'une seule. Les fleurs femelles sont soutenues par des pédoncules courts, qui partent de l'aisselle des feuilles, comme ceux des fleurs mâles. Le calice et la corolle se ressemblent dans les deux sexes : l'organe génital femelle consiste en un ovaire inférieur, du sommet duquel s'élève un style trifide, dont les stigmates sont échancrés.

Le fruit est une baie globuleuse, de la grosseur d'un pois, d'abord verte, devenant d'un rouge vif à l'époque de la maturité, contenant cinq à six graines ovoïdes, enveloppées dans une pulpe mucilagineuse.

Les diverses parties de la bryone exercent sur nos organes une action diverse. L'odeur des baies est légèrement nauséeuse, leur saveur est fade; Hollefear en a vu manger plusieurs sans qu'il soit survenu aucun effet remarquable. Dioscoride nous apprend que les jeunes pousses servaient d'aliment comme les asperges; mais il ajoute qu'elles déterminent l'excrétion des fèces et de l'urine. Toutefois, ce sont les racines qui jouissent depuis un temps immémorial d'une grande recommée. Des thérapeutistes modernes très-célèbres exaltent les propriétés médicamenteuses de ces racines, et se plaignent de les voir trop négligées de nos jours. « Nous sommes convaincus par une suite d'expériences, dit Gilibert, que cette plante, en différens temps, peut fournir toutes les espèces de purgatifs, depuis le minoratif jusqu'au drastique. Quelques observations prouvent qu'il existe une espèce de manie entretenue par une matière glaireuse vitrée, qui tapisse les intestins et l'estomac : dans ce cas, la couleuvrée, même récente, a guéri en évacuant ces glaires. »

L'immortel Fourcroy place la bryone sur la même ligne que le jalap, et trouve étonnant qu'on n'en fasse pas plus d'usage. « C'est un incisif, un fondant, un purgatif, un diurétique précieux, lorsqu'on l'emploie à petites doses et bien préparé. Cette racine, administrée récente et à plus forte dose, devient un drastique puissant, un irritant énergique; elle paraît différer du jalap en ce qu'elle perd plus de ses vertus par la dessiccation. La racine fraîche de bryone pourrait aussi être comparée à celle du manioc : elle contient un suc très-âcre et presque vénéneux; mais on peut en extraire, par le repos et les lavages répétés, une fécule fine et blanche, susceptible de fournir une substance alimentaire d'au-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0138-2
DFG

tant plus utile dans des cas de disette, que cette racine est abondante, et acquiert un grand volume (3). »

Ce n'est pas au jalap seulement que la bryone a été substituée. M. Bodard prétend qu'elle remplace parfaitement le séné : il prescrit le suc, d'après Alston, à la dose de trois gros dans un bouillon ; il la donne sèche et pulvérisée, depuis un scrupule jusqu'à un gros ; il fait prendre une égale quantité d'extrait. Le docteur Harmant de Montgarny voit dans la racine de bryone un ipécacuanha indigène, qui ne le cède point à l'exotique dans le traitement des affections diarrhéiques et dysenteriques. En Allemagne, en Suède, les paysans creusent les racines de bryone fraîche, et remplissent ce *gobelet* de bière, qui, dans l'espace d'une nuit, devient émétique et purgative ; ils coupent cette racine par tranches minces, qui irritent, enflamment la peau, et forment ainsi des rubéfians, des épispastiques, des exutoires.

Ces observations, auxquelles il m'eût été facile d'en ajouter beaucoup d'autres, suffisent pour révéler l'analogie frappante qui existe entre la racine de bryone et celle d'arum. Celle-là comme celle-ci (4) est, quoi qu'on en dise, un médicament infidèle, puisque, trop caustique à l'état frais, elle perd, en se desséchant, toute son énergie.

HANDTWIG (GUSTAVE CHRÉTIEN), *De bryoniâ ; Von der heiligen Ruebe*, *Diss.* in-4°. *Rostochii*, 1758.

(3) *Encyclopédie méthodique : médecine ;* tome 4, page 184.
(4) Voyez le tome 1, page 138.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 77.

(*La plante est représentée un peu plus petite que nature*)

a. Individu femelle en fruit.
b. Individu mâle en fleur.
1. Racine très-réduite.
2. Fleur femelle entière.
3. Fleur mâle ouverte.
4. Étamine grossie.
5. Fruit coupé horizontalement.
6. Graine isolée grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0139-0
DFG

Turpin. P.

Lambert. F. sculp.

BUGLE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0142-2
DFG

BUGLE.

Grec ..... ἀσσοκαυλος; Renealme.

Latin ..... CORNUTUS HERBA FRANCORUM; Bauhin, *Hist.* lib. 7, sect. 2.
BUGULA; Tournefort, clas. 4, *Labiées*, Jussieu, clas. 8, ord. 6, *labiées*.
GYMNOSPERMIA; *stalonibus reptantibus*; Linné, clas. 14, *didynamie gymnospermie*.

Italien ..... BUGOLA.

Espagnol ..... BUGULA.

Français ..... BUGLE; BUGLE RAMPANTE.

Anglais ..... BUGLE.

Allemand ..... GÜNSEL, Bauhin; KRIECHENDER GÜNSEL, Hagen; KRIECHENDER-GOLDEN-GÜNSEL, Kops.

Hollandais ..... KRUIPENDE ZEEGROEN, Kops; ZEEGROEN; INGROEN; BUGULA.

On trouve abondamment cette plante vivace dans les prairies et dans les bois de la France, au milieu des sables de la Pologne, sur les dunes de la Hollande.

La racine grisâtre, menue, fibreuse, pousse une tige haute de cinq à six pouces (1), droite, simple, carrée, et en outre des rejets couchés sur la terre, qui donnent naissance à de nouvelles tiges (2).

Les feuilles sont opposées, ovales, retrécies à leur base, bordées de quelques dents anguleuses obtuses.

Les fleurs, communément bleues, sont rougeâtres dans une variété et blanches dans une autre : presque sessiles, disposées par verticilles garnis de bractées dont les supérieures sont colorées; elles forment un bel épi terminal. Chaque fleur présente un calice court, persistant, monophylle, à cinq découpures aiguës; une corolle monopétale, labiée irrégulière, la lèvre supérieure n'étant constituée que par deux petites dents très courtes, à peine sensibles, tandis que l'inférieure assez ample est formée de

(1) Kops en a vu s'élever jusqu'à près d'un pied et demi dans les terrains humides.

(2) On voit ici l'origine du nom ἀσσοκαυλος, imaginé par Renealme; ἀσσον, double, καυλος, tige.

Les étymologies des termes génériques *ajuga* et *bugula* sont tellement obscures, qu'elles ont diversement expliquées par les divers écrivains, que, pour ne point entrer dans une discussion longue et nécessairement fastidieuse, je me borne à renvoyer aux auteurs cités pour ces mots les curieux de les connaître :

Lemery, *Universal dictionary*, p. 35 : *ajuga* et *bugula*.

Hedwig, *Lexicon botanicum*, 1801, pag. 10 et 41.

Thory, *Nouveau dictionnaire de botanique*, 1810, pag. 14.

Nota. Lamarck.

d.

BUGLE.

LXXVIII.

BUGLE.

Grec.....	δισσοκαυλος; Reneaulme.
Latin.....	CONSOLIDA MEDIA PRATENSIS; Bauhin, Πιναξ, lib. 7, sect. 2. BUGULA; Tournefort, clas. 4, *labiées*. Jussieu, clas. 8, ord. 6, *labiées*. AJUGA REPTANS; *stolonibus reptantibus*; Linné, clas. 14, *didynamie gymnospermie*.
Italien.....	BUGOLA.
Espagnol....	BUGULA.
Français...,	BUGLE; BUGLE RAMPANTE.
Anglais.....	BUGLE.
Allemand...	GUNTZEL, Hermann; KRIECHENDER GUENSEL, Hagen; SCHLEICHENDER-GÜLDEN-GUENSEL, Kops.
Hollandais...	VOORTKRUIPEND ZEGEGROEN, Kops; ZENEGROEN; INGROEN; BUGULA.

On trouve abondamment cette plante vivace dans les prairies et dans les bois de la France, au milieu des sables de la Pologne, sur les dunes de la Hollande.

La racine grisâtre, menue, fibreuse, pousse une tige haute de cinq à six pouces (1), droite, simple, carrée, et en outre des rejets couchés sur la terre, qui donnent naissance à de nouvelles tiges (2).

Les feuilles sont opposées, ovales, retrécies à leur base, bordées de quelques dents anguleuses obtuses.

Les fleurs, communément bleues, sont rougeâtres dans une variété et blanches dans une autre: presque sessiles, disposées par verticilles garnis de bractées dont les supérieures sont souvent colorées, elles forment un bel épi terminal. Chaque fleur présente: un calice court, persistant, monophylle, à cinq découpures aiguës; une corolle monopétale, labiée irrégulière, la lèvre supérieure n'étant constituée que par deux petites dents très-courtes, à peine sensibles, tandis que l'inférieure assez ample est formée de

(1) Kops en a vu s'élever jusqu'à près d'un pied et demi dans les terrains fertiles.

(2) On voit ici l'origine du mot δισσοκαυλος, imaginé par Reneaulme: δισσος, double, καυλος, tige.

Les étymologies des termes génériques *ajuga* et *bugula* sont tellement obscures, et si diversement expliquées par les divers écrivains, que, pour ne point entrer dans une discussion longue et nécessairement fastidieuse, je me borne à indiquer les principales sources au lecteur curieux de les consulter:

Littleton, *Latin dictionary*; 1735: *ajuga* et *bugula*.
Beckmann, *Lexicon botanicum*; 1801, pag. 10 et 41.
Théis, *Glossaire de botanique*; 1810, pag. 14.

trois lobes, dont le moyen est échancré en cœur; quatre étamines didynames; un ovaire supérieur, quadripartite, du centre duquel s'élève un style filiforme, bifide à son sommet.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovales-oblongues, situées au fond du calice.

Plus on examine les faibles qualités physiques de la bugle, et plus on est étonné de la voir occuper une place éminente dans les anciennes pharmacologies. Ettmuller et Rivière la croyaient propre à guérir la phtisie pulmonaire et l'esquinancie; Camerarius et Dodoens la prescrivaient contre les obstructions du foie; Mauchart la faisait entrer dans son eau viscérale. Elle a été recommandée, dit Fourcroy, dans les hémorragies, le crachement de sang, les pertes, les dysenteries, et le nom de *petite consoude* lui a été donné parce qu'on la jugeait capable de souder, pour ainsi dire, les blessures des vaisseaux sanguins. On appliquait aussi ses feuilles hachées sur les ulcères, les coupures, les contusions; elles étaient un des ingrédiens de l'eau d'arquebusade; enfin, la propriété vulnéraire de cette plante était en quelque sorte consacrée par un proverbe pitoyable. Soumise à des observations plus exactes, la bugle a perdu de nos jours toute sa renommée. En effet, loin d'avoir droit à quelque prééminence, elle ne partage pas même les vertus des labiées les plus vulgaires. Son eau distillée ne vaut pas l'eau commune, dit Gilibert, et ce vulnéraire si vanté guérit uniquement les plaies que la nature seule conduirait très-bien à cicatrice.

Brugmans classe la bugle parmi les plantes nuisibles aux prés : les moutons et les chèvres la broutent; elles est négligée par les chevaux et les cochons.

Les Italiens, dit Willemet, mangent au printemps les jeunes pousses et les racines de la bugle en salade (3).

Ce n'est point la bugle rampante, mais bien la pyramidale, qui figure dans les pharmacologies de Linné, de Bergius, de Peyrilhe. Ces trois thérapeutistes n'ont signalé cette labiée que pour la déclarer absolument inerte et superflue.

(3) *Phytographie encyclopédique;* 1805 : tome 2, page 673.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 78.

(La plante est de grandeur naturelle)

1. Fleur entière de grandeur naturelle.
2. La même fendue longitudinalement, dans laquelle on voit à la base un ovaire quadrilobé, du centre duquel s'élève un style bifide au sommet, et quatre étamines didynames insérées vers les deux tiers du tube de la corolle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0146-6
DFG

BUGLOSE.

a.l.l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0148-8
DFG

LXXIX.

BUGLOSE.

Grec	ἀγχουσα ; Hippocrate.
Latin	BUGLOSSUM ANGUSTIFOLIUM MAJUS ; Bauhin, Πιναξ, lib. 7, sect. 2. Tournefort, clas. 2, *infundibuliformes*.
	ANCHUSA OFFICINALIS ; *foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis* ; Linné, clas. 5, *pentandria monogynia*. Jussieu, clas. 8, ord. 9, *borraginées*.
Italien	BUGLOSSA.
Espagnol	BUGLOSA.
Français	BUGLOSE.
Anglais	BUGLOSS.
Allemand	OCHSENZUNGE.
Hollandais	OSSETONG.
Suédois	OXTUNGA.

Faut-il regarder comme deux espèces différentes la buglose officinale de Linné et celle de Lamarck, généralement connues ? Tel est le sentiment de M. Poiret, qui signale les caractères distinctifs (1), et ajoute que la première est indigène du nord de l'Europe, tandis que la seconde croît abondamment par toute la France. Ce n'est point ici le lieu de discuter si les caractères énumérés par M. Poiret sont assez tranchés pour établir deux espèces, ou s'ils constituent seulement deux variétés ; mais je dois faire observer que M. Turpin ayant, avec raison, dessiné la buglose *officinale* de Lamarck, qui est effectivement celle de nos pharmacies, c'est également l'espèce ou la variété dont je vais offrir la description (2).

La racine, grosse comme le doigt, est vivace, oblongue, rameuse, brune ou roussâtre, succulente.

La tige, qui s'élève à plus de deux pieds, est couverte de poils rudes et épais.

Les feuilles sont alternes, ovales-aiguës, hérissées de poils écartés, qui naissent chacun d'un tubercule blanc très-dur.

Les fleurs, qui passent de la couleur rouge à la bleue, sont disposées unilatéralement sur des épis géminés terminaux, roulés en queue de scorpion (*a*). Chaque fleur présente : un calice oblong, persistant, monophylle, à cinq divisions profondes, étroites, linéaires ; une corolle monopé-

(1) *Encyclopédie méthodique : botanique, supplément*, tome 1, page 733.
(2) M. Poiret adopte pour la buglose officinale de Lamarck le nom spécifique et la phrase de M. J. Bauhin : *anchusa italica, foliis lucidis, strigosis, racemis bipartitis, dumosis, floribus subæqualibus, fauce barbatis*.
(*a*) Observation d'une variété à fleurs blanches. (*F.*)

BUGLOSE.

LXXIX.

BUGLOSE.

Grec.....	αγχουσα; Hippocrate.
Latin.....	BUGLOSSUM ANGUSTIFOLIUM MAJUS; Bauhin, Πιναξ, lib. 7, sect. 2. Tournefort, clas. 2, *infondibuliformes*.
	ANCHUSA OFFICINALIS; *foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis;* Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie*. Jussieu, clas. 8, ord. 9, *borraginées*.
Italien.....	BUGLOSSA.
Espagnol....	BUGLOSA.
Français....	BUGLOSE.
Anglais.....	BUGLOSS.
Allemand...	OCHSENZUNGE.
Hollandais...	OSSETONG.
Suédois.....	OXTUNGA.

Faut-il regarder comme deux espèces différentes la buglose officinale de Linné et celle de Lamarck, généralement confondues? Tel est le sentiment de M. Poiret, qui signale les caractères distinctifs (1), et ajoute que la première est indigène du nord de l'Europe, tandis que la seconde croît abondamment par toute la France. Ce n'est point ici le lieu de discuter si les caractères énumérés par M. Poiret sont assez tranchés pour établir deux espèces, ou s'ils constituent seulement deux variétés; mais je dois faire observer que M. Turpin ayant, avec raison, dessiné la buglose *officinale* de Lamarck, qui est effectivement celle de nos pharmacies, c'est également l'espèce ou la variété dont je vais offrir la description (2).

La racine, grosse comme le doigt, est vivace, oblongue, rameuse, brune ou roussâtre, succulente.

La tige, qui s'élève à plus de deux pieds, est couverte de poils rudes et épais.

Les feuilles sont alternes, ovales-aiguës, hérissées de poils écartés, qui naissent chacun d'un tubercule blanc très-dur.

« Les fleurs, qui passent de la couleur rouge à la bleue, sont disposées unilatéralement sur des épis géminés, terminaux, roulés en queue de scorpion (*a*). » Chaque fleur présente : un calice oblong, persistant, monophylle, à cinq divisions profondes, étroites, linéaires; une corolle mono-

(1) *Encyclopédie méthodique : botanique; supplément*, tome 1, page 735.

(2) M. Poiret adopte pour la buglose officinale de Lamarck le nom spécifique et la phrase de A. J. Retzius : *anchusa italica, foliis lucidis, strigosis, racemis bipartitis, diphyllis, floribus subæqualibus, fauce barbatis.*

(*a*) On connaît une variété à fleurs blanches. (T.)

pétale, dont le tube a son orifice garni de cinq écailles très-barbues, tandis que le limbe, ouvert en rosette, se partage en cinq découpures arrondies; cinq étamines courtes, alternes avec les écailles; un ovaire quadrilobé, du centre duquel s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate bilobé.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, ridées, attachées au fond du calice.

La plus frappante analogie rapproche la buglose de la bourrache : le port des deux plantes est le même; la structure et la teinte des fleurs ont une grande ressemblance; les feuilles de l'une, comme celles de l'autre, ont été comparées, à cause de leur forme et de leur rudesse, à une langue de bœuf, et la similitude est ici tellement parfaite, que notre bourrache est précisément la buglose des anciens (3). Les qualités physiques, les usages économiques, les propriétés médicinales, que j'ai déterminées en traitant de la première, se retrouvent complétement dans la seconde. Toutes deux sont imprégnées d'un suc visqueux très-abondant; toutes deux recèlent une forte proportion de nitre; toutes deux sont employées dans divers pays à titre de plantes potagères (4); toutes deux, enfin, ont été dépouillées par les thérapeutistes modernes des vertus toniques, cordiales, exhilarantes, qui leur avaient été gratuitement accordées.

J'ajoute peu de confiance aux observations de Ladislas Bruz sur l'efficacité de la teinture alcoolique des fleurs de buglose contre l'épilepsie.

M. Willemet a vu des poitrinaires soulagés par la racine de buglose confite au sucre : il dit que la fleur sert à la peinture, et que les feuilles bouillies dans l'eau avec de l'alun donnent une belle couleur verte; il ajoute que la plante entière peut servir à la nourriture du bétail (5).

(3) Βουγλωσσον; de βους, bœuf, et γλωσσα, langue.
(4) Linné, *Flora Suecica*, n°. 161.
(5) *Phytographie encyclopédique*; tome 1, page 172.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 79.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Corolle ouverte dans laquelle on voit l'insertion des cinq étamines, et les cinq écailles velues qui leur sont alternes.
2. Pistil composé d'un ovaire quadrilobé, du centre duquel sort le style qui est terminé par un stigmate bilobé.
3. Fruit : quatre graines renfermées dans le calice.
4. Graine isolée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0152-8
DFG

Turpin P. Lambert F. sculp

BUIS.

a. l. l

BOIS.

Buxus.

Linné, cl. 21, ord. monoïcæ; Ruiz et Pavon, Flora, tab. 15, sect. 2. Tournefort, cl. 18, arbres à apétales. Lamarck, Flore française, 1778, tome 2, page 203, n°. 178.

MONOÏCÆ; foliis ovatis. Linné, cl. 21, ord. tetrandria. Jussieu, cl. 8, ord. 1, euphorbiæ.

Genre.

Espèce.

Synonymie.

Étymologie.

Caractères génériques.

Caractères spécifiques.

Habitation.

Description.

Propriétés.

Culture.

Usages.

Le buis croît naturellement dans les contrées australes et tempérées de l'Asie et de l'Europe, le buis croît principalement sur les montagnes et dans les bois.

La racine est grosse, ligneuse, jaune, contournée, rameuse.

Le tronc, qui peut s'élever en arbrisseau jusqu'à la hauteur de douze à quinze pieds, et acquérir une grosseur considérable (1), est garni de nombreux rameaux, lorsqu'il est recouvert d'une écorce brunâtre, tandis que le bois est de couleur jaune; les branches sont anguleuses, revêtues d'une écorce

Les feuilles sont simples, opposées, vertes, lisses, luisantes, ovales-oblongues, par fois échancrées au sommet.

Les fleurs sont toutes unisexuelles, et les deux sexes, quoique séparés dans des fleurs différentes, se trouvent non-seulement sur le même pied, mais presque toujours dans le même paquet, une seule fleur femelle entourée de plusieurs fleurs mâles. Chaque fleur mâle offre un calice triphylle, une corolle à deux pétales, quatre étamines, un corpuscule verdâtre, plus, qui n'est autre chose que l'ovaire avorté. Celui dans la fleur femelle, est gros, obtusément trigône, surmonté de trois styles, épais, écartés, terminés par des stigmates hispides, sillonnés.

Le fruit est une capsule arrondie, couronnée par trois espèces de petites cornes, s'ouvrant par trois valves, et divisée intérieurement en trois loges qui renferment chacune deux graines (2).

(1) Il existe auprès de Genève un buis dont le tronc avait six pieds de circonférence.

(2) Lamarck, *Encyclopédie méthodique : botanique*, tome 1^er^, page 511.

BUIS.

LXXX.

BUIS.

Grec.....	Πυξος.
Latin.....	BUXUS ARBORESCENS; Bauhin, Πυξος, lib. 12, sect. 3. Tournefort, clas. 18, *arbres apétales*. Lamarck, *Flore française*; 1778, tome 2, page 203, n°. 178.
	BUXUS SEMPERVIRENS; *foliis ovatis*; Linné, clas. 21, *monœcie tétrandrie*. Jussieu, clas. 15, ord. 1, *euphorbes*.
Italien.....	BOSSO; BUSSO.
Espagnol....	BOX.
Français.....	BUIS; BOUIS.
Anglais.....	BOX-TREE.
Allemand...	BUXBAUM.
Hollandais...	BOXBOOM; PALMBOOM; PALM.
Suédois.....	BUXBOM.

Indigène des contrées australes et tempérées de l'Asie et de l'Europe, le buis croît principalement sur les montagnes et dans les bois.

La racine est grosse, ligneuse, jaune, contournée, rameuse.

Le tronc, qui peut s'élever en arbrisseau jusqu'à la hauteur de douze à quinze pieds, et acquérir une grosseur considérable (1), est garni de nombreux rameaux, tortu, recouvert d'une écorce brunâtre, tandis que le bois est de couleur jaune : les branches sont anguleuses, revêtues d'une écorce verdâtre.

Les feuilles sont simples, opposées, vertes, lisses, luisantes, coriaces, ovales-oblongues, par fois échancrées au sommet.

Les fleurs sont toutes unisexuelles, et les deux sexes, quoique séparés dans des fleurs différentes, se trouvent non-seulement sur le même pied, mais presque toujours dans le même paquet, une seule fleur femelle entourée de plusieurs fleurs mâles. Chaque fleur mâle offre un calice triphylle; une corolle à deux pétales; quatre étamines; un corpuscule verdâtre et obtus, qui n'est autre chose que l'ovaire avorté. Celui-ci, dans la fleur femelle, est gros, obtusément trigône, surmonté de trois styles, épais, écartés, terminés par des stigmates hispides, sillonnés.

Le fruit est une capsule arrondie, couronnée par trois espèces de petites cornes, s'ouvrant par trois valves, et divisée intérieurement en trois loges qui renferment chacune deux graines (2).

(1) Il existait auprès de Genève un buis dont le tronc avait six pieds de circonférence.

(2) Lamarck, *Encyclopédie méthodique : botanique*; tome 1^er^, page 511.

Les anciens connaissaient le buis, et l'ont mentionné dans leurs écrits comme un arbrisseau intéressant par la dureté de son bois, par sa longue durée et par ses usages. C'est particulièrement à Saint-Claude, en Franche-Comté, que se font aujourd'hui ces sortes de travaux. On y fabrique des peignes (3), des instrumens de musique, des ustensiles à vis, des cuillers et fourchettes, des tabatières (4), souvent remarquables par les accidens que présente le bois sous le tour. On y dessine à l'eau-forte des portraits, de petits tableaux. On grave sur le buis; c'est le plus inaltérable et le plus pesant de nos bois d'Europe, le seul qui se précipite au fond de l'eau (5).

L'odeur assez désagréable de cet arbrisseau devient surtout plus sensible dans les temps pluvieux. Les feuilles, ainsi que les autres parties ont une saveur amère et nauséabonde (6).

Les chameaux broutent volontiers les sommités du buis, qui les exposent à de graves accidens, et leur causent même la mort, si l'on en croit J. Hanway (7).

Mattioli assure que la lessive du buis rend les cheveux roux. Le conteur Lentilius (Linsenbahrt) va bien plus loin: il suppose à cette lessive non-seulement la vertu de faire repousser les cheveux, mais de rendre velues les surfaces du corps naturellement glabres.

Les propriétés médicinales du buis sont incontestables; mais trop exaltées par les uns, trop dépréciées par les autres, elles ont besoin d'être plus exactement déterminées. Les feuilles réduites en poudre, et prises à la dose d'un gros, produisent des déjections alvines très-copieuses, et même sanguinolentes, selon Vogel (8); leur décoction est un purgatif modéré, suivant Gilibert. P. Linus vante l'efficacité de cette boisson dans la pleurésie, l'hémoptysie, la fièvre catarrhale, la goutte; et, sur la foi de cet apothicaire, le docteur Wauters n'hésite point à ranger les feuilles de buis parmi les succédanés du camphre (9). C'est avec beaucoup plus de raison qu'il propose, avec plusieurs autres pharma-

(3) Il serait toutefois ridicule de prétendre, avec Willich, qu'on ne fait à Paris que des peignes de buis.

(4) Les Grecs désignaient presque par le même mot *buis* et *boîte* : πυξος et πυξις; ils ont été imités par les Anglais, qui nomment le buis arbre à boîte, *box-tree*.

(5) Gilibert, *Démonstrations élémentaires de botanique;* 1796 : tome 3, page 317.

(6) Biett, dans le *Dictionnaire des sciences médicales;* tome 3, page 404.

(7) *An account of the British trade over the Caspian sea;* vol. 1, pag. 191.

(8) *Historia materiæ medicæ;* 1764, pag 126.

(9) *Repertorium remediorum indigenorum;* 1810, pag. 25.

cologistes, de substituer le bois de cet arbrisseau à celui du gaïac, bien que je n'établisse pas, comme lui, une identité parfaite (10). J'ai lu ce que le portugais Amatus, Heucher, Welsch, Chomel, Burtin, Gilibert, ont écrit sur les vertus antifébrile, apéritive, antipsorique, vermifuge, et spécialement sur la propriété antisiphilitique de la râpure de buis; j'ai comparé ces observations avec celles bien plus nombreuses et bien plus authentiques, faites sur le gaïac, et ce dernier m'a paru revendiquer à tous égards la prééminence. Quant à l'huile empyreumatique, celle extraite de l'un ne me semble guère l'emporter sur celle retirée de l'autre : elles ne sont presque plus employées à l'intérieur; on se borne à en appliquer une ou deux gouttes sur les dents cariées.

Gilibert, Macquart, Roques, Bodard, Biett prescrivent la râpure du bois ou de la racine de buis, à la dose d'une à deux onces, bouillie dans deux livres d'eau, ou infusée dans la même quantité de vin.

(10) Voici les expressions du médecin de Gand : *cum iis auctoribus conspiro, qui ligno guajaco præ buxino nihil tribuerunt.*

EXPLICATION DE LA PLANCHE 80.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Rameau en fleurs.
2. Rameau chargé de fruits.
3. Fleur mâle grossie, composée d'un calice triphylle, d'une corolle, de deux pétales bifides, d'un ovaire avorté et de quatre étamines plus longues que la corolle.
4. Fleur femelle grossie.
5. Fruit tel qu'il s'ouvre pour faciliter la dispersion de ses graines.
6. Fruit coupé horizontalement pour faire voir que chacune des trois loges contient deux graines.
7. Graine isolée grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0159-1

Turpin P. Lambert sculp

BUPLEVRE.

BUPLEVRE.

Grec ..... βουπλευρον ; βουπλευρος.

Latin ..... { PERFOLIATA VULGATISSIMA, sive ANNUA ; Bauhin, *Pinax*, lib. 7, sect. 5.
BUPLEVRUM PERFOLIATUM ET PERFOLIUM, ANNUUM ; Tournefort, *Inst.*, clas. 7, *umbelliferæ*.
BUPLEVRUM PERFOLIUM ; *umbellis universalibus multifidis, floribus polygamis* ; Linné, clas. 5, *pentandria digynia*, Jussieu, ord. 14, *umbelliferæ*.

Italien ..... PERFOGNATA ; BUPLEURO.

Espagnol ..... BUPLEVRO.

Français ..... BUPLEVRE ; PERCEFEUILLE ; OREILLE DE LIÈVRE.

Anglais ..... THOROUGH-WAX ; THOROUGH-WAX ; HARE'S-EAR.

Allemand ..... DURCHWACHS ; HASENOHRLEIN.

Hollan. ..... HAAZEN-OOR.

Cette plante annuelle, dit Lamarck, est assez curieuse par la manière dont la tige et les rameaux percent les feuilles. Très-commune dans nos champs, elle préfère les terrains secs et pierreux.

Sa racine, blanchâtre, dure, garnie çà et là de ramuscules très-fins, pénètre dans le sol à la profondeur de six à huit pouces.

La tige, cylindrique, lisse, rameuse, dans sa moitié supérieure, s'élève jusqu'à la hauteur d'un pied et demi.

Les feuilles sont ovales, arrondies dans leur partie inférieure, armées d'une petite pointe à leur sommet, glabres, d'un vert glauque, nerveuses, la plupart perfoliées ou percées par la tige, les inférieures sont simplement amplexicaules (1).

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, qui manquent d'involucre universel ; les partiels sont composés de cinq folioles ovales, jaunâtres intérieurement, plus grandes que les ombellules. Chaque fleur présente : cinq pétales entiers, recourbés, subcordiformes ; cinq étamines terminées par des anthères sphéroïdes ; un ovaire inférieur, chargé de deux styles, petits, réfléchis.

(1) Quelques écrivains anciens voient dans les feuilles du buplèvre l'origine de ses dénominations générique, spécifique, et vulgaires ; mais ils sont loin de s'accorder sur le mode d'explication. Celle donnée par Linnæus, Boccler, Ventenat, Boissier, Poiret, ne me semble guère admissible ; celle de Pline, adoptée par Beckmann et par Tournefort, est souverainement ridicule. Enfin je regarde aussi comme peu vraie, du moins comme plus vraisemblable celle proposée par Théis, de la texture ramifiée des feuilles du buplèvre, comparées, sous ce rapport, à la plèvre qui tapisse l'intérieur de la poitrine des animaux en général, et des bœufs en particulier (βους, bœuf ; πλευρα ou πλευρη, côte, côté, plèvre).

BUPLEVRE.

LXXXI.

BUPLÈVRE.

Grec..... βουπρηστις; βουπλευρον.

Latin..... PERFOLIATA VULGATISSIMA, sive ARVENSIS; Baubin, Πιναξ, lib. 7, sect. 5.
BUPLEVRUM PERFOLIATUM, ROTUNDIFOLIUM, ANNUUM; Tournefort, clas. 7, *ombellifères*.
BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM; *involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis*; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères*.

Italien..... PERFORATA; BUPLEURO.
Espagnol.... BUPLEYRO.
Français.... BUPLÈVRE; PERCEFEUILLE; OREILLE DE LIÈVRE.
Anglais..... THOROW-WAX; THOROUGH-WAX; HARE'S-EAR.
Allemand... DURCHWACHS; HASENOEHRLEIN.
Hollandais.. HAAZEN-OOR.

Cette plante annuelle, dit Lamarck, est assez curieuse par la manière dont la tige et les rameaux percent les feuilles. Très-commune dans nos champs, elle préfère les terrains secs et sabloneux.

La racine, blanchâtre, dure, garnie çà et là de ramuscules très-fins, pénètre dans le sol à la profondeur de six à huit pouces.

La tige, cylindrique, lisse, rameuse, dans sa moitié supérieure, s'élève jusqu'à la hauteur d'un pied et demi.

Les feuilles sont ovales, arrondies dans leur partie inférieure, armées d'une petite pointe à leur sommet, glabres, d'un vert glauque, nerveuses, la plupart perfoliées ou percées par la tige, les inférieures sont simplement amplexicaules (1).

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, qui manquent d'involucre universel; les partiels sont composés de cinq folioles ovales, jaunâtres inférieurement, plus grandes que les ombellules. Chaque fleur présente : cinq pétales entiers, recourbés, subcordiformes; cinq étamines terminées par des anthères sphéroïdes; un ovaire inférieur, chargé de deux styles, petits, réfléchis.

(1) Tous les étymologistes voient dans les feuilles du buplèvre l'origine de ses dénominations générique, spécifique, et vulgaires; mais ils sont loin de s'accorder sur le mode d'explication. Celle donnée par Littleton, Bœcler, Ventenat, Boissieu, Poiret, ne me semble guère admissible; celle de Pline, adoptée par Beckmann et par Tournefort, est souverainement ridicule. Enfin je regarde, sinon comme plus vraie, du moins comme plus vraisemblable celle proposée par Théis; de la texture membraneuse des feuilles du buplèvre, comparées, sous ce rapport, à la plèvre qui tapisse l'intérieur de la poitrine des animaux en général, et des bœufs en particulier (βους, bœuf; πλευρα ou πλευρον, côté, côte, plèvre).

Le fruit, arrondi, consiste en deux graines noirâtres, aplaties d'un côté, convexes et striées de l'autre.

Si l'on mâche les feuilles de buplèvre, elles impriment sur la langue un sentiment d'âpreté, qui, plus prononcé encore dans les graines, n'est pourtant point assez énergique pour justifier les propriétés médicinales attribuées à cette plante par Solenander, Simon, Pauli, Welsch, Bœcler, Chomel : c'est, à les en croire, un excellent vulnéraire, et le plus efficace de tous les astringens, puisque, selon eux, il prévient et guérit même les hernies. Schulze prétend que les feuilles cuites dans le vinaigre, et appliquées chaudes sur les ganglions, dissipent comme par enchantement ces tumeurs rebelles. Observateurs plus exacts et moins crédules, les thérapeutistes de nos jours, sans égard pour les éloges prodigués au buplèvre, ont déclaré cette plante inerte et indigne de figurer parmi les substances médicamenteuses : déjà Linné l'avait jugée infidèle et superflue (2).

Le buplèvre falciforme, *bupleurum falcatum*, L., indiqué par Haller comme réunissant à la propriété vulnéraire du percefeuille celle de guérir les fièvres intermittentes, est également tombé en désuétude.

Plusieurs espèces s'élèvent en arbrisseaux, et sont cultivées dans les jardins : tels sont, entre autres, le buplèvre d'Ethiopie, *bupleurum fruticosum*, L., qui exhale une odeur de chervi, et conserve toute l'année ses feuilles, ce qui le rend propre à la décoration des bosquets d'hiver (3); le buplèvre hétérophylle, *bupleurum difforme*, L., remarquable par la singularité de son feuillage (4).

(2) *Materia medica per regna tria naturæ*; 1772, pag. 77, n°. 123.
(3) Poiret, dans le *Dictionnaire des sciences naturelles*, tom. 5, pag. 439. Mordant Delaunay, *Le bon Jardinier*; 1814, page 578.
(4) Miller, *Gardeners dictionary*.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 81.

(*La plante est réduite aux deux tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Racine.
2. Fleur entière considérablement grossie.
3. Fruit de grandeur naturelle.
4. Le même grossi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0166-7
DFG

Turpin P. Lambert Sculp.

CALAGUALA.

CALAGUALA.

POLYPODIUM ADIANTIFORME; Forster, Prodrom. class. 1, ord. 5, *fougères*.
ASPIDIUM COSTALIFERUM; Swartz.
ASPIDIUM COSTALIFERUM; *frondibus bipinnatis; apice simpliciter pinnatis, cæterum pinnatis oblongo-lanceolatis, ultimo versus inferiorem subpinnatifidis, spinuloso-ciliato*; Willdenow, class. 24, *cryptogames fougères*.

CALAGUALA.
ESPAGNOL..... CALAGUALA; CALAHUALA.
FRANÇAIS..... CALAGUALA.

C'est depuis un petit nombre d'années seulement que la calaguala est connue en Europe. Personne n'a peut-être plus contribué que M. Turpin à signaler d'une manière exacte les caractères de cette cryptogame. La description que je vais en donner offre un véritable intérêt, c'est à lui qu'il faut en rapporter tout le mérite.

Le nouveau monde est la patrie de cette fougère; elle croît particulièrement sur les hautes montagnes des Andes; elle se plaît au bord des bois, dans les lieux frais et ombragés. On la trouve sur les rochers. MM. Ruiz et Pavon l'ont aussi découverte dans leurs voyages au continent de l'Amérique australe; M. Labillardière en a recueilli de superbes échantillons à la nouvelle Hollande; M. Turpin l'a observée à Saint-Domingue.

La racine, ou plutôt le rhizome, que l'on désigne généralement sous cette dénomination, et que je ne pense pas devoir regarder, avec M. Forster, comme une tige souterraine, traçante, est cylindroïde, écailleuse, roussâtre, rameuse; elle est garnie dans toute son étendue de fibrilles radicales, qui se subdivisent en filamens capillaires.

Les feuilles, portées sur de longs pétioles arrondis d'un côté, aplatis et canaliculés de l'autre, sont amples, d'un vert foncé, vertes, fongeuses en dessus, plus pâles en dessous, bipinnées à leur base, bipinnées vers le milieu, simplement pinnées au milieu lobées supérieurement.

a) Les grosses racines dont ces feuilles paroissent le long de la tige souterraine sont celles que l'on trouve dans les pharmacies, précédées d'un nom ridicule, des espèces de chiens, qui ne sont autre chose que les restes des feuilles tombées, dans cet état les tiges sont presque toujours dépouillées de leurs feuilles. (T.)

CALAGUALA.

LXXXVI.

CALAGUALA.

Latin. . . . . POLYPODIUM ADIANTHIFORME; Forster. Jussieu, clas. 1, ord. 5, *fougères*.
ASPIDIUM CORIACEUM; Swartz.
ASPIDIUM CORIACEUM; *frondibus bipinnatis, apice simpliciter pinnatis, coriaceis, pinnulis oblongo-lanceolatis, obtusè serratis inferioribus subpinnatifidis, stipite aspero*; Willdenow, clas. 24, *cryptogamie fougères*.

Italien. . . . . CALAGUALA.

Espagnol. . . CALAGUALA; CALAHUALA.

Français. . . . CALAGUALA.

C'est depuis un petit nombre d'années seulement que la calaguala est bien connue en France. Personne n'a peut-être plus contribué que M. Turpin à signaler d'une manière aussi exacte que complette les caractères de cette cryptogame; et si la description que je vais en tracer offre un ensemble satisfaisant, c'est à lui qu'il faut en rapporter tout le mérite.

Le nouveau monde est la patrie de cette fougère: elle croît principalement sur les hautes montagnes des Andes; elle se plaît au bord des bois, dans les lieux froids et ombragés; elle végète même sur les rochers. MM. Ruiz et Pavon l'ont fréquemment trouvée dans leurs voyages au continent de l'Amérique australe; M. Labillardière en a recueilli de superbes échantillons à la nouvelle Hollande; M. Turpin l'a rapportée de Saint-Domingue.

La racine, ou du moins la partie que l'on désigne généralement sous cette dénomination, et que je ne serais pas éloigné de regarder, avec M. Turpin, comme une tige souterraine, traçante, est cylindroïde, écailleuse, roussâtre, flexueuse; elle est garnie dans toute son étendue de fibrilles grêles, qui se subdivisent en filamens capillaires (1).

Les feuilles, portées sur de longs pétioles arrondis d'un côté, aplatis et canaliculés de l'autre, sont amples, dures, coriaces, vertes, foncées en dessus, plus pâles en dessous, tripinnées à leur base, bipinnées vers le milieu, simplement pinnées ou même lobées supérieurement.

(1) Les vraies racines sont ces fibrilles répandues le long de la tige souterraine: celle-ci, que l'on trouve dans les pharmacies, présente encore, d'un seul côté, des espèces de chicots, qui ne sont autre chose que les supports des feuilles tombées; dans cet état, les tiges sont presque totalement dépouillées de leurs écailles. (T.)

La fructification, disposée sur la surface inférieure de la feuille, se montre sous la forme de points ou de petits tubercules brunâtres, placés alternativement des deux côtés de la ligne médiane de chaque pinnule (2).

Au centre des racines de la calaguala est une moelle spongieuse, semblable à celle de la canne à sucre, et de couleur de miel: elles ont d'abord une saveur douce, qui bientôt se change en une amertume très-prononcée. L'odeur qu'elles exhalent est rance et huileuse. Analysées par M. Vauquelin, elles ont fourni en effet un peu de sucre, une huile essentielle très-âcre, du mucilage jaunâtre, un peu d'amidon, du muriate de potasse, du carbonate de chaux, une quantité inappréciable d'acide et de matière colorante rouge. Ces résultats expliquent d'une manière assez satisfaisante les qualités physiques et les propriétés médicamenteuses attribuées aux racines de calaguala. Elles sont regardées comme un excellent sudorifique, propre à dissiper le rhumatisme, la goutte et même la siphilis, dans l'Amérique méridionale, où cette maladie n'a pas besoin, comme chez nous, de l'emploi des mercuriaux. Plusieurs médecins de Rome prétendent avoir guéri l'hydropisie par l'usage continué de cette substance. Le docteur Gelmetti la recommande surtout contre les phlegmasies chroniques de la poitrine, et à titre de vulnéraire. Le professeur Carminati, qui a répété les expériences cliniques de ses compatriotes, ne juge point aussi favorablement la calaguala: elle s'est à peine montrée légèrement diurétique, et dans la plupart des cas elle a complétement échoué. Le botaniste Ruiz, qui s'est constitué le défenseur de la racine péruvienne, assure et veut prouver qu'il faut rejeter l'inefficacité qu'on lui reproche si *injustement*, sur l'infidélité des commerçans et des droguistes, qui lui substituent les racines du *polypodium crassifolium* et celles de l'*acrostichum huacsaro*.

Plus je cherche à concilier les sentimens opposés des pharmacologistes, plus je soumets au flambeau de la critique les argumens de ceux qui ont préconisé la calaguala avec une

(2) Ces points, vus à la loupe, présentent, lorsqu'ils sont jeunes, un petit tubercule blanchâtre, membraneux, hémisphérique, ombiliqué dans son centre. Peu après, cette membrane ou involucre se déchire en son bord extérieur, restant seulement fixée par son ombilic, et laisse apercevoir un grand nombre de petites capsules, dont chacune est ovale, aplatie, réticulée, entourée d'un anneau élastique articulé, muni d'un pédoncule très-délié, au moyen duquel elle est fixée sur la feuille, et sous l'involucre; elle renferme une infinité de séminules qui se dispersent lorsque l'anneau se rompt dans l'une des parties faibles de ses articulations. (T.)

exagération ridicule, et plus je doute que cette fougère exotique puisse devenir jamais une acquisition précieuse pour *notre* matière médicale.

GELMETTI (DOMINIQUE-LOUIS), *Della radice di calaguala ;* c'est-à-dire, De la racine de calaguala ; in 8°. Mantoue, 1788.

CARMINATI (BASSIANO), *Saggio di alcune ricerche su i principi e sulla virtù della radice di calaguala ;* c'est-à-dire, Essai de quelques recherches sur les principes et la vertu de la racine de calaguala ; in-8°. Pavie, 1791.

RUIZ (HIPPOLYTE), *Memoria sobre la legitima calaguala, etc. ;* c'est-à-dire, Mémoire sur la vraie calaguala, et sur deux autres racines qui nous viennent de l'Amérique méridionale, sous le même nom ; in-8°. Madrid, 1805.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 86.

(*La plante est de grandeur naturelle, seulement on a imité un petit individu*)

1. Racine ou plutôt tige traçante, souterraine, recouverte d'un grand nombre d'écailles, à travers lesquelles s'échappent des racines.
2. La même dépouillée de ses écailles, et telle qu'elle se présente dans le commerce.
3. Portion d'une foliole, au trait, sur laquelle on a représenté la fructification composée d'un grand nombre de petites capsules recouvertes par un involucre pelté.
4. Une capsule isolée et détachée de dessous l'involucre.
5. Graines ou sporules (Hedwig) contenues dans les capsules.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0173-6 DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CAMELÉE.

LXXXVII.

CAMELÉE.

Grec ..... χαμαιδαφνη ; χαμαιλεα τριτοκκος.

Latin ..... CHAMELEA TRICOCCOS ; Bauhin, *Pinax*, lib. 12, sect. 1. Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés*.
CNEORUM TRICOCCUM, Linné, clas. 5, *diandrie monogynie*. Jussieu, clas. 14, ord. 12, *térébinthacées*.

Italien ..... CAMELEA ; CAMOLEA.

Espagnol ... OLIVILLA ; CAMELEA.

Français .... CAMÉLÉE ; GAROUGE.

Anglais .... WIDOW WAIL.

Allemand .... ZYMBEL. Plance.

Cet arbrisseau, toujours vert, croît en Grèce, en Italie, en Espagne, et dans les départemens méridionaux de la France. Il se plaît dans les terrains secs, incultes, rocailleux, et s'élève à la hauteur de deux à trois pieds.

La tige, recouverte d'une écorce brunâtre, se divise en sombreux rameaux, redressés, cylindriques, glabres.

Les feuilles, alternes, sessiles, vertes, entières, oblongues, allongées, plus larges au sommet qu'à la base, se rapprochent par leur forme de celles de l'olivier (1).

Les fleurs, jaunâtres, terminales, portées sur des pédoncules très-courts, sortent de l'aisselle des feuilles supérieures, quelquefois deux ou trois ensemble, plus souvent solitaires. Chacune d'elles présente un petit calice trident, persistant ; trois pétales oblongs, concaves, beaucoup plus grands que le calice ; trois étamines un peu plus courtes que les pétales ; un ovaire supérieur, surmonté d'un style que termine un stigmate trifide (2).

Le fruit est une baie sèche, composée de trois coques réunies (3), qui conservent le style de la fleur. D'abord verte,

(1) Telle est l'origine des mots *camélée*, *chamelea*, *camolea*, de *camæ*, bas, et *elea*, olivier.

(2) Cette structure et les divisions des parties de la fleur sont quelquefois en quatre, au lieu de trois.

(3) Chacun voit clairement ici l'étymologie du nom, *tricoccus* ou *tricoccos*. Quant à la dénomination générique, elle désigne probablement la ressemblance de la plante avec l'olivier, *oleum*. Il importe de remarquer que le *cneorum* de Linné diffère de celui des Grecs : celui-ci appartient au genre *daphne*. Le

CAMELIA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0178-5
DFG

LXXXVII.

CAMÉLÉE.

Grec . . . . . χαμελαια ; χαμαιλεα τριχοκκος.

Latin. . . . . . CHAMELÆA TRICOCCOS ; Bauhin, Πιναξ, lib. 12, sect. 1. Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés*. CNEORUM TRICOCCUM ; Linné, clas. 3, *diandrie monogynie*. Jussieu, clas. 14, ord. 12, *térébintacées*.

Italien . . . . . CAMELEA ; CALMOLEA.

Espagnol . . . OLIVILLA ; CAMELEA.

Français. . . . CAMÉLÉE ; GAROUPE.

Anglais . . . . WIDOW WAIL.

Allemand . . ZYNDEL, Planer.

Cet arbuste, toujours vert, croît en Grèce, en Italie, en Espagne, et dans les départemens meridionaux de la France : il se plaît dans les terrains secs, incultes, rocailleux, et s'élève à la hauteur de deux à trois pieds.

La tige, recouverte d'une écorce brunâtre, se divise en nombreux rameaux, redressés, cylindriques, glabres.

Les feuilles, alternes, sessiles, vertes, entières, épaisses, allongées, plus larges au sommet qu'à la base, se rapprochent par leur forme de celles de l'olivier (1).

Les fleurs, jaunes, terminales, portées sur des pédoncules très-courts, sortent de l'aisselle des feuilles supérieures, quelquefois deux ou trois ensemble, plus souvent solitaires. Chacune d'elles présente : un petit calice tridenté, persistant ; trois pétales oblongs, concaves, beaucoup plus grands que le calice ; trois étamines un peu plus courtes que les pétales ; un ovaire supérieur, surmonté d'un style que termine un stigmate trifide (2).

Le fruit est une baie sèche, composée de trois coques réunies (3), qui conservent le style de la fleur. D'abord vertes,

(1) Telle est l'origine des mots χαμελαια, *chamelæa*, *camélée* ; de χαμαι, bas, et ελαια, olivier.

(2) M. Poiret observe que les divisions des parties de la fleur sont quelquefois au nombre de quatre, au lieu de trois.

(3) Chacun voit clairement ici l'étymologie du nom trivial ou spécifique *tricoccum*. Quant à la dénomination générique, elle désigne probablement la causticité de la plante, κνεω, j'irrite, j'excorie, je ronge. Toutefois, il importe de remarquer que le *cneorum* de Linné diffère du κνεορον des Grecs : celui-ci appartient au genre *daphne*, L.

elles deviennent rouges en mûrissant, et renferment chacune deux ou trois graines (*a*).

Toutes les parties de la camelée ont une saveur âcre et brûlante; toutes enflamment vivement la peau, et produisent même un effet vésicant. Le professeur Rondelet et l'illustre Jean Bauhin retiraient un grand succès de l'application des feuilles de garoupe, réduites en cataplasme, sur l'abdomen des hydropiques. Ces habiles praticiens ne bornaient pas à l'extérieur l'emploi de cette plante; ils en exprimaient le suc, qui, soigneusement desséché, formait un extrait hydragogue, dont la dose était d'un à deux gros. Le docteur Gilibert assure que les feuilles de la camelée, pulvérisées et adoucies avec un mucilage, ont dompté des symptômes vénériens qui avaient résisté à toutes les méthodes. On commence par douze grains de la poudre, et l'on va graduellement jusqu'à trente.

On n'a plus employé la camelée aussi souvent, dit Fourcroy, depuis qu'on a renoncé aux purgatifs très-violens, dont les anciens faisaient beaucoup plus d'usage que nous; mais ce médicament héroïque, et analogue à la gomme-gutte, à l'euphorbe, aux tithymales, à la bryone, au colchique, à l'ellébore, serait vraisemblablement fort utile dans les cas où les organes affaiblis dans leur sensibilité comme dans leur mouvement, ne peuvent être mus et excités par des remèdes ordinaires: ces cas sont spécialement l'apoplexie, la paralysie, l'hydropisie, et certaines vésanies (4).

Les jardiniers cultivent la camelée, dont ils garnissent le devant des massifs des bosquets d'hiver, où cet arbrisseau forme un joli buisson épais et toujours verdoyant. On en fait des boutures au printemps, sur une couche tiède, ou bien on sème les graines sur couche, et dès qu'elles sont mûres, si l'on veut qu'il en lève du moins quelques-unes au printemps suivant. Celles qu'on destine à la pleine terre, doivent être

(*a*) Le fruit de la camelée est encore un de ceux dont l'organisation vraie, primitive, se trouve masquée par des avortemens constans; aussi voit-on que, pour ces sortes de fruits, les auteurs sont rarement d'accord entre eux; les uns, tels que Jussieu, Ventenat, Décandolle, Delaunay, etc., disent que chaque coque est monosperme, tandis que Lamarck, et surtout le savant carpologiste Gærtner, plus près de la vérité que les premiers, ont reconnu que les coques étaient bi ou triloculaires, et que chaque loge contenait une graine. Gærtner a de plus observé, décrit et figuré, dans son excellent ouvrage sur les fruits, que les coques, simplement biloculaires dans leur partie inférieure, étaient souvent à quatre loges dans la supérieure. L'examen et l'analyse de l'ovaire pourraient seuls déchirer le voile qui nous cache l'organisation voulue d'abord par la nature, mais dont certaines causes constantes et inconnues viennent ensuite déranger la symétrie. (T.)

(4) *Encyclopédie méthodique : Médecine;* tome 4, page 328.

placées à l'ombre, et surtout empaillées pendant les très-grands froids; il est même prudent de conserver quelques pieds en orangerie (5).

(5) Mordant Delaunay, *Le bon Jardinier*; 1814, page 582.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 87.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière de grandeur naturelle.
2. Calice, pistil et étamines.
3. Fruit entier coupé horizontalement.
4. Une des trois coques isolée et dépouillée de son brou.
5. Graine noire hors de sa loge.
6. Embryon inclus dans un périsperme.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0181-0


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0183-1
DFG

CAMELINE.

a. l. l

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0184-7
DFG

CAMELINE

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0186-9

LXXXVIII.

CAMELINE.

Grec..... μυαγρος ; μυαγρον.

Latin.....
- MYAGRUM SATIVUM ; Bauhin, Πιναξ, lib. 3, sect. 2.
- ALYSSON SEGETUM ; *foliis auriculatis, acutis*, Tournefort, clas. 5, *cruciformes*.
- MYAGRUM SATIVUM ; *siliculis obovatis, pedunculatis, polyspermis* ; Linné, clas. 15, *tetradynamie siliculeuse*. Jussieu, clas. 13, ord. 3, *crucifères*.

Italien..... MIAGRO.
Espagnol... MIAGRO.
Français.... CAMELINE ; SÉSAME D'ALLEMAGNE.
Anglais..... GOLD OF PLEASURE.
Allemand... FLACHS-DOTTER ; LEIN-DOTTER.
Hollandais.. VLAS-DOTTER.

Cette plante annuelle croît dans presque tous les climats, et se plaît au milieu des moissons.

La racine, fibreuse, dure, blanchâtre, s'enfonce assez profondément dans le sol.

La tige, droite, cylindrique, s'élève jusqu'à la hauteur de deux pieds ; elle produit supérieurement des rameaux lisses, remplis d'une moelle spongieuse.

Les feuilles, vertes, molles, quelquefois légèrement velues, allongées, pointues, garnies de dentelures distantes et peu sensibles, embrassent la tige par leur base auriculée.

Les fleurs sont jaunâtres, pédonculées, et disposées, au sommet de la tige et des rameaux, en corymbes qui s'allongent en grappes ou en panicules à mesure que les dernières fleurs se développent. Chacune d'elles présente : un calice de quatre folioles ovales, concaves, caduques ; quatre pétales en croix ; six étamines, dont deux plus courtes ; un ovaire supérieur, chargé d'un style, que termine un stigmate obtus.

Le fruit est une silicule pyriforme, biloculaire, couronnée par le style, et renfermant de dix à douze petites semences ovoïdes, jaunes ou rougeâtres.

Dans plusieurs départemens de la France, et surtout dans ceux de la Somme et du Pas-de-Calais, on cultive la cameline, sous le nom vulgaire de *camomen*. Elle s'aperçoit dans tous les lins, dit Parmentier (1) : les cultivateurs ne se plaignent pas du dommage qu'elle leur cause, parce qu'on peut

(1) *Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle* ; tome 4 ; 1803, p. 162.

la rouir, la filer avec le lin (2), et tirer également l'huile de sa graine (3). Destinée à remplacer le lin, le colsa, les pavots, que l'intempérie des saisons a détruits, la cameline ne trompe jamais l'espoir de l'agronome ; car, pouvant être semée beaucoup plus tard, et n'exigeant que trois mois au plus pour parcourir tous les périodes de sa végétation, elle n'est pas exposée aux mêmes inconvéniens.

Dans les environs de Montdidier, on sème la cameline sur les parties des pièces de froment où ce grain a manqué. On est encore à temps de profiter de la ressource qu'offre cette plante, pour tirer parti de ces places vides dans le courant d'avril. Trois mois après l'ensemencement, la graine est mûre ; mais pour la récolter, il ne faut pas attendre que les capsules soient parfaitement sèches ; il suffit qu'elles commencent à jaunir.

Lorsque la graine est vannée, on en retire, par la pression, une huile dont les usages sont aussi variés qu'importans. Fraîche, elle sert à la nourriture des pauvres (4). Destinée surtout à l'éclairage, elle a moins d'odeur que l'huile de colsa, et ne donne pas beaucoup de fumée. On l'emploie aussi dans la peinture, et pour la confection du savon. Elle est prescrite par les médecins à l'intérieur, comme relâchante dans la constipation, et à l'extérieur, pour adoucir, amollir et faire disparaître les aspérités, les gerçures et les brûlures. Un cataplasme fait avec la plante toute entière a plus d'une fois calmé des inflammations locales assez graves.

Les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et une foule d'oiseaux recherchent avidement la graine de cameline. On peut la moudre et en mêler avec la farine ordinaire dans les années de disette (5).

Quand la tige de cette plante est battue, dépouillée de sa graine et séchée, on la conserve pour se chauffer et pour couvrir les chaumières des paysans.

(2) L'illustre agronome Parmentier, qui m'a fourni presque tous les détails économiques relatifs à la cameline, observe que la filasse de cette plante est d'une qualité inférieure, et peut être négligée.

(3) La plante doit à cette analogie le nom de *cameline*, qui signifie exactement *petit lin* : χαμαι, bas, λινον, lin. Le terme générique *myagrum*, formé de μυια, mouche, et αγρα, prise, capture, chasse, est tellement impropre, que je suis infiniment étonné de le voir consacré par le savant et judicieux Linné. En effet, le titre de *attrape-mouche*, qui conviendrait parfaitement à la dionée, à certains asclépiades et gouets, n'appartient en aucune manière à la cameline.

(4) Bœcler, *Cynosuræ*, *mat. med. continuatio* 2 ; 1731, page 134.

(5) Willemet, *Phytographie encyclopédique* ; 1805, tome 2, page 760.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0188-1
DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE 88.

(*La Plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Racine.
2. Feuille au trait de la variété.
3. Fleur entière grossie.
4. Pistil et étamines.
5. Fruit.
6. Le même, coupé horizontalement.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0189-9
DFG

Turpin P. Lambert F. sculp.

CAMOMILLE.

a. l. l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0192-4
DFG

CAMOMILLE

LXXXIX.

CAMOMILLE.

Grec..... ανθεμις ; ανθεμον ; χαμαιμηλον.

Latin..... CHAMÆMELUM NOBILE, SIVE LEUCANTHEMUM ODORATIUS ; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 1. Tournefort, clas. 14, *radiées.*

ANTHEMIS NOBILIS ; *foliis pinnato-compositis, linearibus, acutis, subvillosis* ; Linné, clas. 19, *syngénésie polygamie superflue.* Jussieu, clas. 10, ord. 3, *corymbifères.*

Italien..... CAMOMILLA ; CAMOMILLA ROMANA ; CAMOMILLA NOBILE.

Espagnol .. MANZANILLA.

Français.... CAMOMILLE ; CAMOMILLE ROMAINE ; CAMOMILLE NOBLE ; CAMOMILLE ODORANTE ; ANTHÉMIS ODORANTE, Mordant.

Anglais .... CHAMOMILE ; ROMAN CHAMOMILE ; SWEET-SCENTED CHAMOMILE.

Allemand... KAMILLE ; KOMEY ; RŒMISCHE KAMILLE.

Hollandais.. KAMILLE ; ROOMSCHE KAMILLE.

Polonais.... RUMIANEK, Erndtel.

La nature a, pour ainsi dire, semé cette plante utile avec une généreuse profusion. Très-commune dans tous les climats chauds et tempérés, on la voit croître de toutes parts sur le sol de notre belle France, dans les lieux secs, sablonneux, le long des grandes routes. Elle prospère merveilleusement, ainsi que le remarque M. Bodard, sur les rives délicieuses de la Loire, de l'Indre, du Cher et de la Mayenne.

La racine, vivace, est fibreuse, chevelue.

Les tiges, longues de sept à dix pouces, sont herbacées, rameuses, menues, faibles et penchées.

Les feuilles sont alternes, sessiles, composées, ailées, linéaires, aiguës, vertes.

Les fleurs, solitaires, terminales, soutenues par de longs pédoncules, présentent : un calice commun, hémisphérique, embriqué d'écailles linéaires, serrées ; une corolle radiée, dont le disque, formé de fleurons jaunes, hermaphrodites, tubulés, à cinq dents, est entouré et comme couronné par des demi-fleurons blancs femelles, ordinairement tridentés, et posés, ainsi que les fleurons, sur un réceptacle conique, alvéolé, garni de paillettes lamelleuses.

Le fruit consiste en plusieurs petites graines oblongues, nues, situées sur le réceptacle commun, et environnées par le calice persistant.

Il s'exhale des fleurs de camomille un arome pénétrant qui

plaît à l'odorat (1). Leur saveur est chaude et amère. L'analyse chimique en retire un principe gommo-résineux, du tannin, du camphre, et, par la distillation, une huile d'un beau bleu.

Les médecins ont irrévocablement constaté l'action thérapeutique de la camomille, et son usage est devenu tellement général, qu'on s'est déterminé à la cultiver en grand. L'illustre agronome Parmentier (2) et le savant thérapeutiste Alibert (3) ont proclamé l'excellence de la méthode employée par M. Descroizilles dans ses plantations aux portes de la ville de Dieppe. La camomille se multiplie par marcottes enracinées au printemps. Les principaux soins qu'elle exige sont des sarclages, qu'il faut répéter jusqu'à ce que la plante soit parvenue à étouffer l'accroissement des herbes parasites. Plantée au commencement de mars, la camomille fournit, dès les premiers jours de juin, une récolte qui se continue jusque dans le mois de septembre (4). Les fleurs qui se développent d'abord sont semi-doubles; mais, à mesure que le terme de la récolte approche, elles deviennent tout à fait doubles, et sont alors beaucoup plus recherchées dans le commerce, à cause de leur plus grande blancheur, acquise toutefois au préjudice de leurs vertus. L'épanouissement des fleurs influe notablement sur leur blancheur : on a observé cependant que, dans certains cas, il valait mieux les cueillir aux trois quarts ouvertes, surtout quand on craint un orage. Pour les dessécher, on les expose, par couches minces, à l'ardeur du soleil, sur des chassis revêtus en toile, et à la surface desquels on a collé du papier gris. Quand la dessiccation est complette, il faut s'occuper de leur conservation. Le mieux serait probablement de comprimer les fleurs dans des tonneaux garnis intérieurement de papier bien collé, placés dans un lieu sec, frais et obscur. Un des avantages de la culture de la camomille en plein champ, est de n'être pas attaquée par les moutons et les autres bestiaux.

(1) Cette odeur qui, suivant la remarque de Samuel Herzog, est singulièrement modifiée par la nature du terrain, se rapproche tantôt de celle que répandent les coings, tantôt de celle des pommes de reinette : de là l'étymologie des mots *chamæmelum*, *chamomilla*, *camomille*; χαμαιμηλον, petit pommier, petite pomme. Les Espagnols expriment la même chose par le terme *manzanilla*, diminutif de *manzana*, pomme.

(2) *Bibliothèque physico-économique*; 1803, page 73.
Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle; tome 4; 1803, page 170.

(3) *Nouveaux élémens de thérapeutique*; 1814, tome 1, page 132.

(4) La camomille doit aux jolies fleurs dont elle est ornée pendant toute la belle saison, sa dénomination générique *anthemis*, ανθεμον, fleur; ανθεμα, fleurs; ανθεμος, fleuri.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0196-8
DFG

La matière médicale possède bien peu de substances dont les vertus soient plus efficaces et plus variées que celle des fleurs de camomille. Bien qu'elles appartiennent plus spécialement aux remèdes appelés diffusibles, qu'à ceux désignés sous le titre de permanens, elles semblent réunir les avantages des uns et des autres; elles stimulent sans irriter; elles relèvent et soutiennent le ton des organes sans produire d'éréthisme; elles sont, dit Gilibert, la consolation des hypocondriaques, des hystériques, de tous ceux dont les forces digestives languissent; elles facilitent et régularisent l'écoulement des menstrues retenues, supprimées ou déviées par une disposition cachectique générale, ou par la faiblesse de l'utérus. M. Bodard a contribué puissamment à rétablir la camomille noble dans tous ses droits usurpés par la vulgaire (5): des guérisons nombreuses, opérées par lui ou sous ses yeux, attestent les propriétés fébrifuges et antiseptiques de cette plante, que j'ai eu mille fois occasion de confirmer. L'infusion simple ou vineuse des fleurs de camomille romaine a presque toujours été l'unique moyen à l'aide duquel j'ai combattu les fièvres intermittentes printannières. Il faut quelquefois joindre à cette boisson les fleurs en substance. Réduites en poudre, elles se donnent à la même dose et de la même manière que le quinquina, dont elles sont un des meilleurs succédanés indigènes. J'en ai souvent obtenu les plus heureux résultats dans les fièvres muqueuses continues et périodiques. Elles sont un auxiliaire précieux dans les fièvres adynamiques; mais alors il convient de les employer en poudre, en infusion théiforme (6), en lavemens. Elles sont encore prescrites par certains pharmacologistes sous diverses autres formes. On prépare une eau distillée, une huile fixe, une huile volatile ou essentielle, un extrait, un sirop de camomille romaine; on réduit les fleurs ou la plante entière en cataplasme, que l'on applique tantôt sur des tumeurs douloureuses, et notamment sur les hémorroïdes, tantôt sur le sein des femmes en couche qui ne veulent point remplir le devoir sacré de mère. Enfin, l'anthémis odorante constitue la base ou l'un des principaux ingrédiens de plusieurs médications tant internes qu'externes, lotions, fomentations, pédiluves, bains, électuaires, pilules, etc.

(5) Je ne dois pas m'occuper ici de la camomille vulgaire, qui n'est point une *anthemis*, mais bien une *matricaire*, ainsi que j'aurai occasion de le dire en traçant l'histoire de cette plante.

(6) Je verse une livre d'eau bouillante sur deux à trois gros de fleurs de camomille, et j'ajoute parfois à cette infusion quelques onces de vin blanc généreux, ou quelques dragmes d'alcool, quelques scrupules d'eau de fleurs d'oranger, ou quelques gouttes d'éther, suivant l'indication que je me propose de remplir.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0197-4

La camomille puante, ou maroute, *anthemis cotula*, L., ne doit qu'à son odeur repoussante et à son goût nauséeux, l'injuste oubli auquel on l'a condamnée; car ses vertus ne sont point douteuses: je l'ai vu produire de très-bons effets sur des femmes hystériques, et M. Bodard la signale en effet comme succédanée de l'asa fétide. Peyrilhe l'a ordonnée avec succès, à forte dose, contre des fièvres intermittentes rebelles au quinquina, et le docteur Gilibert contre les scrophules. L'habile médecin lyonnais a également constaté l'énergie de la camomille des teinturiers, camomille jaune ou œil-de-bœuf, *anthemis tinctoria*, L. L'infusion de ses fleurs a réussi dans le catarrhe pulmonaire, l'affection hypocondriaque et les fièvres tierces vernales.

SCHEFFER (Jean-Daniel), *De chamomillâ, Diss.* in-4°. *Argentorati*, 1700.
HERZOG (samuel), *De chamœmelo, Diss. med. inaug. præs. Joan.-Henr. Schulze*; in-4°. *Halæ Magdeburgicæ*, 22 *april.* 1739.
CARL (Jean-Daniel), *Vires chamomillæ, Diss. med. inaug. præs. Ern.-God. Baldinger*; in-4°. *Gottingæ*, 1775.
GROOTE (Gérard-Guillaume), *Dissertatio inauguralis medica, quâ virtutem chamœmeli antipyreticam nuperis experimentis illustrat*; in-4°. *Trajecti ad Viadrum*, 24 *april.* 1783.
ISNARDI (Pierre), *De chamœmelo, Specimen inaugurale*; in-4°. *Augustæ Taurinorum*, 20 *august.* 1810.
BODARD (Pierre-Henri-Hippolyte), Propriétés médicinales de la camomille noble; in-8°. Paris, 1810.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 89.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Fleur double.
2. Fleur flosculeuse dépourvue de rayons.
3. Moitié d'un calice commun, dans lequel on voit le réceptacle alvéolé, sur le sommet duquel on a laissé un des fleurons hermaphrodites accompagné de son écaille.
4. Fleuron hermaphrodite ayant son écaille.
5. Demi-fleuron femelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0198-0
DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CAMPÊCHE.

a. l. l.

XC.

CAMPÊCHE.

Latin . . . . { LIGNO BRASILIANO SIMILE; Bauhin, *Hist.* lib. II, sect. I.
HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM; Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*. Jussieu, clas. 12, ord. 11, *légumineuses*.

Italien . . . . . CAMPEGGIO; LEGNO CAMPECE.
Espagnol . . . CAMPECHE.
Français . . . . CAMPÊCHE; CAMPÊCHE ÉPINEUX; BOIS DE SANG; BOIS DE NICARAGUE.
Anglais . . . . CAMPEACHY-TREE; LOGWOOD.
Allemand . . . KAMPECHENBAUM; BLUTHOLZBAUM.
Hollandais . . KAMPECHE-BOOM.

C'est à la baie de Campêche, qui lui a donné son nom, cet arbre épineux, toujours vert, croît avec une promptitude extrême jusqu'à la hauteur de trente à quarante pieds, et se multiplie avec une facilité prodigieuse.

Son tronc est à côtes, droit, mais le diamètre n'est pas proportionné à l'élévation. L'écorce est brunâtre, l'aubier d'un jaune jaunâtre, et le cœur de bois rouge (1). Les rameaux nombreux, irréguliers, sont armés d'épines axillaires, courtes, solitaires et droites.

Les feuilles sont ailées sans impaire, et composées de quatre à huit folioles subcordiformes, ou plutôt cunéiformes, vertes et glabres en dessus, plus pâles en dessous, striées obliquement de chaque côté, et longues d'environ un demi-pouce: ces feuilles sont alternes sur les jeunes rameaux, et fasciculées sur les anciens.

Les fleurs sont petites, disposées en grappes simples et axillaires vers le sommet des branches. Chacune d'elles présente un calice persistant, découpé en cinq segmens ovales, d'un pourpre violet; une corolle à cinq pétales jaunâtres, plus grands que le calice; dix étamines un peu plus longues que les pétales, et dont les filamens sont libres et tomenteux; un ovaire supérieur, oblong, surmonté d'un style que termine un stigmate tronqué et comme échancré.

Le fruit est une gousse plate, membraneuse, plus large vers son milieu, plus rétrécie vers les deux bouts, longue d'un pouce et demi à deux pouces, et renfermant deux ou trois graines presque olivaires.

(1) Le campêche doit à cette couleur le nom de *bois de sang*, et la dénomination générique *hæmatoxylon* ou *hematoxylon*, qui signifie la même chose: αἷμα, génitif αἵματος, sang; ξύλον, bois.

CAMPECHE.

XC.

CAMPÈCHE.

Latin . . . . . { LIGNO BRASILIANO SIMILE ; Bauhin, Πιναξ, lib. II, sect. I.
HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM ; Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*. Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.
Italien . . . . . CAMPEGGIO ; LEGNO CAMPECE.
Espagnol . . . CAMPECHE.
Français . . . . CAMPÊCHE ; CAMPÊCHE ÉPINEUX ; BOIS DE SANG ; BOIS DE NICARAGUE.
Anglais . . . . CAMPEACHY-TREE ; LOGWOOD.
Allemand . . . KAMPECHEBAUM ; KAMPESCHBAUM.
Hollandais . . KAMPECHE-BOOM.

Originaire de la baie de Campêche, qui lui a donné son nom, cet arbre épineux, toujours vert, croît avec une promptitude extrême jusqu'à la hauteur de trente à quarante pieds, et se multiplie avec une facilité prodigieuse.

Le tronc est à côtes, droit, mais le diamètre n'est pas proportionné à l'élévation. L'écorce est brunâtre, l'aubier d'un blanc jaunâtre, et le cœur du bois rouge (1). Les rameaux nombreux, irréguliers, sont armés d'épines axillaires, courtes, solitaires et droites.

Les feuilles sont ailées sans impaire, et composées de quatre à huit folioles subcordiformes, ou plutôt cunéiformes, vertes et glabres en dessus, plus pâles en dessous, striées obliquement de chaque côté, et longues d'environ un demi-pouce : ces feuilles sont alternes sur les jeunes rameaux, et fasciculées sur les anciens.

Les fleurs sont petites, disposées en grappes simples et axillaires vers le sommet des branches. Chacune d'elles présente : un calice persistant, découpé en cinq segmens ovales, d'un pourpre violet ; une corolle à cinq pétales jaunâtres, plus grands que le calice ; dix étamines un peu plus longues que les pétales, et dont les filamens sont libres et tomenteux ; un ovaire supérieur, oblong, surmonté d'un style que termine un stigmate tronqué et comme échancré.

Le fruit est une gousse plate, membraneuse, plus large vers son milieu, plus rétrécie vers les deux bouts, longue d'un pouce et demi à deux pouces, et renfermant deux ou trois graines presque olivaires.

(1) Le campêche doit à cette couleur le titre de *bois de sang*, et la dénomination générique *hæmatoxylum* ou *hæmatoxylon*, qui signifie la même chose : αιμα, génitif αιματος, sang ; ξυλον, bois.

Aujourd'hui le campèche croît en abondance à la Jamaïque et à Saint-Domingue, où il est parfaitement naturalisé. Cependant on ne le cultive pas communément dans nos colonies pour tirer parti de son bois, mais pour clore les habitations; il est très-propre à cet usage, et forme des haies défensives d'un vert gai et faciles à tailler. Les curieux, pour se procurer cet arbre en Europe, ont recours aux couches et aux serres chaudes. Elevé ainsi de graines qu'on apporte souvent de l'Amérique, il vient d'abord assez vîte, et se garnit très-bien de feuilles; mais dans la suite il a de la peine à les conserver, et fait très-peu de progrès; rarement atteint-il la hauteur d'un grand arbrisseau.

Dépouillé de son aubier, le bois de campèche est transporté en Europe, où il est très-recherché pour les teintures. Par la simple infusion dans l'eau, il donne une couleur d'un très-beau noir, laquelle, mêlée avec des gommes, peut tenir lieu d'encre pour écrire. Par la décoction, il fournit une couleur rouge foncée, et même pourprée, dont on varie les teintes en y mettant plus ou moins d'eau (2).

Dambourney a constaté par des expériences nombreuses et pleines d'intérêt que l'écorce de bouleau possédait le précieux avantage de fixer et d'aviver à la fois la couleur communiquée aux étoffes par le bois de campèche (3).

L'alcool se charge, comme l'eau, de la partie colorante, qui se transmet aux urines et aux déjections alvines des personnes qui en font usage. La dissolution de sulfate de fer y décèle une certaine quantité d'acide gallique; aussi le bois de campèche imprime-t-il sur la langue un sentiment d'astriction, tempéré toutefois par sa saveur douceâtre. Cette double propriété l'a fait regarder comme infiniment précieux dans les diarrhées et les dysenteries. George Baker et Jean Clarke administraient la décoction; Pringle, Duncan et Baldinger donnaient la préférence à l'extrait, délayé dans de l'eau de cannelle et de menthe, à la dose d'un gros par jour. Toutefois, personne n'a porté l'exagération aussi loin que Weinrich, qui, dans son aveugle enthousiasme, n'hésite point à proclamer le bois de campèche supérieur à l'écorce de quinquina, pour la guérison des dysenteries et des fièvres putrides.

N.-J. Jacquin, Patrice Browne et d'autres voyageurs ont observé que le tronc et les principales branches du campèche distillent un suc rouge-noirâtre, qui se coagule en masses

(2) Dutour, dans le *Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle*; tom. 4; 1801, page 181.
(3) *Recueil de procédés, etc.*; an 11, page 82.

parfois grosses comme un œuf. Cette gomme durcit avec une promptitude extrême, et devient tellement friable, qu'elle se brise et se pulvérise en quelque sorte sous les doigts qui la pressent. Elle se dissout avec lenteur dans l'eau, et lui communique un goût douceâtre et une teinte rouge foncée.

WEINRICH (George-Albert), *De hæmatoxylo campechiano, Diss. inaug.* in-4°. *Erlangæ ;* 1780.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 90.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière grossie, dont on a enlevé les pétales.
2. Pétale détaché.
3. Étamine grossie.
4. Fruit légumineux de grandeur naturelle.
5. Graine isolée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0205-3

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CAMPHRÉE.

a. l. l.

XCI.

CAMPHRÉE.

Grec	Χαμαιπιτυς.
Latin	CAMPHORATA HIRSUTA ; Bauhin, Hist., lib. 12, sect. 3. Tournef., clas. 15, *apétales.*
	CAMPHOROSMA MONSPELIACA ; *foliis hirsutis, linearibus ;* Linné, clas. 14, *tétrandrie monogynie*, Jussieu, clas. 6, ord. 6, *arroches.*
Italien	CANFORATA.
Espagnol . . .	ALCANFORADA.
Français	CAMPHRÉE ; CAMPHRÉE DE MONTPELLIER.
Anglais	HAIRING CROUM.-PINE.
Allemand . . .	KAMPHERKRAUT.
Hollandais . . .	KAMPHER-KRUID.

Ce sous-arbrisseau qui, comme l'observe Lamarck, a l'aspect d'une bruyère, s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Il croît sur les plages sablonneuses de la Tartarie, sur les rives maritimes du royaume de Naples, dans les lieux incultes et sur les bords des chemins de l'Espagne, du Languedoc et de la Provence.

Les tiges sont rameuses, ligneuses, blanchâtres, tomenteuses.

Les feuilles sont excessivement nombreuses, alternes, sessiles, entières, subulées, velues. Dans l'aisselle de ces feuilles, ajoute Lamarck, il s'en trouve d'autres ramassées en faisceau, et qui sont dues à de jeunes pousses non développées.

Les fleurs sont petites, disposées par paquets axillaires, le long des rameaux. Dépourvues de corolle, elles présentent : un calice urcéolé, divisé en quatre segmens pointus, inégaux, dont les deux plus grands sont opposés ; quatre étamines saillantes hors du calice : un ovaire supérieur, chargé d'un style bifide, à stigmates aigus et plumeux.

Le fruit est une capsule uniloculaire, s'ouvrant par en haut, recouverte par le calice, et renfermant une seule graine, ovale, comprimée, noirâtre, luisante.

Si la culture contribue puissamment à perfectionner les végétaux alimentaires, elle détériore généralement les plantes médicinales. L'arome pénétrant qui s'exhale de la camphrée sauvage froissée entre les doigts, n'existe plus dans celle de nos jardins. Vainement chercherait-on dans cette dernière la saveur piquante qui distingue la camphrée des environs de Montpellier : altérée, dénaturée par nos soins, nos engrais, elle devient une herbe insipide et inodore qui ne justifie plus

Turpin del.

Lambert sculp.

CAMPHIDIA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0210-9
DFG

XCI.

CAMPHRÉE.

Grec..... χαμαιπιτυς.
Latin..... CAMPHORATA HIRSUTA ; Bauhin, Πιναξ, lib. 12, sect. 5. Tournefort, clas. 15, *apétales*.
CAMPHOROSMA MONSPELIACA ; *foliis hirsutis, linearibus* ; Linné, clas. 14, *tétrandrie monogynie*. Jussieu, clas. 6, ord. 6, *arroches*.
Italien..... CANFORATA.
Espagnol... ALCANFORADA.
Français.... CAMPHRÉE ; CAMPHRÉE DE MONTPELLIER.
Anglais.... STINKING GROUND-PINE.
Allemand... KAMPHERKRAUT.
Hollandais.. KAMPHER-KRUID.

Ce sous-arbrisseau qui, comme l'observe Lamarck, a l'aspect d'une bruyère, s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Il croît sur les plages sablonneuses de la Tartarie, sur les rives maritimes du royaume de Naples, dans les lieux incultes et sur les bords des chemins de l'Espagne, du Languedoc et de la Provence.

Les tiges sont rameuses, ligneuses, blanchâtres, tomenteuses.

Les feuilles sont excessivement nombreuses, alternes, sessiles, entières, subulées, velues. Dans l'aisselle de ces feuilles, ajoute Lamarck, il s'en trouve d'autres ramassées en faisceau, et qui sont dues à de jeunes pousses non développées.

Les fleurs sont petites, disposées par paquets axillaires, le long des rameaux. Dépourvues de corolle, elles présentent : un calice urcéolé, divisé en quatre segmens pointus, inégaux, dont les deux plus grands sont opposés ; quatre étamines saillantes hors du calice : un ovaire supérieur, chargé d'un style bifide, à stigmates aigus et plumeux.

Le fruit est une capsule uniloculaire, s'ouvrant par en haut, recouverte par le calice, et renfermant une seule graine, ovale, comprimée, noirâtre, luisante.

Si la culture contribue puissamment à perfectionner les végétaux alimentaires, elle détériore généralement les plantes médicinales. L'arome pénétrant qui s'exhale de la camphrée sauvage froissée entre les doigts, n'existe plus dans celle de nos jardins. Vainement chercherait-on dans cette dernière la saveur piquante qui distingue la camphrée des environs de Montpellier : altérée, dénaturée par nos soins, nos engrais, elle devient une herbe insipide et inodore qui ne justifie plus

son titre (1), et ne possède point les vertus que les thérapeutistes ont reconnues dans la sauvage. Celle-ci, trop exaltée peut-être par le docteur Burlet (2), a pourtant déployé une efficacité incontestable dans diverses maladies. On l'emploie avec succès dans l'asthme pituiteux et dans la plupart des autres affections du poumon, lorsqu'il s'agit de favoriser l'excrétion muqueuse de cet organe. M. Bodard assure (3) que la camphrée n'est pas moins utile dans la coqueluche, dans les métastases goutteuses sur l'organe pulmonaire, dans les obstructions récentes des viscères abdominaux et dans la menstruation supprimée ou insuffisante. Elle facilite, augmente le cours des urines, dit Gilibert; infusée dans le vin, elle détermine les sueurs; elle est un secours précieux dans les hydropisies, spécialement dans l'anasarque; elle modère les diarrhées et les dysenteries entretenues par l'atonie des intestins; elle est un bon auxiliaire dans le rhumatisme chronique, les dartres, et généralement dans les altérations qui dépendent de la diathèse asthénique (4). On verse une livre d'eau bouillante sur un à deux gros de feuilles et de sommités de camphrée, ou bien on les fait digérer dans une égale quantité de vin blanc.

(1) La dénomination générique *camphorosma*, formée en apparence d'un mot latin, *camphora*, et d'un mot grec, οσμη, semble d'abord irrégulière, incohérente, hybride. Mais si l'on réfléchit que le camphre est exprimé dans les écrits des divers médecins grecs, notamment d'Aetius, sous le nom de καφουρα, et dans ceux des Grecs modernes sous celui de καμφορα, l'immortel Linné ne sera plus accusé d'avoir violé les lois qu'il a lui-même établies.

(2) *Mémoires de l'Académie des sciences de Paris*; 1703: *Histoire*; page 53.

(3) *Cours de botanique médicale comparée*; 1810, tome 2, pag. 214.

(4) *Démonstrations élémentaires de botanique*; 1796, tom. 3, p. 117.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 91.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Feuille grossie.
2. Fleur entière grossie.
3. Pistil.
4. Fruit capsulaire dans une portion du calice.
5. Graine mise à nu.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0212-1
DFG

Turpin P. Lambert Jne sculp.

CANELLE

a. l. l.

XCII.

CANELLE.

Grec	ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ.
Latin	CINNAMOMUM, sive CANELLA ZEYLANICA; Bauhin, Pinax, lib. 11, sect. 3. LAURUS CINNAMOMUM; *foliis trinerviis, ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus*; Linné, clas. 9, *enneandria monogynia*. Jussieu, clas. 6, ord. 4, *Lauriers*.
Italien	CANELLA; CANNELLA; ALBERO DELLA CANNELLA.
Espagnol	CANELA; CANELO.
Français	CANELLE; CANELLIER.
Anglais	CINNAMON-TREE.
Allemand	ZIMMETBAUM.
Hollandais	KANEELBOOM.
Polonais	CYNAMON.

Célèbre par la beauté de son climat, autant moins que par sa vaste étendue, l'antique Taprobane porte aujourd'hui le nom d'île de Ceylan : fertile en végétaux brillans, savoureux, aromatiques, elle fut longtemps l'unique patrie du canellier ; et si l'on est parvenu à cultiver cet arbre précieux dans d'autres contrées de l'Asie, et même dans le Nouveau-Monde, celui qui croît dans l'île de Ceylan revendique à tous égards la prééminence. Le *champ de canelle*, qui s'étend sur un espace d'environ quatorze lieues, depuis Negambo jusqu'à Gallières, est encore la source à laquelle vont puiser tous les peuples de l'univers (1). Les Hollandais voulant se rendre maîtres exclusifs de ce commerce important, ne se bornèrent pas à chasser les Portugais de Ceylan; ils conquirent en outre sur eux le royaume de Cochin, sur la côte de Malabar, pour leur enlever le débit de la *canelle sauvage*, portugaise ou grise, qui croît dans ce pays. La première chose qu'ils firent après cette conquête, fut d'arracher la canelle sauvage. Ils détruisirent même à Ceylan tous les canelliers venant sans culture hors du *champ* qui leur est destiné; ils connaissaient par l'expérience de plus d'un siècle la quantité de canelle nécessaire.

On a souvent et longuement disserté pour savoir si notre canelle est le *kinnâmom* des Hébreux et le *κιννάμωμον* des Grecs. Je crois pouvoir résoudre négativement la première question et affirmativement la seconde, quoi qu'en disent l'érudit Tournefort et les frères Campi (2). J'ajouterai que les

(1) Poivre assure qu'on trouve à la Cochinchine une canelle supérieure à celle de Ceylan.

(2) *Spicilegio botanico*; *Dialogo nel quale si manifesta lo sconosciuto cinnamomo degli Antichi*, etc.; in-4°. *Lucca*, 1653.

Turpin. P. Lambert Jr. sculp.

CANELLE

XCII.

CANELLE.

Grec..... κιννάμωμον.

Latin..... CINNAMOMUM, sive CANELLA ZEILANICA; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 3.
LAURUS CINNAMOMUM; *foliis trinerviis, ovato-oblongis, nervis versùs apicem evanescentibus*; Linné, clas. 9, *enneandrie monogynie*. Jussieu, clas. 6, ord. 4, *lauriers*.

Italien..... CANELLA; CANNELLA; ALBERO DELLA CANNELLA.
Espagnol... CANELA; CANELO.
Français.... CANELLE; CANELLIER.
Anglais.... CINNAMOM-TREE.
Allemand... ZIMMETBAUM.
Hollandais.. KANEELBOOM.
Polonais.... CYNAMON.

Célèbre par la beauté de son climat, non moins que par sa vaste étendue, l'antique Taprobane porte aujourd'hui le nom d'île de Ceylan: fertile en végétaux brillans, savoureux, aromatiques, elle fut longtemps l'unique patrie du canellier; et si l'on est parvenu à cultiver cet arbre précieux dans d'autres contrées de l'Asie, et même dans le Nouveau-Monde, celui qui croît dans l'île de Ceylan revendique à tous égards la prééminence. Le *champ de canelle*, qui s'étend sur un espace d'environ quatorze lieues, depuis Negambo jusqu'à Gallières, est encore la source à laquelle vont puiser tous les peuples de l'univers (1). Les Hollandais voulant se rendre maîtres exclusifs de ce commerce important, ne se bornèrent pas à chasser les Portugais de Ceylan; ils conquirent en outre sur eux le royaume de Cochin, sur la côte de Malabar, pour leur enlever le débit de la *canelle sauvage*, portugaise ou grise, qui croît dans ce pays. La première chose qu'ils firent après cette conquête, fut d'arracher la canelle sauvage. Ils détruisirent même à Ceylan tous les canelliers venant sans culture hors du *champ* qui leur est destiné; ils connaissaient par l'expérience de plus d'un siècle la quantité de canelle nécessaire.

On a souvent et longuement disserté pour savoir si notre canelle est le *kinnamom* des Hébreux et le κιννάμωμον des Grecs. Je crois pouvoir résoudre négativement la première question, et affirmativement la seconde, quoi qu'en disent l'érudit Jaucourt et les frères Campi (2). J'ajouterai que les

(1) Poivre assure qu'on trouve à la Cochinchine une canelle supérieure à celle de Ceylan.

(2) *Spicilegio botanico; Dialogo nel quale si manifesta lo sconosciuto cinnamomo degli Antichi, etc.*; in-4°. *Lucca*, 1654.

Grecs, supposant, comme les Arabes, que la canelle venait de la Chine, et trouvant son odeur analogue à celle de leur αμωμον, lui donnèrent le nom de κιννα μωμον, qui exprime cette double signification.

La racine du canellier se partage en plusieurs branches : elle est grosse, fibreuse, dure ; son écorce grisâtre en dehors, rougeâtre en dedans, recouvre un bois solide, dense et blanchâtre.

Le tronc, qui s'élève de quinze à vingt pieds, acquiert jusqu'à dix-huit pouces de diamètre : son écorce extérieure, épidermoïde, est, comme celle des rameaux, d'abord verdâtre, puis grisâtre ; la seconde écorce, placée sous cet épiderme, offre une teinte presque semblable, qui devient, avec le temps, fauve ou jaune-rougeâtre.

Les feuilles, longues de quatre à cinq pouces sur deux pouces environ de largeur, sont imparfaitement opposées, c'est-à-dire que l'une est souvent insérée à un point un peu plus haut que l'autre qui lui correspond ; elles sont pétiolées, ovales, terminées en pointe, entières, coriaces, glabres des deux côtés, vertes et luisantes en dessus, blanchâtres et ternes en dessous ; elles ont communément trois, et quelquefois cinq nervures longitudinales, qui partent en divergeant de la base de chaque feuille, et se prolongent jusqu'au sommet ; entre ces nervures, on aperçoit des veines nombreuses et transverses.

Les fleurs sont dioïques, petites, jaunâtres intérieurement, blanchâtres et un peu veloutées en dehors, disposées en panicules terminales : les fleurs mâles ont un calice corolliforme à six découpures ; neuf étamines situées sur plusieurs rangs concentriques, et creusées chacune de quatre ouvertures operculées par où s'échappe le pollen (3). Les fleurs femelles ont pareillement un calice à six divisions et persistant ; un ovaire supérieur, chargé d'un style simple à stigmate obtus.

Le fruit est un drupe ovale, long de cinq à six lignes, brun-bleuâtre dans sa maturité, contenant une pulpe verte et onctueuse, qui enveloppe un noyau dans lequel on trouve une amande purpurine.

Le canellier fleurit en février ou en mars, et conserve sa verdure toute l'année. L'âge, l'exposition, la culture de l'arbre, modifient singulièrement la qualité de l'écorce qu'on en retire ; celle que fournissent les grosses branches est moins estimée que celle des rameaux plus délicats : aussi distingue-t-on la canelle en fine, moyenne et grossière. La récolte se fait deux fois par an : la grande récolte a lieu d'avril en août, pendant

(3) C'est à M. Turpin qu'on doit la connaissance de cette singulière structure des étamines des lauriers.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0218-6
DFG

la mousson pluvieuse, et la petite, de novembre en janvier, dans la mousson sèche. On coupe les branches de trois ans; on emporte l'écorce extérieure, en la râclant avec une serpette dont la courbure, la pointe et le dos sont tranchans; on fend avec la pointe la deuxième écorce d'un bout à l'autre de la branche, et avec le dos du même outil, on la détache peu à peu : on ramasse toutes ces écorces; les plus petites sont mises dans les plus grandes; elles sont exposées au soleil, où elles se roulent d'elles-mêmes de plus en plus, à mesure qu'elles se dessèchent. Au bout de deux ou trois ans, l'arbre se trouve revêtu d'une écorce nouvelle, qu'on peut alors enlever.

Toutes les parties du canellier sont utiles. L'écorce odorante de la racine fournit une huile essentielle limpide, jaunâtre, employée intérieurement et à l'extérieur par les Indiens, comme diaphorétique, diurétique, stomachique, carminative; et du camphre très-blanc, très-pur, très-volatil, recueilli avec un soin extrême, et réservé pour les princes du pays. Les vieux troncs du canellier offrent des nœuds qui sentent le bois de rose, et dont l'ébénisterie peut tirer parti. Les feuilles ont une odeur et un goût agréables; on s'en sert dans les bains aromatiques; soumises à l'alambic, elles donnent une huile dont l'odeur approche de celle du girofle, et qui passe pour correctif des violens purgatifs. Les fleurs du canellier exhalent un parfum si suave et tellement diffusible, qu'il embaume l'atmosphère à plusieurs milles de distance : elles sont la base d'une conserve, et d'une eau réputée cordiale et anthystérique. On retire des fruits, par la distillation, une huile volatile très-odorante, et par la décoction, une espèce de suif regardé par les Indiens comme très-propre à guérir les contusions, les fractures, les luxations, et que l'on nous apporte en pains, sous le nom de *cire de canelle*, parce que le roi de Candy en fait fabriquer ses bougies, qui répandent une odeur agréable.

Ces usages variés des racines, du tronc, des feuilles, des fleurs et des fruits du canellier ne nous sont guère connus que par les rapports des voyageurs; mais nous employons souvent la *canelle* comme remède, et plus souvent encore à titre de condiment. Elle flatte à la fois le sens du goût et celui de l'odorat. Elle a une saveur d'abord sucrée, qui bientôt devient piquante et très-aromatique. Toutefois, ces qualités physiques qui caractérisent la bonne canelle, sont plus ou moins développées dans les nombreuses variétés désignées sous les dénominations de *rasse-coronde*, *cahatte-coronde*, *cappiroe-coronde*, *nai-coronde*, etc. (4).

(4) Murray, *Apparatus medicaminum*; tom. 4 : 1787, page 421.
Alibert, *Nouveaux Elémens de thérapeutique*; tom. 1 : 1814, p. 101.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0219-4
DFG

Cet aromate, dit le docteur Bodard (5), est peut-être celui de tous les exotiques qui soit le plus ami de l'homme : il rétablit merveilleusement les forces vitales, ranime le système nerveux, fortifie l'estomac, dissipe les flatuosités, excite l'action de l'appareil dermoïde, calme le vomissement, et apaise doucement les diarrhées par atonie. Quelques observateurs, ajoute M. Alibert, se sont crus fondés à penser que la canelle affectait d'une manière spéciale les propriétés vitales de l'utérus : de là vient que les accoucheurs ont parfois recours à l'eau de canelle pour réveiller l'irritabilité de cet organe frappé d'inertie par les labeurs de l'enfantement, et faciliter par ce moyen l'expulsion du placenta. Fourcroy observe que dans ce cas, ainsi que dans les maladies éruptives, on faisait autrefois un grand abus de cette écorce. « Les gens du peuple, les habitans des campagnes, aussitôt que leurs enfans avaient les premiers signes de l'éruption variolique ou morbilleuse, les tenaient bien chaudement, les accablaient de couvertures, et leur donnaient de grands verres de vin où ils avaient fait infuser de la canelle. La vigueur du tempérament et la nature bénigne de la maladie résistent quelquefois à ce traitement inconsidéré. »

On administre la canelle sous des formes et à des doses très-variées, suivant les indications que l'on se propose de remplir. Elle est fréquemment destinée à masquer la saveur repoussante, ou à augmenter l'énergie de certains médicamens. Fourcroy recommande aux personnes qui éprouvent des dyspepsies, des diarrhées habituelles, de mâcher tous les matins de la canelle, et d'avaler la salive qui en est imprégnée. J'ai souvent joint un gros de cette écorce en poudre à une once de celle de quinquina. Des succès multipliés confirment l'efficacité de ce mélange, qui convient surtout aux fièvres périodiques entretenues par une diathèse scorbutique, scrophuleuse, ou par la funeste influence d'un climat froid et humide. J'ai pareillement eu à me louer de la canelle unie à la rhubarbe, au cachou, à la limaille d'acier, dans des leucorrhées opiniâtres. Chacun sait qu'elle entre dans une foule de préparations pharmaceutiques, parmi lesquelles il suffit de citer la thériaque, l'orviétan, le mithridate, le diascordium, le philonium romain, le diaphénic, le baume apoplectique, la confection alkermès, l'électuaire hiéra-picra. Boerhaave a exalté outre mesure l'huile volatile de canelle, et Samuel-Théophile Gmelin a prodigué des éloges non moins fastueux et non moins frivoles à son alcool et à son essence (6). Les thérapeutistes modernes

(5) *Cours de botanique médicale comparée ;* 1810, tome 2, pag. 217.
(6) *De analepticis quibusdam nobilioribus, à cinnamomo, aniso stellato et asâ fœtidâ ; Tubingæ*, 1763.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0220-5
DFG

emploient fréquemment l'eau distillée, la teinture spiritueuse et le sirop de canelle, qui sont en effet des toniques précieux.

HOECHSTETTER (jean-philippe), *De cinnamomo*, *Diss. inaug. præs. Joan. Theod. Schenck*; in-4°. *Ienæ*, 1670.
TITIUS (george-chrétien), *De cinnamomo*, *Diss. inaug. præs. Georg.-Wolfg. Wedel*; *cum Invitatione publicâ Joannis-Hadriani Slevogt*, *De αυτοχειρια medicâ in genere*; in-4°. *Ienæ*, 17 *decemb.* 1707.
GOELLER (christophe-louis), *De cinnamomo*, *Diss.* in-4°. *Ultrajecti*, 1709.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 93.

(*La plante est représentée un peu plus petite que nature*)

1. Fleur mâle.
2. Étamine grossie, afin de faire voir les quatre ouvertures operculées par où s'échappe le pollen.
3. Fleur femelle.
4. Pistil.
5. Fruit de grosseur naturelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0221-1
DFG

Turpin. P. Lambert Jr sculp.

CAOUT-CHOUC.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0224-8
DFG

CAOUTCHOUC.

Latin	HAVEA BRASILIENSIS ; *foliis ternatis, ellipticis, integerrimis, subtus cæsiis, longe petiolatis* ; Linné fils, class. 21, *monœcie monadelphie*, Jussieu, class. 15, ord. 1, *euphorbes*.
	HEVEA GUIANENSIS ; Aublet.
	SIPHONIA CAHUCHU ; Schreber, Richard.
Italien	EVEA ; ALBERO DELLA RESINA ELASTICA.
Espagnol	EVEA ; ARBOL DE LA RESINA ELASTICA.
Français	CAOUTCHOUC ; CAOUTCHOU ; CAOUTCHOUQUIER, C. ; ARBRE, Lamarck, MEDICINIER ELASTIQUE.
Anglais	INDIA RUBBER-TREE ; CAOUTCHOUC-TREE, SYRINGE-TREE, Willd.
Allemand	KAOUTSCHOUBAUM.

Plus de trente végétaux, énumérés par le savant naturaliste Vitry (1), fournissent du caoutchouc ; mais cette substance singulière distille surtout abondamment du médicinier élastique, auquel appartient plus spécialement le titre de caoutchouc, que lui donnent les Mainas et les Garipons le nomment siringa, les habitans d'Esmeraldas, au nord-ouest de Quito, l'appellent hévé.

Ce grand arbre de l'Amérique méridionale s'élève à la hauteur de cinquante à soixante pieds, sur un tronc de deux pieds et demi de diamètre. Son bois est blanc, peu compacte ; son écorce est épaisse et grise-rougeâtre. Plusieurs branches, les unes droites, les autres inclinées, naissent vers le sommet, s'étendent au loin, et se répandent en tout sens.

Les feuilles, éparses, et pourtant peu écartées, se composent chacune de trois folioles ovales-cunéiformes, arrondies à leur sommet, parfois armé d'une pointe fort courte, rétrécies vers leur base, très-entières, longues de trois à quatre pouces sur deux de largeur, coriaces, glabres des deux côtés, vertes en dessus, plus pâles et comme cendrées en dessous, traversées par des nervures parallèles, et portées sur un long pétiole commun, cylindrique, légèrement canaliculé.

Les fleurs, disposées en grappes terminales, sont petites, dépourvues de corolle, monoïques, les deux sexes placés sur la même panicule, où les mâles se trouvent en assez grand nombre, tandis que les femelles sont solitaires. Chaque fleur mâle offre : un calice monophylle, urcéolé, semi-quinquefide,

(1) *Bulletin de pharmacie* ; juillet 1813, page 320.

CAOUT-CHOUC.

XCIII.

CAOUTCHOUC.

Latin . . . . . JATROPHA ELASTICA ; *foliis ternatis, ellipticis, integerrimis, subtùs canis, longè petiolatis ;* Linné fils, clas. 21, *monœcie monadelphie.* Jussieu, clas. 15, ord. 1, *euphorbes.*
HEVEA GUIANENSIS ; Aublet.
SIPHONIA CAHUCHU ; Schreber, Richard.

Italien . . . . . EVEA ; ALBERO DELLA RESINA ELASTICA.

Espagnol . . . EVEA ; ARBOL DE LA RESINA ELASTICA.

Français . . . . CAOUTCHOUC ; CAOUTCHOU ; CAOUTCHOUQUIER, C. ; HÉVÉ, Lamarck ; MÉDICINIER ÉLASTIQUE.

Anglais . . . . INDIA RUBBER-TREE ; CAOUTCHOUC-TREE ; SYRINGE-TREE, Willich.

Allemand . . . KAOTSCHUCKBAUM.

Plus de trente végétaux, énumérés par le savant naturaliste Virey (1), fournissent du caoutchouc ; mais cette substance singulière distille surtout abondamment du médicinier élastique, auquel appartient plus spécialement le titre de caoutchouc, que lui donnent les Mainas : les Garipons le nomment siringa ; les habitans d'Esmeraldas, au nord-ouest de Quito, l'appellent hévé.

Ce grand arbre de l'Amérique méridionale s'élève à la hauteur de cinquante à soixante pieds, sur un tronc de deux pieds et demi de diamètre. Son bois est blanc, peu compacte ; son écorce est épaisse et grise-rougeâtre. Plusieurs branches, les unes droites, les autres inclinées, naissent vers le sommet, s'étendent au loin, et se répandent en tout sens.

Les feuilles, éparses, et pourtant peu écartées, se composent chacune de trois folioles ovales-cunéiformes, arrondies à leur sommet, parfois armé d'une pointe fort courte, rétrécies vers leur base, très-entières, longues de trois à quatre pouces sur deux de largeur, coriaces, glabres des deux côtés, vertes en dessus, plus pâles et comme cendrées en dessous, traversées par des nervures parallèles, et portées sur un long pétiole commun, cylindrique, légèrement canaliculé.

Les fleurs, disposées en grappes terminales, sont petites, dépourvues de corolle, monoïques, les deux sexes placés sur la même panicule, où les mâles se trouvent en assez grand nombre, tandis que les femelles sont solitaires. Chaque fleur mâle offre : un calice monophylle, urcéolé, semi-quinquefide,

(1) *Bulletin de pharmacie ;* juillet 1814, page 320.

à découpures pointues ; cinq étamines, dont les filamens réunis en une petite colonne cylindrique, portent des anthères ovales, biloculaires, échancrées supérieurement, pointues à la base. Chaque fleur femelle présente : un calice monophylle, turbiné, caduc, et dont le bord est divisé en cinq dents pointues ; un ovaire supérieur, conique, couronné de trois stigmates sessiles, bilobés.

Le fruit est une grosse capsule ligneuse, à trois lobes latéraux, arrondis, triloculaires, à loges bivalves, dont chacune contient une à trois graines ovoïdes, roussâtres, bariolées de noir, à tunique mince et cassante : recouvrant une amande blanche.

La Condamine, Fresneau, Fusée-Aublet, Richard, Tussac, Alibert, ont donné des renseignemens utiles sur l'histoire, l'extraction et les usages du caoutchouc. Nous savons que ce suc laiteux coule en grande quantité, par des incisions latérales et obliques dans l'écorce de l'arbre, et qui vont aboutir, au moyen d'une longue incision perpendiculaire, à l'entaille profonde faite à la partie inférieure du tronc. Reçu dans des vases appropriés, le suc, encore liquide, est appliqué, au pinceau, sur des moules d'argile de différentes formes. Quand la première couche a pris une certaine consistance, on en applique une seconde, et ainsi successivement, jusqu'à ce que l'enduit soit de l'épaisseur qu'on veut lui donner. Si les vases qui ont servi de moule sont de terre glaise, on introduit de l'eau pour la délayer et la faire sortir ; s'ils sont de terre cuite, on les brise en petits morceaux. M. Tussac doute que la couleur brune et la solidité du caoutchouc proviennent de son exposition au feu et à la fumée : toutes les variétés qu'il a extraites de diverses végétaux, après avoir été très-blanches les premiers jours, ont pris spontanément une teinte brune plus ou moins foncée (2) ; toutes se sont ramollies par l'action de la chaleur, loin de se dessécher plus rapidement. M. Tussac attribue ce desséchement et cette coloration à la combinaison de l'air atmosphérique et de la lumière avec le fluide laiteux. Cette opinion est également celle de M. Tremollière, qui a obtenu du suc de figuier une matière élastique, qu'il appelle caoutchouc indigène (3).

L'immortel Fourcroy, qui savait allier aux charmes de la plus belle imagination une excellente judiciaire, est allé trop loin peut-être en faisant du caoutchouc un des matériaux im-

(2) On trouve des échantillons de caoutchouc jaunes et transparens ; on en voit même de bleus et de rouges : ils sont tous moins élastiques que les bruns (Murray).

(3) *Bulletin de pharmacie ;* juillet 1814, page 317.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0228-2
DFG

médiats des végetaux. Toutefois, il a parfaitement exposé les caractères, l'analyse chimique et les principales propriétés de cette substance, qu'il serait beaucoup plus avantageux, selon lui, de nous envoyer liquide, dans des vases hermétiquement fermés. Puisqu'il n'en est pas ainsi, et que nous recevons le caoutchouc complétement desséché, et communément sous forme de bouteilles, il s'agit de le dissoudre à l'aide de réactifs qui ne détruisent point son élasticité. Personne n'a énuméré avec plus d'exactitude que Murray (4) les nombreux procédés imaginés pour atteindre ce but. Macquer est parvenu le premier à opérer cette dissolution. Mais l'éther, dont il s'est servi, ne saurait convenir aux usages économiques. Il a donc fallu chercher des réactifs moins chers : « On les a trouvés, dit M. Cadet, dans les huiles essentielles, seules ou mélangées d'huiles grasses, et surtout dans l'huile de camphre. On prépare un vernis de caoutchouc en faisant fondre cette matière dans un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Lorsque la dissolution est faite, on l'étend sur les étoffes avec un pinceau, ou bien à la manière des sparadraps. C'est ainsi que l'on enduit les toiles ou tafetas destinés à faire des ballons aérostatiques, des couvertures imperméables, des tabliers pour les nourrices, des enveloppes de chapeaux, des serretêtes pour les nageurs. »

Par ces différens procédés, habilement modifiés, Bernard, Durand, Bucholtz, Troja, Theden, ainsi que d'autres chirurgiens et artistes ingénieux, ont fabriqué divers bandages, des bourrelets, des anneaux, des pessaires, des seringues, des canules, des sondes pleines et creuses, des bougies (5). On a prétendu cependant, et M. Cullerier affirme, que les bougies élastiques de Bernard sont formées d'un tissu de soie, de fil ou de coton, vernissé d'huile de lin très-rapprochée par une longue ébullition : en effet, dit Chaptal, si l'on rend l'huile de lin très-siccative en la faisant digérer sur les oxides de plomb, qu'ensuite on l'applique avec un pinceau sur un corps quelconque, et qu'on la fasse dessécher au soleil ou à la fumée, il en résultera une pellicule d'une consistance assez ferme, d'une transparence marquée, brûlant à la manière du caoutchouc, et susceptible d'une extension et d'une élasticité étonnantes. Si on abandonne cette huile bien siccative dans un vase très-large, la surface s'épaissit, et forme une membrane qui a la plus grande analogie avec la gomme élastique. Une livre de cette huile étendue sur une pierre et exposée à l'air pendant six

(4) *Apparatus medicaminum* ; tom. 4 : 1787, pag. 176.

(5) Je n'ajoute point à cette liste le nom de Gesscher, dont les procédés, ensevelis dans l'ombre du mystère, n'ont présenté d'ailleurs aucun résultat satisfaisant, malgré les promesses mensongères de l'auteur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0229-0
DFG

mois, a acquis presque toutes les propriétés du caoutchouc ; on s'en est servi pour faire des vases, des sondes et des vernis.

JULIAANS (Arnoud), *De resinâ elasticâ Cajennensi, Diss. chem. inaug.* in-4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1780.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 93.

(*La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Fleur mâle grossie.
2. Étamines monadelphes.
3. Fleur femelle grossie.
4. Pistil composé d'un ovaire trigone, couronné de trois stigmates bifides.
5. Fruit tricoque réduit aux deux tiers de sa grandeur naturelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0230-0
DFG


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0231-6
DFG

Turpin P. Lambert Sc. sculp.

CAPILLAIRE.

Grec . . . . . *adiante*.

Latin . . . . ADIANTUM COMMUNE ; CAPILLUS, Horat, lib. 10, sat. 8 ; *pumilum*, clas. 16, *scalaris cum flore*, clas. 24, *filicula*, clas. 24, *filicula dentata alternis, pinnis cuneiformibus, lobatis, pectinatis* ; *filicula*, clas. 24, *cryptogamie*, *fougères*. Juss. ord. 1, ord. 5, *fougères*.

Italien . . . . ADIANTO ; CAPILLARE ; CAPELVENERE.

Espagnol . . . CULANTRILLO DE POZO.

Français . . . . CAPILLAIRE, CAPILLAIRE DE MONTPELLIER ; CAPILLAIRE VRAI ; CHEVEU DE VÉNUS ; ADIANTE A FEUILLES DE CORIANDRE, Lamarck.

Anglais . . . . MAIDEN-HAIR ; VENUS-HAIR.

Allemand . . . FRAUENHAAR, VENUSHAAR.

Hollandais . . . VROUWEN-HAAR, VENUS-HAAR.

On connaît près de quatre vingts espèces d'adiante ; celle de Montpellier est la seule indigène. Elle végète dans les lieux pierreux, humides et couverts de mousse, surtout en Italie, et dans les départemens méridionaux de la France. Scopoli et Jacquin l'ont trouvé en Illyrie, Haller en Suisse, Lightfoot en Ecosse, Latourette dans la grotte de Fontanières près Lyon.

La racine, brunâtre, obliquement couchée, longue de trois à quatre pouces, grosse à peu près comme un tuyau de plume de cygne, jette çà et là des fibrilles très-déliées (1).

Les feuilles, toujours vertes, s'élèvent au dessus du sol à la hauteur de cinq à huit pouces. Leur pétiole commun est assez luisant (2), rougeâtre, noirâtre, extrêmement grêle, garni de nombreux pétioles particuliers alternes, qui soutiennent des folioles très-petites, glabres, découpées ou lobées à leur bord supérieur.

(1) L'observation de M. Turpin sur la racine de calaguala s'applique parfaitement ici. Voyez la page 121 de ce volume.

(2) On dit que l'adiante doit sa dénomination à la propriété, qu'elle a en effet commune avec plusieurs autres plantes aquatiques, de n'être point pénétrée par l'eau qui coule sur ses feuilles : *a* privatif, et *βαπτω*, mouiller, humecter. Mais pourquoi l'appelle-t-on capillaire, ou cheveu de Vénus ? Les érudits ne sont pas d'accord sur ce point. Pline, et, d'après lui Daubin, prétendent qu'on lui donne ce titre parce qu'il fait croître et embellit les cheveux. Bias'sart, ou plutôt son continuateur Isenflamm, adopte une étymologie, sinon plus probable, du moins plus naturelle, et qui, je l'avoue, ne me déplaît pas : *quia illa planta pudendi muliebris pilos quodam modo referat*. Le savant Theis, plus discret (car le lecteur français veut être respecté), se contente de voir dans ses cheveux de Vénus une allusion aux tiges longues et fines de l'adiante.

CAPILLAIRE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0234-4
DFG

XCIV.

CAPILLAIRE.

Grec..... αδιαντον.

Latin..... ADIANTUM FOLIIS CORIANDRI ; Bauhin, Πιναξ, lib. 10, sect. 1. Tournefort, clas. 16. *apetales sans fleurs.*
ADIANTUM CAPILLUS VENERIS ; *frondibus decompositis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus, lobatis, pedicellatis ;* Linné, clas. 24, *cryptogamie, fougères.* Jussieu, clas. 1, ord. 5. *fougères.*

Italien..... ADIANTO ; CAPILLARE ; CAPELVENERE.

Espagnol... CULANTRILLO DE POZO.

Français.... CAPILLAIRE ; CAPILLAIRE DE MONTPELLIER ; CAPILLAIRE VRAI ; CHEVEU DE VÉNUS ; ADIANTE A FEUILLES DE CORIANDRE, Lamarck.

Anglais.... MAIDEN-HAIR ; VENUS-HAIR.

Allemand... FRAUENHAAR ; VENUSHAAR.

Hollandais.. VROUWEN-HAIR ; VENUS-HAIR.

On connaît près de quatre-vingts espèces d'adiante ; celui de Montpellier est le seul indigène. Il végète dans les endroits pierreux, humides et couverts de l'Europe australe, surtout en Italie, et dans les départemens méridionaux de la France. Scopoli et Jacquin l'ont trouvé en Illyrie, Haller en Suisse, Lightfoot en Ecosse, Latourette dans la grotte de Fontanières près Lyon.

La racine, brunâtre, obliquement couchée, longue de trois à quatre pouces, grosse à peu près comme un tuyau de plume de cygne, jette çà et là des fibrilles très-déliées (1).

Les feuilles, toujours vertes, s'élèvent audessus du sol à la hauteur de cinq à huit pouces. Leur pétiole commun est assez luisant (2), rouge-noirâtre, extrêmement grêle, garni de nombreux pétioles particuliers alternes, qui soutiennent des folioles très-minces, glabres, découpées ou lobées à leur bord supérieur.

(1) L'observation de M. Turpin sur la racine de calaguala s'applique parfaitement ici. Voyez la page 111 de ce volume.

(2) On dit que l'adiante doit sa dénomination à la propriété, qui toutefois lui est commune avec plusieurs autres plantes aquatiques, de n'être point pénétrée par l'eau qui coule sur ses feuilles : α privatif, et διαιτειν, mouiller, humecter. Mais pourquoi l'appelle-t-on capillaire, ou cheveu de Vénus ? Les érudits ne sont pas d'accord sur ce point. Pline, et, d'après lui, Bauhin, prétendent qu'on lui donne ce titre parce qu'il fait croître et embellit les cheveux. Blankaart, ou plutôt son continuateur Isenflamm, adopte une étymologie, sinon plus probable, du moins plus naturelle, et qui, je l'avoue, ne me déplaît pas : *quia illa planta pudendi muliebris pilos quodam modo referat.* Le savant Théis, plus discret (car le lecteur français veut être respecté), se contente de voir dans les cheveux de Vénus une allusion aux tiges luisantes et fines de l'adiante.

La fructification se compose de petites graines contenues dans des capsules situées au sommet des découpures des folioles, dont les bords se replient en dessous pour les envelopper (3).

Est-ce à des qualités physiques très-prononcées, à des vertus énergiques ou variées, que le capillaire doit sa grande réputation et l'usage presque général qu'on en fait? Non, sans doute; car il imprime sur la langue une sensation très-légère d'amertume et de stypticité; il répand un arôme agréable, mais faible, qui, pourtant, s'exalte par l'action de l'eau bouillante. Cette infusion édulcorée forme une boisson que les médecins prescrivent dans le catarrhe pulmonaire, et que les malades prennent avec plaisir.

Tout le monde connaît le sirop de capillaire; on le trouve chez les confiseurs et dans les cafés, comme sur les tablettes des officines pharmaceutiques. L'illustre Fourcroy, que je prendrai pour guide, enseigne la manière de le préparer convenablement et suivant l'art:

« Prenez une once de capillaire le mieux conservé et le plus odorant; faites-le infuser pendant douze heures avec quatre livres d'eau bouillante, dans un vaisseau fermé. Passez la liqueur avec expression; battez quelques blancs d'œufs avec un peu de cette infusion, et délayez-y quatre livres de cassonade. Versez cette masse épaisse dans le reste de la liqueur; agitez bien le mélange; soumettez-le à l'ébullition; écumez à deux ou trois reprises; faites cuire jusqu'à ce que le sirop se ride légèrement dans une cuiller en soufflant à sa surface; coulez-le tout bouillant sur du capillaire haché dans un vase que vous clorez bien; et quand il sera refroidi, passez-le au travers d'une étamine, et renfermez-le dans des bouteilles. On obtient par ce procédé un sirop parfumé, supérieur en qualité à celui si renommé de Montpellier, qui s'y prépare en faisant infuser sur le capillaire du sirop de sucre ordinaire: quelquefois on ajoute un peu d'eau de fleurs d'oranger. »

Fourcroy vante prodigieusement le sirop de capillaire: c'est, dit-il, un béchique adoucissant et relâchant; on l'emploie avec succès dans les rhumes, la toux sèche, les douleurs et l'ardeur de la poitrine, l'âcreté et le sentiment de déchirure qui souvent attaque le larynx et le pharynx; il facilite l'expectoration, diminue la sécheresse et la violence de la toux; et son usage est d'autant plus précieux qu'il rend les boissons plus agréables en augmentant leurs propriétés médicamen-

(3) Tournefort a très-bien décrit et figuré cette fructification singulière, dans son excellent ouvrage intitulé: *Institutiones rei herbariæ*; 1719: tome 1, page 543, et tome 3, tab. 317.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0236-6
DFG

teuses. C'est en quelque sorte un édulcorant général, qui sert aussi à incorporer les poudres destinées à former des pilules, des confections, des opiats; il entrait dans le loch de poumons de renard, de Mesué, dans le loch savonneux de la Pharmacopée d'Edimbourg, dans le sirop de guimauve de Fernel.

Le capillaire de Canada, *adiantum pedatum*, L., est plus délicat, plus élégant que celui de Montpellier; il est aussi plus odorant. Il se multiplie, dit-on, si prodigieusement en Amérique, que les commerçans en garnissent leurs marchandises, au lieu de foin, pour les expédier dans les pays éloignés.

CAMPO (benoît del), *Exercitatio græca pariter et latina super adianto, medicis et pharmacopœis admodùm proficua.* — Cette Dissertation est réunie au *Commentariolus de lumine*, du même auteur; in-8°. *Granatæ*, 1544.

FORMI (pierre), Traité de l'adianton ou cheveu de Vénus, contenant la description, les utilités et les diverses préparations de cette plante; in-12. Montpellier, 1644.

L'auteur exalte jusqu'au ridicule les vertus prodigieuses du capillaire; il en fait une vraie panacée.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 94.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Feuille grandie, dont les bords repliés en forme de lunules, servent d'involucre et portent un certain nombre de capsules.
2. Sommet de feuille dont on a relevé le bord, afin de faire voir la situation des capsules.
3. Une capsule grossie.
4. Graines ou psorules contenues dans les capsules.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0237-2 DFG

Turpin P. Lambert Jr sculp.

CAPRIER.

a. b. c.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0240-6
DFG

XCV.

CAPRIER.

Grec	ΚΑΠΠΑΡΙΣ.
Latin	CAPPARIS ; Bauhin, Pinax, lib. 12, sect. 4 ; Tournefort, class. 6, rosacées.
	CAPPARIS SPINOSA ; *pedunculis unifloris, solitariis, aggregatis spinis foliis annuis, capsulis ovalibus* ; Linné, class. 13, *polyandrie monogynie* (1). Jussieu, ord. 13, gen. 4, *caprier*.
Italien	CAPPERO ; CAPPARO.
Espagnol	ALCAPARRO ; ALCAPARRA.
François	CAPRIER ; TAPENIER.
Anglais	CAPER-TREE.
Allemand	KAPPERNBAUM.
Hollandais	KAPPERBOOM.

On regarde généralement le caprier comme originaire de l'Asie, d'où il nous a été apporté par les colons grecs (1). Cet arbrisseau croît et prospère aujourd'hui dans toutes les contrées méridionales de l'Europe, telles que l'Espagne, l'Italie, le Languedoc, la Provence ; il se plaît le long des murs, bien exposés aux rayons du soleil, dans les endroits pierreux, dans les fentes des rochers.

La racine est grande, ligneuse, rameuse et revêtue d'une écorce épaisse. Les tiges nombreuses, disposées en touffe lâche et diffuse, ont deux ou trois pieds de longueur ; elles sont cylindriques et glabres.

Les feuilles sont alternes, entières, ovales-arrondies, lisses, vertes, soutenues par les pétioles qui ont à leur base deux épines courtes et crochues.

Les fleurs sont simples, axillaires, solitaires, portées sur de longs pédoncules simples ; elles présentent : un calice composé de quatre folioles ovales, coriaces, caduques ; une corolle formée de quatre pétales blancs, sous-orbiculaires, ouverts en rose ; des étamines très-nombreuses, très-longues, purpurines ; un style très-allongé, que termine un stigmate ovale.

(1) Je préfère, avec M. Turpin, la dénomination spécifique proposée par Persoon, à celle de *spinosa*, qui est donnée par impropriété ; en effet, plusieurs espèces de capriers sont armées d'épines crochues, tandis que celui qui nous occupe en est dépourvu. Introduit par la culture, et bien naturalisé dans quelques vignobles, comme l'a observé Gouan, sur les murailles à l'île d'Aix, etc. (Note du rédacteur botanique de l'Encyclopédie.)

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0242-8
DFG

XCV.

CAPRIER.

Grec.....	καππαρις.
Latin.....	CAPPARIS ; Bauhin, Πιναξ, lib. 12, sect. 4. Tournefort, clas. 6, *rosacees*.
	CAPPARIS SPINOSA ; *pedunculis unifloris, solitariis, stipulis spinosis foliis annuis, capsulis ovalibus* ; Linné, clas. 13, *polyandrie monogynie* (1). Jussieu, clas. 13, ord. 4, *capriers*.
Italien.....	CAPPERO ; CAPPARO.
Espagnol...	ALCAPARRO ; ALCAPARRA.
Français....	CAPRIER ; TAPENIER.
Anglais.....	CAPER-TREE.
Allemand...	KAPERNBAUM.
Hollandais..	KAPPERBOOM.

On regarde généralement le caprier comme originaire de l'Asie, d'où il nous a été apporté par des colons grecs (2). Cet arbrisseau croît et prospère aujourd'hui dans toutes les contrées méridionales de l'Europe, telles que l'Espagne, l'Italie, le Languedoc, la Provence ; il se plaît le long des murs, bien exposés aux rayons du soleil, dans les endroits pierreux, dans les fentes des rochers.

La racine est grande, ligneuse, rameuse, et revêtue d'une écorce épaisse. Les tiges nombreuses, disposées en touffe lâche et diffuse, ont deux ou trois pieds de longueur : elles sont cylindriques et glabres.

Les feuilles sont alternes, entières, ovales-arrondies, lisses, vertes, soutenues par des pétioles qui ont à leur base deux épines courtes et crochues.

Les fleurs sont amples, axillaires, solitaires, portées sur de longs pédoncules simples ; elles présentent : un calice composé de quatre folioles ovales, coriaces, caduques ; une corolle formée de quatre pétales blancs, sous-orbiculaires, ouverts en rose ; des étamines très-nombreuses, très-longues, purpurines ; un style très-allongé, que termine un stigmate ovale.

(1) Je préfère, avec M. Turpin, la dénomination spécifique *sativa*, proposée par Persoon, à celle de *spinosa*, qui est doublement impropre : en effet, plusieurs espèces de caprier sont armées de stipules spinescentes, tandis que celui qui porte le nom d'épineux devient inerme par la culture et l'est même naturellement dans quelques variétés, comme l'a observé Tournefort à l'île d'Antiparos, et Murray dans le jardin botanique de Gottingue.

(2) Beckmann, *Vorbeireitung zur Waarenkunde* : t. 1 ; 1793 ; p. 111. Murray, *Apparatus medicaminum* : tom. 2 ; 1794, pag. 378.

Le fruit est une silique pédiculée, charnue, qui, semblable à une baie pyriforme, renferme dans son parenchyme beaucoup de graines menues et blanchâtres, sub-réniformes.

C'est au mois de juillet que s'épanouissent les grandes et belles fleurs du caprier; mais si quelques-uns de ces arbrisseaux sont destinés à faire l'ornement des jardins, la plupart servent à des usages économiques. C'est surtout entre Marseille et Toulon qu'on voit des champs entiers couverts de capriers, cultivés avec des soins que couronne un succès constant. S'il n'entre point dans mon plan d'énumérer ces procédés agronomiques, très-exactement décrits par Miller, Beraud, Bernard, Rozier, Dutour, Mordant Delaunay, je dois faire connaître la manière de récolter et de préparer les câpres, qui, comme on le sait, ne sont autre chose que les boutons des fleurs du caprier non encore épanouies.

Les femmes et les enfans vont tous les matins recueillir ces boutons qui, dans leur état de fraîcheur, exhalent une faible odeur, et impriment sur la langue une saveur légèrement piquante. On les expose à l'ombre pendant trois ou quatre heures, jusqu'à ce qu'ils commencent à se flétrir, afin d'empêcher qu'ils ne s'ouvrent. On les met ensuite dans un vase qu'on remplit de vinaigre; on les couvre, et on les laisse ainsi pendant huit jours; on les retire alors; on les presse doucement, et on les remet dans de nouveau vinaigre, durant huit autres jours: on répète cette opération une troisième fois; puis on les sépare au moyen de plusieurs cribles percés de trous de divers diamètres. Les boutons les plus petits donnent les câpres les plus fermes, les plus délicates et les plus recherchées. Ce triage fait, on renferme les câpres dans des tonneaux avec du vinaigre, auquel parfois on ajoute du sel.

On préfère les câpres qui ont une belle couleur verte; certains marchands la leur communiquent à l'aide du cuivre, et deviennent, par cette sophistication coupable, de vrais empoisonneurs.

Telle précaution qu'on apporte dans la cueillette des boutons, il y en a toujours qui échappent et qui fleurissent; on les laisse venir à graine, et quand les capsules encore vertes sont grosses comme une olive, on les cueille et on les confit. Elles forment un mets agréable, comme les câpres, et sont appelées *cornichons de caprier* (3).

« Ces assaisonnemens, qui jouissent de propriétés excitantes, ne conviennent qu'aux estomacs faibles, aux personnes d'un tempérament muqueux, d'une constitution molle, et

(3) Maison, dans l'*Encyclopédie méthodique : Médecine;* tome 4, page 375.

chargées de beaucoup d'embonpoint: ils facilitent la digestion chez ces individus, et la retarderaient plutôt, en irritant l'estomac, chez les personnes délicates, nerveuses, à fibres sèches, mobiles, légèrement impressionnables (4). »

C'est pour fondre les obstructions abdominales, et surtout celles de la rate, qu'on a principalement vanté les câpres. Leur usage, joint à celui de l'eau des forgerons, a dissipé une induration splénique qui, pendant sept années, avait éludé les autres secours de l'art, s'il faut en croire Benivieni. Cette faculté désobstruante attribuée aux *boutons* du caprier, se retrouve plus puissante, plus énergique encore dans l'écorce de sa racine, qui est une des cinq apéritives mineures. « On la rencontre chez les droguistes en morceaux roulés, gros à peu près comme un tuyau de plume d'oie, et de l'épaisseur d'une ligne : elle est grise, quelquefois légèrement teinte d'une couleur vineuse, et garnie extérieurement de rides transversales peu saillantes; sa cassure est blanche, celluleuse, avec de petits points jaunâtres; elle a une saveur amère, piquante, et un peu âcre à la gorge; elle est inodore (Guersent). »

Jadis employée et préconisée par Forest, Pauli, Sennert, elle avait perdu presque toute sa renommée lorsque le docteur Tronchin la proposa comme un des meilleurs anthypocondriaques. Cette vogue passagère ne survécut point au médecin génevois, et l'écorce du caprier est retombée, peut-être à tort, en désuétude. On la prescrivait pulvérisée à la dose d'un gros, ou bien à celle d'une once infusée dans une livre d'eau. Elle entrait dans l'huile de scorpions composée, dans le sirop hydragogue de Charas; cuite, on l'appliquait tantôt sur l'estomac, pour ranimer la vitalité de cet organe, tantôt sur les vieux ulcères atoniques.

Le vinaigre dans lequel ont macéré les câpres a longtemps passé pour un bon résolutif, pour un astringent précieux.

(4) Guersent, dans le *Dictionaire des sciences médicales*, tome 4, page 41.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 95.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Bouton de fleur tel que l'on le cueille pour le confire dans le vinaigre, et connu sous le nom de câpre.
2. Fruit entier de grandeur naturelle.
3. Le même, coupé horizontalement.
4. Graine isolée.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0245-6

Turpin P. *Lambert Jne sculp*

CAPUCINE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0248-3
DFG

XCVI.

CAPUCINE.

Latin . . . . . { NASTURTIUM INDICUM *amplioris folio et majoris floris*, Tournefort, clas. 11, *monopetalæ*.
TROPÆOLUM *majus*; *foliis peltatis, subquinquelobis, petalis obtusis*; Linné, clas. 8, *octandria monogynia*, Jussieu, clas. 13, ord. 13, *geraines*.

Italien . . . . . NASTURZIO D'INDIA; ARTUZIA.
Espagnol . . . . CAPUCHINA; MASTUERZO DE INDIAS.
Français . . . . CAPUCINE.
Anglais . . . . INDIAN CRESS.
Allemand . . . . INDIANISCHE KRESSE; CAPUCINERKRESSE.
Hollandais . . . INDIAANSCHE KERS.
Suedois . . . . . INDIANSK KRASSE.

Originaire du Mexique et du Pérou, cette belle plante fait aujourd'hui l'ornement de nos jardins: contente elle y périt chaque année, tandis qu'elle est vivace dans son pays natal. Linné dit que elle fut introduite en Europe en 1684, par les soins de Jérôme Heyerumpf, naturaliste et apothicaire hollandais.

La racine est petite, fibreuse, blanchâtre, rampante.

Les tiges sont herbacées, cylindriques, glabres, succulentes. En fournissant un appui à ces tiges faibles et lourdes, on peut les faire monter à la hauteur de six à sept pieds, et en décorer les murs des bosquets, les berceaux, les terrasses, ainsi que les cours et les fenêtres des maisons.

Les feuilles sont très-nombreuses, alternes, planes, arrondies dans leur contour, à cinq lobes superficiels, attachées à leur centre en forme de bouclier, par un pétiole long, flexueux, qui s'entortille et les colle voisins à la manière des vrilles.

Les fleurs, grandes et belles, portées sur de longs pédoncules axillaires, se succèdent dans nos climats pendant tout l'été, et même jusqu'à l'entrée de l'hiver; dans les pays chauds, au contraire, la capucine demeure verte et fleurit toute l'année. Chaque fleur présente: un calice monophylle, caduc, divisé profondément en cinq découpures lancéolées, et terminé postérieurement par une sorte de capuchon (1); une superbe corolle, composée de cinq pétales obtus, de grandeur et de figure inégales, de couleur jaune orangé ou ponceau fort éclatant.

(1) La plante doit à cette conformation singulière le titre de *capucine*. Le nom générique *tropæolum* rappelle le casque et le bouclier dont les fleurs et les feuilles offrent l'image. Voici les propres expressions de l'immortel Linné: *Ita dixi herbam, cujus flortulani solent pyramidibus reticulatam extruere, per quem scandat planta, dum mente veterum repræsentat trophæa, seu signa victoriæ, sæpe foliis clypeos, et flores galeas auratas sanguine tinctas hastasque pertusas exhibentia.*

Turpin P. Jacobert Pcrip.

CAPUCINE.

XCVI.

CAPUCINE.

Latin	CARDAMINDUM *ampliori folio et majori flore;* Tournefort, clas. 11, *anomales.*
	TROPÆOLUM MAJUS ; *foliis peltatis, subquinquelobis, petalis obtusis ;* Linné, clas. 8, *octandrie monogynie,* Jussieu, clas. 13, ord. 13, *geraines.*
Italien	NASTURZIO D'INDIA ; ASTUZIA.
Espagnol	CAPUCHINA ; MASTUERZO DE INDIAS.
Français	CAPUCINE.
Anglais	INDIAN CRESS.
Allemand	INDIANISCHE KRESSE ; CAPUCINERKRESSE.
Hollandais	INDIAANSCHE KERS.
Suédois	INDIANSK KRÄSSE.

Originaire du Mexique et du Pérou, cette belle plante fait aujourd'hui l'ornement de nos jardins : toutefois elle y périt chaque année, tandis qu'elle est vivace dans son pays natal. Linné dit qu'elle fut introduite en Europe en 1684, par les soins de Jérôme Beverninck, naturaliste et diplomate hollandais.

La racine est petite, fibreuse, blanchâtre, rampante.

Les tiges sont herbacées, cylindriques, glabres, succulentes. En fournissant un appui à ces tiges faibles et lourdes, on peut les faire monter à la hauteur de six à sept pieds, et en décorer les murs des bosquets, les berceaux, les terrasses, ainsi que les cours et les fenêtres des maisons.

Les feuilles sont très-nombreuses, alternes, planes, arrondies dans leur contour, à cinq lobes superficiels, attachées à leur centre en forme de bouclier, par un pétiole long, flexueux, qui s'entortille sur les corps voisins à la manière des vrilles.

Les fleurs, grandes et belles, portées sur de longs pédoncules axillaires, se succèdent dans nos climats pendant tout l'été, et même jusqu'à l'entrée de l'hiver ; dans les pays chauds, dit Dutour, la capucine demeure verte et fleurit toute l'année. Chaque fleur présente : un calice monophylle, caduc, divisé profondément en cinq découpures lancéolées, et terminé postérieurement par une sorte de capuchon (1) ; une superbe corolle, composée de cinq pétales obtus, de grandeur et de figure inégales, de couleur jaune orangé ou ponceau fort écla-

(1) La plante doit à cette conformation singulière le titre de *capucine.* Le nom générique *tropæolum* rappelle le casque et le bouclier dont les fleurs et les feuilles offrent l'image. Voici les propres expressions de l'immortel Linné : *Ita dixi herbam, cum hortulani solent pyramidulum reticulatum extruere, per quem scandat planta, dum lepidè veterum repræsentat tropæos, seu statuas victoriales, ubi folia clypeos, et flores galeas auratas sanguine tinctas hastaque pertusas exhibent.*

tant, attachés au calice, alternes avec ses découpures, les deux supérieurs nus et striés à leur base de lignes pourpres, les trois intérieurs ayant les onglets ciliés.

Le fruit trilobé, consiste en trois capsules charnues réunies, convexes et sillonnées en dehors, angulaires à l'intérieur, et fixées à la base du style persistant; chacune d'elles renferme une graine ovoïde.

On doit à la fille du célèbre Linné la première observation d'un phénomène très-curieux. Dans les beaux jours d'été, vers le crépuscule du soir, au mois de juillet surtout, il sort des fleurs de la capucine une lumière vive comme l'éclair, et qui ressemble à une étincelle électrique. M. Braconot croit pouvoir attribuer ces petits éclairs qui s'échappent du voisinage des parties sexuelles de cette plante, à une production de phosphore qui brûle, et s'acidifie à mesure qu'il est formé. En effet, M. Braconot a trouvé dans la capucine non-seulement une quantité notable d'acide phosphorique, mais encore des phosphates de potasse et de chaux; il a démontré en outre la présence des carbonate, sulfate et muriate de potasse.

Toute la plante fraîche, et spécialement les fleurs, ont une saveur, une odeur et des propriétés fort analogues à celles du cresson; aussi la capucine est-elle souvent désignée par les titres de cresson d'Inde, cresson du Pérou, cresson du Mexique. Les jolies fleurs servent à orner les salades, et à en relever le goût. On confit au vinaigre les jeunes boutons et les fruits verts, comme ceux du caprier, qu'ils peuvent remplacer: Dutour assure même que les câpres-capucines sont plus parfumées. Toutefois, il importe d'observer que l'action médicamenteuse de ce cresson péruvien est très-inférieure à celle de nos cressons indigènes. Cependant on a préconisé le suc des feuilles de capucine, non-seulement à titre d'antiscorbutique, mais comme un précieux antiphthisique. MM. Roques et Biett remarquent judicieusement à ce sujet que le catarrhe pulmonaire ayant été confondu mille fois avec la phthisie, on doit ajouter peu de confiance à ces cures brillantes fastueusement prônées par des docteurs inhabiles et incapables de saisir le vrai caractère d'une maladie.

Si les fruits de la capucine donnent, à leur état de verdeur, un assaisonnement agréable, ils acquièrent en mûrissant et se desséchant, la faculté cathartique. Une jeune femme fut purgée cinq fois avec deux de ces capsules; un soldat robuste, qui en prit trois, éprouva six déjections alvines très-abondantes (2).

(2) Arnold, *Observ. phys. med.*, 1777; page 70.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0252-4
DFG

La petite capucine, *tropæolum minus*, se rapproche singulièrement de la grande par ses caractères botaniques, et peut servir aux mêmes usages. La plupart des naturalistes, Lamarck, Gilibert, Dutour, Delaunay, fixent à l'année 1580 l'introduction de cette plante en Europe. Cette date est évidemment fausse; car je lis dans un ouvrage de Monardès, médecin espagnol, qui mourut en 1578: *semen* floris sanguinei, *ex Peru delatum, terræ commisi, ut ejus elegantiam potiùs conspicerem, quam quòd ullâ medicâ facultate præditus sit.*

EXPLICATION DE LA PLANCHE 96.

(*La plante est représentée aux deux tiers de sa grandeur naturelle*)

1. L'un des trois pétales inférieurs, réduit à moitié de sa grandeur naturelle.
2. Calice et étamines.
3. Pistil de grandeur naturelle.
4. Fruit entier de grandeur naturelle.
5. Une des trois parties du fruit détachée.
6. Graine dépouillée de son péricarpe.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0253-0

Turpin. P.

Lambert Sc. sculp.

CARDAMINE.

CARDAMINE.

Grec	ΚΑΡΔΑΜΙΝΗ ; ὀξυβαφὶς ἄγριος, Dioscoride.
Latin	NASTURTIUM PRATENSE ; Bauhin, Pinax, clas. 3, sect. 9. CARDAMINE PRATENSIS ; Tournefort, clas. 5, *cruciformes*. CARDAMINE PRATENSIS ; *foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis subrotundis caulinis lanceolatis* ; Linné, clas. 15, *tetradynamia siliculosa*. Jussieu, clas. 13, ord. 3, *cruciferæ*.
Italien	CARDAMINA ; NASTURZIANTINA ; NASTURZIO SILVATICO ; CRESCIONE PRATENSE.
Espagnol . . .	CARDAMINE DE PRADOS.
Français	CARDAMINE ; CRESSON DES PRÉS ; CRESSON ÉLÉGANT ; CRESSON SAUVAGE ; CRESSON DES PRÉS.
Anglais	MEADOW CRESS ; MEADOW CRESS ; CUCKOW FLOWER.
Allemand . . .	WIESEN-KRESSE ; WIESEN-SCHAUMKRAUT.
Hollandais . .	WEIDE-KRES ; GEMEEN SCHUIMLAD ; KOEKLOOFS-BLOEM.
Suédois	MÄSKRASSE.

On trouve communément cette plante vivace dans les prairies basses et humides, dans les marécages, le long des fossés.

La racine est blanchâtre, dure, fibreuse.

La tige, droite, ordinairement simple, cylindrique, glabre, s'élève à la hauteur de quinze à vingt pouces.

Les feuilles sont alternes, ailées avec impaires; les radicales sont composées de cinq à neuf folioles obrondes, subunguleuses, et d'autant plus grandes qu'elles sont plus près du sommet de la feuille. Les folioles des feuilles caulinaires sont plus nombreuses, étroites, lancéolées, et même linéaires à mesure qu'elles deviennent supérieures.

Les fleurs sont grandes, blanches, avec une teinte purpurine plus ou moins remarquable, et disposées en corymbe ou en bouquet lâche et terminal (1); chacune d'elles présente : un calice de quatre folioles légèrement ouvertes ; une corolle formée de quatre pétales en croix, ovales-arrondis, veinés, et beaucoup plus grands que le calice ; six étamines, insérées sur le réceptacle, dont quatre sont un peu plus longues que les deux autres, à anthères arquées et sagittées, un ovaire supérieur, dépourvu de style, et surmonté d'un stigmate en tête obtuse.

(1) Lamarck, dans l'*Encyclopédie méthodique : Botanique*, tome 2, page 184.

CARUXANA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0258-9
DFG

XCVII.

CARDAMINE.

Grec..... καρδαμινη ; σισυμβριον ετερον, Dioscoride.

Latin..... NASTURTIUM PRATENSE ; Bauhin, Πιναξ, clas. 3, sect. 2.
CARDAMINE PRATENSIS ; Tournefort, clas 5, *cruciformes*.
CARDAMINE PRATENSIS ; *foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis ;* Linné, clas. 15, *tetradynamie siliqueuse*. Jussieu, clas. 13, ord. 3, *cruciferes*.

Italien..... CARDAMINA ; CARDAMANTINA ; NASTURZIO SELVACCIO ; CRESCIONE PRATENSE.

Espagnol... CARDAMINE DE PRADOS.

Français.... CARDAMINE ; CRESSON DES PRÉS ; CRESSON ÉLÉGANT ; CRESSON SAUVAGE ; PASSERAGE SAUVAGE.

Anglais.... MEADOW LADIES SMOCK ; MEADOW CRESSES ; CUCROW FLOWER.

Allemand... WIESENKRESSE ; WIESEN-SCHAUMKRAUT.

Hollandais.. WEIDE-KERS ; GEMEEN SCHUIMBLAD ; KOEKKOES-BLOEM.

Suédois..... ÆNGKRASSE.

On trouve communément cette plante vivace dans les prairies basses et humides, dans les marécages, le long des fossés.

La racine est blanchâtre, dure, fibreuse.

La tige, droite, ordinairement simple, cylindrique, glabre, s'élève à la hauteur de quinze à vingt pouces.

Les feuilles sont alternes, ailées avec impaire; les radicales sont composées de cinq à neuf folioles obrondes, subanguleuses, et d'autant plus grandes qu'elles sont plus près du sommet de la feuille. Les folioles des feuilles caulinaires sont plus nombreuses, étroites, lancéolées, et même linéaires à mesure qu'elles deviennent supérieures.

Les fleurs sont grandes, blanches, avec une teinte purpurine plus ou moins remarquable, et disposées en corymbe ou en bouquet lâche et terminal (1); chacune d'elles présente : un calice de quatre folioles légèrement ouvertes ; une corolle formée de quatre pétales en croix, ovales-arrondis, veinés, et beaucoup plus grands que le calice ; six étamines, insérées sur le réceptacle, dont quatre sont un peu plus longues que les deux autres, à anthères arquées et sagittées, un ovaire supérieur, dépourvu de style, et surmonté d'un stigmate en tête obtuse.

(1) Lamarck, dans l'*Encyclopédie méthodique : Botanique ;* tome 2, page 184.

Le fruit est une silique allongée, linéaire, comprimée, à deux valves qui s'ouvrent avec facilité en se roulant sur elles-mêmes de bas en haut, et divisée par une cloison en deux loges qui renferment des graines nombreuses et arrondies.

Des traits frappans de ressemblance rapprochent et confondent, pour ainsi dire, la cardamine avec le cresson. Les anciens désignaient ces plantes par les mêmes noms ou par des noms prodigieusement analogues (2). Ils ont été imités par les modernes, comme on peut s'en convaincre en jetant un coup-d'œil sur la synonymie. Les jeunes feuilles de la cardamine offrant l'odeur du cresson et la saveur piquante qui plaît dans cette crucifère, pourraient également se manger en salade. Cependant elles sont rarement employées à cet usage, et plus rarement encore prescrites par les médecins, à titre d'antiscorbutiques. Heberden prétend que les fleurs calment les douleurs de la goutte, et Georges Baker exalte les vertus antispasmodiques de ces fleurs pulvérisées, et administrées à la dose d'un scrupule à un gros par jour. J'ai peine à croire aux guérisons d'hystérie, d'asthme, de chorée, de dysphagie, *mentionnées* par le docteur anglais, surtout quand je vois les fleurs extrêmement peu actives de la cardamine tromper l'espoir des praticiens les plus distingués.

Les moutons et les chèvres aiment à brouter cette plante, que les vaches, les chevaux et les cochons négligent (3); les abeilles et la phalène aurore vont puiser le suc de ses fleurs.

(2) Καρδαμον, cresson ; καρδαμινη, plante analogue au cresson, plante cressonnée. Cette étymologie me paraît si naturelle, si évidente, que je ne conçois pas pourquoi le savant philologue Théis préfère dériver le mot *cardamine* de καρδια, cœur, et δαμαω, je dompte ; à cause de la qualité fortifiante et stomachique de cette crucifère.

(3) Willich, *Domestic encyclopædia*, tome 3 ; 1802, page 58.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 97.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Racine et feuille radicale.
2. Calice, pistil et étamines grossis.
3. Silique ou fruit de grandeur naturelle.
4. Le même, ayant ses deux battans roulés en spirale.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0260-8
DFG

Turpin. P *Lambert Jr. sculp.*

CARLINE.

a. l. l.

XCVIII.

CARLINE.

Grec	χαμαιλεων λευκος; ιξια.
Latin	CARLINA *vulgo*, *magno flore*; Bauhin, Pinax, lib. 10, sect. 6. Tournefort, clas. 14. *radiées*.
	CARLINA *acaulis*, *caule uniflora*, *flore breviore*; Linné, clas. 19, *synigénèse polygamie égale*. Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cinarocéphales*.
Italien	CARLINA.
Espagnol . . .	CARLINA.
Français	CARLINE.
Anglais	CARLINE, CAROLINE THISTLE.
Allemand . . .	EBERWURREL.
Hollandais . .	EVER WORTEL.

Cette plante vivace croît dans les climats chauds et les lieux élevés. On la trouve sur les montagnes de l'Italie, de la Suisse, du Languedoc et de la Provence; elle a été recueillie par Lamarck en Auvergne, dans les environs de Clermont et de Murat, sur les collines sèches.

La racine, épaisse, oblongue, subfusiforme, garnie de quelques fibres éparses, rousse à l'extérieur, blanche-jaunâtre intérieurement, pénètre dans le sol jusqu'à la profondeur de huit à dix pouces.

Les feuilles partent immédiatement de la racine. Étalées sur la terre en une large rosette d'un pied de rayon, elles sont simples, lancéolées, épineuses en leurs bords, lacinées et presque ailées.

La fleur, composée flosculeuse, très-remarquable par sa largeur de quatre à cinq pouces, ne l'est pas moins par sa position solitaire, sessile au centre de la rosette formée par les feuilles, elle présente un calice commun, ventru, imbriqué, composé d'écailles lâches, pointues, dont les intérieures, fort longues, lancéolées, légèrement purpurines vers leur base, blanches supérieurement, imitent une couronne radiée, tandis que les extérieures sont courtes et épineuses; les corolles sont des fleurons tous hermaphrodites, tubulés, quinquéfides, réguliers, posés sur un réceptacle épais chargé de paillettes, et entourés par le calice commun.

Le fruit consiste en plusieurs graines subcylindriques, couronnées d'une aigrette plumeuse, et environnées par le calice persistant.

« Dans les Basses-Alpes, dit M. Bosc (1), on donne aux carlines le nom vulgaire de *chardousses*, et celui de *loques* dans les Cévennes. Partout où elles se trouvent, les habitans

(1) *Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*, tom. 4; 1803, pag. 357.

Turpin. P. Lambert. F. sculp.

CARLINE.

XCVIII.

CARLINE.

Grec . . . . . χαμαιλεων λευκος ; ιξια.

Latin . . . . . CARLINA ACAULOS, *magno flore ;* Bauhin, Πιναξ, lib. 10, sect. 6. Tournefort, clas. 14. *radiées.*
CARLINA ACAULIS, *caule unifloro, flore breviore ;* Linné, clas. 19, *syngénésie polygamie égale.* Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cinarocéphales.*

Italien . . . . . CARLINA.

Espagnol . . . CARLINA.

Français . . . . CARLINE.

Anglais . . . . CARLINE ; CAROLINE THISTLE.

Allemand . . . EBERWURZEL.

Hollandais . . EVERWORTEL.

Cette plante vivace aime les climats chauds et les lieux élevés : on la trouve sur les montagnes de l'Italie, de la Suisse, du Languedoc et de la Provence ; elle a été recueillie par Lamarck en Auvergne, dans les environs de Clermont et de Murat, sur les collines sèches.

La racine, épaisse, oblongue, subfusiforme, garnie de quelques fibres éparses, rousse à l'extérieur, blanche-jaunâtre intérieurement, pénètre dans le sol jusqu'à la profondeur de huit à dix pouces.

Les feuilles partent immédiatement de la racine. Étalées sur la terre en une large rosette d'un pied de rayon, elles sont simples, dentées, épineuses en leurs bords, laciniées et presque ailées.

La fleur, composée-flosculeuse, très-remarquable par sa largeur de quatre à six pouces, ne l'est pas moins par sa position ; solitaire, sessile au centre de la rosette formée par les feuilles, elle présente : un calice commun, ventru, imbriqué, composé d'écailles lâches, pointues, dont les intérieures, fort longues, lancéolées, légèrement purpurines vers leur base, blanches supérieurement, imitent une couronne radiée, tandis que les extérieures sont courtes et épineuses ; les corolles sont des fleurons tous hermaphrodites, tubulés, quinquéfides, réguliers, posés sur un réceptacle épais chargé de paillettes, et entourés par le calice commun.

Le fruit consiste en plusieurs graines subcylindriques, couronnées d'une aigrette plumeuse, et environnées par le calice persistant.

« Dans les Basses-Alpes, dit M. Bosc (1), on donne aux carlines le nom vulgaire de *chardousses*, et celui de *loques* dans les Cévennes. Partout où elles se trouvent, les habitans

(1) *Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle*, tom. 4 ; 1803, pag. 357.

en mangent les réceptacles comme ceux des artichauts, auxquels ils ne sont point inférieurs en bon goût, et qu'ils surpassent très-souvent en grosseur. On les sèche pour l'hiver; mais ces plantes, dont la nature est prodigue dans les lieux qui leur conviennent, ne souffrent que difficilement la culture, et inutilement on a tenté plusieurs fois de les introduire dans les jardins même de leur climat. »

Recherchée par les chèvres, la carline est négligée par les vaches et les autres bestiaux. Ses fleurs, s'épanouissant par un temps sec, et se fermant lorsque l'atmosphère est humide, sont un hygromètre naturel (2); desséchées, elles caillent assez bien le lait, comme celles de la plupart des chardons (3).

Toutefois, c'est uniquement la racine dont les vertus merveilleuses ont été fastueusement célébrées. La carline doit même sa dénomination à sa propriété alexipharmaque révélée par un ange à Charlemagne, qui préserva et guérit ainsi de la peste une grande partie de son armée (4). Administrée par des mains profanes et vulgaires, la carline mérite à peine d'occuper un des derniers rangs parmi les plantes médicamenteuses. Douée d'une saveur piquante non désagréable, et d'une odeur aromatique, imprégnée d'une huile essentielle assez pesante, elle produit sur l'organisme animal une excitation médiocre, qui n'a rien de particulier. Le professeur Gilibert en fait un éloge que l'expérience est loin de justifier. La prédilection de ce médecin distingué pour les substances indigènes, l'entraîne au delà du but. Il dit que l'infusion vineuse de carline s'est montrée utile dans le rhumatisme, les dartres, la gale, l'anorexie, les flatuosités, la suppression des règles; elle a ranimé les malades et accélère la crise des fièvres intermittentes et rémittentes atoniques. La dose est de trois à quatre gros infusés dans l'eau, et plus communément digérés dans le vin. Quand on l'administre en substance, deux gros de cette racine pulvérisée suffisent. Elle entre dans la thériaque, l'orviétan, l'essence alexipharmaque de Sthal, et autres préparations pharmaceutiques analogues, appelées, à juste titre, monstrueuses par Chaptal.

(2) Willich, *The domestic Encyclopædia*; 1802, tome 1, page 436.
(3) Peyrilhe, *Tabl. méth. d'un cours d'hist. nat. méd.*; 1804, page 394.
(4) Les glossateurs ne sont pas d'accord sur cette fable: quelques-uns attribuent la guérison miraculeuse à Charles-Quint; il en est même qui ont la témérité de révoquer en doute, et qui mieux est, de nier formellement la vision angélique!

EXPLICATION DE LA PLANCHE 98.

(*La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Fleuron de grandeur naturelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0266-3
DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CAROTTE.

a. l. l.

XCIX.

CAROTTE.

Grec	
Latin	DAUCUS SYLVESTRIS TENUIFOLIA SYLVESTRIS DIOSCORIDIS, vel DAUCUS OFFICINARUM. Bauhin, Hist., lib. 4 sect. 4. DAUCUS VULGARIS; Tournefort, clas. 7, *ombellifères*. DAUCUS CAROTA; *foliolis hispidis, petiolis subtùs nervosis*; Linné, clas. 5 *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 12 ord. 2, *ombellifères*.
Italien	CAROTA; DAUCO.
Espagnol	ZANAHORIA.
Français	CAROTTE.
Anglais	CARROT; BIRD'S NEST.
Allemand	MOHRE; MOHRRUBEN; VOGELNEST; KAROTTE.
Hollandais	PEEN; VOGELNEST; KAROTE.
Suédois	MORÖT.
Polonais	MARCHEW.

Il est certain que la culture améliore, perfectionne la carotte sauvage, sans altérer notablement ses caractères botaniques. Toutefois, cette dernière étant la souche primitive, et en quelque sorte le type original de la plante, c'est elle que je vais décrire. On la trouve communément dans les prés, sur le bord des champs et le long des chemins.

La racine, blanche-jaunâtre, dure, grêle, fusiforme, s'enfonce profondément dans le sol, jetant çà et là quelques ramuscules.

La tige, herbacée, rameuse, légèrement cannelée, chargée de poils courts, s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds.

Les feuilles, amplexicaules, grandes, molles, deux ou trois fois ailées, ont leurs folioles partagées en découpures très-étroites et pointues.

Les fleurs sont disposées en ombelles doubles, qui, blanches, pendant la floraison, se contractent et deviennent concaves à mesure que le fruit approche de sa maturité (x). L'ombelle générale est munie d'une collerette dont les folioles sont laciniées; celles de la collerette de l'ombellule sont plus simples. Chaque fleur présente: cinq pétales, blancs ou rougeâtres, cordiformes, les extérieurs plus grands; cinq étamines, dont les filamens portent les anthères simples; un ovaire inférieur, chargé de deux styles courts.

(x) C'est par allusion à la forme de cette concavité, que les Anglais, les Allemands et les Hollandais ont nommé la carotte nid d'oiseau, *bird's nest*, *vogelnest*.

CAROTTE.

XCIX.

CAROTTE.

Grec..... δαυκος.

Latin..... PASTINACA TENUIFOLIA SYLVESTRIS DIOSCORIDIS, vel DAUCUS OFFICINARUM ; Bauhin, Πιναξ, lib. 4 sect 4.
DAUCUS VULGARIS ; Tournefort, clas. 7, *ombellifères.*
DAUCUS CAROTA ; *seminibus hispidis, petiolis subtùs nervosis ;* Linné, clas. 5, *pentandrie digynie.* Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères.*

Italien..... CAROTA ; DAUCO.
Espagnol... ZANAHORIA.
Français.... CAROTTE.
Anglais.... CARROT ; BIRD'S NEST.
Allemand... MŒHRE ; MOHRRUEBE ; VOGELNEST ; KAROTTE.
Hollandais.. PEEN ; VOGELNEST ; KAROTE.
Suédois..... MOROT.
Polonais.... MARCHEW.

Il est certain que la culture améliore, perfectionne la carotte sauvage, sans altérer notablement ses caractères botaniques. Toutefois, cette dernière étant la souche primitive, et en quelque sorte le type originel de la plante, c'est elle que je vais décrire. On la trouve communément dans les prés, sur le bord des champs et le long des chemins.

La racine, blanche-jaunâtre, dure, grêle, fusiforme, s'enfonce profondément dans le sol, jetant çà et là quelques ramuscules.

La tige, herbacée, rameuse, légèrement cannelée, chargée de poils courts, s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds.

Les feuilles, amplexicaules, grandes, molles, deux ou trois fois ailées, ont leurs folioles partagées en découpures très-étroites et pointues.

Les fleurs sont disposées en ombelles doubles, qui, planes, pendant la floraison, se contractent et deviennent concaves à mesure que le fruit approche de sa maturité (1). L'ombelle générale est munie d'une collerette dont les folioles sont laciniées ; celles de la collerette de l'ombellule sont plus simples. Chaque fleur présente : cinq pétales, blancs ou rougeâtres, cordiformes, les extérieurs plus grands ; cinq étamines, dont les filamens portent les anthères simples ; un ovaire inférieur, chargé de deux styles courts.

(1) C'est par allusion à la forme de cette concavité, que les Anglais, les Allemands et les Hollandais ont nommé la carotte nid d'oiseau : *bird's nest ; vogelnest.*

Le fruit, ovoïde, se partage en deux graines aplaties d'un côté, convexes de l'autre, hérissées de nombreux poils rudes.

C'est au zèle de la société établie à Londres pour l'encouragement des arts, dit Dutour (2), qu'on doit la culture en grand de la carotte. Comme elle pivotte beaucoup, elle n'épuise point la superficie du terrain, et par conséquent ne peut nuire aux blés ni aux grains de toute espèce qui sont semés après elle. Cette plante fournit aux bestiaux une nourriture abondante et substantielle (3). Les bœufs, les moutons, les chevaux et les porcs mangent la racine avec plaisir; elle les engraisse, les maintient en santé, et les rétablit promptement après la maladie; le lait des vaches en est augmenté et rendu meilleur, ainsi que le beurre. Miller assure (4) qu'un arpent de terre ensemencé de carottes donne plus de fourrage que trois arpens de navets aux moutons, aux cochons et aux bœufs, dont la chair devient en outre plus ferme et plus savoureuse. Ces animaux broutent aussi le jeune feuillage; mais après la floraison ils sont repoussés par l'aspérité des tiges et des graines de cette ombellifère, que, pour cette raison, Brugmans regarde comme nuisible aux prairies (5).

L'agronome Walford est dans l'usage de semer des carottes toutes les fois qu'il fait une plantation de pins ou d'arbres qui se dépouillent. En arrachant les carottes, on fait, selon lui, moins de tort aux petites racines des arbres qu'en labourant autour d'eux, et le vide qu'elles laissent se remplissant de la terre la plus meuble, les racines encore tendres des jeunes arbres poussent avec plus de facilité (6).

Il existe plusieurs variétés de carotte, qui se distinguent surtout par la couleur. En France, on préfère la jaune: la blanche craint moins l'humidité; la plus recherchée en Hollande est celle d'un rouge vif, appelée communément carotte de Hoorn (7); les Anglais accordent la prééminence à la carotte orange.

Je connais peu de légumes plus agréables et plus salubres que la carotte, qui tantôt se mange seule, et tantôt parfume et assaisonne les autres alimens. Marggraf en a retiré un sirop ou miel excellent, qui pourtant a refusé de se cristalliser en sucre. Séchée et réduite en poudre, la racine de carotte est utile aux voyageurs, et peut entrer, sous cette forme, dans

(2) *Nouveau Dictionaire d'hist. nat.*; tome 4 (1803), page 369.
(3) R. Billing, *An account of carrots, and their great use in feeding and fattening cattle*; in 8°. *London*, 1765.
(4) *The abridgment of the gardeners dictionary*; 1763.
(5) Kops, *Flora Batava.*
(6) Dutour, dans le *Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle.*
(7) Kops, *Flora Batava.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0272-5
DFG

les potages et dans les ragoûts. On en fait un pain de qualité médiocre ; suivant Mattuschka : Forster, Hunter et Hornby en ont retiré de bonne eau-de-vie.

Aux environs de Dusseldorf, d'Elberfeld, dans le canton du Léman et ailleurs, on rôtit la racine de carotte pour la mêler au café en diverses proportions.

Il faut bien parler des propriétés médicinales de la carotte, puisqu'elles ont été fastueusement exaltées. Rosen et Van den Bosch la disent vermifuge ; Lacroix compose avec le suc de cette racine un sirop que je croirais volontiers utile dans certaines dysenteries. La carotte est un des lithontriptiques accumulés dans la rapsodie de Théophile Lobb (8). Mais elle a surtout été célébrée pour la guérison des ulcères putrides, scrophuleux, scorbutiques et cancéreux, par Sulzer, Michaelis, et tout récemment par M. Bouillon-Lagrange, qui l'administre à l'intérieur et à l'extérieur. Déjà l'illustre Arétée l'avait employée avec succès contre l'éléphantiase. Le docteur Bridault, de la Rochelle, voyait dans la carotte une véritable panacée (9). Observateur plus judicieux, M. Montègre pense qu'elle mérite à peine d'occuper une place dans les officines pharmaceutiques (10). Sa graine, aromatique, est une des quatre semences chaudes mineures : elle communique à la bière une saveur piquante et une qualité supérieure. Son infusion théiforme est une boisson stimulante, dont les Anglais font un usage fréquent. L'huile essentielle qu'on en retire par la distillation était regardée jadis comme un excellent diurétique, un précieux emménagogue. Ces vertus éminentes n'ont point été confirmées par l'expériences des pharmacologistes modernes.

(8) *A treatise on dissolvents of the stone ;* 1639.
(9) Traité sur la carotte, et Recueil d'Observations sur l'usage et les effets salutaires de cette plante dans les maladies externes et internes.
(10) *Gazette de santé ;* 1 janvier 1816, page 4.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 99.

(*La plante est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle*)

1. Racine réduite.
2. Fleur entière grossie.
3. Fruit entier grossi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0273-1
DFG

Turpin P. Lambert N. sculp.

CAROUBIER.

all.

CAROUBIER.

Grec . . . . . κερατία? κερατωνία.

Latin. . . . . { SILIQUA DULCIS : Bauhin. Theat. lib. 12, sect. 2. Tournef. class. 18, *arbres apétales.*
CERATONIA SILIQUA : Linn. class. 22, *polygamie triocie* Juss. ord. 11, *légumineuses.*

Italien . . . . CARRUBO; CARRUBIO; GUARNELLA.
Espagnol . . . ALGARROBO.
Français . . . CAROUBIER; CAROUGE.
Anglais . . . CARAB-TREE; LOCUST-TREE.
Allemand . . . KAROBBAUM; JOHANNISBROTBAUM, JOHANNISBROT. Gmelin.
Hollandais . . . KAROBEN-BOOM; KAAS-BROOD-BOOM.
Suédois . . . . JOHANNESBRÖD.

Connu de temps immémorial, mentionné dans les écrits les plus anciens, le caroubier croît en Orient, sous le beau ciel de l'Orient et dans les climats tempérés de l'Europe méridionale. On le rencontre sur les côtes de Barbarie, et Olivier dans l'île de Chypre, il se plaît beaucoup sur les terrains pierreux et dans les fentes des rochers.

C'est, dit Lamarck, un arbre de grandeur médiocre, toujours vert, dont la cime est étalée comme celle du pommier, les rameaux nombreux, et le tronc raboteux à écorce brune. Ses feuilles sont ailées sans impaire et composées de six ou huit folioles ovales-oblongues, lisses, fermes, coriaces, presque semblables, glabres, luisantes, alternes et persistantes. Les fleurs [illegible] nues, irrégulières, et dans l'aisselle des feuilles supérieures, disposées en grappes courtes, serrées, qui ressemblent à des épis. Elles sont tantôt mâles, tantôt hermaphrodites; celles-ci portent un petit calice divisé à cinq divisions; une petite charnu, quinquelobé, occupant le milieu de la fleur; cinq étamines, dont les longs filaments, opposés aux divisions du calice, portent des anthères didymes; un ovaire supérieur, ayant au centre du disque, surmonté d'un style simple, que termine un stigmate légèrement capité.

Le fruit est une sorte de silique, ou plutôt une gousse, longue de six à huit pouces, obtuse, aplatie, communément arquée (1), lisse, épaisse en ses bords, divisée intérieurement

(1) Frappés de la ressemblance de ce fruit avec les cornes de divers animaux, les Grecs donnèrent à l'arbre le nom de κερατωνία, que lui a conservé Linné: de κερας, génitif, κερατος, corne. J'ajouterai que κερατιον signifie également *petite corne* et *silique*; ces deux objets ont en effet beaucoup d'analogie, je dirais presque une similitude parfaite.

CAROUBIER.

C.

CAROUBIER.

Grec	κερατια ; κερατωνια.
Latin.....	SILIQUA EDULIS ; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 2. Tournefort, clas. 18, *arbres apétales.*
	CERATONIA SILIQUA ; Linné, clas. 23, *polygamie triœcie.* Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses.*
Italien	CARRUBO ; CARRUBIO ; GUAINELLA.
Espagnol ...	ALGARROBO.
Français. ...	CAROUBIER ; CAROUGE.
Anglais	CAROB-TREE ; JOHN'S BREAD-TREE.
Allemand ..	KAROBBAUM ; JOHANNISBRODBAUM, SODBRODRAUM. Gmelin.
Hollandais ..	KAROBEN-BOOM ; JANS-BROOD-BOOM.
Suédois.....	JOHANNISBRÖD.

Connu de temps immémorial, mentionné dans les écrits les plus antiques, le caroubier croît et prospère sous le beau ciel de l'Orient et dans les climats tempérés de l'Europe. M. Poiret l'a fréquemment rencontré sur les côtes de Barbarie, et Olivier dans l'île de Crète. Il se plaît beaucoup sur les terrains pierreux et dans les fentes des rochers.

C'est, dit Lamarck, un arbre de grandeur médiocre, toujours vert, dont la cime est étalée comme celle du pommier, les branches tortueuses, et le tronc raboteux à écorce brune.

Les feuilles sont ailées sans impaire et composées de six ou huit folioles ovales-obtuses, lisses, fermes, coriaces, presque sessiles, vertes en dessus, veineuses et pâles en dessous.

Les fleurs viennent sur la partie nue des branches et dans l'aisselle des feuilles en petites grappes, d'abord pourpres, puis blanchissant à mesure qu'elles approchent de la maturité : elles sont tantôt unisexuelles, tantôt hermaphrodites ; celles-ci présentent : un petit calice ouvert à cinq divisions ; un disque charnu, quinquélobé, occupant le milieu de la fleur ; cinq étamines, dont les longs filamens, opposés aux divisions du calice, portent des anthères didymes ; un ovaire supérieur, situé au centre du disque, et surmonté d'un style simple, que termine un stigmate légèrement capité.

Le fruit est une sorte de silique, ou plutôt une gousse, longue de six à huit pouces, obtuse, aplatie, communément arquée (1), lisse, épaisse en ses bords, divisée intérieurement

(1) Frappés de la ressemblance de ce fruit avec les cornes de divers animaux, les Grecs donnèrent à l'arbre le nom de κερατωνια, que lui a conservé Linné : de κερας, génitif, κερατος, corne. J'ajouterai que κερατιον signifie également *petite corne* et *silique* ; ces deux objets ont en effet beaucoup d'analogie, je dirais presque une similitude parfaite.

par des cloisons transversales, en plusieurs loges, dont chacune contient, dans une pulpe succulente, une graine elliptique, comprimée, dure et luisante (2).

Toutes les parties du caroubier sont utiles. Son bois, très-dur, veiné, d'un beau rouge foncé, est propre aux ouvrages de menuiserie et de marqueterie : mais il est sujet à se carier lorsque l'arbre vieillit ; l'aubier, d'ailleurs, est trop considérable et trop tendre ; les feuilles et l'écorce servent au tannage (3).

Acerbe quand il est vert, le fruit du caroubier acquiert par la maturité une saveur très-douce ; Proust en a même retiré un véritable sucre. J'ai vu vendre ces gousses à vil prix aux marchés de Venise et de Padoue, et j'en ai souvent mangé avec plaisir, sans éprouver ni diarrhées ni coliques ; les Maures en font une immense consommation ; elles sont si communes dans certains pays, qu'on s'en sert pour nourrir les pauvres et engraisser les bestiaux. Je vois même avec surprise, que dès les temps les plus reculés, ce fruit n'était point estimé ce qu'il vaut. Pour exprimer l'état de misère auquel était réduit l'enfant prodigue, Luc l'évangéliste le représente mendiant des caroubes, *qui sont la nourriture ordinaire des pourceaux* (4).

Les Égyptiens extraient de ces gousses une sorte de miel, et les emploient pour confire les tamarins et les myrobolans : mêlées avec la racine de réglisse, le raisin sec et d'autres fruits, elles forment la base des sorbets, dont les Musulmans font un usage journalier.

La pulpe des caroubes, nommées dans les pharmacies *siliquæ dulces*, est administrée comme béchique, et Jœrdens prétend avoir guéri, par ce moyen, des toux convulsives extrêmement opiniâtres. Elles entrent dans le sirop diacode, ainsi que dans la décoction pectorale de la Pharmacopée de Wirtemberg.

(2) A.-J. Cavanilles a tracé une Description très-intéressante de cet arbre dans le second volume de son bel ouvrage intitulé, *Icones et descriptiones plantarum quæ aut sponte in Hispaniâ crescunt, aut in hortis hospitantur ;* in-fol. *Matriti*, 1791.

(3) Poiret, dans l'*Encyclopédie méthodique : Botanique ; supplément*, tome 2, page 119.

(4) Chap. 15, v. 16 : επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων, ων ησθιον οι χοιροι.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 108.

(*La figure que nous donnons est l'individu mâle, réduit au tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Fleur mâle de grandeur naturelle, composée d'un petit calice quinquépartite, d'un disque charnu, quinquélobé, au centre duquel est un pistil avorté, et de cinq longues étamines à anthères didymes.
2. Fleur hermaphrodite de grandeur naturelle.
3. Fleur simplement femelle.
4. Fruit, moitié grandeur naturelle, dont on a enlevé la moitié d'un des battans, afin de faire voir les loges et les graines.
5. Graine coupée horizontalement.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0281-5
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0283-7
DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CARVI.

a.l.l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0284-3
DFG

CARVI.

Grec	καρον. Dioscoride; καρδον. Aetius.
Latin	CUMINUM PRATENSE, CARVI OFFICINARUM; Bauhin, Hist., lib. 4, sect. 3.
	CARUI CASALPINI; Tournefort, clas. 7, *ombellifères*: CARUM CARVI; Linné, cles. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, cl. 12, ord. 2, *ombellifères* (1).
Italien	CARVI; CARO; COMINO TEDESCO.
Espagnol	ALCARAVEA.
Français	CARVI; CUMIN DES PRÉS.
Anglais	CARAWAY.
Allemand	MATTENKUMMEL; GEMEINER KUMMEL; WIESENKUMMEL; FELDKÜMMEL.
Hollandais	KERWEL.

Les anciens naturalistes et médecins grecs et romains ont souvent fait mention de cette plante bisannuelle, qu'ils ont nommée καρος, καρδον, *carum*, parce qu'elle croissait plus particulièrement dans la Carie, province de l'Asie. Elle est commune dans les prairies de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Suède et de la Pologne.

La racine est fusiforme, de la grosseur du pouce, et garnie de nombreuses fibrilles.

Les tiges, droites, fortes, cylindriques, glabres, striées, s'élèvent à la hauteur d'environ deux pieds, et fournissent une grande quantité de rameaux.

Les feuilles, alternes, amplexicaules, deux fois ailées, composées de folioles lancéolées, dont les folioles sont pinnatifides à découpures linéaires inégales; les feuilles radicales sont beaucoup moins finement découpées; leurs folioles, plus larges, se divisent seulement en lobes sinueux.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales: l'ombelle universelle, lâche, *inégale*, composée de huit à dix rayons inégaux, est garnie d'une collerette à une seule foliole, longue, sétacée; les ombellules sont courtes, ramassées, dépourvues de collerette; les cinq pétales, ouverts en rose, sont un peu échancrés à leur sommet.

(1) Il n'y a, peut-être pas une seule famille de plantes dans laquelle il soit plus difficile, que dans celle des ombellifères, d'obtenir des caractères génériques parfaitement tranchés: aussi règne-t-il une grande divergence d'opinions à cet égard entre les botanistes. Le carvi, par exemple, pour Tournefort, constitue le genre *carum*, qui jusqu'à présent contient une espèce unique, est aux yeux de Roth un *Ligusticum*. Gmelin en fait un *selinum*, Jussieu l'incorpore dans le genre *physospermum*. Scopoli et Lamarck traitent qu'ils rangent plus naturellement parmi les *sésélis*.

CARVI

CARVI.

Grec..... καρος, Dioscoride; καρεον, Aetius.

Latin..... CUMINUM PRATENSE, CARVI OFFICINARUM; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 5.
CARVI CÆSALPINI; Tournefort, clas. 7, *ombellifères*.
CARUM CARVI; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères* (1).

Italien..... CARVI; CARO; COMINO TEDESCO.

Espagnol.... ALCARAVEA.

Français..... CARVI; CUMIN DES PRÉS.

Anglais..... CARAWAY.

Allemand.... MATTENKUEMMEL; GEMEINER KUEMMEL; WIESENKUEMMEL; FELDKUEMMEL.

Hollandais... KARWEY.

Les anciens naturalistes et médecins grecs et romains ont souvent fait mention de cette plante bisannuelle, qu'ils ont nommée καρος, καρεον, *careum*, parce qu'elle croissait plus particulièrement dans la Carie, province de l'Asie. Elle est commune dans les prairies de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Suède et de la Pologne.

La racine est fusiforme, de la grosseur du pouce, et garnie de nombreuses fibrilles.

Les tiges, droites, fortes, cylindriques, glabres, striées, s'élèvent à la hauteur d'environ deux pieds, et fournissent une grande quantité de rameaux.

Les feuilles, alternes, amplexicaules, deux fois ailées, composées de pinnules lancéolées, dont les folioles sont pinnatifides à découpures linéaires inégales : les feuilles radicales sont beaucoup moins finement découpées; leurs folioles, plus larges, se divisent seulement en lobes anguleux.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales : l'ombelle universelle, lâche, étalée, composée de huit à dix rayons inégaux, est garnie d'une collerette à une seule foliole, longue, sétacée; les ombellules sont courtes, ramassées, dépourvues de collerette; les cinq pétales, ouverts en rose, sont un peu échancrés à leur sommet.

(1) Il n'y a peut-être pas une seule famille de plantes dans laquelle il soit plus difficile, que dans celle des ombellifères, d'obtenir des caractères génériques parfaitement tranchés : aussi règne-t-il une grande divergence d'opinions à cet égard entre les botanistes. Le carvi, par exemple pour lequel Linné a établi le genre *carum*, qui jusqu'à présent contient une espèce unique, est aux yeux de Roth un *ligusticum*, Crantz en fait un *apium*, Boissieu propose de l'incorporer dans le genre *pimpinella*; Scopoli et Lamarck trouvent qu'il se range plus naturellement parmi les sésélis.

Le fruit consiste en deux petites graines brunes, accolées, planes intérieurement, convexes et striées en dehors.

Cultivé dans nos jardins (2), le carvi perd une grande portion de son âcreté native; la racine devient plus volumineuse et plus succulente; les graines, plus grosses, plus huileuses, exhalent un arome et acquièrent une saveur plus agréable. Presque tous les bestiaux aiment à brouter cette plante : les feuilles fraîches relèvent le goût des potages. Dès le temps de Dioscoride, on mangeait la racine de carvi comme celle du panais (3); c'est probablement elle qui, mentionnée par Jules-César, sous le nom de *Chara*, fut broyée, mêlée avec du lait, et réduite en pain par les soldats de Valerius (4). Les belliqueux Germains en faisaient jadis la base d'une boisson vineuse; on la mettait aussi confire dans le miel et le moût; elle se mange encore aujourd'hui, surtout dans le nord, soit crue, en guise de salade, soit cuite et apprêtée comme les autres racines potagères.

Les Tartares Nogais et ceux de Circassie préparent avec les graines de carvi une farine et des gâteaux qui, pour eux, sont un mets exquis, et de première nécessité dans certains cas. Les paysans suédois et allemands assaisonnent avec ces graines leurs soupes, leurs ragoûts, leur pain et leur fromage; on s'en sert aussi pour aromatiser l'eau-de-vie et l'alcool. En effet, elles contiennent presque la vingtième partie de leur poids d'une huile essentielle éthérée, et en outre un extrait muqueux sucré. Rangées par les pharmacologistes au nombre des semences chaudes majeures, elles sont prescrites, soit pulvérisées, à la dose d'un scrupule à un gros; soit à celle d'une once, bouillies dans une livre d'eau, qu'on boit en tisane, ou qu'on injecte en lavement. Quelquefois on administre quatre ou six gouttes d'huile volatile, répandues sur un morceau de sucre, ou incorporées dans une potion. Ces diverses préparations conviennent dans l'atonie de l'appareil digestif; elles sont propres surtout à rétablir l'équilibre des forces inégalement distribuées : tel est du moins le sentiment de Hermann (5), de Ypey (6), de Willemet (7), de Sprengel (8). Willich

(2) Les procédés relatifs à cette culture ont été décrits par Jean Théophile Gleditsch, dans le tome second de ses *Vermischte physikalisch-botanisch-ækonomische Abhandlungen*, 1766.

(3) Περι υλης ιατρικης, lib. 3, cap. 66.

(4) J. G. Weinmann, *Tractatus botanico-criticus de chará Cæsaris*; in-8°. *Carolsruhæ*, 1769.

(5) *Cynosura materiæ medicæ*; 1726, pag. 281.

(6) *Afbeeldingen der artsenygewassen*, tom. 1; 1803, pag. 6.

(7) *Phytographie encyclopédique*; tom. 1; 1805, page 338.

(8) *Institutiones pharmacologicæ*; 1816, pag. 100.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0288-6
DFG

recommande aux personnes dont l'estomac ne remplit pas convenablement ses fonctions, des tartines de beurre saupoudré de carvi, de gingembre et de sel.

On a exalté les vertus galactopoïétiques, carminatives et aphrodisiaques du carvi; j'ai suffisamment examiné et apprécié ces propriétés, communes à la plupart des ombellifères (9).

MILHAU (jean louis), *De carvi, Diss.* in-4°. *Argentorati*, 1740.

(9) *Flore médicale*, tome 1, pages 80 et 92.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 102.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Racine.
2. Feuille radicale.
3. Fleur entière grossie.
4. Fruit de grandeur naturelle.
5. Le même grossi, tel qu'il se détache dans la maturité.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0289-4 DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0291-4
DFG

CASCARILLE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0292-0
DFG

CIII.

CASCARILLE.

Latin.	RICINOIDES AMERICANA LAURIFOLIO, Tournefort, *appendix.* CROTON CASCARILLA; *foliis lanceolatis acutis, integerrimis, petiolatis, subtùs tomentosis, caule arboreo;* Linné, class. 21, *monoecia monadelphia*, Jussieu, class. 15, ord. 1, *euphorbes.*
Italien.	CASCARIGLIA.
Espagnol.	CASCARILLA.
François.	CASCARILLE; CHACRILLE; CROTON CASCARILLE OU A FEUILLE DE CHARLE, Lamarck; CASCARILLERA, C.
Anglois.	CASCARILLA; Cullen.
Allemand.	KASCARILLENSTRAUCH; Hagen.
Hollandois.	KASCARILLBOOMTJE.

S'il fallait en croire aveuglément les relations ampoulées de certains voyageurs et les éloges fastueux de quelques médecins, la cascarille serait une des acquisitions les plus précieuses faites à la découverte du Nouveau-Monde. L'arbuste qui produit cette écorce trop vantée croît dans les deux Amériques, mais surtout dans la partie méridionale de ce vaste continent (1). C'est une des plantes qui vivent en société, dit M. Turpin, comme dans le règne animal les fourmis et les abeilles: elle se plaît dans les lieux secs, arides, et battus par les vents; là elle forme presque à elle seule des forêts de plusieurs lieues à l'île de Saint-Domingue, dans les environs du Port-de-Paix, et sur le bord de la mer entre Monte-Christ et le cap Lagrange.

Le croton cascarille s'élève à la hauteur de trois à six pieds: le tronc, assez gros, recouvert d'une écorce cendrée, pousse des branches nombreuses, cylindriques, cassantes, dont l'écorce est grisâtre.

Les feuilles, alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, se rapprochent singulièrement, par leur grandeur et leur figure, de celles du Vacandier. Légèrement ondées sur les bords, elles ont la surface supérieure luisante et comme argentée, tandis que la supérieure est parsemée de petites écailles orbiculaires et blanchâtres, avec un point à leur centre (2).

Les fleurs, monoïques, sont disposées en épi au sommet de la plante. La fleur mâle offre un calice double, décaphylle,

(1) Très-abondante à l'île d'Eleuthère, la cascarille est désignée par certains pharmacologistes sous le titre de *cortex Eleutheriæ*, *cortex eleutheriæ*.

(2) M. Turpin a très-bien reconnu les petites écailles orbiculaires, qui ressemblent aux chaînes tressées dont les guerriers sauvages se parent pour entraver la marche de leur ennemi.

CASCARILLE.

CIII.

CASCARILLE.

Latin.....	RICINOIDES AMERICANA ELÆAGNI FOLIO; Tournefort, *appendix*. CROTON CASCARILLA; *foliis lanceolatis acutis, integerrimis, petiolatis, subtùs tomentosis, caule arboreo*; Linné, clas. 21, *monœcie monadelphie*. Jussieu, clas. 15, ord. 1, *euphorbes*.
Italien.....	CASCARIGLIA.
Espagnol.....	CASCARILLA.
Français.....	CASCARILLE; CHACRILLE; CROTON CASCARILLE OU A FEUILLE DE CHALEF, Lamarck; CASCARILLIER, C.
Anglais.....	CASCARILLA; Cullen.
Allemand....	KASKARILLSTRAUCH; Hagen.
Hollandais...	KASKARILBOOMTJE.

S'il fallait en croire aveuglément les relations ampoulées de certains voyageurs et les éloges fastueux de quelques médecins, la cascarille serait une des acquistions les plus précieuses dues à la découverte du Nouveau-Monde. L'arbuste qui produit cette écorce trop vantée croît dans les deux Amériques, mais surtout dans la partie méridionale de ce vaste continent (1). C'est une des plantes qui vivent en société, dit M. Turpin, comme dans le règne animal les fourmis et les abeilles: elle se plaît dans les lieux secs, arides, et battus par les vents; là elle forme presque à elle seule des forêts de plusieurs lieues à l'île de Saint-Domingue, dans les environs du Port-de-Paix, et sur le bord de la mer entre Monte-Christ et le cap Lagrange.

Le croton cascarille s'élève à la hauteur de trois à six pieds: le tronc, assez gros, recouvert d'une écorce cendrée, pousse des branches nombreuses, cylindriques, cassantes, dont l'écorce est grisâtre.

Les feuilles, alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, se rapprochent singulièrement, par leur grandeur et leur figure, de celles de l'amandier. Légèrement ondées sur les bords, elles ont la surface inférieure luisante et comme argentée, tandis que la supérieure est parsemée de petites écailles orbiculaires et blanchâtres, avec un point à leur centre (2).

Les fleurs, monoïques, sont disposées en épi au sommet de la plante. La fleur mâle offre un calice double, décaphylle,

(1) Très-abondante à l'île d'Éleuthera, la cascarille est désignée par certains pharmacologistes sous le titre de *cortex Eleutheriæ*, *cortex eleutheranus*.

(2) M. Turpin a très-bien représenté ces petites *armes* stelliformes, qu'il compare aux chausse-trappes dont les guerriers se sont quelquefois servis pour entraver la marche de leurs ennemis.

dont les cinq folioles intérieures sont réputées des pétales par Lamarck et divers autres naturalistes ; quinze étamines dont les filamens sont réunis à leur base. La fleur femelle se compose d'un calice double, et d'un ovaire trigone surmonté de trois styles bifides.

Le fruit est une capsule obronde, à trois lobes latéraux arrondis, à trois loges bivalves, dont chacune contient une graine ovoïde noirâtre.

Une odeur agréable s'exhale de toutes les parties du cascarillier. On prépare avec les feuilles une boisson qui flatte le goût et l'odorat, et dont les habitans de Saint-Domingue font usage sous le nom de *thé du Port-de-Paix* (3).

C'est à son écorce que la cascarille doit la renommée dont elle a joui longtemps, et même la dénomination, que les Espagnols lui ont imposée (4). Nous la recevons en fragmens roulés, longs de deux à quatre pouces, de l'épaisseur d'une ligne, d'une cassure résineuse, d'un gris cendré à l'extérieur, et d'une couleur rouille de fer en dedans. L'épiderme blanc, rugueux, sillonné de lignes transversales, et par fois tapissé de lichens, dont il faut le nétoyer. La cascarille s'enflamme aisément, et son arome devient alors plus énergique et plus suave.

« Les recherches chimiques de Boulduc, Neumann, Dehne, Spielmann, Lewis, n'ont jeté qu'une faible lumière sur la nature des principes de cette écorce. L'analyse plus récente de Trommsdorff, plus exacte, laisse néanmoins encore à désirer. Il serait curieux d'examiner comparativement la cascarille avec le quinquina, puisque ces deux substances paraissent offrir plusieurs caractères analogues. Dans l'état actuel de nos connaissances, on sait seulement que la cascarille contient un extractif amer, une huile volatile, une certaine quantité de résine soluble dans l'alcool, et peut-être un peu d'acide benzoïque (5). »

On doit à l'espagnol Vincent Garcias Salat un des premiers écrits sur la cascarille (6), dont il étudia les effets dans la fièvre tierce. Le professeur allemand, Jean-André Stisser, fournit des renseignemens plus étendus sur cette écorce (7);

(3) L'arbrisseau lui-même porte à Saint-Domingue le nom de *sauge du Port-de-Paix*. M. Turpin, auquel je dois cette observation, ajoute que l'infusion a besoin d'être filtrée ; sinon toutes les petites chausse-trappes dont les feuilles sont tapissées resteraient dans la gorge, y produiraient une vive irritation, et feraient beaucoup tousser.

(4) *Cascarilla*, petite écorce, mince écorce; diminutif de *cascara*, écorce.

(5) Bien dans le *Dictionaire des sciences médicales*; tome 4, page 257.

(6) *Unica quæstiuncula, in quâ examinatur pulvis de quarango, vulgò* cascarilla, *in curatione tertianæ*; in-4°. *Valentiæ*. 1692.

(7) *Acta laboratorii chymici, Specimen* 2; *Helmestadii*, 1693.

il la présenta comme propre à être fumée avec le tabac, dont elle corrige l'odeur vireuse et narcotique; il pressentit, plutôt qu'il ne constata la vertu fébrifuge, que d'autres médecins ont si diversement appréciée. En effet, je vois Jean-Louis Apinus préconiser la cascarille comme le spécifique des fièvres rémittentes bilieuses qui désolèrent la ville de Herspruck (8). Santhesson prétend avoir obtenu le même succès dans une épidémie analogue qui se manifesta dans la Suède. On a porté l'enthousiasme jusqu'à donner au quinquina faux (9) la préférence sur le véritable; et l'on regrette de trouver parmi ces prôneurs inconsidérés les noms justement célèbres de Fagon, de Stahl, et de ses disciples Jean Juncker, Michel Alberti, André Ottomar Gœlicke. Des praticiens illustres, des observateurs impartiaux, Werlhof, Bergius, Cullen, ont interrogé l'expérience clinique : la cascarille n'a plus été rivale du quinquina; mais elle conserve un rang distingué dans la même classe. C'est un tonique utile dans les cachexies, les affections muqueuses, les diarrhées rebelles, les dysenteries chroniques. La meilleure manière de l'administrer consiste à la mêler au quinquina, dont elle aide l'efficacité médicinale (10) : on peut aussi la joindre à la rhubarbe. Elle est prescrite en poudre à la dose de trente à cinquante grains; digérée dans l'alcool, elle constitue l'essence de cascarille, qui se donne, ainsi que l'extrait, à la même dose que la poudre. Le sirop se prend de quatre à six gros, ou bien il sert à la préparation des bols et des électuaires.

BOEHMER (Philippe Adolphe), *De cortice cascarillæ, ejusque insignibus in medicinâ viribus, Diss. inaug. præs. Frider. Hofmann;* in-4°. fig. *Halæ Magdeburgicæ*, 1738.

(8) *Febris epidemicæ anno* 1694 *et* 1695 *in Noricæ ditionis oppido Herspruccensi grassari deprehensæ historica relatio;* in-8°. *Norimbergæ*, 1697.

(9) Appelée dans plusieurs traités de pharmacologie *faux quinquina*, la cascarille a fréquemment été vendue pour la véritable écorce du Pérou.

(10) Alibert, *Nouveaux élémens de thérapeutique*, tome 1; 1814, page 75.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0297-0 DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE 103.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Portion de feuille grossie, sur laquelle on a figuré cette quantité de petites épines asteriformes, ou espèce de petites chausse-trappes qui recouvrent toutes les parties de ce végétal.
2. Fleur mâle grossie, composée d'un calice double (dix parties), et de quinze étamines, dont les filamens sont réunis à leur base.
3. Fleur femelle grossie, composée d'un calice double et d'un ovaire trigone, surmonté de trois styles bifides.
4. Fruit tricoque grossi.
5. Le même coupé horizontalement, pour faire voir les trois loges, dans l'une desquelles on a laissé la graine composée d'un gros périsperme, au centre duquel se trouve l'embryon.
6. Graine isolée.
7. Un morceau d'écorce telle qu'elle se trouve dans le commerce.

La figure que nous donnons ici, est extraite de la collection de M. Turpin.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0298-6
DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CASSE.

a. l. l.

CIV.

CASSE.

Grec	ΚΑΣΣΙΑ μέλαινα; Actuarius.
Latin	CASSIA VISTULA ALEXANDRINA; Bauhin, Pinax, lib. 11, sect. 2; Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés*.
	CASSIA VISTULA; *foliis subquinquejugis, ovatis, acuminatis, glabris, petiolis eglandulatis*; Linné, clas. 10, *decandrie monogynie*; Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses*.
Italien	CASSIA.
Espagnol	CANAFISTOLA.
Français	CASSE; CASSIER; CANEFICIER.
Anglais	CASSIA.
Allemand	ROHRACHIE; CASSIENBAUM; WURSTROHRBAUM.

Originaire de l'Égypte et des Indes orientales, le casséolier a été transporté dans le Nouveau-Monde, où sa culture a parfaitement réussi. C'est un grand et bel arbre, analogue au noyer par son port, et qui s'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds. Le tronc, recouvert d'une écorce lisse et cendrée, acquiert une grosseur considérable, et fournit des branches multipliées.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, composées de cinq ou six paires de folioles ovales-pointues, longues de trois à cinq pouces sur deux de large, marquées de nervures fines.

Les fleurs, amples, nombreuses, jaunes, d'un aspect agréable, sont disposées en grappes axillaires de huit à dix pouces. Chaque fleur, soutenue par un pédoncule particulier assez long, présente : un calice de cinq pièces ovales, concaves, courtes, caduques ; une corolle formée de cinq larges pétales obtus et veinés : dix étamines de longueur inégale, dont les anthères sont barbées ; un ovaire supérieur, pédiculé, surmonté d'un style court, arqué, et terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une gousse noirâtre, pendante, cylindrique, droite, plus grosse que le pouce, longue d'un pied et demi, divisée à l'intérieur par des cloisons minces, transversales et parallèles, en beaucoup de loges, dont chacune, remplie d'une pulpe noire, contient une graine subcordiforme, aplatie, dure et roussâtre. Les deux coques, minces et ligneuses, sont réunies par deux sutures, dont l'une est plate et lisse, tandis que l'autre est saillante et nerveuse. On voit jusqu'à douze à quinze gousses rassemblées sur la même branche par un pédoncule flexible. Lorsque le vent les agite, elles font, en se heurtant, un bruit considérable, et tombent quand elles sont mûres.

CASSE.

CIV.

CASSE.

Grec..... κασσια μελαινα; Actuarius.

Latin..... CASSIA FISTULA ALEXANDRINA; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 2. Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés.*

CASSIA FISTULA; *foliis quinquejugis, ovatis, acuminatis, glabris, petiolis eglandulatis;* Linné, clas. 10, *décandrie monogynie*, Jussieu, clas. 14, ord. 11, *légumineuses.*

Italien..... CASSIA.

Espagnol.... CANAFISTOLA.

Français.... CASSE; CASSIER; CANEFICIER.

Anglais..... CASSIA.

Allemand... ROHRKASSIE; CASSIENROEHRLEIN; WURSTROEHRENBAUM.

Originaire de l'Egypte et des Indes orientales, le canéficier a été transporté dans le Nouveau-Monde, où sa culture a parfaitement réussi. C'est un grand et bel arbre, analogue au noyer par son port, et qui s'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds. Le tronc, recouvert d'une écorce lisse et cendrée, acquiert une grosseur considérable, et fournit des branches multipliées.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, composées de cinq ou six paires de folioles ovales-pointues, longues de trois à cinq pouces sur deux de large, marquées de nervures fines.

Les fleurs, amples, nombreuses, jaunes, d'un aspect agréable, sont disposées en grappes axillaires de huit à dix pouces. Chaque fleur, soutenue par un pédoncule particulier assez long, présente : un calice de cinq pièces ovales, concaves, courtes, caduques; une corolle formée de cinq larges pétales obtus et veinés; dix étamines de longueur inégale, dont les anthères sont bilobées; un ovaire supérieur, pédiculé, surmonté d'un style court, arqué, et terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une gousse noirâtre, pendante, cylindrique, droite, plus grosse que le pouce, longue d'un pied et demi, divisée à l'intérieur par des cloisons minces, transversales et parallèles, en beaucoup de loges, dont chacune, enduite d'une pulpe noire, contient une graine subcordiforme, aplatie, dure et roussâtre. Les deux cosses, minces et ligneuses, sont réunies par deux sutures, dont l'une est plate et lisse, tandis que l'autre est saillante et nerveuse. On voit jusqu'à douze à quinze gousses rassemblées sur la même branche par un pédoncule flexible. Lorsque le vent les agite, elles font, en se heurtant, un bruit considérable, et tombent quand elles sont mûres.

Il paraît que la casse, inconnue aux anciens naturalistes et médecins de la Grèce et de Rome, a été mentionnée d'abord et introduite dans l'art de guérir par Actuarius, Avicenne et Serapion (1). Celle qui nous est apportée d'Amérique diffère peu de celle du Levant, à laquelle certains pharmacologistes donnent la préférence. Il importe de choisir celle qui ne sonne point lorsqu'on la secoue, qui est bien pleine, dont la pulpe est de consistance moyenne et de saveur douce.

On donne, dans les officines, le nom de *casse en bâtons* aux gousses entières : frappées sur une des sutures avec un rouleau de bois ou un maillet, elles se séparent en deux valves, dont l'intérieur, ratissé avec une spatule de fer, fournit une masse noire composée des cloisons, de la pulpe, et des graines; c'est la *casse en noyaux*. On frotte rudement celle-ci, avec une spatule de bois, sur un tamis de crin neuf; la pulpe molle passe à travers les mailles du crin, et prend le nom de *casse mondée* (2) : elle se conserve dans des vases de fayence placés dans un lieu sec et frais.

Les travaux de Neumann, de Cartheuser, de Geoffroy, n'ont répandu qu'une bien faible lumière sur la nature de la casse. Baumé l'a examinée avec plus de discernement; toutefois, la seule analyse exacte de cette substance est due au professeur Vauquelin. Ce savant chimiste a recherché et déterminé les principes constituans des diverses parties du fruit (3); il a trouvé que la pulpe est une combinaison intime d'une matière parenchymateuse, de gélatine, de gluten, de gomme, d'extrait et de sucre.

Tous les médecins conviennent que la pulpe de casse est un des purgatifs les plus doux. On la prescrit avec sécurité, dit Fourcroy, dans tous les cas où la nécessité de purger est jointe avec des affections qui semblent présenter une véritable contre-indication à l'emploi des cathartiques. C'est ainsi que dans les maladies des femmes enceintes et des enfans, dans les fièvres inflammatoires, les affections de poitrine, les douleurs rhumatismales et goutteuses, on prescrit la casse avec succès, comme laxative.

Les Egyptiens emploient dans les maladies des reins et de la vessie la pulpe de casse mêlée avec du sucre candi et de la réglisse. Mésué, Mattioli, Fallope, Monardès jugent pareil-

(1) *Nec fuit Hippocrati, nec cassia nota Galeno;*
Ad medicum sed primus arabs hanc attulit usum.
POSTH.

(2) Fourcroy, dans l'*Encyclopédie méthodique : médecine;* tome 5, page 443.

lement cette substance amie des voies urinaires; et si des hommes distingués, tels que Pigray, Fabrice de Hilden et Baillou ont adopté une opinion contraire, il est facile de s'apercevoir qu'ils ont été aveuglés par le préjugé, ou qu'ils n'ont point prononcé d'après leur expérience. La même diversité de sentiment règne sur la couleur, tantôt verte, tantôt brune ou noire, que l'arabe Avicenne, l'illustre Boerhaave, Lœsecke et Lewis attribuent à l'urine de ceux qui font usage de la casse : ce phénomène n'a jamais été observé par Sommer, Gmelin, Bergius, ni Gilibert.

Les personnes dont le ventre est paresseux, la digestion pénible, se sont quelquefois assez bien trouvées d'une petite quantité de casse prise avant le repas. Ce moyen recommandé par Hermann (4), Spielmann (5), Elie Col de Villars (6), a droit aux plus magnifiques éloges, s'il a réellement calmé les souffrances et agrandi la carrière de l'homme qui brille au premier rang dans les fastes de la république littéraire (7).

Une à deux onces de casse avalées en guise de confiture, ou dissoutes dans l'eau, purgent très-légèrement; aussi a-t-on coutume d'y joindre deux à trois gros de sulfate de magnésie ou de soude.

L'extrait de casse est communément préparé dans des vases de cuivre, où il contracte des propriétés extrêmement délétères. La pulpe de casse est par fois appliquée sous forme de topique; elle fait la base d'un électuaire qui en retient le nom; elle entre dans certains clystères, et dans divers médicamens composés, tels que le *catholicum* double, l'électuaire lénitif de Fiorenzola, la confection Hamech, la marmelade de Tronchin.

(3) *Annales de chimie*; tome 6, page 275.
(4) *Cynosura mat. med.*, pag. 352.
(5) *Institutiones mat. med.* 1784, pag. 621.
(6) *An alvo pigræ cassia antè cibum? affirm. Quæst. med. inaug. præs. Nic. Bailly*; in-4°. *Parisiis*, 1712.

(7) La casse prolongea les vieux jours de Voltaire.
DELILLE.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 104.

(*La grappe de fleur est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle*)

1. Feuille composée, entière, au trait, réduite à la moitié de sa grandeur naturelle.
2. Étamine grossie.
3. Fruit ou silique réduit au tiers de sa grandeur naturelle, dont on a enlevé une partie d'un des battans, afin de faire voir les graines et les cloisons transversales.
4. Graine de grosseur naturelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0306-4
DFG

Turpin P. Lambert Sr. sculp.

CATAIRE.

a. l. l.

CATAIRE.

Latin	MENTHA CATARIA vulgaris et major; Bauhin, Hist., lib. 6, sect. 5. CATARIA MAJOR, vulgaris; Tournefort, clas. 4, *labiées*. NEPETA CATARIA; *floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis, cordatis, dentato-serratis*; Linné, class. 14, *didynamie gymnospermie*. Jussieu, clas. 8, ord. 6, *labiées*.
Italien	GATTARIA; ERBA GATTA; NEPITELLA.
Espagnol	YERBA GATERA.
Français	CATAIRE; CHATAIRE; HERBE AU CHAT.
Anglais	CATMINT; NEP.
Allemand	KATZENKRAUT; KATZENMINZE.
Hollandais	KATTE-KRUID; NEP.
Suédois	KATTMYNTA.

On trouve communément cette plante [illegible] sur le bord des chemins, et le long des haies.

La racine, ligneuse, se divise en nombreuses ramifications.

La tige, quadrangulaire, branchue, pubescente, acquiert deux à trois pieds de hauteur.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, cordiformes, dentées en scie, vertes supérieurement, blanchâtres en dessous.

Les fleurs, portées sur de courts pédoncules, sont disposées en verticilles qui, accompagnés de petites bractées sétacées, forment, par leur réunion, des épis au sommet de la tige et des rameaux. Chaque fleur présente un calice monophylle, quinquédenté, tubulé; une corolle, tantôt blanchâtre, tantôt purpurine, monopétale, labiée, à tube cylindrique, courbé, et à limbe composé d'une lèvre supérieure échancrée, tandis que l'inférieure a trois divisions, dont la moyenne est grande, concave, arrondie, crénelée, et les deux latérales figurent des ailes; quatre étamines didynames, rapprochées; un ovaire supérieur, partagé en quatre lobes, du centre desquels s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, situées au fond du calice, qui leur sert d'enveloppe.

Comme la plupart des autres labiées, la cataire est amère, piquante, aromatique. L'odeur qu'elle exhale est un peu moins suave que celle de la menthe, dont, au reste, elle se rapproche beaucoup. Aucune plante ne justifie mieux sa dénomination. En effet, les chats la recherchent avec un empressement, une passion qui tient de la fureur; ils se précipitent et

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0310-5
DFG

CV.

CATAIRE.

Latin	MENTHA CATARIA vulgaris et major; Bauhin, Πιναξ, lib. 6, sect. 5. CATARIA MAJOR, vulgaris; Tournefort, clas. 4, *labiées.* NEPETA CATARIA; *floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis, cordatis, dentato-serratis;* Linné, clas. 14, *didynamie gymnospermie.* Jussieu, clas. 8, ord. 6, *labiées.*
Italien	GATTARIA; ERBA GATTA; NEPITELLA.
Espagnol	YERBA GATERA.
Français	CATAIRE; CHATAIRE; HERBE AU CHAT.
Anglais	CATMINT; NEP.
Allemand	KATZENKRAUT; KATZENMUENZE.
Hollandais	KATTE-KRUID; NIP.
Suédois	KATTMYNTA.

On trouve communément cette plante vivace sur le bord des chemins, et le long des haies.

La racine, ligneuse, se divise en nombreuses ramifications.

La tige, quadrangulaire, branchue, pubescente, acquiert deux à trois pieds de hauteur.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, cordiformes, dentées en scie, vertes supérieurement, blanchâtres en dessous.

Les fleurs, portées sur de courts pédoncules, sont disposées en verticilles qui, accompagnés de petites bractées sétacées, forment, par leur réunion, des épis au sommet de la tige et des rameaux. Chaque fleur présente : un calice monophylle, quinquédenté, tubulé; une corolle, tantôt blanchâtre, tantôt purpurine; monopétale, labiée, à tube cylindrique, courbé, et à limbe composé d'une lèvre supérieure échancrée, tandis que l'inférieure a trois divisions, dont la moyenne est grande, concave, arrondie, crénelée, et les deux latérales figurent des ailes; quatre étamines didynames, rapprochées; un ovaire supérieur, partagé en quatre lobes, du centre desquels s'élève un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, situées au fond du calice, qui leur sert d'enveloppe.

Comme la plupart des autres labiées, la cataire est amère, piquante, aromatique. L'odeur qu'elle exhale est un peu moins suave que celle de la menthe, dont, au reste, elle se rapproche beaucoup. Aucune plante ne justifie mieux sa dénomination. En effet, les chats la recherchent avec un empressement, une passion qui tient de la fureur; ils se précipitent et

se vautrent dessus, l'embrassent de mille manières, la mordent, la dévorent en faisant les plus singulières gesticulations; ils semblent vouloir se bien imprégner de son parfum, qui, dit-on, est pour eux très-aphrodisiaque; ils l'arrosent de leur urine : aussi pour éloigner les rats des ruches à miel, il suffit d'y suspendre un paquet de cataire. Ce qu'il y a de fort surprenant, c'est que les chats, si prodigieusement avides de la cataire transplantée, ne touchent point à celle qu'on a laissée en place. L'illustre Jean Ray a plusieurs fois vérifié ce phénomène, consacré par un proverbe anglais (1).

Il est impossible qu'une plante dont l'influence sur l'économie animale se prononce avec tant d'énergie, ne possède pas des qualités médicamenteuses. Divers thérapeutistes se plaignent de la voir injustement négligée (2). Elle paraît convenir surtout dans les affections qui ont leur principale source dans l'utérus Ses vertus contre la chlorose, l'hystérie, l'aménorrhée, sont établies sur de bonnes observations faites par Hermann, Bœcler (3), Gilibert (4). On l'administre en infusion aqueuse ou vineuse, en fumigations, en fomentations, en pédiluves, en demi-bains, en injections, en lavemens. Gaspard Hofmann vante la propriété antipsorique de la décoction, et Tabernamontanus dit que si on la fait bouillir dans l'hydromel, cette boisson calme parfaitement les toux opiniâtres, et guérit l'ictère.

(1) *If you set it, the cats will eat it;*
If you sow it, the cats can't know it.

(2) Bodard, *Cours de botan. méd. comp.*, 1810; tome 2, page 88.
Linné, *Mat. med.*, 1772, pag. 146 nº. 311.

(3) *Cynosura mat. med.*, tom. 1, pag. 470.

(4) *Démonstrations élém. de botan.*, tome 2; 1796, page 79.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 105.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière grossie.
2. Corolle, étamines et style vus de face.
3. Pistil composé d'un ovaire, quadrilobé, du centre duquel s'élève un style bifide.
4. Calice ouvert, poilu à son orifice, au fond duquel on remarque que, sur quatre graines, presque toujours trois avortent.
5. Graine grossie.

Turpin P. Lambert Jne sculp.

CENTAURÉE.

a. l. l.

CVI.

CENTAURÉE.

Grec..... ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ; ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ.

Latin..... CENTAUREA, *calyx ovato inclusus squamis imbricatis, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus, serratis.* Linné, clas. 19, *syngénésie polygamie frustranée*. Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cinarocéphales*.

Italien..... CENTAUREA.

Espagnol..... CENTAUREA.

Français..... CENTAURÉE; GRANDE CENTAURÉE.

Anglais..... CENTAURY.

Allemand..... GROSSES TAUSENDGULDENKRAUT.

Hollandais..... CENTAURIE; GROTE.

Cette plante vivace est d'un beau port, et croît sur les montagnes élevées de l'Espagne et de l'Italie.

La racine est volumineuse, longue d'environ trois pieds, succulente, brune à l'extérieur, rougeâtre en dedans.

Ses tiges, rameuses, cylindriques, s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq pieds.

Les feuilles, ailées, sont simples, aiguës avec impaire, vertes, glabres, à folioles oblongues, dentées, un peu décurrentes sur leur pétiole commun.

L'extrémité de chaque rameau porte une fleur grosse, globuleuse, pourpre, qui, naît seule à un calice commun, sphérique, composé d'écailles lisses, ovales, couvertes et entières; une corolle tubuleuse, formée de nombreux fleurons tubulés, quinquéfides, dont ceux du centre sont tous hermaphrodites, tandis que ceux de la circonférence sont stériles: le réceptacle qui contient ces fleurons est tapissé de soies.

Le fruit consiste en plusieurs graines ovoïdes, lisses, couronnées d'une aigrette sessile, et environnées par le calice commun.

Cette grande centaurée est la centaurée des anciens, dont Pline a tracé une description qui n'est ni sans intérêt ni sans une certaine exactitude (1). Il faut convenir que nos aïeux étaient beaucoup plus crédules que nous; car ils attribuaient à la racine de cette plante des propriétés vulnéraires et fébrifuges très-énergiques; ils l'avaient même décorée du titre

(1) *Historia mundi*, lib. 25, cap. 6.

CENTAUREE.

CVI.

CENTAURÉE.

Grec.....	κενταυριον; κενταυριον το μεγα.
Latin.....	CENTAURIUM MAJUS, *folio in lacinias plures diviso*; Bauhin, Πιναξ, lib. 3, sect. 4. Tournefort, clas. 12, *flosculeuses.*
	CENTAUREA CENTAURIUM; *calycibus inermibus, squamis ovatis, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus, serratis.* Linné, clas. 19, *syngénésie polygamie frustranée.* Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cinarocéphales.*
Italien.....	CENTAUREA.
Espagnol.....	CENTAUREA.
Français.....	CENTAURÉE; GRANDE CENTAURÉE.
Anglais.....	CENTAURY.
Allemand.....	GROSSTAUSENDGUELDENKRAUT.
Hollandais....	CENTAURIE; SANTORIE.

Cette plante vivace et d'un beau port, croît sur les montagnes élevées de l'Espagne et de l'Italie.

La racine est volumineuse, longue d'environ trois pieds, succulente, brune à l'extérieur, rougeâtre en dedans.

Les tiges, rameuses, cylindriques, s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq pieds.

Les feuilles, alternes, sont amples, ailées avec impaire, vertes, glabres, à folioles oblongues, dentées, un peu décurrentes sur leur pétiole commun.

L'extrémité de chaque rameau porte une fleur grosse, globuleuse, pourprée, qui présente : un calice commun, sphéroïde, composé d'écailles lisses, ovales, convexes et entières; une corolle flosculeuse, formée de nombreux fleurons tubulés, quinquéfides, dont ceux du centre sont tous hermaphrodites, tandis que ceux de la circonférence sont stériles : le réceptacle qui soutient ces fleurons est tapissé de soies.

Le fruit consiste en plusieurs graines ovoïdes, lisses, couronnées d'une aigrette sessile, et environnées par le calice commun.

Si notre grande centaurée est la centaurée des anciens, dont Pline a tracé une description qui n'est ni sans intérêt ni sans une certaine exactitude (1), il faut convenir que nos ayeux étaient beaucoup plus crédules que nous; car ils attribuaient à la racine de cette plante des propriétés vulnéraires et fébrifuges très-énergiques; ils l'avaient même décorée du titre

(1) *Historia mundi*, lib. 25, cap. 6.

qu'elle porte, parce que le centaure Chiron s'en servit pour se guérir d'une blessure qu'il s'était faite au pied avec une flèche d'Hercule (2). Peu séduits par cette cure brillante, les médecins ont singulièrement négligé la centaurée : c'est, pour ainsi dire, à regret que certains pharmacologistes consentent à la citer. Craton l'administrait dans les obstructions viscérales, Camerarius dans les affections cachectiques ; elle est un des ingrédiens de la poudre antarthritique du prince de la Mirandole. La plupart des thérapeutistes modernes n'en font aucun usage. Elle mérite pourtant, selon MM. Roques et Biett, d'obtenir une place parmi les amers indigènes. On peut l'employer pour exciter la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins. Elle se donne en poudre, à la dose d'un gros ; on en fait bouillir une once dans une livre d'eau, ou bien infuser la même quantité dans le vin. Le suc exprimé de la racine fraîche forme, avec la cassonade, un sirop dont Bœcler prescrivait deux ou trois onces dans les maladies catarrhales (3).

Diverses autres espèces de centaurée jouissent d'une réputation plus étendue et mieux méritée que la grande.

1°. La centaurée des blés, *centaurea cyanus*, L., porte encore plusieurs autres dénominations qui rappellent sa couleur, son séjour ordinaire, ou ses prétendues propriétés : c'est ainsi qu'on l'appelle *bluet*, ou mieux *bleuet*, *barbeau*, *aubifoin*, *casse-lunette*. Abondamment répandu au milieu de nos moissons, le bleuet offre le plus agréable coup-d'œil ; on en tresse de jolies couronnes, de charmantes guirlandes ; mais il ne figure plus dans nos pharmacopées. Linné le rejette comme infidèle et superflu ; toutefois, certains empiriques ne connaissent point de remède plus souverain pour *éclaircir* la vue que *l'eau de casse-lunette*.

2°. La centaurée lanugineuse, ou bénite, *centaurea benedicta*, L., plus connue sous le nom de *chardon béni*, se distingue facilement des autres espèces par les larges bractées qui environnent ses fleurs. La racine, blanche et rameuse, pousse plusieurs tiges rougeâtres, velues, qui s'élèvent jusqu'à la hauteur de deux pieds. Les feuilles sont oblongues, dentées, tomenteuses, d'un vert clair ; les inférieures sont sinuées, découpées ; les unes et les autres ont leurs dents terminées par des épines faibles. Les fleurs, terminales, jaunes, sont enveloppées par un calice lanugineux, armé d'épines jaunâtres.

Très-commun dans les belles contrées de l'Espagne, de

(2) Puisque les Grecs ont mentionné la centaurée, il faut rejeter l'étymologie latine qu'on lui a parfois supposée, de *centum* et *aurum* ; étymologie que semble rappeler le mot allemand *tausendguldenkraut*, et à laquelle fait allusion Ledel, en parlant de la petite centaurée : *centaurium minus, auro tamen majus*.

(3) *Cynosura mat. med. contin.*, 1729, pag. 35.

l'Italie, et des départemens méridionaux de la France, le chardon béni croît et prospère dans nos jardins ; on l'y cultive pour l'usage médicinal. En effet, toute la plante, douée d'une amertume bien prononcée, exerce sur l'estomac et le tube intestinal une action tonique qui se propage dans tous les points de l'économie. Lewis, Linné, Gilibert en ont constaté les bons effets dans l'anorexie, la dyspepsie, l'ictère, les fièvres intermittentes atoniques ; mais il faut bien se garder d'adopter aveuglément les éloges fastueux prodigués à cette centaurée par Jean Bauhin, par Lange, et surtout par George Christophe Petri von Hartenfels (4), et George Christophe Otto (5), qui la regardent comme tempérante, alexitère, alexipharmaque, anticancéreuse.

3°. La centaurée étoilée, chardon étoilé, ou chausse-trappe, *centaurea calcitrapa*, L., doit ses dénominations à ses épines calicinales blanches, ouvertes, disposées en étoile avant l'épanouissement des fleurs, et dont la couleur tranche assez agréablement sur le fond vert de la plante.

Mentionnée dans les livres saints, la chausse-trappe était employée par les Juifs pour assaisonner l'agneau pascal, et les Arabes s'en servent encore pour le même objet. Ils mangent les jeunes et tendres pousses aux mois de février et de mars.

Des médecins illustres, parmi lesquels je distingue Jean Bauhin, Tournefort, Seguier, Linné, Gilibert, ont reconnu des qualités diurétiques et fébrifuges dans la racine, les feuilles, les fleurs, les graines de chausse-trappe (6). Ces dernières exercent surtout une action très-marquée sur l'appareil urinaire.

La petite centaurée, beaucoup plus estimée que la grande, n'appartient point au même genre : elle est une espèce de *gentiane*, et c'est en traçant l'histoire de celle-ci que je ferai mention de celle-là.

(4) *Asylum languentium, seu carduus sanctus, vulgò benedictus, medicina patrumfamilias polychresta, verumque pauperum thesaurus ; ad normam et formam Academiæ naturæ curiosorum elaboratus ;* in-8°. *Ienæ*, 1669.

(5) *De carduo benedicto, Diss. inaug. præs. G. H. Behr ;* in-4°. *Argentorati*, 1738.

(6) Buchoz a publié une Dissertation pour célébrer la vertu spécifique de la chausse-trappe dans les fièvres intermittentes. Or, chacun sait le degré de confiance que mérite le jugement de cet ignare compilateur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0319-0 DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE 106.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Fleuron stérile.
2. Fleuron hermaphrodite ayant à la base de son ovaire quelques-unes des soies qui tapissent le réceptacle.
3. Fruit de grosseur naturelle, couronné de son aigrette.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0320-0
DFG

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CENTINODE.

a. l. l.

CVII.

CENTINODE.

Latin ..... { *Scandices sanicularia*; Bauhin, Tournef., Rupp., etc. 5. Tournef., cl. 15, *apétales*. *POLYGONUM VULGARE*; *Floribus octandris, trigynis, axillaribus, pedunculatis, undique approximatis, basi connatis*; Linn., syst. 8, *octandrie trigynie*, Juss., cl. 6, ord. 8, *polygonées*.

Italien ..... CENTINODIA; SANGUINARIA; CORREGGIUOLA.

Espagnol ..... SANGUINARIA MAYOR.

Anglais ..... KNOT-GRASS.

Allemand ..... KNOTGRAS; VOGELKNOTEN; KLUTENKRAUT.

Suédois ..... KNÖRTGRÖS.

Danois ..... KNOEGRÆS.

Cet amer croît commun sur le bord des chemins, des rivières, dans les champs, dans les lieux incultes; la centinode est une plante annuelle qui fleurit aux mois de juillet et d'août.

Sa racine est longue, dure, tortueuse, fibreuse, peu garnie.

Ses tiges sont vertes, cannelées, glabres, articulées (1), divisées en nombreux rameaux étalés sur la terre (2), longs d'environ un pied et demi, garnis de stipules courtes, vaginales.

Les feuilles sont alternes, presque sessiles, entières, ovales.

Les fleurs sont sessiles, entourées d'une bractée à leur base, petites, un calice partagé en cinq découpures concaves, presque étoilées, un ovaire supérieur, trigone, surmonté de trois styles très-courts, terminés par autant de stigmates arrondis.

Le fruit consiste en trois petites, triangulaires, noires, luisantes, couvertes par le calice persistant qui leur sert d'enveloppe.

L'odeur d'odeur, la centinode imprime sur la langue un ferment astringent très-actif. Elle est bronzée par tous les bestiaux; elle n'est point épargnée par les agronomes de Bechstein, qui prétend que ce fourrage dispose aux obstructions viscérales. On pourrait, dans certains cas, tirer parti de la faculté astringente des graines, dont les oiseaux se montrent

(1) La plante doit à ses articulations ou nœuds, qui sont très-multipliés, les noms de *centinode*, *renouée*, *herbe-grasse*, *sanguinaire*, et même le nom grec que *polygonum*.

(2) Il n'est pas besoin de dire que telle est la source de la dénomination vulgaire, *traînasse*.

38e *Livraison*. b

CENTINODE.

CVII.

CENTINODE.

Latin..... POLYGONUM LATIFOLIUM; Bauhin, Πνιαξ, lib. 7, sect. 5. Tournefort, clas. 15, *apétales*.

POLYGONUM AVICULARE; *floribus octandris, trigynis, axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo*; Linné, clas. 8, *octandrie trigynie*. Jussieu, clas. 6, ord. 5, *polygonées*.

Italien..... CENTINODIA; SANGUINARIA; CORREGGIUOLA.

Espagnol... SANGUINARIA MAYOR.

Français.... CENTINODE; RENOUÉE; TRAINASSE.

Anglais..... KNOT-GRASS.

Allemand... WEGTRIT; TAUSENDKNOTEN; BLUTKRAUT.

Hollandais... DUIZENDKNOOP.

Suédois..... TRAMP-GRÄS

Extrêmement commune sur le bord des chemins, des rivières, dans les champs, dans les lieux incultes, la centinode est une plante annuelle qui fleurit aux mois de juillet et d'août.

La racine est longue, dure, tortueuse, fibreuse, rampante.

Les tiges sont vertes, herbacées, glabres, articulées (1), divisées en nombreux rameaux étalés sur la terre (2), longs d'environ un pied et demi, garnis de stipules courtes, vaginales.

Les feuilles sont alternes, presque sessiles, entières, ovales.

Les fleurs axillaires sessiles, entourées d'une bractée à leur base, présentent : un calice partagé en cinq découpures concaves ; huit étamines ; un ovaire supérieur, trigone, surmonté de trois styles très-courts, terminés par autant de stigmates arrondis.

Le fruit consiste en graines petites, triangulaires, noires, lisses, recouvertes par le calice persistant qui leur sert d'enveloppe.

Privée d'odeur, la centinode imprime sur la langue un léger sentiment d'astriction. Elle est broutée par tous les bestiaux; et je ne suis point convaincu par les argumens de Bechstein, qui prétend que ce fourrage dispose aux obstructions viscérales. On pourrait, dans certains cas, tirer parti de la faculté nutritive des graines, dont les oiseaux se montrent

(1) La plante doit à ces articulations ou nœuds, qui sont très-multipliés, les titres de *centinode*, *renouée*, *knot-grass*, *tausendknoten*, et même le nom générique *polygonum*.

(2) Je n'ai pas besoin de dire que telle est la source de la dénomination vulgaire, *trainasse*.

très-friands, ce qui a valu à la centinode le nom spécifique de *aviculaire*.

Les anciens pharmacologistes accordaient à cette plante un rang distingué parmi les astringens. Hermann et Bœcler la regardent comme un excellent vulnéraire ; ils la croient propre à dissiper les flux, à modérer, à tarir les hémorragies, et spécialement l'hémoptysie (3). Plusieurs praticiens modernes prétendent avoir constaté ces vertus. Le docteur Gilibert a quelquefois employé la centinode avec succès dans les diarrhées et sur la fin des dysenteries. Toutefois le judicieux Linné déclare qu'elle est superflue ; les thérapeutistes Cullen, Alibert et Schwilgué ne la mentionnent point dans leurs ouvrages, et M. Biett pense, avec raison, qu'elle ne mérite pas d'être tirée de l'oubli. Certains vétérinaires la donnent, à titre de spécifique, dans l'hématurie des vaches (4).

(3) *Cynosura mat. med.*, tom. 1, pag. 564.
On aperçoit aisément dans cette propriété réelle ou imaginaire l'origine du mot *sanguinaria*.
(4) Willemet, *Phytographie encyclopédique*; 1805, tome 1, page 457.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 107.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Fleur entière grossie.
2. Calice ouvert dans lequel on voit huit étamines.
3. Pistil.
4. Fruit entouré du calice.
5. Le même dépouillé.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0326-6
DFG

Turpin. P *Lambert Jne sculp*

CERFEUIL.

a.b.l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0328-7
DFG

CVIII.

CERFEUIL.

Grec.....	χαιρεφυλλον; σκανδυξ, Dioscoride.
Latin.....	CHÆROPHYLLUM SATIVUM; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 4. Tournefort, clas. 7, *ombellifères*. SCANDIX CEREFOLIUM; *seminibus nitidis, ovato-subulatis, umbellis sessilibus, lateralibus*; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 10, ord. 2, *ombellifères*.
Italien.....	CERFOGLIO; CERFUGLIO.
Espagnol....	PERIFOLLO; PERIFOLIO; CERAFOLIO.
Français....	CERFEUIL.
Anglais.....	CHERVIL.
Allemand....	KOERBEL.
Hollandais...	KERVEL.
Suédois.....	KYRFWEL.
Polonais....	TRYBULA; TRZEBULA.

Il est surprenant, comme l'observe le savant Sprengel, que Théophraste ne fasse aucune mention de cette plante potagère, qui croît dans les champs de la Grèce, et dont les Athéniens faisaient un usage continuel.

La racine, fusiforme, de l'épaisseur du petit doigt, roussâtre en dehors, blanche en dedans, est garnie, vers son extrémité, de fibres assez nombreuses.

La tige, cylindrique, glabre, striée, fistuleuse et rameuse, s'élève jusqu'à la hauteur de deux pieds.

Les feuilles sont alternes, subamplexicaules, deux ou trois fois ailées, composées de folioles un peu élargies, courtes, pinnatifides (1).

Les fleurs sont disposées en ombelles placées latéralement au sommet des rameaux. Chacune d'elles présente : cinq pétales blancs, ouverts en rose; cinq étamines, dont les filamens portent des anthères arrondies; un ovaire inférieur, chargé de deux styles persistans.

Le fruit se compose de deux graines accolées, oblongues, lisses, sillonnées d'un côté, planes de l'autre, noirâtres dans leur maturité.

On trouve le cerfeuil dans tous nos jardins : c'est une plante annuelle, dont la culture est aussi facile qu'avantageuse. Il aime le demi-soleil et une terre assez substantielle. On peut le semer toute l'année, excepté dans les derniers mois du prin-

(1) Le mot *chærophyllum*, qu'on a modifié en celui de *cerefolium*, et dont est formé le mot français *cerfeuil*, vient-il du nombre, de l'élégance et de l'arome de ses feuilles : χαιρειν, *gaudere*, φυλλον, *folium*?

temps et le cours de l'été; il monterait alors trop tôt en graine. Pour en avoir toujours de frais, il est bon d'en semer tous les huit jours (2).

Dans son état de fraîcheur, le cerfeuil exhale une odeur aromatique agréable; il imprime sur la langue une saveur légèrement piquante, analogue à celle de l'anis. Ces qualités physiques diminuent considérablement par la dessiccation et par l'ebullition; aussi en retrouve-t-on à peine la trace dans les bouillons, les sauces, les potages, tandis qu'elles se conservent dans les salades, les fritures, les sucs, les macérations, et même dans les infusions faites à une douce chaleur.

Plusieurs animaux, et notamment les lapins, sont très-friands du cerfeuil. Peu de plantes, dit Macquart (3), sont plus amies de l'estomac; il semble convenir à tous les âges, à tous les tempéramens. Son emploi n'est pas borné à l'économie domestique; les médecins s'en servent avec succès pour la guérison de diverses maladies. Doué d'une vertu stimulante modérée, il porte principalement son action sur les organes glanduleux, ce qui le rend fort utile dans les obstructions viscérales et dans les affections des voies urinaires, ainsi que tendent à le prouver les observations de Balthazar Ehrhart (4), de Haller (5), de Gilibert (6). Il est recommandé dans les vices de l'appareil cutané, par Plenck; le professeur Lazare Rivière vantait son efficacité dans l'hydropisie, et le docteur Biett en prescrit le suc dans les affections légères du foie, particulièrement dans l'ictère commençant.

Pilé et appliqué sur les mamelles en forme de cataplasme, le cerfeuil est un des antilaiteux les plus énergiques, surtout si on l'unit aux feuilles d'aune (7).

Il ne faut ajouter aucune confiance aux vertus antiphtisiques et anticancéreuses de cette plante, exaltées par J. H. Lange (8), Hermann et Bœcler (9).

Le cerfeuil musqué, cerfeuil odorant, cerfeuil d'Espagne, *scandix odorata*, L., se rapproche encore plus de l'anis que le cerfeuil ordinaire. Les feuilles fraîches, aromatiques, sont

(2) Dutour, *Nouveau Dictionaire d'hist. nat.*, tome 4; 1803, page 519.
(3) *Encyclopédie méthodique : Médecine*; tome 4, page 562.
(4) *Œkonomische Pflanzenhistorie*; tom. 5, pag. 218.
(5) *Historia plant. helv.*, n°. 747.
(6) *Démonstrations élém. de botan.*; 1796, tome 2, page 409.
(7) Murray, *Apparatus medicam.*, tom. 1; 1793, pag. 409.
(8) *Tentamen medico-phys. de remediis Brunsvic. domest.*; 1765, pag. 252.
(9) *Cynosura mat. med.*, tom. 3, pag. 346.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0330-6
DFG

un aliment, ou plutôt un condiment très-recherché des Suédois, tandis que les racines sont employées comme potagères par les Silésiens (10).

NARCISSUS (ferdinand george), *De chærophyllo, Dissertatio botanico-medica inaug. præs. Christoph. Helvig.*; in-4°. *Gryphiswaldiæ*, 14 *mart.* 1714.

(10) Bergius, *Materia medica;* 1782, pag. 225.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 108.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Racine.
2. Fleur entière grossie.
3. Fruit grossi.
4. Le même tel qu'il se détache dans la maturité.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0331-2 DFG

Mme E. Panckoucke. Lambert Fecit et sculp.

CERISIER.

a. l. l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0334-0
DFG

GERMER

CIX.

CERISIER.

Grec.....	κερασος.
Latin.....	CERASA SATIVA, ROTUNDA, RUBRA ET ACIDA; Bauhin, Πινακ, lib. 11, sect. 6.
	CERASUS SATIVA, FRUCTU ROTUNDO, RUBRO ET ACIDO; Tournefort, clas. 21, *arbres rosacés*.
	PRUNUS CERASUS; *umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis, glabris, conduplicatis;* Linné, clas. 12, *icosandrie monogynie*.
	CERASUS; Jussien, clas. 14, ord. 10, *rosacées*.
Italien.....	CIRIEGIO; CILIEGIO.
Espagnol....	CEREZO.
Français....	CERISIER.
Anglais.....	CHERRY-TREE.
Allemand...	KIRSCHBAUM.
Hollandais...	KERSEBOOM; KARSSEBOOM.
Suédois.....	KOERSBÆR.
Polonais....	WISN.

Tout le monde, dit Rozier, répète après les anciens, que l'Europe doit le cerisier à Lucullus, qui le transporta de Cérasonte à Rome, après avoir vaincu Mithridate. Son nom lui vient-il de cette ville, ou cette ville était-elle ainsi nommée parce qu'il croissait dans ses environs un grand nombre de cerisiers? Peut-être Lucullus n'apporta-t-il de Cérasonte que des greffes ou des arbres dont la qualité du fruit était supérieure à celle des cerisiers sauvages qui ne fixaient pas l'attention des Romains. Il paraît que le type de presque toutes les espèces de cerisiers aujourd'hui connues existait dans les Gaules, et ce type est le merisier (1).

L'opinion de Rozier, habilement développée par cet excellent agronome, étayée de preuves nombreuses et concluantes, est presque généralement adoptée. Je devrais, en conséquence, faire ici l'histoire de ces trois plants sauvages, dont l'un est la souche du guignier, l'autre celle du bigarreautier, et le troisième celle du griottier. Mais ces détails historiques, qui sont un des ornemens du *Cours complet d'agriculture*, seraient ici déplacés. Il me suffit de les avoir indiqués, et je passe à la description de la variété qui, sous le nom de *cerisier de Montmorency*, porte un fruit aussi beau que savoureux.

C'est un arbre de grandeur médiocre, dont la tige droite, bien élancée, couronnée de nombreux rameaux, est revêtue

(1) Dutour, dans le *Nouveau Dictionaire d'hist. natur.*, tome 4; 1803, page 523.

d'une écorce grise à l'extérieur, rougeâtre en dedans, et qui se détache par bandes longitudinales.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales-pointues, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont latérales, blanches, soutenues par des pédoncules assez longs, souvent réunis en ombelle sur un pedoncule commun très-court, garnis à leur base de bractées trifides. Chaque fleur présente : un calice inférieur, monophylle, campanulé, à cinq divisions concaves et caduques ; une corolle formée de cinq pétales obronds, ouverts en rose, insérés sur le calice par les onglets, vingt à trente étamines, dont les filamens subulés se terminent par des anthères courtes et bilobées ; un ovaire supérieur, duquel s'élève un style filiforme, surmonté d'un stigmate orbiculaire.

Le fruit est un drupe globuleux, d'abord vert, puis d'un rouge éclatant à mesure qu'il approche de la maturité, contenant, au milieu d'une enveloppe pulpeuse, un noyau sphéroïde, sillonné à ses bords, et à suture saillante.

Tout sol de nature calcaire et légère convient au cerisier ; il ne se plaît pas dans les expositions trop chaudes ; les pays montagneux lui conviennent à merveille ; et, s'il y est plus tardif, son fruit est, en revanche, beaucoup plus parfumé. Cet arbre a conservé, malgré nos soins, son principe sauvage ; il veut pousser à sa fantaisie ; la serpette du jardinier cherche-t-elle à le contraindre, il dépérit et meurt promptement ; il faut l'abandonner à la nature. La majeure partie des cerisiers se multiplie et se reproduit de noyaux ; la greffe cependant est préférable, plus expéditive et plus sûre (2).

Les usages économiques du cerisier sont extrêmement nombreux. Je vais les indiquer, et M. Dutour sera encore ici mon guide. Le merisier a son bois plus serré, plus dur que le cerisier ; il est recherché par les tourneurs, les ébénistes, et surtout par les luthiers, qui le trouvent sonore. Dans certains cantons de la France, on fait avec les branches des échalas et des cerceaux. Les merises fournissent une nourriture saine aux habitans de divers cantons de la Suisse : ils en font beaucoup sécher, pour les manger en forme de soupe, cuites avec du pain, pendant l'hiver et le printemps ; ils en préparent des compotes et de la tisane pour les malades. C'est par la distillation de ce fruit fermenté qu'on obtient le *kirschenwasser*, avec lequel se fait presque tout le marasquin du commerce, par l'addition d'une quantité proportionnée d'eau et de sucre.

De toutes les variétés du cerisier, les griottes, et notamment celles de Montmorency, sont les plus salubres et les plus

(2) Dutour, *loc. cit.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0338-3 DFG

agréables. « Elles ont quelque chose de vineux, de sucré et d'acide, qui délecte et rafraîchit puissamment : elles sont amies de l'estomac, excitent l'appétit, favorisent l'évacuation de l'urine, tiennent le ventre libre (3). » Elles conviennent à tous les tempéramens, modèrent la violence des fièvres inflammatoires et bilieuses, dissipent les embarras gastriques et les obstructions viscérales. La meilleure manière de les administrer aux fébricitans consiste à en exprimer le suc, que l'on délaie dans l'eau, et que l'on édulcore avec de la cassonade. Fernel cite plusieurs exemples de mélancoliques guéris par la décoction de cerises desséchées, et Vanswieten dit avoir vu des maniaques rendus à la raison après avoir mangé des quantités considérables de cet excellent fruit.

Tissot recommande l'infusion des queues de cerises pour calmer les catarrhes pulmonaires opiniâtres ; cette boisson est regardée par d'autres comme diurétique.

On fait avec les cerises un sirop, un rob, un vin délicieux, un ratafia très-recherché, des confitures très-délicates. Sèches, elles offrent, dans toutes les saisons, un aliment qui peut, au besoin, devenir la base de diverses compositions médicamenteuses.

On a proposé de substituer l'écorce de cerisier à celle de quinquina, et des prôneurs inconsidérés de nos remèdes indigènes ont fastueusement célébré les avantages de cette substitution. Mais l'illusion a été de courte durée, et cette confiance aveugle dans une substance presque inerte n'a jamais eu qu'un très-petit nombre de partisans. L'écorce de cerisier, rejetée aujourd'hui des meilleures officines, se glisse frauduleusement dans celles des pharmaciens militaires, qui la mélangent à l'écorce péruvienne, et, trompant la religion du médecin, foulant aux pieds les lois de l'honneur, se jouent de la vie des braves, pour étancher la criminelle soif de l'or. J'ai mille fois été témoin de ces turpitudes à l'armée; car je n'ai que très-rarement eu le bonheur d'y voir le service pharmaceutique dirigé ou exécuté par des hommes qui, tels que les Bayen, les Parmentier, les Laubert, les Malatret, les Virey, les Lodibert, réunissent à des talens éminens la plus scrupuleuse probité.

Je suis très-persuadé que la gomme de cerisier peut, dans une foule de cas, remplacer la gomme arabique, et pourtant je n'admets point avec Thomson, Bodard, Gilibert, leur identité absolue. Des chimistes fort habiles ont beau soutenir que l'analyse découvre dans l'une et dans l'autre les mêmes prin-

(3) Macquart, dans l'*Encyclopédie méthodique : Médecine*; tome 4, page 564.

cipes constituans ; je vois notre gomme indigène plus molle, plus pâteuse, plus opaque, tandis que celle d'arabie est plus sèche, plus diaphane, plus brillante ; je vois celle-ci fondre plus promptement et plus parfaitement dans l'eau, sans en troubler la limpidité : ces phénomènes ne diminuent point mon admiration pour la chimie, et ne m'empêchent point de reconnaître qu'elle peut répandre des lumières sur la médecine. Toutefois les applications de cette science utile à l'art de guérir doivent être faites avec une sage réserve : je souris de pitié en lisant dans une hématologie, très-estimable d'ailleurs, qu'il n'existe pas une différence notable entre le sang d'un scorbutique et celui d'un individu frappé d'une violente phlegmasie, dévoré par une fièvre angioténique brûlante.

DOLFUSS (Jean George), *Cerasologia medica ;* in-4°. *Basileæ*, 1717.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 109.

(*La plante est de grandeur naturelle*)

1. Fruit dont on a enlevé la moitié de la chair.
2. Fleur entière.
3. Calice et pistil.

Turpin P. Lambert Jr. sculp.

CHANVRE MALE.

a. l. l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0342-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0343-0
DFG

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0344-5
DFG

CX.

CHANVRE.

Grec..... κανναβις.

Latin..... CANNABIS SATIVA; Bauhin, Πιναξ, lib. 8, sect. 5. Tournefort, clas. 15, *apétales*.
CANNABIS SATIVA; *foliis digitatis;* Linné, clas. 22, *diœcia pentandrie*. Jussieu, clas. 15, ord. 3, *orties*.

Italien..... CANAPA; CANAPE.
Espagnol.... CAÑAMO.
Français.... CHANVRE.
Anglais..... HEMP.
Allemand.... HANF.
Hollandais... HENNIP; KENNIP.
Suédois..... HAMPA.
Polonais..... KONOP.

Bien que les Indes-Orientales soient la véritable patrie du chanvre, ce végétal utile croît en abondance et spontanément sur les bords glacés de la Newa, du Borystène et du Wolga.

La racine est blanche, ligneuse, fusiforme, garnie de fibrilles.

La tige, droite, ordinairement simple, obtusément quadrangulaire, fistuleuse, rude, velue, s'élève à une hauteur qui varie prodigieusement selon la nature du sol et l'influence du climat: tandis qu'elle monte à peine à trois pieds en Lithuanie, souvent elle parvient chez nous à une toise d'élévation, et dans les plaines fertiles du Piémont elle acquiert la taille gigantesque de quinze à vingt pieds.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, digitées, composées de cinq à sept folioles lancéolées, dentées en scie, et dont les inférieures sont les plus petites.

Les fleurs sont dioïques, c'est-à-dire que les organes sexuels sont séparés sur deux individus différens (1). Les fleurs mâles, disposées en petites grappes lâches dans les aisselles des feuilles supérieures et au sommet de la tige, présentent: un calice de cinq folioles oblongues, légèrement arquées et concaves, cinq étamines, dont les filamens très-courts portent des anthères oblongues et tétragones. Les fleurs femelles, également axillaires, et presque sessiles, offrent: un calice monophylle, conique, spathiforme, s'ouvrant d'un côté dans toute sa longueur; un ovaire supérieur, surmonté de deux styles longs, subulés et velus.

(1) Quelques individus sont monoïques, et portent conséquemment les deux sexes dans des fleurs séparées.

Le fruit est une capsule crustacée, subglobuleuse, brune ou grise, lisse, composée de deux vulves qui restent unies, recouverte par le calice, et renfermant une graine blanche et huileuse.

Presque partout on cultive le chanvre, et presque partout il réussit à merveille : les procédés de cette culture intéressante et facile, la manière de le récolter et de le préparer ont été parfaitement décrits dans les traités généraux et spéciaux de jardinage, d'économie rurale et domestique de Miller, Duhamel, Rozier, Rougier la Bergerie, et dans des monographies estimées (2) Je ne dois qu'effleurer cette matière, et mentionner seulement quelques précautions dont l'exacte observance contribue puissamment à la perfection des produits qu'on retire du chanvre.

Toute rupture lui est pernicieuse : ainsi, pour ne le point briser, en le cueillant il faut le tirer droit hors de terre brin à brin, et, lorsqu'il est très-élevé, le jeter sur le bras gauche, jusqu'à ce qu'on en ait une poignée. On secoue légèrement la terre qui tient aux racines; on y met deux liens, et la tige reste entière. Ces poignées sont portées hors de la chenevière; un homme muni d'un instrument tranchant les prend l'une après l'autre; et, les posant sur une fourche fichée solidement en terre, il coupe toutes les racines un peu audessus du collet; puis il abat, avec un sabre de bois, le paquet de feuilles qui couronne chaque poignée.

Dépositaire de la graine, le chanvre femelle a besoin d'une existence plus prolongée; on ne le récolte que trois semaines ou un mois après le mâle, et l'on suit absolument la même méthode : Brale préfère le fauchage, et les motifs de cette préférence qu'il allègue sont assez plausibles.

Après avoir soigneusement abattu les feuilles et les grappes, on fait aussitôt rouir le chanvre dans un fleuve ou dans une eau

(2) BARUFFALDI (Jérôme), *Il canapajo, libri otto; poema georgico*; in-4°. *Bologna*, 1741.

Coltivazione della canapa; istruzioni di Fabrizio Berti, Innocenzo Bregoli ed Antonio Pallara, raccuolte da Girolamo Antonio Berti; in-4°. *Bologna*, 1741.

On trouve ordinairement cet opuscule joint au petit poème de Baruffaldi.

MARCANDIER, Traité du chanvre; in-12. Paris, 1758.—Id. in-8°. Bourges, 1764. — Trad. en anglais, Londres, 1764. — Trad. en allemand, avec des additions; in-8°. Freystadt, 1763.

L'auteur avait déjà publié en 1757, dans le *Journal économique*, un Mémoire sur une nouvelle manière de préparer le chanvre, dont le *Traité* est le développement.

Recueil de Mémoires sur la culture et le rouissage du chanvre; par Rozier, Prozet Perthuis, etc. Lyon et Paris, 1788.

BRALE, Analyse pratique sur la culture et la manipulation du chanvre, in-8°. Amiens et Paris, 1790.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0346-7
DFG

dormante (3). Il est roui au point convenable lorsque la filasse qui constitue l'écorce se détache facilement de la tige, vulgairement appelée *chenevotte*.

Dès qu'on a retiré le chanvre du rouissoir, on le lave pour entraîner la substance glutineuse et la vase qui y restent attachées. On le fait ensuite sécher, puis on le serre dans des greniers ou dans d'autres lieux aérés, et pendant les veillées de l'hiver on le teille; ou bien, si la récolte est considérable, on le soumet à l'action beaucoup plus rapide de la *maque*.

Séparée des tuyaux ou chenevottes, la filasse est passée à plusieurs reprises par le *séran*, espèce de peigne garni de pointes de fer; après quoi on la met en bottes et on la conserve pour les nombreux usages auxquels elle est destinée (4). Tantôt le chanvre est employé à fabriquer des cordages et des voiles pour les navires; tantôt il se transforme en tissus plus délicats dans la main de l'ouvrier industrieux, qui en compose des fils et des toiles, dont la blancheur, la finesse et le moelleux le disputent aux étoffes de lin (5).

Presque tous les pharmacologistes placent avec raison le chanvre au nombre des végétaux suspects, et l'on doit s'étonner que des médecins distingués aient voulu démontrer l'innocuité d'une plante aussi évidemment délétère. Il suffit de faire quelques pas dans une chenevière pour être frappé d'une odeur vireuse, et pour éprouver plus ou moins promptement, plus ou moins complétement, selon la susceptibilité individuelle, les principaux effets du narcotisme.

Nuisible à ceux qui le récoltent, le chanvre nuit bien plus encore à ceux qui le préparent. L'eau dans laquelle on le rouit exhale des miasmes infects, et contracte un degré de putréfaction tel que les poissons languissent et meurent (6). Les car-

(3) Duhamel conseille l'eau dormante, et Marcandier l'eau courante.

Dans les pays où l'eau manque, on étend le chanvre sur des prés; ou bien on l'expose à la rosée et au soleil, contre des haies et des murs; ou enfin on le place debout dans une fosse humide et couverte. Ces divers modes de rouissage n'ont jamais la perfection de celui qui se fait dans une rivière ou dans un étang.

(4) Dutour a été mon principal guide dans l'ébauche que j'ai tracée de la culture, de la récolte et de la préparation du chanvre.

(5) Marcandier, *op. cit.*

J. B. Calvisi, dans la *Bibliothèque physico-économique*; 1796, page 317.

E. Antill, dans le *Journal de physique*, de Rozier; *supplément*: 1778, tome 13.

(6) Gilibert, *Démonstrations élém. de botan.*; 1796, tome 3, page 218.

P. P. Pereda, *An cannabis et aqua in quâ mollitur possint aerem inficere?* 1579.

Biett, dans le *Dictionaire des sciences médicales*; tome 4, page 433.

Geoffroy, *Traité de la matière médicale*; tome 5, page 426.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0347-3

deurs de chanvre sont sujets à une toux continuelle, à l'asthme, à la phthisie.

Les dames piémontaises, dans leurs promenades champêtres, aiment à porter des cannes ou des badines faites avec les tiges de chanvre, qui réunissent à une grande légèreté une blancheur éclatante. Moins volumineuses chez nous, ces tiges servent à faire des allumettes, et quelquefois du charbon pour la poudre à canon.

Gilibert a étudié sur lui-même l'action des feuilles de chanvre : infusées, à la dose d'une once dans une demi-livre d'eau, elles communiquèrent à ce liquide une odeur et un goût nauséeux ; cette infusion souleva l'estomac, produisit la céphalalgie, et augmenta le cours des urines en déterminant une sueur fétide ; l'habile praticien lyonnais a vu réussir cette boisson dans le rhumatisme chronique et les dartres ; il ajoute que les feuilles fraiches appliquées en cataplasme raniment les tumeurs froides et les disposent à la résolution.

Connue sous le nom de *chenevis*, la graine de chanvre est d'une utilité journalière et très-variée. Elle fournit un aliment aussi substantiel que savoureux à la gent volatile, et notamment à la charmante famille des passereaux. Les habitans de certaines régions du Nord, tels que les Russes, les Polonais, les Livoniens, font frire ces graines avec quelques aromates, et ce *mets exquis* paraît au dessert sur les meilleures tables : les paysans se contentent de les piler, d'y joindre du sel, et d'étendre ce mélange sur du pain noir en guise de tartines. Tode et Schwediauer regardent l'infusion des semences de chanvre comme un excellent moyen de calmer la vive irritation des voies urinaires, qui accompagnent les blennorrhagies très-inflammatoires. Quelques médecins préfèrent administrer ces semences sous forme d'émulsion édulcorée avec le sirop de guimauve.

L'huile de chenevis est bonne à brûler ; elle entre dans la préparation des cérats, des onguens et du savon vert ; elle sert même à la nourriture grossière des pauvres Lithuaniens. Les gâteaux dont l'huile a été exprimée sont recherchés par le bétail, qu'ils engraissent.

Le chanvre des Indes, *cannabi similis exotica*, Bauhin ; *cannabis indica*, Lamarck, paraît, aux yeux du célèbre auteur de la *Flore française*, une espèce très-distinguée du chanvre ordinaire. Celui des Indes est moins grand, plus rameux ; sa tige plus dure, et presque cylindrique, porte des feuilles constamment alternes ; l'écorce mince dont elle est revêtue n'est point susceptible d'être filée et tissue comme celle du chanvre européen ; mais, en revanche, toute la plante exhale une odeur plus nauséabonde, et ses qualités vireuses sont bien plus for-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0348-9
DFG

tement prononcées. Loin d'être rebutés par ces propriétés vénéneuses, les Indiens y attachent un grand prix, et savent parfaitement les utiliser. C'est avec l'écorce, les feuilles, les fleurs, les graines du chanvre, tantôt isolées, tantôt réunies, souvent même jointes à d'autres substances, que les Orientaux préparent des poudres, des pastilles, des breuvages exhilarans, aphrodisiaques, dont l'abus toutefois produit inévitablement la torpeur, l'impuissance et l'idiotisme. Parmi ces compositions recherchées avec une sorte de fureur par les Orientaux, se distinguent le *haschisch* des Ismaéliens (7), le *bang*, *bangue* ou *bangi* des Usbecks, et le *maslac* des Turcs (8).

(7) A. I. Silvestre de Sacy, Mémoire sur les préparations enivrantes faites avec le chanvre. — Lu à l'Institut le 7 juillet 1809; analysé dans le *Bulletin des sciences médicales*; septembre 1809, page 201.
(8) Chardin, *Voyage en Perse*; tome 4, page 207.
P. B. Garnier, *Dissertation sur l'ivresse*; 1815, page 13.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 110.

(*La plante est représentée moitié de grandeur naturelle*)

1. Fleur mâle entière grossie.
2. Étamine grossie isolée.
3. Fleur femelle accompagnée de sa bractée, composée d'un cali espathiforme, au fond duquel est placé un ovaire ovale surmonté de deux styles légèrement plumeux.
4. La même grossie.

Obs. Toutes les figures du chanvre, données dans divers ouvrages, représentent toujours l'individu femelle; j'ai cru devoir ici préférer le mâle, tant parce que cela complette l'iconographie de cet intéressant végétal, que parce que l'image du mâle est plus belle. (T.)

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0349-7
DFG

Turpin P. Lambert Jne sculp

CHARDON-MARIE.

a. l. l

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0353-5
DFG

CHARDON-MARIE.

CHARDON-MARIE.

Grec..... σιλυβον; Dioscoride.

Latin..... CARDUUS ALBIS MACULIS NOTATUS VULGARIS; Bauhin, Πινακ, lib. 10, sect. 6. Tournefort, clas. 12, *flosculeuses.*

CARDUUS MARIANUS; *foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis, spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis, duplicato-spinosis;* Linné, clas. 19, *syngénésie polygamie égale.* Jussieu, clas. 10, ord. 2, *cinarocéphales.*

CARTHAMUS MACULATUS; Lamarck.

Italien..... CARDO DI MARIA; CARDO DEL LATTE.

Espagnol... CARDO MARIANO; CARDO LECHAL.

Français.... CHARDON-MARIE; CHARDON NOTRE-DAME; CHARDON ARGENTÉ.

Anglais..... MILK-THISTLE; LADIES' THISTEL.

Allemand... MARIENDISTEL; FRAUENDISTEL; MILCHDISTEL.

Hollandais... MARIENDISTEL; VROUWENDISTEL; MELKDISTEL.

Suédois..... SEMPERTIN.

Très-commune en Italie, en Angleterre, en Allemagne, cette plante annuelle, remarquable par la beauté de son feuillage, croît pareillement avec une sorte de profusion en France: on la trouve presque à chaque pas aux environs de Paris, et surtout à Montmorency, dans les lieux incultes, sur le bord des chemins et des fossés.

La racine est longue, épaisse, cylindrique, fibreuse.

La tige, ferme, droite, striée, rameuse, s'élève à la hauteur de deux à trois pieds.

Les feuilles sont alternes, grandes, larges, sinuées, épineuses, lisses, vertes, parsemées de taches laiteuses, de veines ou marbrures blanches qui les font paraître agréablement panachées (1). Les feuilles inférieures sont pétiolées, les supérieures sessiles et amplexicaules.

Les fleurs, solitaires à l'extrémité des tiges, sont grosses, purpurines, flosculeuses, composées de fleurons tubulés hermaphrodites dans le disque et à la circonférence, placés sur

(1) « On a dit qu'une goutte de lait de la vierge Marie, tombée sur cette plante, y fit les marques blanches que l'on voit sur ses feuilles. Les Grecs disaient de même qu'une goutte du lait de Junon fit la voie lactée. L'une de ces images est noble et poétique; l'autre est faible et triviale. »

THÉIS, *Glossaire de botanique;* 1810, page 89.

un réceptacle chargé de poils, et environnés par le calice commun, obrond, embriqué d'écailles appendiculées, hérissé d'épines latérales et terminales.

Le fruit consiste en plusieurs graines ovoïdes, anguleuses, lisses, couronnées d'une aigrette simple, sessile, très-longue, et renfermées dans le calice commun.

S'il faut juger des propriétés médicinales du chardon-marie, par ses qualités physiques, on sera porté à le ranger parmi les plantes alimentaires, plutôt que d'en surcharger la liste déjà si effrayante des drogues pharmaceutiques. En effet, toutes ses parties sont inodores, et leur faible saveur se fait à peine remarquer par une légère amertume. Les racines plaisent à divers animaux. Les tiges, après une ébullition préliminaire dans l'eau, peuvent être accommodées en guise de légumes. Les feuilles fraîches, débarrassées de leurs épines, se mangent en salade (2). Les têtes remplacent quelquefois celles d'artichaut (3), que pourtant elles sont loin d'égaler en délicatesse (4).

On a beaucoup exalté les vertus antipleurétiques des semences de chardon-marie réduites en poudre, et ainsi données en substance, ou administrées sous forme d'émulsion: Triller, auquel nous devons une monographie estimée de la pleurésie, rejette comme illusoire la faculté spécifique attribuée à des graines presque inertes.

S'il fallait en croire Mattioli, le chardon-marie serait un excellent hydragogue; il guérirait l'hydropisie, la jaunisse et les affections des voies urinaires; Macquart le prescrit dans la leucorrhée, et Lindanus n'hésite point à proclamer les graines de cette flosculeuse le remède souverain de l'hydrophobie. Ne suffit-il pas d'énoncer de pareilles assertions pour en faire sentir tout le ridicule?

(2) Les lapins sont très-friands des feuilles et des jeunes tiges de ce chardon, et Willich regarde cette nourriture comme très-salubre pour ces animaux à l'état de domesticité.

(3) Dans plusieurs départemens le chardon-marie est connu sous le nom de *artichaut sauvage*.

(4) Les Grecs faisaient cuire ce chardon, et l'assaisonnaient avec l'huile et le sel : η τις αρτιφυης εσθιεται εφθη συν ελαιῳ και αλσι.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0356-3
DFG

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Fleuron entier de grandeur naturelle, ayant à la base de son ovaire quelques-unes des soies qui tapissent le réceptacle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0357-9
DFG

Turpin. P. Lambert Jr. sculp.

CHATAIGNIER.

a. l. l.

CHATAIGNIER.

Turpin. P. Lambert Jne sculp.

CHATAIGNIER.

a. l. l.

CHATAIGNIER.

CXII.

CHATAIGNIER.

Grec	καστανον, Dioscoride; καστανάϊκον καρυον, Théophraste.
Latin	CASTANEA SYLVESTRIS, *quæ peculiariter* CASTANEA; Bauhin, Πιναξ, lib. 11, sect. 4. Tournefort, clas. 19, *arbres amentacés.*
	FAGUS CASTANEA; *foliis lanceolatis, acuminato-serratis, subtùs nudis;* Linné, clas. 21, *monœcie polyandrie.* Jussieu, clas. 15, ord. 4, *amentacées.*
	CASTANEA VULGARIS; Lamarck.
Italien	CASTAGNO.
Espagnol ...	CASTAÑO.
Français	CHATAIGNIER.
Anglais	CHESNUT; CHESNUT-TREE.
Allemand ...	KASTANIENBAUM; KOESTENBAUM.
Hollandais ...	KASTANJE-BOOM.
Suédois	CASTANIE-TRÅ.
Polonais	KASZTAN.

Sous le beau ciel de la Grèce, de même que sur les collines de la brillante Italie, le chataignier croît en abondance; la nature semble l'avoir multiplié en raison de son extrême utilité; on le trouve en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, et surtout en France, où il prospère merveilleusement.

Cet arbre, qui atteint communément la hauteur d'environ trente pieds, parvient quelquefois à une élévation beaucoup plus considérable, et acquiert des dimensions tellement prodigieuses en tout sens, qu'elles paraissent incroyables. Kircher, par exemple, dit avoir observé près du mont Etna, en Sicile, un chataignier dont la circonférence était de plus de cent pieds. Cet arbre monstrueux a depuis été soigneusement examiné, décrit et figuré par divers voyageurs (1); il porte le nom très expressif de *castagnaro di cento cavalli*. On trouve en Angleterre plusieurs chataigniers également remarquables par leurs immenses proportions et leur étonnante longévité. Celui de Bristol, par exemple, avait dix-neuf pieds de diamètre, et on le croyait âgé de plus de cinq cents ans (2).

(1) Houel, *Voyage pittoresque de Sicile;* tome 2, page 79, tab. 114. Bartels, *Briefe ueber Calabrien und Sicilien;* tom. 2, pag. 347.
(2) Houttuyn, *Natuurlyke historie;* pact. 3, pag. 344.

Qui n'a pas entendu parler du fameux chataignier de Tortworth, dans le comté de Gloucester? Depuis une longue suite de siècles il sert de limite; sa circonférence est de cinquante-deux pieds; déja, en 1150, il était appelé *the great chesnut*, et l'on présume qu'il compte plus de mille années d'existence (3).

Les feuilles du chataignier sont alternes, peu éloignées les unes des autres, pétiolées, longues-lancéolées, vertes, glabres, légèrement luisantes en dessus, nerveuses en dessous, dentées en manière de scie (4).

Les fleurs, monoïques, amentacées, sortent de l'aisselle des feuilles; les fleurs mâles, sessiles, groupées le long d'un chaton cylindrique, grêle, blanchâtre, offrent: un calice à cinq et plus souvent à six divisions, dans lequel sont implantées une douzaine d'étamines. Les fleurs femelles proviennent des mêmes boutons que les mâles, mais ne font point partie des chatons à la base desquels on les trouve communément placées: « elles sont renfermées, au nombre de trois (5), dans un involucre légèrement pédonculé, muni d'une écaille à sa base, et composé d'un grand nombre de petites écailles réfléchies, qui, à la maturité du fruit, deviennent autant d'épines. Ces trois fleurs, disposées sur une seule ligne, présentent, chacune: un ovaire inférieur, en forme de gourde, couronné d'un petit calice velu, divisé en six lobes, à l'intérieur duquel sont insérées douze petites étamines stériles, dont six alternativement plus courtes. Au centre du calice, sur le sommet de l'ovaire, s'élèvent six styles droits, cartilagineux, subulés, velus à leur base, terminés par des stigmates simples (6). »

(3) Houttuyn, *op. cit.*, part. 2, pag. 34.

(4) Chaque pétiole est accompagné à sa base de deux grandes stipules caduques. (T.)

(5) Dans le chataignier cultivé, l'involucre ne contient qu'une seule fleur.

(6) M. Turpin, auquel je dois cette description des fleurs femelles, m'a communiqué en outre plusieurs observations neuves sur la fructification du chataignier: je crois devoir consigner ici les plus intéressantes, à mon avis.

« Si l'on coupe transversalement un ovaire quelque temps après la fécondation, on voit que la véritable organisation de la chataigne est d'avoir six loges, par fois sept, et deux graines dans chacune, puisque cette coupe offre six cloisons, et six loges bourrées d'une substance spongieuse. Au sommet et dans l'angle de chaque loge, sont attachés deux ovules alongés, et terminés supérieurement par un bec. De ces nombreux ovules, un seul (rarement deux) se développe; en grossissant, il pousse, détruit toutes les cloisons, et remplit à lui seul toute la capacité du péricarpe. »

« En même temps que l'ovaire fécondé grossit et se convertit en fruit, l'involucre subit des changemens très-remarquables: de sphérique, il devient

Le fruit est une coque ou une capsule, hérisée extérieurement de pointes, s'ouvrant en deux ou quatre parties, et renfermant dans une seule loge autant de grosses graines qu'il y avait de fleurs dans l'involucre. Ces graines, universellement connues sous le nom de *chataignes*, ovales, obrondes, aplaties d'un côté, convexes de l'autre, consistent en une amande à chair blanche et ferme, recouverte d'une peau coriace, lisse et brune.

Nous possédons très-peu d'arbres qui réunissent des avantages aussi nombreux et aussi importans que le chataignier. Il croît dans les terres légères, dans les lieux secs et stériles, sur les rochers, les pierrailles. Les sols sablonneux lui conviennent assez; mais il redoute les terres argileuses, dures, grasses et marécageuses. Les montagnes du troisième ordre sont, en général, propres à sa culture; il se plaît sur le penchant des coteaux, où, par sa position naturelle, il a la faculté d'étendre ses branches, et de prendre la forme d'oranger, si agréable aux yeux des amateurs (7).

Au moyen de la greffe et de quelques soins agronomiques, le chataignier acquiert plus de volume et de perfection dans toutes ses parties; ses fruits mieux nourris, plus arrondis, plus savoureux, prennent alors le titre de *marrons*. Ceux qu'on apporte du Vivarais et du Dauphiné à Lyon, retiennent le nom de cette dernière ville, et sont les plus estimés de tous. On en récolte aussi d'excellens dans le Limousin (8).

Tous les peuples s'accordent à célébrer les louanges du chataignier. Les Anglais Miller, Bryant, Curtis, Willich,

tétragone, quadrivalve, toutes ses écailles molles se changent en autant d'épines acérées, ce qui lui donne entièrement l'aspect d'un hérisson. »

« Si l'on dégage adroitement la graine de l'enveloppe cartilagineuse du péricarpe, on retrouve encore à son sommet tous les petits ovules avortés. »

(7) Dutour, dans le *Nouveau dictionaire d'hist. nat.*, tome 5, 1803, page 94.

(8) « Un administrateur assez célèbre sous le ministère du duc de Choiseul, après avoir médité longtemps sur les moyens à employer pour pacifier les habitans de l'île de Corse, proposa de couper tous les chataigniers, parce que leur production annuelle fournissait à ces insulaires une subsistance assurée sans aucun travail, et d'y substituer la culture des grains, qui les obligerait à des travaux continuels pour se procurer une subsistance incertaine, ce qui les détournerait nécessairement des complots séditieux, qu'il regardait comme l'effet d'une oisiveté inquiète chez un peuple pauvre et sobre. Ce spéculateur, digne à cet égard de figurer parmi les conquérans du Nouveau-Monde, ignorait que les terrains plantés de chataigniers en Corse ne convenaient nullement à la culture des grains. On eut le bon esprit de ne point adopter ce projet insensé et destructeur. » (PARMENTIER)

les Allemands Bœhmer, Kruenitz, Ehrhart, Bechstein Hochheimer, Pietsch, les Italiens Arduini, Targioni, Rè, Santi, et une foule de nos compatriotes placent honorablement cet arbre à côté du chêne. C'est avec son bois que la plupart des anciens bâtimens de Londres ont été construits (9); la charpente d'une foule d'antiques édifices à Paris, à Lyon, et dans beaucoup d'autres villes de France, est pareillement en bois de chataignier, et depuis trois ou quatre siècles elle n'a pas souffert la plus légère altération (10). « La propriété qu'il a de conserver toujours son volume égal, sans se gonfler ni se resserrer, le rend surtout très propre à contenir toutes sortes de liqueurs; il laisse moins évaporer leur partie spiritueuse que le bois de sapin ou de chêne: aussi fait-on partout, avec le chataignier, des cerceaux et des futailles de toutes les grosseurs, dans lesquelles le vin conserve sa qualité, et se perfectionne même. On devrait, par cette raison, cultiver constamment cet arbre dans le voisinage des pays de vignoble. D'ailleurs, il procure un ombrage agréable; il a une très-belle forme, et figure très-bien dans les parcs et dans les plantations d'ornement. Mais il ne faut pas le placer trop près des habitations, parce qu'il répand, lorsqu'il est en fleur, une odeur spermatique nauséabonde (11). »

Chaque pays a sa méthode de récolter les chataignes. Presque toutes ces méthodes sont vicieuses. On doit préférer celle de l'illustre agronome Parmentier. « Les chataignes et les marrons ramassés au grand soleil, exposés ensuite à l'action de cet astre pendant sept à huit jours, sur des claies, que l'on retire tous les soirs, et que l'on pose les unes sur les autres dans l'endroit le plus chaud de la maison, acquièrent la propriété de se conserver très-longtemps, et même de supporter les plus longs trajets sans rien perdre de leur excellent goût et de leur faculté reproductive. »

La consommation prodigieuse qui se fait de toutes parts en chataignes et en marrons, démontre suffisamment qu'on sait les apprécier ce qu'ils valent. Des peuplades entières en font leur nourriture principale et presque exclusive, pendant plusieurs saisons de l'année; elles s'en servent en outre pour engraisser leurs bestiaux. « Le chataignier, dit M. Bodard, forme le plus grand et le plus intéressant revenu que

(9) Miller, *Gardeners dictionary*.
(10) Houttuyn, *Natuurlyke historie*; part. 2, pag. 347.
Gilibert, *Démonstrations élém. de botanique*, 1796; tome 3, page 340.
(11) Dutour, dans le *Nouveau dictionaire d'hist. nat.*, tome 5; 1803, page 98.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0370-9
DFG

l'art et la nature fournissent aux habitans du Montamiata en Toscane. Tendres ou mûres, fraîches ou sèches, crues ou cuites, réduites en farine, préparées en beignets ou en bouillie, les chataignes offrent un aliment sain, agréable au goût, et facile à digérer. » Ce que le docteur Bodard a vu pratiquer en Toscane, nous le retrouvons en France dans les départemens de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuze ; j'ajouterai que les procédés employés par les Limousins me semblent infiniment préférables à ceux de leurs voisins. Ceux-ci, en effet, se contentent, suivant le docteur Grellet (12), de faire bouillir les chataignes, sans jamais enlever la seconde écorce, qui détériore singulièrement une graine farineuse et sucrée, rend sa déglutition très-pénible, et lui communique une saveur âcre insupportable. M. Grellet félicite ses concitoyens de métamorphoser ainsi un aliment en médicament; rien n'est plus propre, selon lui, à guérir les dysenteries métalliques qui affligent épidémiquement les habitans des rives de la Creuze, que l'enveloppe intérieure des chataignes, à l'aide du bienfaisant tannin dont elle est imprégnée. Sans adopter avec une confiance aveugle les assertions exagérées du docteur Grellet, je croirai volontiers que les chataignes non *pelées* peuvent n'être pas inutiles dans certains périodes du catarrhe intestinal; mais je reste intimement persuadé que les individus bien portans se privent d'une grande jouissance en ne pelant jamais leurs marrons.

M. Bodard nous assure que le chocolat préparé avec parties égales de marrons et d'amandes de cacao torréfiés, est d'une qualité supérieure à celui composé de cacao seul. Il faut pardonner cette hyperbole à l'utile propagateur des végétaux indigènes. L'amour de la patrie est une vertu si noble, et maintenant si rare!

Il est *possible* de faire du pain de chataignes, et le conseiller Pietsch affirme en avoir fabriqué de très-bon en augmentant la dose du levain. Il est permis de concevoir quelques doutes sur la *foi germanique* de l'économiste prussien, et de s'en rapporter au témoignage plus authentique de notre vénérable Parmentier, l'un des plus fameux *panificateurs* de l'Europe (13). Je pense donc, avec lui, que le boulanger le

(12) *Recherches sur quelques causes de la dysenterie*; in-4°. Paris, 1807.

(13) Voyez la plupart de ses ouvrages, et notamment son *Parfait boulanger*; in-8°. Paris, 1778; et son *Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la manière de faire leur pain*; in-8°. Paris, 1777.

plus éclairé, en appliquant les procédés de son art à la farine des meilleurs marrons, n'en obtiendra jamais qu'un aliment bien inférieur à la *polenta* des Italiens, et au *châtigna* des Limousins.

Les marrons glacés sont une confiture sèche délicieuse. Macquart dit que l'on peut préparer avec la chataigne des émulsions, des cataplasmes; on en retire une liqueur alcoolique. L'écorce du chataignier distille parfois une gomme estimée; l'enveloppe coriace du fruit sert dans la teinture; enfin, l'énumération des usages auxquels on peut employer les diverses parties de cet arbre intéressant, exigerait, pour être complette, des développemens qui me sont interdits.

PIETSCH (Jean Gotthold), *Abhandlung von Anziehung und Pflanzung der Kastanienbœume, hauptsæchlich der guten essbaren, und dem Gebrauch ihrer fruechte;* c'est-à-dire, Traité de la culture et de la plantation du chataignier, et principalement de l'usage de son fruit; in-8°. Halle, 1776.
PARMENTIER (Antoine Augustin), *Traité de la chataigne;* in-8°. Bastia et Paris, 1780.

EXPLICATIONS.

PLANCHE 112.

(*La plante, représentée au moment de sa floraison, est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle*)

1. Involucre situé à la base d'un épi, dans lequel sont contenues trois fleurs femelles ou hermaphrodites.
2. Fleur mâle entière grossie.
3. Trois fleurs femelles, dégagées de l'involucre, grossies.
4. Corolle d'une fleur femelle ouverte, dans laquelle on voit douze étamines stériles, six alternativement plus courtes.
5. Coupe transversale d'un ovaire, dans laquelle on aperçoit six loges remplies d'une espèce de bourre.
6. Jeune fruit coupé verticalement pour faire voir que les ovules, quelquefois au nombre de deux dans chaque loge, sont attachés dans l'angle supérieur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0372-1
DFG

PLANCHE 112 bis.

(*La plante, représentee au moment où l'involucre s'ouvre pour laisser échapper les chataignes, est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle*)

1. Fruit entier, plus petit que nature.
2. Graine dépouillée de son péricarpe, au sommet de laquelle on voit plusieurs ovules avortés.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0373-7
DFG

CHELIDOINE.

a. l. l.

CXIII.

CHÉLIDOINE.

Grec	Χελιδόνιον μεγα.
Latin	CHELIDONIUM MAJUS VULGARE; Bauhin, Pinax, 88. { sect. 2. Tournefort, clas. 5, *cruciformes*.
	CHELIDONIUM MAJUS; *pedunculis umbellatis*; Linné, clas. 13, *polyandrie monogynie*. Jussieu, clas. 13, ord. 2, *papavéracées*.
Italien	CELIDONIA; CENEROGNOLA.
Espagnol	CELIDONIA; CELIDONIA MAYOR.
Français	CHÉLIDOINE; CHÉLIDOINE COMMUNE; GRANDE CHÉLIDOINE; ÉCLAIRE; ÉTINCELLE.
Anglais	CELANDINE.
Allemand	SCHELLENKRAUT; SCHWALBENKRAUT.
Hollandais	SCHELLE-KRUID; GOUWE.
Suédois	SVAL-ÖRT.
Polonais	JASKOLAK; Erudiel.

Théophraste, Dioscoride, Galien ont vu la chélidoine croître abondamment sous le beau ciel de la Grèce; nous rencontrons cette plante vivace dans toute l'Europe, le long des haies, autour des puits, sur les vieilles murailles, sur les terrains incultes et couverts. Gmelin l'a trouvée extrêmement répandue sur le sol affreux de la Sibérie, et le docteur Schœpf l'a souvent recueillie aux environs de New-Yorck, en Amérique.

La racine est brune-rougeâtre, cylindrique, fibreuse, chevelue.

Les tiges, droites, grêles, fragiles, rameuses, légèrement duvetées, s'élèvent à la hauteur d'environ un pied et demi.

Les feuilles sont alternes, grandes, molles, ailées, découpées en lobes arrondis, vertes en dessus, glauques en dessous, et munies de poils rares seulement sur leur pétiole.

Les fleurs, jaunes, sont disposées en manière d'ombelles au sommet des tiges. Chaque fleur présente: un calice formé de deux folioles, ovales, concaves, caduques (1); une corolle de quatre pétales obtus, planes, ouverts en croix; vingt à trente, quelquefois cinquante à soixante étamines, dont les filamens jaunes portent des anthères didymes; un ovaire supérieur, terminé par un stigmate bifide.

(1) Avant l'épanouissement des pétales, le calice est d'une seule pièce; il se déchire en deux par l'action des pistils naissans.

(CHAIGNEAU)

Soc. *Libration*.

CHELIDOINE.

CXIII.

CHÉLIDOINE.

Grec..... χελιδονιον μεγα.

Latin..... CHELIDONIUM MAJUS VULGARE; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 3. Tournefort, clas. 5, *cruciformes*.
CHELIDONIUM MAJUS; *pedunculis umbellatis*; Linné, clas. 13, *polyandrie monogynie*. Jussieu, clas. 13, ord. 2, *papavéracées*.

Italien..... CELIDONIA; CENEROGNOLA.

Espagnol.... CELIDONIA; CELIDONIA MAYOR.

Français.... CHÉLIDOINE; CHÉLIDOINE COMMUNE; GRANDE CHÉLIDOINE; ÉCLAIRE; FELOUGNE.

Anglais..... CELANDINE.

Allemand.... SCHELLKRAUT; SCHOELKRAUT; SCHWALBENKRAUT.

Hollandais... SCHELLE-KRUID; GOUWE.

Suédois..... SVAL-ÖRT.

Polonais..... JASZKOLKE; Erndtel.

Théophraste, Dioscoride, Galien ont vu la chélidoine croître abondamment sous le beau ciel de la Grèce; nous rencontrons cette plante vivace dans toute l'Europe, le long des haies, autour des puits, sur les vieilles murailles, sur les terrains incultes et couverts. Gmelin l'a trouvée extrêmement répandue sur le sol affreux de la Sibérie, et le docteur Schœpf l'a souvent recueillie aux environs de New-Yorck, en Amérique.

La racine est brune-rougeâtre, cylindrique, fibreuse, chevelue.

Les tiges, droites, grêles, fragiles, rameuses, légèrement duvetées, s'élèvent à la hauteur d'environ un pied et demi.

Les feuilles sont alternes, grandes, molles, ailées, découpées en lobes arrondis, vertes en dessus, glauques en dessous, et munies de poils rares seulement sur leur pétiole.

Les fleurs, jaunes, sont disposées en manière d'ombelles, au sommet des tiges. Chaque fleur présente: un calice formé de deux folioles, ovales, concaves, caduques (1); une corolle de quatre pétales obtus, planes, ouverts en croix; vingt à trente, quelquefois cinquante à soixante étamines, dont les filamens jaunes portent des anthères didymes; un ovaire supérieur, terminé par un stigmate bifide.

(1) Avant l'épanouissement des pétales, le calice est d'une seule pièce; il se déchire en deux par l'action des pétales tuméfiés.

(GILIBERT)

Le fruit est une silique grêle, de la longueur d'un pouce et demi, bivalve, contenant dans une seule loge une centaine de graines obrondes, luisantes, noirâtres.

Dans son état de fraîcheur, la chélidoine exhale une odeur désagréable, que Tournefort compare à celle des œufs couvés, et Murray à celle de la moisissure septique. L. Elle a un goût amer, accompagné d'une âcreté qui diminue par la dessiccation, tandis que l'amertume augmente. Ces qualités physiques sont essentiellement dues à la présence d'un suc jaune-orange, dont toutes les parties de la plante sont copieusement imprégnées, et qui s'en écoule à la plus légère incision.

Linné, Murray, Schallern, Gilibert, Bodard s'étonnent avec raison de l'injuste oubli auquel a été condamnée pendant plusieurs siècles une substance pleine d'énergie, et que les anciens avaient parfaitement appréciée; ils font la remarque très-judicieuse que les propriétés sont plus éminentes, et en quelque sorte plus concentrées dans la racine. Galien l'administrait, infusée dans du vin blanc, pour la guérison de l'ictère; Dioscoride y ajoutait de l'anis; Foreest la faisait bouillir dans la bière. Chomel, dont, au reste, l'autorité n'est pas d'un grand poids, conseille de faire macérer les feuilles de chélidoine dans du petit-lait, auquel on ajoute un peu de crême de tartre. Je pense qu'il convient d'adopter la méthode indiquée par le professeur Wendt: il exprime, en été, le suc de toute la plante, et le mêle à une égale quantité de miel. La dose, qui d'abord est de deux gros, est graduellement portée jusqu'à une demi-once, délayée dans une à deux cuillerées d'eau. Au printemps et en automne, il n'emploie que le suc de la racine, et en hiver, il administre l'extrait de la plante toute entière, dont il forme des pilules de deux grains: il commence par en donner deux; puis il porte successivement le nombre jusqu'à dix, et continue cette dose jusqu'à ce que la cure soit complette. Mais le professeur d'Erlangen, entraîné par sa prédilection pour la chélidoine, lui accorde des vertus trop éminentes et trop multipliées; il ne la prescrit pas seulement contre l'ictère, les embarras viscéraux, les fièvres intermittentes, les hydropisies; elle est en outre, selon lui, un remède souverainement propre à combattre les affections scrophuleuses et siphilitiques. Disciple de Wendt, le docteur Schallern a renouvelé des Grecs la réputation antophtalmique de la chélidoine (2);

(2) Le mot χελιδονιον dérive très-certainement de χελιδων, hirondelle: mais la chélidoine a-t-elle reçu cette dénomination parce que ses fleurs s'épanouissent à l'arrivée des hirondelles, et se fanent au départ de ces oiseaux voya-

et, à l'exemple de son maître, il a parfois outrepassé les limites de la stricte vérité. Les anciens préparaient dans un vase de cuivre un collyre composé du suc de cette plante et de miel. L'eau distillée d'éclaire, recommandée depuis pour remplir la même indication, est un topique presque inerte. Le docteur Schallern fait usage intérieurement et extérieurement de la chélidoine pour dissiper les maladies des yeux; il se flatte d'avoir, par ce moyen, prévenu la cataracte, dissipé des ophtalmies, absorbé des taies, guéri des amauroses.

Les vices cutanés, qui se manifestent sous tant de formes hideuses, et repoussent avec obstination les secours de l'art, cèdent pourtant quelquefois à la chélidoine, administrée en topique et à l'intérieur par un praticien habile. Gilibert regarde le suc de chélidoine comme un des plus puissans détersifs des ulcères cacoèthes. Le peuple en fait chaque jour usage, et non sans succès, pour détruire les cors, les verrues, et autres durillons.

Le Prussien Kramer *raconte* les cures de goutte et de calcul qu'a opérées, sous ses auspices, l'infusion théiforme de chélidoine.

La couleur jaune que communique au papier, aux étoffes, à la peau, le suc de cette plante, est passagère; une simple ablution d'eau suffit pour l'effacer; par conséquent, l'art tinctorial ne peut, alors, en retirer aucun avantage. Mais, au moyen de la fermentation, le professeur saxon C. G. Rœssig a obtenu de la chélidoine une couleur bleue solide, semblable à celle de la guède.

CREUZBAUER (George Adam), *De radicis chelidonii majoris ad solvendos pellendosque cholelithos efficaciâ, biga observationum comprobata*, *Diss.* in-4°. *Argentorati*, 1785.

GLUMM (Joseph Antoine), *De chelidonio majori*, *Diss.* in-4°. *Duisburgi*, 1786.

SCHALLERN (Théophile Adam Joseph de), *Dissertatio inauguralis, quâ chelidonii majoris virtus medica novis observationibus firmatur;* in-4°. *Erlangæ*, 1790.

geurs; ou bien, faut-il rapporter ce titre générique à la persuasion dans laquelle étaient les Grecs que les hirondelles se servaient du suc de chélidoine pour rendre la vue à leurs petits dont on avait crevé les yeux? J'ai vu plusieurs de mes contemporains, et surtout de bons Tourangeaux, mes compatriotes, ajouter une confiance évangélique à ce conte puéril; je n'en ai point été surpris; la sotte crédulité n'est-elle pas de tous les temps et de tous les pays?

EXPLICATION DE LA PLANCHE 113.

(*La plante est réduite aux deux tiers de sa grandeur naturelle*)

1. Calice diphylle, caduque, étamines et pistil.
2. Fruit ou silique de grandeur naturelle, tel qu'il s'ouvre dans sa maturité.
3. Graine grossie, armée d'une caroncule particulière.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0382-7
DFG

Turpin P. Dubois sculp.

CHÊNE

a.ll.

CHÊNE.

Grec..... Δρυς

Latin..... QUERCUS FOLIIS LOBATIS SESSILIBUS; Boulon, Tournef., lib. II, sect. 2, Pocockiart, class. 23, *arbres amentacés*.
QUERCUS FOLIIS *foliis deciduis, oblongis, sinuosis (lobatis, sinubus acutioribus) angulis obtusis*; Linné, class. 21, *monoecia polyandria*, Jussieu, class. 15, ord. 2, *amentacées*.

Italien..... QUERCIA.
Espagnol.... ENCINA; ROBLE.
Français.... CHÊNE; ROUVRE.
Anglois..... OAK.
Allemand... EICHE.
Hollandois... EIKE; EIKEBOOM.
Suédois..... EK.
Polonais.... DAB.

Parmi les végétaux qui ornent et enrichissent nos forêts, le chêne tient sans contredit le premier rang : il est le roi des arbres européens. Ses immenses racines pénètrent profondément et s'étendent au loin dans le sol, tandis que sa cime majestueuse s'élève parfois jusqu'à près de cent pieds de hauteur (1).

Les feuilles, portées sur des pétioles extrêmement courts, sont alternes, oblongues, plus larges vers leur sommet, divisées en leurs bords en découpures obtuses, arrondies et sinueuses; leur surface supérieure est lisse, verte; l'inférieure, presque glauque, est marquée de nervures latérales et obliques.

Les fleurs sont monoïques, c'est-à-dire, pour parler le langage si expressif et si vrai de l'immortel Linné, que les deux sexes, habitant la même maison, reposent dans des lits différens. Les fleurs mâles, distribuées d'espace en espace sur un long chaton mince, lâche et pendant, offrent : un calice membraneux, formé d'une seule feuille, découpée en cinq segmens; dix étamines, dont les filamens très-courts portent des anthères larges, divisées en deux par un sillon. Les fleurs femelles, solitaires, ou groupées en très-

(1) *Quantum vertice ad auras*
Ætherias, tantum radice in Tartara tendit.
(VIRGILE)

Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
(LAFONTAINE)

CHÊNE.

CXIV.

CHÊNE.

Grec..... δρυς.

Latin..... QUERCUS CUM LONGO PEDICULO; Bauhin, Πινακ, lib. 11, sect. 4. Tournefort, clas. 19, *arbres amentacés*.
QUERCUS ROBUR; *foliis deciduis, oblongis, supernè latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis*; Linné, clas. 21, *monœcie polyandrie*. Jussieu, clas. 15, ord. 4, *amentacées*.

Italien..... QUERCIA.
Espagnol.... ENCINA; ROBLE.
Français.... CHÊNE; ROUVRE.
Anglais..... OAK.
Allemand... EICHE.
Hollandais... EIKE; EIKENBOOM.
Suédois..... EK.
Polonais.... DAB

Parmi les végétaux qui ornent et enrichissent nos forêts, le chêne tient sans contredit le premier rang : il est le roi des arbres européens. Ses immenses racines pénètrent profondément et s'étendent au loin dans le sol, tandis que sa cime majestueuse s'élève par fois jusqu'à près de cent pieds de hauteur (1).

Les feuilles, portées sur des pétioles extrêmement courts, sont alternes, oblongues, plus larges vers leur sommet, divisées en leurs bords en découpures obtuses, arrondies et sinueuses; leur surface supérieure est lisse, verte; l'inférieure, presque glauque, est marquée de nervures latérales et obliques.

Les fleurs sont monoïques, c'est-à-dire, pour parler le langage si expressif et si vrai de l'immortel Linné, que les deux sexes, habitant la même maison, reposent dans des lits différens. Les fleurs mâles, distribuées d'espace en espace sur un long chaton mince, lâche et pendant, offrent : un calice membraneux, formé d'une seule feuille, découpée en cinq segmens; dix étamines, dont les filamens très-courts portent des anthères larges, divisées en deux par un sillon. Les fleurs femelles, solitaires, ou groupées en très-

(1) *Quantùm vertice ad auras*
Ætherias, tantùm radice in Tartara tendit.
(VIRGILE)

Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
(LAFONTAINE)

petit nombre sur les jeunes rameaux, et dans les aisselles des feuilles supérieures, sont tantôt sessiles, tantôt soutenues par un pédoncule commun plus ou moins long (2); elles présentent : un calice monophylle, hémisphérique, coriace, raboteux en dehors; un ovaire supérieur, à trois loges confuses, dont chacune est surmontée de trois, quatre ou cinq styles réfléchis.

Le fruit, universellement connu sous le nom de *gland*, est une sorte de capsule ou de coque ovoïde, enchâssée par toute sa base dans une coupe ou cupule hémisphérique, assez épaisse, lisse en dedans, écailleuse en dehors : cette coque formée d'une peau cartilagineuse et tres-polie, ne s'ouvre point; elle contient une amande de même forme, dont la substance, modérément dure, se partage en deux lobes.

Les poètes, les philosophes, les romanciers, les agronomes, les économistes ont à l'envi célébré le chêne; il a constamment été l'emblème de la force et de la durée. « Son élévation, sa grosseur et l'épaisseur de son feuillage attestent sa supériorité sur ceux qui croissent autour comme loin de lui. Dans l'antiquité, il fut un objet de vénération pour ces peuples qui prêtaient une âme à toutes les productions de la nature. Les chênes de la forêt de Dodone rendirent des oracles; depuis, ceux des Gaules servirent d'autels; c'était sous leur ombre sacrée que les Druides chantaient des hymnes à l'Eternel. Chez les Grecs et les Romains, une branche de chêne tressée en couronne fut toujours regardée comme la plus belle récompense qu'on put offrir à la vertu, et l'estimable citoyen qui l'avait méritée s'en tenait plus honoré que s'il avait été comblé de la faveur des rois. C'est ainsi que tout était ennobli et agrandi par l'imagination vive de ces hommes qui nous ont précédés de vingt siècles. Aujourd'hui nous ne voyons dans le chêne qu'un simple objet d'utilité, et cet arbre superbe, consacré autrefois à Jupiter, et qui reçut tous les honneurs des mystères fabuleux, ne présente maintenant à nos yeux que de froids matériaux pour nos édifices, pour notre marine et pour nos divers usages domestiques (3). »

(2) M. Leman et M. Turpin ont observé dans la forêt de Saint-Germain une foule de chênes qui portaient sur le même pied des glands sessiles et d'autres suspendus, en nombre binaire ou ternaire, à l'extrémité d'un pédoncule long de deux ou trois pouces. Ces deux habiles botanistes concluent de cette observation que le chêne roure et le chêne à grappe, de Lamarck, sont une seule et même espèce.

(3) Dutour, dans le *Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle;* tome 5; 1803, page 127.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0388-2
DFG

« Presque toutes les expositions, tous les terrains conviennent au chêne : le fond des vallées, la pente des collines, la crête des montagnes, un sol sec ou humide, la glaise, le limon, le sable, il s'établit partout ; mais il en résulte de grandes différences dans son accroissement et dans la qualité de son bois. Il se plaît et réussit mieux dans les terres douces, limoneuses, profondes et fertiles ; il profite très-bien dans les terres dures et fortes qui ont du fond, et même dans la glaise ; il s'accommode aussi des terrains sablonneux, crétacés et graveleux, pourvu qu'il y ait assez de profondeur. »

« Nul bois n'est d'un usage aussi général que celui du chêne ; il est le plus recherché et le meilleur pour la charpente des bâtimens, la construction des navires, des moulins, des pressoirs ; pour la menuiserie, le charronage ; pour des treillages, des échalas, des cercles ; pour du bardeau, des éclisses, des lattes, des douves, et pour tous les ouvrages où il faut de la solidité, de la force, du volume et de la durée ; il est excellent pour faire des tonneaux, des cuves, des fouloirs et autres vases nécessaires à la confection du vin. »

« Le désavantage du chêne est d'avoir beaucoup d'aubier, et d'une qualité bien inférieure à celle du cœur du bois. Cet aubier, qui est très-marqué et d'une couleur particulière, se pourrit promptement dans les lieux humides, et quand il est placé sèchement, il est bientôt vermoulu et corrompt tous les bois voisins ; aussi doit-on l'enlever très-soigneusement (4). »

Je vais examiner maintenant plus en détail les qualités physiques, l'emploi économique et les propriétés médicinales des diverses parties du chêne. L'écorce de l'arbre adulte est épaisse, raboteuse, brune sur le tronc, lisse et cendrée sur les jeunes branches : dépourvue d'odeur, elle a un goût acre et très-astringent, dû à la grande quantité de tannin dont elle est imprégnée. Aussi, de toutes les matières connues est-elle la meilleure et la plus recherchée pour tanner les peaux. La poudre de tan qui a servi à la préparation des cuirs forme d'excellentes couches dans les serres chaudes ; ou bien, réduite en disques, elle est brûlée sous le nom de *mottes*. Les thérapeutistes n'ont point négligé l'écorce de chêne ; ils l'ont administrée souvent avec succès tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les maladies causées par la flac-

(4) *Encyclopédie alphabétique*; article *chêne*.
Encyclopédie méthodique : botanique, tome 1, page 716.
Dutour, *loc. cit.*

cidité des solides, et dans les flux muqueux immodérés ou opiniâtres ; ils la prescrivent sous différentes formes ; tantôt ils la donnent pulvérisée, à la dose d'un gros, incorporée dans du miel ou dans une conserve ; tantôt ils font bouillir une once d'écorce dans une livre d'eau ou de bière ; tantôt ils en préparent un extrait aqueux. Le docteur Alibert reconnaît l'efficacité de ce remède dans les leucorrhées constitutionnelles entretenues par une faiblesse générale et un relâchement de la membrane muqueuse vaginale : dans ce dernier cas, on injecte la partie souffrante en même temps qu'on fait prendre à l'intérieur la poudre, l'extrait ou la décoction. Ledel a guéri par ce moyen des diarrhées et des dysenteries ; Scopoli, Cullen et Schwilgué ont dissipé des fièvres intermittentes. Appliquée extérieurement, l'écorce de chêne mondifie les ulcères sordides, arrête quelquefois l'accroissement des gonflemens œdémateux, et même les progrès des hernies commençantes chez les enfans.

Si l'on fait une incision au tronc d'un chêne, il en distille une eau, que l'on fait tiédir, pour en imbiber les compresses avec lesquelles on enveloppe les membres frappés de douleurs arthritiques. L'académicien Hagedorn dit avoir retiré de ce topique les plus grands avantages.

On recueille une espèce de manne sur les jeunes pousses et sur les feuilles de chêne (5). Celles-ci pilées et appliquées sur les plaies, en favorisent la cicatrisation, au rapport de Galien et de Reneaulme. Infusées dans du vin auquel on ajoute une suffisante quantité de miel, elles forment un gargarisme que le docteur Darel juge très-efficace pour combattre les angines rebelles.

Des panégyristes ignorans, imposteurs ou enthousiastes des mœurs antiques, répètent avec une affectation bien ridicule, que nos bons aïeux, plus simples, plus sobres, moins sensuels que leurs descendans, trouvaient dans les fruits du chêne une nourriture abondante et savoureuse. J'ignore quelle époque ces louangeurs inconsidérés assignent à cet heureux siècle de bonhomie, à ce prétendu âge d'or. Mais j'ai beaucoup lu l'histoire de nos devanciers, et j'ai acquis la triste conviction qu'ils ne valaient pas mieux que nous. Je me suis également assuré que si, dans des années de disette, ils avaient eu recours aux glands du chêne roure, jamais ces fruits âpres et insalubres n'avaient été leur aliment ordinaire. Ainsi, je n'aperçois aucune différence, sous ce rapport, entre les hommes du tems passé et ceux du temps

(5) Gilibert, *Démonstrations élém. de botanique;* tom. 3 ; 1796, pag. 337.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0390-3
DFG

présent. Les Norwégiens, en effet, les Smolandais, et diverses hordes misérables des contrées septentrionales, ont souvent été forcés de mêler de la farine de glands à celle des graminées. Les Français eux-mêmes, bien que possesseurs d'un sol fertile, ont été réduits, dans la malheureuse année 1709, à manger de ce pain détestable, qui produisit de graves accidens : on peut cependant, à l'aide de quelques procédés, le rendre moins désagréable et moins nuisible (6). Les glands dont certains peuples se nourrissaient jadis, appartiennent à des espèces différentes, et n'ont pas discontinué de servir au même usage, comme j'aurai bientôt occasion de le dire. Il n'y a donc rien encore de changé sur ce point, rien qui prouve la dégénération de nos contemporains. Si les glands du chêne ordinaire n'ont pas été destinés par la nature à nous alimenter, ils sont avidement recherchés par plusieurs oiseaux de nos basses-cours, et surtout par les cochons, auxquels ils procurent un excellent lard.

Rejetés de la bromatologie, les fruits du chêne méritent-ils d'occuper une place distinguée dans la thérapeutique ? Dioscoride leur attribue de nombreuses vertus, ainsi qu'à la cupule ; il les prescrit intérieurement et à l'extérieur comme propres à faciliter la sécrétion de l'urine, à calmer la céphalalgie, à dissiper les flatuosités, à détruire l'effet des poisons, à modifier les ulcères. Arnauld de Villeneuve a composé en l'honneur du chêne un petit traité spécial, qui ne valait guère la peine qu'a prise Lessing de le publier. Quoi qu'il en soit, les glands avaient perdu depuis plusieurs siècles leur réputation médicinale ; ils semblaient désormais destinés à engraisser nos animaux domestiques : tout-à-coup divers médecins allemands leur supposent des propriétés multipliées et merveilleuses. Schrœder assure qu'il n'existe pas de moyen plus efficace pour fondre les obstructions glanduleuses et viscérales (7). Les docteurs Marx (8) et Keiser (9) enchérissent sur leur confrère de Marbourg, préconisent la toute-puissance des glands pour la cure des scrophules, du rachitis, de la phtisie, de l'asthme, de l'hydropisie, de l'épilep-

(6) Parmentier, *Recherches sur les végétaux nourrissans qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les alimens ordinaires ;* in-8°. Paris, 1781.

(7) *Von den Wirkungen der Eicheln, Verstopfungen der Druesen im menschlichen Kœrper aufzulœsen ;* in-4°. *Gœttingen*, 1774.

(8) *Geschichte der Eicheln, nebst Erfahrung ueber den diœtetischen und medicinischen Gebrauch derselben ;* in-8°. *Dessau*, 1784.

(9) *Unterricht vom dem Nutzen und besonderen Heilkraft der Eicheln in Absicht auf Duerrsucht oder Auszehrung der Kinder ;* in-8°. *Lemgo*, 1775—1781.

sie, des fièvres intermittentes. Karch dit en avoir obtenu des succès remarquables dans les diarrhées et les dysenteries (10). Enfin, il est peu de maladies qu'on n'ait essayé de combattre avec les glands, soit crûs, soit torréfiés comme le café, et mêlés par fois à cette délicieuse graine orientale. Il est curieux d'observer que le même pays vit naître les éloges les plus hyperboliques et les critiques les plus sévères des fruits du chêne. Jean-Jacques Mueller soutint en 1778, à l'université de Francfort sur l'Oder, sous la présidence de Pierre-Emmanuel Hartmann, une dissertation (11) dans laquelle il prouve que les glands administrés avec toutes les précautions indiquées par Schrœder, Marx, Keiser et Karch, loin de modérer la violence des symptômes, de mettre un terme aux souffrances, ont constamment rendu l'état des malades pire, et souvent désespéré. Faut-il donc bannir absolument les glands de la matière médicale? Non, sans doute; il faut tenter de nouvelles expériences cliniques plus judicieuses, plus impartiales, et conséquemment plus décisives.

Presque toutes les espèces de chêne, servent d'habitation et de pâture à des insectes parasites, dont l'un pique les fleurs, l'autre les rameaux, celui-ci les feuilles, celui-là leurs pétioles. Cette piqûre détermine des excroissances de forme, de consistance et de grosseur diverses, auxquelles on a donné le nom de *galles* ou *noix de galle*. Celles que produit le cynips sur les bourgeons des jeunes rameaux du *quercus insectoria*, d'Olivier, sont, suivant ce naturaliste voyageur, les noix de galle du commerce. Recueillies avant la sortie de l'insecte, elles sont dures, tuberculeuses, pesantes, ligneuses, brunes, et on les désigne sous le nom de *galles noires*: les meilleures viennent d'Alep. Les galles dont l'insecte s'est échappé sont percées, leur pesanteur est moins considérable, leur qualité très-inférieure, et on les appelle *galles blanches*.

Regardée jadis comme un remède précieux, la noix de galle n'est point assez estimée par les médecins de nos jours, qui semblent l'abandonner aux teinturiers. Hippocrate s'en servait à l'extérieur contre les affections de la matrice, et Galien guérissait les fièvres intermittentes en l'administrant à la dose d'un gros. L'usage externe et interne de la noix de galle est indiqué dans les maladies asthéniques des systèmes lymphatique et cellulaire, dans quelques flux muqueux

(10) *Kurzgefasste Anmerkungen ueber die Heilkræfte der Eicheln in der Ruhr*; in-8°. *Frankfurt*, 1782.

11) *Suspiciosas glandium quernarum laudes publicè reputat.*

trop abondans, tels que la blennorrhée, la leucorrhée. Virgile conseillait de s'en servir pour guérir la diarrhée des abeilles :

Proderit et tunsum gallæ admiscere saporem.

Elle est un puissant auxiliaire pour retenir en place les parties dont la contiguité a été rompue.

Par sa simple infusion dans l'eau, la noix de galle laisse déposer des cristaux brillans, lamelleux ou octaèdres, de saveur aigre et styptique ; c'est l'acide gallique, qui conserve les propriétés de la substance qui l'a fourni. L'acool bouillant dissout parties égales de cet acide ; froid, il en dissout le quart. L'acool gallique qui en résulte me paraît un astringent très-énergique, susceptible de remplir des indications curatives variées. La noix de galle contient en outre une très-grande proportion de tannin.

Une foule d'autres espèces de chêne mériteraient une mention spéciale ; je dois me borner à indiquer celles qui m'ont semblé plus essentiellement utiles, renvoyant, pour les détails qui me sont interdits, aux monographies de Jean Duchoul (12), de Jean Engstroem (13), de Secondat (14), de Juge-de-Saint-Martin (15), de Michaux (16), et au savant voyage de Humboldt.

1°. Le chêne grec, petit chêne, chêne hêtre, *quercus esculus*, L. ne s'élève guère qu'à six pieds de hauteur ; il se dépouille tous les ans, et porte des glands sessiles, longs, assez doux, qui cependant occasionnent une pesanteur de tête, et même une sorte d'ivresse, soit qu'on les mange bouillis ou grillés, soit qu'on les réduise en pain.

2°. Le chêne à feuilles rondes, *quercus rotundifolia*, Lamarck, croît naturellement en Espagne, et produit des glands gros, longs, d'une saveur agréable. Il s'en fait une telle consommation, que M. Bosc raconte les avoir vu vendre sur le marché à Burgos, avec le même débit que la chataigne en France.

3°. Le chêne ballotte, *quercus ballota*, Desfontaines, acquiert une élévation de trente à quarante pieds ; c'est un

(12) *Varia quercûs historia*; in-8°. fig. *Lugduni*, 1555.
(13) *De quercu*, *Diss. inaug. resp. Lange*; in-4°. *Lundini Gothorum*, 1738.
(14) *Mémoire sur l'histoire naturelle du chêne*, etc.; in-fol. fig. Paris, 1785.
(15) *Traité de la culture du chêne*; in-8°. Paris, 1788.
(16) *Histoire des chênes de l'Amérique*, etc.; in-fol. fig. Paris, 1801.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0393-1
DFG

des arbres les plus communs dans les royaumes d'Alger et de Maroc ; « Il y en a d'immenses forêts sur les montagnes de Belide, de Mascar, de Tlemsen. On le rencontre quelquefois dans les plaines, mais en petite quantité. Les fruits, que l'on vend dans les marchés publics, sont très-nourrissans, et n'ont aucune amertume ; on les mange crûs, bouillis ou rôtis. Dans quelques cantons de la Barbarie, on en exprime une huile très-douce. Il serait facile, et en même temps très-avantageux d'acclimater et de multiplier en France cet arbre, qui fournirait à l'économie domestique ses glands savoureux, et aux arts son bois dur, compacte et pesant (17).

4°. Le chêne liège, *quercus suber*, L. se distingue éminemment par son écorce fort épaisse, spongieuse, crevassée, connue sous le nom de *liège;* on l'en dépouille tous les huit ou dix ans. Loin de l'endommager, cette opération est pour lui un moyen tutélaire. Les arbres non écorcés demeurent rarement en bon état plus de cinquante à soixante ans ; ceux dont l'écorce est enlevée à des époques régulières, subsistent plus de cent cinquante ans.

5°. Le quercitron ou chêne noir de Pensylvanie, *quercus tinctoria*, Michaux, parvient à la hauteur de soixante ou quatre-vingts pieds. C'est lui qui depuis quelques années a été introduit dans le commerce sous le nom de *quercitron*, pour l'usage de la teinture, à laquelle il fournit une couleur jaune-serin très-solide. Son écorce, également jaune, est excellente pour le tannage des cuirs.

C'est sur une espèce de chêne, *quercus coccifera*, L. qu'on recueille le kermès ou grain d'écarlate; et les recherches d'un médecin-naturaliste fort distingué (18) tendent à prouver qu'une autre espèce non encore bien déterminée produit une substance beaucoup trop vantée, sous le titre *d'alcornoque*.

(17) Desfontaines, *Flor. Atlant.*; tom. 2, pag. 350.
Poiret, *Voyage en Barbarie*; tome 2, page 258.
Dutour, dans le *Nouveau Dictionaire d'hist. nat.*; tome 5; 1803, pag. 143.
(18) Virey, dans le *Bulletin de pharmacie;* année 1811, page 332; et année 1813, pages 14 et 263.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 114.

(*La plante est réduite aux trois-quarts de sa grandeur naturelle*)

1. Grappe de fleurs mâles de grandeur naturelle.
2. Fleur mâle grossie.
3. Fleurs femelles de grandeur naturelle.
4. Gland ou péricarpe détaché de sa capsule ou involucre

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0394-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0395-3
DFG

Turpin. P. *Dubois sculp.*

CHERVI.

CXV.

CHERVI.

Grec	σισαρον (1).
Latin	SISARUM GERMANORUM; Bauhin, *Hist.* lib. 4, sect. 5; Tournefort, clas. 12, ord. 2, *ombelliferæ*. SISUM SISARUM; *foliis pinnatis, foliolis ternatis*; Linné, clas. 5, *pentandria digynia*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombelliferæ*.
Italien	SISARO.
Espagnol	CHIRIVIA.
Français	CHERVI; CHERVIS; CERROUIS; CIBOLE.
Anglois	SKIRRET.
Allemand	ZUCKERWURZEL.
Hollandois	SUIKERWORTEL; SKIRRET WORTEL.
Suédois	SOCKER-ROT.

Il paroît que cette ombellifère vivace est originaire de la Chine, et se rapproche singulièrement du fenouil (2). Certains botanistes sont même d'opinion que c'est une seule plante désignée sous des noms différens (3).

La racine est composée de cinq à neuf ou dix tubérosités, longues de six à sept pouces, grosses comme le doigt, ridées, anguleuses (4), fendues, faciles à rompre, blanches, disposées en faisceau comme une botte de navets, et terminées de même par des radicules filiformes.

Les tiges, droites, striées, s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds.

Les feuilles, alternes, amplexicaules, ailées, sont garnies de cinq, sept ou neuf folioles ovales, pointues, finement dentées en leurs bords et opposées à l'exception de la terminale; les feuilles florales sont ternées.

Les fleurs, petites, blanches, sont disposées en ombelles terminales, dont les rayons varient beaucoup pour le nombre, qui souvent est fort considérable. L'ombelle générale, ainsi

(1) Le savant Sibthorp pense que le chervi n'est point le σισαρον, mais bien l'ελαιοσελινον de Dioscoride; l'erudit Jean Bodeus à Stapel est d'un avis contraire.

(2) Linné, *Systema plant. ed. Reichard*, tom. 1, pag. 694.
Lamarck, *Encyclopédie méthodique : botanique*, tome 1, pag. 636.

(3) Mordant De Launay, *Le bon jardinier*, 1814, pag. 24.

(4) On remarque trois lignes longitudinales qui suivent en règle les divisions principales.

CHÆRVI.

CXV.

CHERVI.

Grec.....	σισαρον (1).
Latin.....	SISARUM GERMANORUM; Bauhin, Πιναξ, lib. 4, sect. 5; Tournefort, clas. 12, ord. 2, *ombellifères*.
	SIUM SISARUM; *foliis pinnatis, floralibus ternatis*; Linné, clas. 5, *pentandrie digynie*. Jussieu, clas. 12, ord. 2, *ombellifères*.
Italien.....	SISARO.
Espagnol.....	CHIRIVIA.
Français.....	CHERVI; CHERVIS; CHIROUIS; GIROLE.
Anglais.....	SKIRRET.
Allemand.....	ZUCKERWURZEL.
Hollandais.....	SUIKERWORTEL; SUIKERYWORTEL.
Suédois.....	SOCKER-ROT.

Il paraît que cette ombellifère vivace est originaire de la Chine, et se rapproche singulièrement du fameux ninsi (2). Certains botanistes sont même d'opinion que c'est une seule plante désignée sous des noms différens (3).

La racine est composée de cinq à neuf ou dix tubérosités, longues de six à sept pouces, grosses comme le doigt, ridées, annelées (4), tendres, faciles à rompre, blanches, disposées en faisceau comme une botte de navets, et terminées de même par des radicules filiformes.

Les tiges, noueuses, striées, s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds.

Les feuilles, alternes, amplexicaules, ailées, sont garnies de cinq, sept ou neuf folioles ovales, pointues, finement dentées en leurs bords et opposées, à l'exception de la terminale; les feuilles florales sont ternées.

Les fleurs, petites, blanches, sont disposées en ombelles terminales, dont les rayons varient beaucoup pour le nombre, qui souvent est fort considérable. L'ombelle générale, ainsi

(1) Le savant Sprengel pense que le chervi n'est point le σισαρον, mais bien l'ελαφοβοσκον de Dioscoride; l'érudit Jean Bodæus à Stapel est d'un avis contraire.

(2) Linné, *Systema plant. ed. Reichard*; tom. 1, pag. 694.
Lamarck, *Encyclopédie méthodique : botanique*; tome 1, page 405.

(3) Mordant De Launay, *Le bon jardinier*; 1814, page 24.

(4) On remarque trois lignes longitudinales qui suivent en zigzags les étranglemens. (T.)

que les ombellules, sont munies à leur base d'une collerette formée de quatre ou cinq folioles simples, linéaires et inégales. Chaque fleur présente : une corolle rosacée de cinq pétales égaux, subcordiformes; cinq étamines, plus longues que les pétales; un ovaire inférieur, chargé de deux styles courts.

Le fruit consiste en deux graines accolées, convexes et striées d'un côté, planes de l'autre.

Une odeur agréable s'exhale des fleurs du chervi; mais c'est à l'excellence de sa racine que cette plante doit son antique réputation. Cultivée jadis dans tous les jardins potagers, elle était servie, diversement préparée, sur la table des rois. L'infâme Tibère, durant son séjour en Allemagne, trouva les racines de chervi tellement délicieuses, qu'il en exigea chaque année une certaine quantité en forme de tribut. Je suis étonné de voir un mets si savoureux, si nourissant, condamné de nos jours à un injuste oubli. Cependant la culture du chervi est facile, et sa racine offre une ressource précieuse : elle donne un amidon d'une blancheur éclatante; soumise à la fermentation, elle fournit abondamment de l'alcool; Marggraf en a extrait de très-beau sucre, comparable, sous tous les rapports, à celui qu'on retire de la canne.

Les pharmacologistes ne cessent de répéter que la propriété médicamenteuse dans les végétaux est, comme dans les substances des autres règnes, en raison inverse de la qualité alimentaire. Voilà pourquoi les poisons deviennent, dit-on, des remèdes héroïques, lorqu'ils sont administrés par un praticien habile et judicieux. Ce n'est point ici le lieu de discuter, de commenter cette proposition, vraie à plusieurs égards. Il me suffit d'observer que les médicamens héroïques sont réservés pour les cas graves. La plupart des maladies qui nous affligent réclament des moyens plus doux; elles cèdent fréquemment à des alimens médicamenteux, qui n'ont point, comme les drogues énergiques, le fatal inconvénient de porter dans toute l'économie humaine un trouble et un désordre souvent irremédiables. Profondément pénétré de cette vérité, c'est dans la bromatologie que je puise, toutes les fois que cela m'est possible, les agens thérapeutiques. Je pense, avec Boerhaave, que le chervi convient merveilleusement aux hémoptysiques, aux personnes atteintes de catarrhe pulmonaire chronique et menacées de phtisie. Je le crois encore très-utile dans les phlegmasies et les irritations du tube alimentaire et des voies urinaires, telles que le ténesme, la dysenterie, la strangurie, l'hématurie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0400-4
DFG

A l'exemple du célèbre professeur de Leyde, je conseillerais cette racine appétissante, et même tant soit peu aphrodisiaque, dans le lait, dans le petit-lait, dans les bouillons, et, pour ainsi dire, dans tous les alimens des malades.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 115.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Racine réduite au quart de sa grandeur naturelle.
2. Feuille inférieure au trait.
3. Fleur entière grossie.
4. Fruit de grandeur naturelle.
5. Le même grossi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0401-0 DFG

Mlle E. Panckoucke P. Lambert Fr. sculp.

CHÈVRE-FEUILLE.

a. l. l.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0404-8 DFG

CXVI.

CHEVREFEUILLE.

Grec. . . . . PERIKLYMENON; PERIKLOIMENOS.

Latin. . . . . CAPRIFOLIUM GERMANICUM, *Bauhin, Pinax*, lib. 8, sect. . . .

CAPRIFOLIUM GERMANICUM, *Tournefort*, clas. 19, *arbres monopétales*.

LONICERA PERICLYMENUM; *capitulis ovatis, involucris tomentosis, foliis ovatis duriusculis*; Linné, cla. 5, *pentandria monogynia*.

CAPRIFOLIUM; Jussieu, clas. 11, ord. 3, *chevrefeuilles*.

Italien. . . . . CAPRIFOGLIO; CAPRIFOLIO; MADRESELVA.

Espagnol. . . . MADRESELVA.

Français. . . . CHEVREFEUILLE; CHEVRIFEUILLE DES BOIS.

Anglois. . . . . WOOD-BIND; WOODBINE.

Allemand. . . . GEISSBLATT; GEISSBLATT; HARTWINDEN; IN TÄFERN IN LAUBEN; GAMSBLATTLEIN.

Hollandois. . . . GAERSCHELT; KAMPERFOELIE; GRITENBLAD; WEI-WINDE.

Dans presque tous les bois, dans la plupart des haies de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre, on trouve ce bel arbrisseau, qui forme trois variétés tellement distinctes que certains botanistes les ont signalées comme de véritables espèces : le chevrefeuille des bois, le gratte-cul, et celui à feuilles de chêne. Bien que la première de ces variétés soit notre chevrefeuille le plus ordinaire, je vais décrire la seconde, pour que le texte soit en harmonie parfaite avec la figure qui, d'ailleurs, a été dessinée sur un individu cueilli dans les bois de Sèvres. Rien ne prouve mieux, à mon avis, que la présence ou l'absence des poils est purement accidentelle.

La racine du chevrefeuille glabre est ligneuse, partagée en plusieurs grosses fibres rampantes et stolonifères.

(1) Sprengel juge que le ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΣ de Dioscoride est effectivement l'arbuste auquel Linné applique la même dénomination spécifique, tandis que le ΧΑΜΑΙΚΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΡΞ désigne le benjoin, *styrax benzoin*. Plusieurs physiologistes, et entre autres Gaspard Bauhin, n'osent pas prononcer aussi affirmativement; ils croient dans le doute philosophique et pensent que ce doute est suffisamment justifié par les descriptions vagues, imparfaites et incomplètes que nous ont laissées les anciens naturalistes grecs.

CHEVRE-FEUILLE

CXVI.

CHEVREFEUILLE.

Grec..... Περικλυμενον; Dioscoride (1).

Latin.....
- PERICLYMENUM NON PERFOLIATUM GERMANICUM; Bauhin, Πιναξ, lib 8, sect. 2.
- CAPRIFOLIUM GERMANICUM; Tournefort, clas. 20, *arbres monopétales.*
- LONICERA PERICLYMENUM; *capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus, foliis omnibus distinctis;* Linné, clas. 5, *pentandrie monogynie.*
- CAPRIFOLIUM; Jussieu, clas. 11, ord. 3, *chevrefeuilles.*

Italien..... CAPRIFOGLIO; CAPRIFOLIO; MADRESELVA.

Espagnol.... MADRESELVA.

Français..... CHEVREFEUILLE; CHEVREFEUILLE DES BOIS.

Anglais..... HONEY-SUCKLE; WOODBINE.

Allemand... GEISSBLATT; SPECKLILIE; WALDWINDE; JE LÆNGER JE LIEBER; HAHNENFUESLEIN.

Hollandais... CAPERFOELY; KAMPERFOELY; GEITENBLAD; WEE-WINDE.

Dans presque tous les bois, dans la plupart des haies de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre, on trouve ce bel arbrisseau, qui forme trois variétés tellement distinctes que certains botanistes les ont signalées comme de véritables espèces : le chevrefeuille des bois velu, le glabre, et celui à feuilles de chêne. Bien que la première de ces variétés soit notre chevrefeuille le plus ordinaire, je vais décrire la seconde, pour que le texte soit en harmonie parfaite avec la figure qui, d'ailleurs, a été dessinée sur un individu cueilli dans les bois de Sèvres. Rien ne prouve mieux, à mon avis, que la présence ou l'absence des poils est purement accidentelle.

La racine du chevrefeuille glabre est ligneuse, partagée en plusieurs grosses fibres rampantes et stolonifères.

(1) Sprengel juge que le περικλυμενον de Dioscoride est effectivement l'arbuste auquel Linné impose la même dénomination spécifique, tandis que le κυκλαμενος ετερα désigne le *lonicera caprifolium.* Plusieurs phytologistes, et entre autres Gaspard Bauhin, n'osent pas prononcer aussi affirmativement; ils restent dans le doute philosophique, et j'avoue que ce doute est suffisamment justifié par les descriptions courtes, imparfaites et inexactes que nous ont laissées les anciens naturalistes grecs.

Les tiges, sarmenteuses, grimpent et s'entortillent autour des arbres (2).

Les feuilles, ovales, alongées, pointues, rétrécies à leur base, sont opposées et sessiles.

Les fleurs, grandes, rougeâtres en dehors, jaunâtres en dedans, sont disposées en jolis bouquets terminaux, qui sont épanouis durant toute la saison de l'été. Chaque fleur présente : un calice supérieur, petit et à cinq dents, une corolle monopétale, tubuleuse, dont le limbe est partagé en cinq découpures inégales, l'inférieure étant plus grande et plus ouverte que les autres ; cinq étamines, dont les filamens portent des anthères oblongues ; un ovaire inférieur, arrondi, duquel s'élève un style couronné par un stigmate obtus.

Les fruits, agglomérés en manière de tête, sont des baies globuleuses, rouges, dont chacune contient, au milieu de sa pulpe, quatre ou cinq graines assez dures, aplaties d'un côté, convexes de l'autre.

Si le chevrefeuille de nos haies doit céder la première place, dans les jardins, à une espèce plus brillante et plus suave, il y figure encore d'une manière très-agréable au second rang. Toutefois, le mérite de ce charmant arbrisseau ne se borne point à servir d'ornement; il possède bien d'autres qualités, s'il faut en croire certains économistes et un grand nombre de médecins. La racine fournit, suivant Reuss, une couleur bleu-ciel, et Suckow dit que les jeunes branches peuvent aussi être employées dans l'art tinctorial. On fait avec les tiges et les rameaux des dents pour les herses, des peignes pour les tisserands, des tuyaux de pipes à fumer (3). L'écorce a été proposée par Kœnig et par Bœcler comme un sudorifique utile dans la goutte vague et la siphilis. Les feuilles, broutées par les vaches, les brebis et les chèvres, sont négligées par les chevaux. Schrœder, Bœcler, Chomel les prescrivent à l'extérieur et à l'intérieur ; ils assurent que leur décoction est diurétique ; et Gardane en compose un gargarisme dont il vante l'efficacité dans l'angine ; pilées

(2) On présume que le chevrefeuille doit à cette faculté de grimper, de s'entortiller, le nom de *periclymenum*, de περιχλειω, j'entoure, j'enveloppe, et peut-être aussi son titre vulgaire *caprifolium*, dont *chevrefeuille* est la traduction française littérale; parce que, dit Théis, il grimpe comme une chèvre, *vel quòd folia sint in extremis flexibus capreolata*, suivant Lobel. D'autres étymologistes, Bœcler, par exemple, voient dans le mot *caprifolium* l'empressement avec lequel les chèvres broutent les feuilles de cet arbrisseau. Quant à la dénomination générique, elle rappelle un célèbre naturaliste allemand du seizième siècle, Adam Lonicer.

(3) Kops, *Flora Batava*.

fraîches, et appliquées sur la peau, elles accélèrent, dit-on, la cure des exanthèmes qui la souillent On ajoute que le suc exprimé de ces feuilles jouit des mêmes vertus. Quant aux fleurs, elles ont été célébrées par Hofmann et Rondelet comme cordiales, céphaliques, anti-asthmatiques, et souveraines pour faciliter l'accouchement. On en préparait jadis une eau distillée, une huile par infusion, et un sirop que l'on supposait infaillible pour suspendre et dissiper le hoquet. Les fruits du chevrefeuille n'ont point été oubliés par les thérapeutistes. Dioscoride a débité sur leurs propriétés merveilleuses des contes tellement absurdes, que je n'ose les répéter. Digérées en vaisseau clos, dans du fumier de cheval, ces baies se résolvent en une liqueur huileuse, dans laquelle George Agricola voit un baume polychreste, auquel les plaies récentes les plus graves ne résistent jamais.

Que faut-il penser maintenant de ces éloges fastueux que l'expérience n'a point confirmés? c'est que les plus illustres médecins ont rarement su se préserver de l'erreur dans l'appréciation des drogues. Il est si facile, et parfois si doux de mettre les prestiges d'une imagination exaltée à la place d'un jugement froid et d'une saine observation!

Parmi les autres espèces de chevrefeuille, je vais mentionner celles qui m'ont semblé se distinguer davantage par l'agrément qu'elles offrent ou par l'utilité qu'on en retire.

1°. Le chevrefeuille des jardins, ou d'Italie, *lonicera caprifolium*, L. est caractérisé par ses belles fleurs verticillées, sessiles, terminales, et par ses feuilles supérieures cohérentes et perfoliées. Sa tige n'est ordinairement qu'une souche ligneuse, qui pousse de nombreux rameaux cylindriques, lisses, colorés, très-flexibles, s'élevant assez pour garnir de hautes murailles, des palissades, des berceaux, des cabinets. On peut aussi le réduire en buisson, l'arrondir en tête, ou en faire des cordons et des haies. Placé au pied des arbres, dans les massifs ou les avenues, il monte et serpente autour de leur tronc, s'entrelace dans leurs branches, et retombe en formant des arcades et des guirlandes qui flattent la vue et l'odorat.

2°. Le chevrefeuille du Chili, *lonicera corymbosa*, L. est un arbrisseau dont la tige non sarmenteuse parvient à dix ou douze pieds, et dont la fleur n'a que quatre étamines. Les branches sont le principal ingrédient d'une teinture noire très-solide, qu'on prépare dans les Indes espagnoles.

3°. Le chevrefeuille d'Acadie, la dierville, *lonicera diervilla*, L. ne s'élève guère qu'à la hauteur de deux à trois pieds. Il doit à ses jolies fleurs jaunes la place que par fois

on lui accorde dans les bosquets. Il y figure certainement mieux que dans la matière médicale, où il a été introduit par Linné, puis par Murray, sur la foi du voyageur Pierre Kalm, qui raconte les succès que les Américans septentrionaux obtiennent constamment de cette plante dans la dysurie, la blennorrhagie urétrale, et dans d'autres affections siphilitiques.

4°. Le chevrefeuille de la Caroline, *lonicera symphoricarpos*, L. porte ses fruits réunis en tête, comme l'exprime sa dénomination spécifique. Il sert à la décoration des bosquets d'automne, et Willemet dit que les Américains font usage de ses jeunes branches réduites en poudre fine, contre les fièvres intermittentes.

5°. Le chevrefeuille des buissons, *lonicera xylosteum*, L. croît dans presque toute l'Europe, à la hauteur de cinq ou six pieds. La dureté de son bois, désignée par l'épithète *xylosteum*, le rend propre à divers usages économiques. Les baies sont émétiques et purgatives. « Les Russes tirent de ce végétal une huile qu'ils emploient intérieurement pour purifier le sang, guérir la vérole, le scorbut et la gale (4). »

6°. Le chevrefeuille des Alpes, *lonicera alpigena*, L. est garni de feuilles larges et très-longues. Les pédoncules, axillaires, portent chacun deux fleurs labiées, jaunâtres en dedans, purpurines en dehors, auxquelles succèdent deux baies réunies en une seule, rouge dans sa maturité, et chargée de deux points noirs. Ces baies, semblables à de petites cerises, jouissent de la faculté cathartique et vomitive.

Le chevrefeuille bleu; *lonicera cœrulea*, L. doit ce titre à la couleur bleuâtre de ses baies ovales, polyspermes, pleines d'un suc pourpre qui teint parfaitement et solidement les étoffes.

(4) Willemet, *Phytographie encyclopédique*; 1805, tome 1, page 216.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 116.

(*La plante est représentée de grandeur naturelle*)

1. Pistil et corolle ouverte, dans laquelle on voit l'insertion des cinq étamines.
2. Tête de fruit de gosseur naturelle.
3. Un fruit isolé, coupé horizontalement, afin de faire voir les quatre ou cinq graines qui se trouvent au milieu de sa pulpe.
4. Graine grossie.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0410-0 DFG


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0412-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-168394-p0415-0

DFG