

Das X. Capitel.

Von den Blumen.

Die officinalische Blumen sind:

Flores Acaciae, pruni sylvestris, Schlehen-Dorn-Blüth.
 Amaranthi purpurei, Floramor.
 Anthos, s. rorismarini, Rosmarin-Blüth.
 Aquilegiae, Akeley-Blüth.
 Aurantiorum, Pomeranzen-Blüth.
 Balauftiorum, Granatenblüth, Granat-Röslein.
 Basilici, Basilien-Blumen.
 Bellidis majoris, Brust-Blumen.
 minoris, Marien-Blumen.
 Betonicae, Betonike.
 Borraginis, Borrageubl.
 Buglossae, Ochsenzungenubl.
 Calcatrippae s. consolidae regalis, Rittersporn.
 Calendulae, Calthae, Ringelbl. Gelbe.
 Caprifolii, Periclymeni, Specklilien.
 Carthami, Cnici, Flor, Safflor, wild Saffran.
 Centaurii minoris, Tausendgüldenubl.
 Cerasorum, Kirschenubl.
 Chamameli s. Chamomillae vulgaris, Camillen-Blumen.
 Romanae, Römisch Camillenubl.
 Cheiri, gelbe Viole.
 Cichorii, Wegwartubl.
 Consolidae minoris, Prunellae, Brunellenubl.
 Cnici sativi, Safflor.
 Croci, Saffranubl.
 Cyani s. Baptiseculae, Blaufornubl.
 Cynosbati, wilde Rosen.
 Enulae, Alantblumen.
 Epaticae albae, weisse Leberblumen.
 caeruleae, blaue Leberblume.
 Euphrasiae, Augen-Trostbl.
 Fabarum, Bohnenubl.
 Genistae, Ginstern-Pfirschenubl.
 Flor. Granatorum, Balauftia, Granatenubl.
 Hyperici, Johannisubl.
 Jacae, Dreyfaltigkeitubl.
 Jasmini, Jasminubl.
 Juglandis, Nußubl. Juli Juglandis.
 Lavendulae, Lavendelubl.
 Ligustri, Hartriegel.
 Liliorum alborum, weiß Lilienubl.
 Antherae lilior. albor. das Gelbe von Lilien.
 Liliorum convallium, Mayenubl.
 Lupuli, Hopfen.
 Malvae arboreae, Stock-Rosen.
 Malvae hortensis, Winter-Rosen, Maul-Rosen,
 Pappel-Rosen.
 Matricariae, Metter-Blumen.
 Meliloti alb. Stein-Kleeubl. weiß Steinklee.
 Meliloti Citrii, gelb Steinklee.
 Melissa, Melissen-Blumen.
 Nymphaeae albae, weisse Seebl.
 Origani, Wohlgemuth.
 Paeoniae, Peonienubl.
 Papaveris erratici, Rhoeadis, Klapper-Rosen.
 Hortensis, Magsamenubl.
 Persici, Persigubl.
 Populi, i. e. gemmae s. oculi, Poppel-Knospen.
 Primulae veris, paralyseos, Schlüsselblümlein.
 Rorismarini, vide Anthos.

Rosarum albarum, s. pallidarum, weisse Rosen.
 Damascenarum, Damascenische Rosen.
 Rubrarum, rothe Rosen.
 Sylvestrium, s. caninarum, Heck-Rosen.

Salviae, Salben-Blumen.
 Sambuci, Holderubl.
 Saxifragiae albae, Steinbrechubl.
 Scabiola, Apostemubl.
 Schœnanthi, Camelheu, ic.
 Siliginis, Kornubl.
 Spicae Celticae, Marien Magdalenen-Blumen.
 Spicanardi, Spicanardi.
 Stœchados Arabicae, Stechasubl.
 Stœchad. citrin. Rheinubl.
 Tanaceti, Rheinfarn-Blumen.
 Tiliae, Linden-Blumen.
 Tunicae, Gras-Nägelein.
 Tussilaginis, Huslattigubl.
 Verbasci, Wulkraut-Königskerzenubl.
 Violarum Martiarum, Merzen-Viole.

Aus besagten sind vor andern berühmt, und werden mit einem einigen Namen Cordiales, (Herz-Blumen) genannt, und sind Borrageubl, Ochsenzungenubl, Rosen und Viole.

Aus den Blumen kan man allerhand bereitere Stücke machen, Decocta, Destillata, Lattwergen, Infusionen, Salben, Pflaster, ic. die minder gemeine bereitere Stücke aber sind die dick gemachte Säfte, Extracta, Tincturae, Essenzen, oder Spirit. und Del, ic.

N. Die Blumen, die aus einem flüchtigen Theile bestehen, geben kaum etwas oder wenig Salz, und sind tauglicher zu denen Medicamenten, die sonder lange Ausdampfung bereitet werden.

Die Kräfte: Ob man schon der Blumen Kräfte insgemein nicht beschreiben kan, weil sie nach Unterscheid der Kräuter unterschieden; so ist doch an diesem Ort zu merken, daß die frische Blumen feucht sind, und deswegen eine lindernde und laxirende Kraft besitzen, welches die ältern nicht mehr thun.

Das XI. Capitel.

Von den Blättern und Kräutern.

Die Namen der Blätter und Kräuter werden in den Recepten oft verworren: denn die Blätter bedeuten eigentlich diß, was vom Stengel abgenommen wird; sind aber diese klein, so nennet man summitates, (Spizlein.)

Die gebräuchlichsten Kräuter in der Officin sind:

Abrotanum, mas, Stabwurz.
 N. foemina, das Weiblein, ist Cyparissus, Garten-Cypress.
 Absinthium ponticum, Römisch Wermuth.
 Vulgare s. rusticum, gemein Wermuth.
 Acetosa, Saurampfer.
 Acetosella, alleluja, Buchampfer, Hasen-Klee.
 Adiantum album, Mauer-Nauten.
 aureum nigrum, goldener Widerthon,
 Frauen-Haar.
 Ageratum, Eupatorium Mesuae, Leber-Balsam.
 Agrimonia, Odermennig.
 Alcea, Cannabis sylvestris, Sigmarskraut.
 Alchimilla, Einmau.

Alke-

- Alkekengi, Halicacabus, Judenkirschenblätter.
 Alinae, Morsus gallinae, Hünerdarm.
 Althæa, Bismalva, Ibisus, Eibisch-Kraut.
 Anagallis terrestris, rubra, Gauchheil, roth
 Gauchheil.
 Anagallis aquatica, Beccabunga, Bachbungen.
 Anethum, Dill.
 Antirrhinum, Hundskopf, Doranth.
 Apium, Paludapium, Markt, Eppich.
 Aquilegia, Agley-Kraut.
 Aristolochia longa, lange Osterluzey.
 Arnica, Mutterwurz, Wolverley.
 Artemisia, Beyfuß, weiser und rother.
 Asarum, Haselwurz-Kraut.
 Attriplex, Milde, Hundsmelte.
 Auricula muris, Pilosella, Mausohrlein.
 Balsamita, Silybrium aquaticum, Bachmünz.
 Basilicum, Basilien.
 Beccabunga, Bachbungen.
 Bellis major et minor, groß und klein Naglie-
 ben, Gäns-Blumen.
 Beta alba, weis Mangold.
 rubra, roth Mangold.
 Betonica, Betonien.
 Betula, Birken-Laub.
 Blitum rubrum, rother Meyer.
 Borrago, Borretsch.
 Botrys, Traubenkraut.
 Branca ursina, Bären-Klau, Bartsch.
 Brassica, weisser Kohl.
 Buglossum, Ochsen-Zungen.
 Bupthalmum, Streichblumen-Kraut.
 Bursa pastoris, Täschelkraut.
 Buxus, Buchsbaum-Laub.
 Calamiotha, Korumünz.
 montana, Bergmünz.
 Capillus Veneris, adianthum nigrum, Frauen-
 Haar.
 Caprifolium, Periclymenum, Baldwinde,
 Specklilien.
 Cardiaca, Herzgespan.
 Carduus benedictus, Cardobenedictenkraut.
 Mariz, Mariendistel.
 Caryophyllata, Sanamunda, Benediktenwurzel-
 Kraut.
 Cerefolium, Körbelkraut.
 Ceterach, Aplenium, Milzkraut.
 Chamædris, Iva moschata, Samanderkraut.
 Chamæpitys, Iva arthetica, Je länger je lieber.
 Chamælea, Mezereum, Seidel-Bast.
 Chamæmelum Romanum, Römisch Camillen,
 vulgare, gemeine Camillen.
 Chelidonium majus, Schellkraut.
 Ch. minus, Scharbocks-Kraut.
 Cichorium, Wegwart.
 Cicuta, Wüterich.
 Cochlearia, Löffelkraut.
 Consolida major, Symphytum, Ballwurzkraut.
 media, Bugula, gülden Gänzel.
 minor, Brunelle.
 Saracenicæ, Heidnisch Wund-Kraut.
 Regalis, Nittersporn.
 Conyza, Pulicaria, Dürrwurz-Kraut.
 Corallina, Meer-Moos.
 Cotula foetida, Hundsdill.
 Crassula major, Fabaria, fette Henne.
 Cuscuta, Cassucha, Flachseiden.
 Cynoglossum, Hundszungen.
 Cyparissus hortulana, Garten-Cypress.
 Daucus hortensis, Möhren-Kraut.
 Diastamus Creticus, Cretischer Diptam.
 Diastamus albus, Fraxinella, weisser Diptam.
 Ebulus, Aittich.
 Endivia fativa, Endivien.
 Sylvestris, Sonchus, Sau-Distel.
 Epithymum, Thymseide.
 Equisetum, cauda equina, Rosschwanz,
 Schaffsheu.
 Erica alba, weisse Heide.
 rubra, rothe Heide.
 Eruca, Senff-Kraut.
 Eryngium, Manns-Treu, blaue Distel.
 Erysimum, Weg-Senff, wilder Senff.
 Esula, Wolfs-Milch.
 Eupatorium Arabum, Ageratum, Leberkraut.
 Euphrasia, Augentrost.
 Fabaria vide Crassula.
 Farfara, Tussilago, Hufstättig.
 Filix, Fahren-Kraut.
 Fœniculum, Fenchel-Kraut.
 Filipendula, saxifraga rubra, roth Steinbrech.
 Fragaria, Erdbeer-Kraut.
 Fraxini folia, Eschenlaub.
 Fumaria, Erdrauch.
 Galega, ruta capraria, Geißkraute.
 Genista, Psriemen-Kraut.
 Geranium, herba Roberti, Storchschnabel.
 Gnaphalium, Ruhr-Kraut.
 Gratiola, Erd-Galle.
 Hedera arborea, Epheu, Eppich.
 terrestris, Sundermann.
 Hepatica alba, gramen Parnassi, weiß Leberkraut.
 H. aurea nobils, gülden Leberkraut.
 H. fontana, Lichen, Brunnen-Leberkraut.
 H. Stellaris, matrisylva, Stern-Leberkraut,
 Waldmeister.
 Herniaria, millegrana, Harnkraut, Bruchkr.
 Hippoglossum, Zäpfelkraut.
 Horminum vulgare, Sclarea, Scharley.
 Hyoscyamus albus, weiß Bilsenkraut.
 Hypericum, St. Johanneskraut.
 Hyssopus, Jisp.
 Jacea, herba Trinitatis, Dreyfaltigkeitkraut.
 Illecebra, fabaria, Donnerkraut.
 Imperatoria, Meisterwurzkraut.
 Iva arthetica, vide Chamæpitys.
 Lactuca, Lattich.
 Lagopus, Pes leporinus, Hispidula, Hasen-
 pfötlein.
 Lapathum acutum, Oxylapathum, Rumex,
 Grind-Wurzkraut.
 Lappa major, Bardana, grosses Klettenkraut.
 Laureola, Seydelbast.
 Laurifolia, Lorbeerblätter.
 Lentesculostres, Wasserlinsen.
 Lepidium, Salsenblätter.
 Levisticum, Liebstöckel.
 Ligusticum, Hartriegel.
 Linaria, wilder Flach, Leimkraut.
 Lingua cervina, Hirschzungen.
 Lotus urbana, trifolium odoratum, Siebengezeit.
 Lupuli juli, Hopfen-Sproßlein.
 Majorana, Majoran.
 Malabathrum, Folium Indum, Indisch-Blatt.
 Malva vulgaris, Hasenpappeln.
 Marru-

- Marrubium album, Prassium, weisser Andorn.
 Marum verum, Marum.
 Matricaria, Mutterkraut.
 Matrifylva, Stellaria, Meßke, Waldmeister.
 Melilotus, Steinklee, gelb Steinklee.
 Melissa, Melissenkraut.
 Mentha, Spießbalsam, Krausmünz.
 M. Saracenicæ, Frauen-Münz, de la mente Sa-
 rasenique, Spear mint, Saracen, mints,
 Roomsche Munte, Balsam-Munte.
 Menthastrum, mentha equina, Rosmünze,
 Waldmünze.
 Mercurialis, Bingelkraut.
 Mezereum, Seidelbast, Kellerhalskraut.
 Milzadella, taube Nessel.
 Millefolium, Schaafgarbe.
 Mororum folia, Maulbeerblätter.
 Morsus diaboli, Succisa, Teuffels Abbis.
 Mucus arboreus, Baum-Moos.
 terrestris, clavatus, Morsch-Babbe, Läuse-
 Kraut.
 Myrtilli nostr. Blaubeerkraut. Schwarzbeer-
 Kraut.
 Myrtifolia, Myrtenblätter.
 Nardus Indica v. Spica Indica.
 Nasturtium aquaticum, Brunnen-Kress.
 Indicum, Indianische Kresse.
 Nepetha, Cattaria, Katzenkraut, Katzenmünze.
 Nicotiana, edler Toback.
 N. Peruviana, l. Indica, Indianisch Toback.
 Nummularia, Pfennigkraut, Egelkraut.
 Nymphæa alba, weiß Seeblumenkraut.
 N. Lutea, gelb Seeblumenkraut.
 Ocimum vide Basilicum.
 Ononis, Resta bovis, Hauhechel.
 Ophioglossum, Lingua Viperina, Natterzünglein.
 Origanum vulgare, Dosten.
 O. Creticum, Cretische Dosten. Origan. de
 Crete. Origanum Cretic. or from Creta.
 Origanum Cretische, of van Creta.
 Papaveris folia, Mohnblätter, Magsaamen.
 Parietaria, Helxine, Tag und Nacht.
 Paris, Einbeerkraut.
 Pastinaca sylvestris, Vogelsnest.
 Pentaphyllum, quinquefolium, Fünffingerkraut.
 Perfoliata, Durchwachs.
 Persicaria, Pulicaria, Flöhkraut.
 Persici folia, Pfersingblätter.
 Petroselinum vulgare, Apium hortense, Pe-
 tersilien.
 Pilosella, Maus-Ohrlein.
 Pimpinella Germanica, Teutsch Bibernell,
 Bocks-Peterlein.
 P. Italica Sanguisorba, Welsch-Pimpinell.
 Plantago major, Breitwegerich.
 P. minor, Spießwegerich.
 Polygonum, Centumnodia, Wegtritt, Weg-
 gras.
 Polium Creticum, Cretischer Polcy.
 Portulaca, Burzellkraut.
 Potentilla, Anserina, Senferich.
 Primula veris, Schlüsselblumenkraut.
 Prunella, Braunellen.
 Prunus sylvestris, Schlehen-Blätter.
 Pulegium, Polcy.
 Pulmonaria arborea muscosa, Eichlungen-Moos.
 P. vera maculosa, Lungenkraut.
 Pyrola, Wintergrün.
 Quercus folia, Eichenlaub-Blätter.
 Quinquefolium, Fünffingerkraut.
 Raphanus, Rettig-Blätter.
 Rorella, Sonnen-Thau.
 Rosmarinus, Rosmarin.
 Rosmarinus sylvestris, wilder Rosmarin, Wan-
 zenkraut.
 Rubi cymæ, summitates, Brombeergipfel.
 Ruta, Weinrauten.
 Ruta muraria, adianthum, Mauerrauten.
 Sabina, Savina, Sevenbaum.
 Sabina sylvestris, Lycopodium, Wald-Seven-
 Baum.
 Salicis folia, Weidenblätter.
 Salvia hortensis major, grosse Salbey.
 S. minor, cruciata nobilis, Kreuz-Salbey.
 S. sylvestris, wilde Salbey.
 Sambuci cymæ, Holderkeimen.
 Sanicula, Sanickel.
 Saponaria, Seiffenkraut.
 Satureja, Thymbra sativa, Pfefferkraut, Sa-
 turan, Hünerfüll.
 Saxifraga alba, weiß Steinbrech.
 Scabiola, Apostemkraut.
 Scariola, Intybus sylvestr. klein Endivien.
 Schoenanthum, Camelsheu.
 Scolopendria, Lingua cervina, Hirsch-Zungen.
 Scordium, Lachenknoblauch.
 Sedum majus, sempervivum, Hauswurz.
 S. minus, vermiculare, Mauerpfeffer.
 Senna folia, Sennelblätter.
 Senecio, Kreuzwurz.
 Serpillum, Quendel.
 Sideritis, Gliedkraut.
 Sigillum Salomonis, Polygonatum, Weiß-
 Wurz.
 Solanum, solatrum, Nachtschatten.
 Sonchus levis, weich Sau-Distel.
 Soldanella, Brassica marina, Meer-Kohl.
 Spica nostras Garten-Spicke.
 Celtica, Römische Spicke.
 Indica, Indianische Spicke.
 Spinachia, Spinat.
 Squinanthum, Kamelheu.
 Stoechas Arabica, Arabisches Stechaskraut.
 Tamariscus, Tamariskenblätter.
 Tanacetum, Reinfarn.
 Taraxacum, Pflaffenröhrlein.
 Telephium majus, fette Henne.
 Thé, Theekraut.
 Thymus, Thym, Thymian.
 Tormentilla, Tormentill, Nabelkraut.
 Trifolium fibrinum, Bocks- oder Biberklee.
 Tussilago, Hufeisig.
 Valeriana, Phu majus, Groß-Baldrian.
 Valeriana minor, Phu minus, Klein-Baldrian.
 Verbascum, Tapsus barbatus, Bullkraut, Kö-
 nigskerz.
 Verbena, Eisenkraut.
 Veronica, Ehrenpreis.
 Vinca peruvica, Singrün, Ingrün.
 Violaria, blau Violentkraut.
 Virga aurea, Consolida Saracenicæ, Heydnisch
 Bundkraut.
 Vitis folia, Weinrebenkraut.
 Ulmaria, Weißbart.

Urtica mortua, taube Nessel. Dead Nettles.
doobe Neetelen.
Urtica urens, Brennessel.
Uvularia, Zayfenkraut.

N. Aus diesen sind fünf erweichende Kräuter:
Pappeln, Epischwurzk. Violentkraut, Bären-
klauen, denen etliche den Mangold, S. Peters-
kraut und Miltkraut auch beyfugen.

5. Kräuter die zum Haare dienen: Frauenhaar,
Maur-Kauten, Widerthon, Milzkraut, Hirschs-
zungen.

Derer bereitete Stücke sind auch dem Wesen
nach unterschieden, und dienen so zu reden fast als
ler Orten.

Das XII. Capitel.

Von den Früchten.

Die Früchte sind insgemein alles diß, was die
Gewächse lestens hervorbringen, und auf
solche Weise sind auch die Saamen und Körner
Früchte, ic. Insbesondere aber haben diesen Na-
men die grossen Früchte, z. E. Birn, Aepfel,
Pflaumen, Kirschen und dergleichen.

Die gebräuchlichsten Früchte sind:

Fructus Acaciarum, prunorum sylvestrium, i. e.
pruna, Schlehen.
Alchermes, grana tinctorum, grana Chermes,
Färberkörner, Scharlachbeeren.
Alkekengi, Baccæ Halicacabi, Judenkirschen,
Borellen.
Amygdalæ amaræ, bittere Mandel.
dulces, süsse Mandel.
Anacardia, Elephantenlaus.
Armeniaca mala, Marillen oder Abricosen.
Avellanæ, Haselnuß.
Aurantia acida, saure Pomeranzen.
dulcia, süsse Pomeranzen.
Balsaminæ, Balsam-Aepfelein.
Been grana, Beerkörner.
Berberes, Erbsen oder Weinlegelen.
Cappares, Kappern.
Cassia fistula, Cassien in Röhrlein.
Cerasa acida, passa seu exsiccata, gedörrte Kirschen
Ciceres, Zizern, Kichern.
Citri poma, Zitronen-Aepfel.
Cocculæ, Kofelkörner.
Colocynthis poma, Coloquint-Aepfel.
Coni Cupressi, Cypressen-Nüsse.
Corni, Eyslein, Corallen.
Cydonia poma exsiccata, Quittenschnitten.
Cynosbati exacinati, Hagebutten.
Dactyli, Dattelkern.
Ebuli baccæ, Attichbeerlein.
Evonymi baccæ, Spindelbaumbeer.
Picus communes, Caricæ Hispanicæ, Laubfei-
gen, kleine Marsilienfeigen.
Fragæ exsiccata, gedörrte Erdbeeren.
Gallæ communes, gemeine Galläpfel.
Turcicæ, Türkische Galläpfel.

Gossypium, Baumwolle.
Granata mala, Granatapfel.
Hederæ baccæ, Epheubeerlein.
Juglandes, welsche Nüsse.
Jujubæ, rothe Brustbeerlein.
Juniperi baccæ, Wacholderbeer.
Lauri baccæ, Lorbeer.
Limonæ, Limonia mala, Lemonien.
Mespila siccata, gedörrte Mispel.
Momordica, Balsam-Aepfel.
Myrobalani bellirici,
Chebuli. }
Citrini. } Myrobalanen.
Emblici. }
Indi seu nigri. }
Mora, Maulbeeren.
Myrti, Myrten.
Myrtilli exsiccati, trockene Blaubeeren,
Schwarzbeere.
Nux aquatica, Tribuli aquatici, Wassernüsse.
N. Cupressi, Cupressenuß.
N. Indica, Indianische Nuß.
N. Moschata, Muscatnuß.
N. Vomica, Krähenauglein.
N. Juglans, welsche Nuß.
Nuclei Persicorum, Pflaumenkörner.
Olivæ, Oliven.
Papaveris capita sine seminibus, Magsamentköpf.
Paridis baccæ, Einbeer.
Passulæ maximæ, Zibebæ, Zibeben.
P. majores, grosse Rosinen.
P. minores, Corinthiacæ, kleine Rosinen, Co-
P. Massiliacæ, blaue Rosinen, Crinten.
Pineæ nuce, Pinien.
Pistacia, Pistici, Pistacien.
Prunella, Weinpflaumenlein, Brunellen.
Pruna acida, saure Pflaumen, Zwetschgen.
P. citria, gelbe Spilling.
P. Hispanica, Spanische Pflaumen.
P. Hungarica, Ungarische Pflaumen.
Rubi Idæi baccæ exsiccata, Hindbeeren.
Rhamni cathartici, Kreuzbeer.
Ribes, Johannesbeer.
Sambuci, Hollunderbeer.
Sennæ folliculi, Sennetbälglein.
Sebesten, schwarze Brustbeeren.
Siliqua Ceratonia, Xyloceratia, Johannes-
brodt.
Scillæ, Meer-Zwiebeln.
Sorba exsiccata, gedörrte Speyerling.
Sumach, Rhus, Färberkörner.
Tamarindi, Tamarinden.
Tribuli aquatici, Wassernuß.
Uvæ l. baccæ paridis, uvæ lupinæ, Einbeer,
Wolfsbeer.
Zibebæ, Zibeben.

Die bereitete Stücke. Die dünne, harte und
minder-saftige Früchte stimmen mit denen Kräu-
tern überein; darum man auch aus selben eben
dergleichen Formeln machen kan. Aus den saft-
tigen Früchten aber machet man inspissirte Cäs-
te, oder Extracta, Wein und vergörte Cässte,
Spiritus, Quintas Essentias, Del und Tartara.

Das XIII. Capitel.

Von den Schwämmen.

Officinalische Schwammen sind:

Fungus Agarici, Lerchenschwamm.
 Cynosbati, Spongiolæ à Rosis siccis, Schlaf-
 Aepfel, Rosenschwamm, Hanbutten.
 Juniperi, Wachholderchwamm.
 Sambuci, Holderchwamm.
 Boletus Cervinus, Hirschbrunst gehöret auch hie-
 her, dergleichen
 Fungus orbicularis, s. Chirurgorum boyista,
 s. crepitus lupi, Wolfesfist, Bovist.

N. Es wachsen auch dergleichen Schwämme
 an den Büchen, Eichen, Birken, weissen
 Pappelbaume, Tuffbaume, Weiden, &c.

Das XIV. Capitel.

Von den Hölzern und Mistel.

Die Hölzer und Mistel, die man in de-
 nen Officinen gebrauchet, sind:

Lignum Aloes, Xylo-Aloes, Agallochum,
 Paradeisholz.
 Aspalathi, Rhodiserdorn.
 Brasilium, Brasilienholz.
 Buxi, Buxbaum.
 Lignum Camphoræ, Campherholz.
 Colubrinum, serpentinum, Giftholz, Schlän-
 genholz.
 Coryli, Haselholz.
 Cupressi, Cypressenholz.
 Ebenum, Ebenholz.
 Fraxinum, Wundholz, Eschholz.
 Guajacum, sanctum, Franzosenholz.
 Hederæ arboreæ, Epheuholz.
 Juniperi, Wachholderholz.
 Lentiscinum, Mastixholz.
 Ligustri, Wund- und Hartriegelholz.
 Nephriticum, Griesholz.
 Rhodium, Rosenholz, ist mit dem Aspalatho ei-
 Santalum album, weis Sandelholz, Cnerley.
 Citrinum, gelb Sandelholz.
 Rubrum, roth Sandelholz.
 Sassafras, Fenchelholz, Sassafras.
 Suberis, Pantoffelholz.
 Tamarisci, Tamariskenholz.
 Viscum Corylinum, Haselmistel.
 de Pyro, Birnmistel.
 Quercinum, Eichenmistel.
 Tiliaceum, Lindenmistel.

Die bereiteten Stücke. Die Hölzer und Mi-
 stel sind ausser denen gemeinen Formeln der Me-
 dicamenten, z. E. den Decoctionen, Infusionen,
 und andern mehr, auch zu den Extracten, Wassern,
 Spir. Oel und Salze zu gebrauchen.

Die Gemüse (Muscus) die man in denen Of-
 ficinen gebrauchet, siehe im vierten Buch.

Das XV. Capitel.

Von den Wurzeln.

Die Wurzel ist der untere Theil an den Ge-
 wächsen, und gleichsam der ersten Kochung
 Werkstoff. Weil nun die Kochung nichts anders,

denn eine Flüchtigmachung der fixen Nahrung und
 eine Begeistigung ist, die Wurzel über das auch
 durch eine weniger ausgearbeitete Nahrung, denn
 die andern Theile, ernähret wird: als folget, daß
 das Wesen der Wurzeln gleichfalls fixer Natur,
 denn die andern sind.

Die in den Officinen gebräuchlichere
 Wurzeln sind:

Radix Acetosæ (deglubata) Saurampferwurz.
 Acori vulgaris, Pseudo-acori, Schwertelwurz.
 Acori veri, calami aromatici, Calmus.
 Alceæ, Sigmaris-Wurzel.
 Alkannæ, Anchusæ, roth Ochsenzungenwurz.
 Allii, Knoblauch.
 Althææ ibilæ, Eibischwurz.
 Angelicæ, Angelicwurz.
 Anthoræ veræ, Heiligist, Giftheilwurz.
 Apii (vulgaris) Eppichwurz.
 Ari, Aronwurz, Teutsch Ingwer.
 Arisari, Klein Aronwurz.
 Aristolochiæ longæ, Lang Welsch Osterlucy.
 Aristolochiæ veræ rotundæ, Welsch rund Oster-
 lucy.
 Aristolochiæ vulgaris, gemein lang Osterlucy.
 Aristolochiæ fabacæ, rund gemein Osterlucy.
 Armoraciæ, raphani sylvestris, wild Meer-
 Rettig.
 Asari, Haselwurz.
 Asparagi, Spargelwurz.
 Asphodelim, Haita regia, Goldwurz.
 Bardanæ, Klettenwurz.
 Been. alb. weis Beenwurz.
 rubr. roth Beenwurz.
 Beræ rubræ, Mangoldwurz.
 Bistortæ, Serpentariæ, Natterwurz.
 Borriginis, Borragenwurz.
 Brusci, Mausdornwurz.
 Bryoniæ, Stiefwurz, Zaunrubenw.
 Buglossæ, Ochsenzungenwurz.
 Calami aromatici, Calmus.
 Capparum, Capperwurz.
 Carlinæ, Eberwurz.
 Cardopatii, Carlinæ albæ, weis Eberwurz.
 Caryophyllatæ, Benedictwurz.
 Centaurii majoris, gemeine grosse Kapontickwurz.
 Chelidonii majoris, groß Schöllkrautwurz.
 minoris, Scharbockswurz.
 Chinæ, Chinawurz.
 Cichorii, Wegwartwurz.
 Colehici nostrat. weisse Zeitlosenwurz.
 Consolidæ majoris, Symphyti, Beinwelle,
 Wallwurz.
 Contrayervæ, Drakenæ, Giftwurz.
 Costi amari, bitter Costuswurz.
 dulcis, Canellæ albæ, Caneel.
 Cucumeris asinini, Eselkürbiswurz.
 Cyclaminis, Arthanitæ, Schweinbrodtnurz.
 Cynoglossæ, Hundszungenwurz.
 Cyperi longi, langer wilder Galgan.
 Cyperi rotundi, rund Galganwurz.
 Diätami albi, fraxinellæ, weisse Diptamwurz.
 Doronici, Semsenwurz.
 Dulcamaræ, Je länger je lieber.
 Ebuli, Attichwurz.
 Ellebori albi, weis Nieswurz.
 E. nigri veri Stiriaci, schwarz Nieswurz.
 Ellebori

Ellebori nigri vulgaris, gemein Christwur.
 Elleborasti nostri, unsere Christwur.
 Endivia, Endivienwur.
 Enula campana, Helenii, Allantwur.
 Eryngii, Mannstreu.
 Esula minoris, kleine Wolfsmilchwur.
 Filicis, Farenwur.
 Filipendula, Saxifragia rubra, roth Steimbrech-
 Fœniculi, Fenchelwur. (wur.
 Fragaria, Erdbeerkrautwur.
 Galanga majoris et minoris, groß und klein
 Galgantwur.
 Gentiana, Enzianwur.
 Glycyrrhiza, Liquiritia, Süßholz.
 Graminis, Quecken, Graswur.
 Hermodactyli Italic. Hermodattelnwur.
 Hirundinaria, vincetoxici, Schwalbenwurzel.
 Hellebori albi et nigri, weiß und schwarze Wiesw.
 Hyoscyami (deglorati) Bilsenwur.
 Jalappa, Jalappenwur.
 Imperatoria, Ostrucii, Meisterwur.
 Iridis Florentina, wöhriehend Biolwur.
 I. nostratis, Schwertelwur.
 Juniperi, Wacholderwur.
 Lapathi acuti, Oxylap, Mengelwur.
 Levistici, Liebstöckelwur.
 Liliorum alborum, weiß Lilienwur.
 Malva, Pappelwur.
 Mandragora, Auranwur.
 Mechoacanna alba, weiße Rhabarbara.
 M. nigra, Gelap, Chelap, Chiolapp, schwar.
 Rhabarbara.
 Meu, Beerwur.
 Mezerei, Laureola, Seidelbast, Keller-Hals.
 Morsus Diaboli, succisa, Abbiswur.
 Napi, Steckrüben.
 Nymphaea alba, weiß Seeblumenwur.
 Olsnitii, Olsnickwurzel.
 Ononidis seu Anonidis, Heuhechelwur.
 Orchidis siehe satyrii.
 Palma Christi, Kreuzblumenwur.
 Pastinaca sativa, Möhren, Gelbrüben.
 Pastinaca sylv. Pastinackwur, Vogelneßwur.
 Pentaphylli, quinquifolii, Fünffingerkrautwur.
 Petasidis, Pestilenzwur, Neunkrautwur.
 Petroselinii, Petersilgenwur.
 Peucedani, Haarstrangwur.
 Pœonia, Peonienwur.
 Pimpinella Germanica, Bibinellenwur.
 P. Italica, sanguisorba, Blutkrautwur.
 Welsch Bibinell.
 Plantaginis, Wegbreitwur, Wegerichwur.
 Polypodii quercini, Engelsfuß.
 Pyrethri, Betramwur.
 Raparum, Rüben.
 Raphani domestici s. vulg. Rettich.
 R. marini, Meerrettich.
 Rhabarbari veri, Rhabarbara.
 R. Monachorum, Münch-Rhabarbara.
 Rhapontici veri, Rhapontick.
 Rhodia, Rosenwur.
 Rubia tinctorum, Ferber-Röthe.
 Rusci, Brusci, Mäusdornwur.
 Sarsa parilla, Salsaparilla, Salsaparill. Sarsa-
 parill.
 Satyrii, Stendelwur, Knabenkrautwur.
 Saxifragia, Steimbrechwur.

Scabiosa, Apöstemwur.
 Scylla cruda et preparata, Meerzwiebel.
 Scorzonera, Giffwurzel, Scorzonera.
 Scrofularia, Scrophularia, Braunw.
 Sigilli Salomonis, Polygonati, Weißw.
 Sileris, Zuckermöhren, Zuckerw.
 Squamaria, Schuppenw.
 Taraxaci, Wassen-Röhrlein.
 Tormentilla, Tormentillw.
 Turpethi albi, Turbith.
 Trifolii fibrini, Bitterkleew.
 Tussilaginis, farfara, Brandlattig, Hufslattigw.
 Valeriana maj. groß Baldrianw.
 V. minoris, klein Baldrianw.
 Verbasci, Wollkrautw.
 Victorialis, Allermannsharnisch.
 Ulmaria, Geißbartw.
 Ungula caballina, s. farfara, Hufslattigw.
 Utrica, Messeln.
 Yerva, Giffw.
 Zedoaria, Zittwer.
 Zingiber, Ingber.

N. Von diesen sind wegen vielfältigen Ge-
brauchs berühmt:

Die fünf große eröffnende Wurzeln, nemlichen
die Eppic wur, Fenchelwur, Spargenwur, Pe-
tersilgenwur, Mäusdornwur, wie ingleichen die
fünf kleine eröffnende: Graswurzel, Farberöthe,
Mannstreu, Kappernwurzel, Heuhechelwurzel.

Derer bereiteten Stücke: Was wir von den
Kräutern und dergleichen Gewächsen gesagt ha-
ben, dieses ist auch von den Wurzeln zu verster-
hen; daß nemlich die Wurzeln zu allerhand Arz-
neyen, so wohl innerlich, als außertlich, dienen. Al-
lein soll man dieses merken, daß die firen Theile vor
allen andern sich in den Wurzeln befinden, darum
sie auch tauglichere Medicamenten sind, z. E. zu den
Extracten, Salzen und Decocten.

Das XVI. Capitel. Von den Saamen.

Semen Acetosae, Saurampfer-Saamen.
 Agni casti, viticis, Keuschbaumsaamen.
 Alkekengi, Halicacabi, Jüdenkirchensaamen.
 Althæa, Eibischsaamen.
 Ammeos veri Cretici, Ammeysaamen.
 Vulgaris, gemein Ammeysaamen.
 Amomi, groß Cardamomen.
 Anethi, Dillsaamen.
 Angelica sativa, Angelicksaamen.
 Anisi, Anis(saamen).
 Apii, Appichsaamen.
 Aquilegia, Agleysaamen.
 Asparagi, Spargensaamen.
 Atriplicis, Mültsensaamen.
 Aurantiorum, Vomeranzkern.
 Bardana, groß Klettensaamen.
 Basilici, Ozymi, Basiliensaamen.
 Bombacis, Gossipii, Corti, Xyli, Baumwollenf.
 excorticatum.
 Brassica rubra, Kohl-Saat.
 Bursa pastoris, Faselkrautsaamen.
 Calendularum, Ringelblumensaamen.
 Cannabis, Hanfsaamen.
 Cardui benedicti, Cardobenedictensaamen.
 C. maria

- C. mariae*, Mariendistelsaamen.
Carthami vel Cnici, Feldsaffransaamen, Floris.
Carvi, Carveos, Wiesenkümmel, Feldkümmel.
Cataputiae majoris, Ricini, groß Treibkörner.
C. minoris, Esulæ Vulpinæ, Treib- Spring-
 Körner.
Ceparum, Zwiebelsaamen.
Cheiri, gelber Violettensamen.
Cerefolii, Körbel-Kraut.
Cicer. alb. weiße Kichern, weiße Ziesererbbsen.
C. rubr. rothe Kichern.
Cichorii, Wegwortsamen.
Cinæ, sanctonici, sanctum, Wurms.
Citri, citrei mali, Zitronenkern, excorticatum.
Citrulli, Citrullensamen.
Coccognidii, klein Kellerhals.
Cochleariæ, Löffelkrautsamen.
Colocynthidis, Coloquintens.
Coriandri, Coriander, præparatum.
Cucumeris, Cucumern, excorticatum.
Cucurbitæ, Kürbissamen, excorticat.
Cydoniorum, Quittenkörner.
Cynosbati, Handbutterkörner.
Cymini, Cumini, Römisch Kümmel.
Dactylorum, Ossa dactylor, Datteln.
Dauci communis, wild Möhren. Vogelneß.
Cretici, Möhren-Kümmel.
Ebuli, acini ebuli, Attich. wild Hollerkern.
Endiviæ, scariolæ, Endivien.
Eruçæ, Senf, gelber Senf.
Fabarum, fabæ, Bohnen.
Fœniculi, Fenchel.
Fœnigræci, Bockshorn.
Fraxini, linguæ avis, Eschenbaum.
Fumariæ, Erdrauch.
Genistæ, Psoraleumkraut.
Granatorum, Granatenkörner.
Halicacabi, alkekengi, Judenkirsche.
Hordei electi, Gersten.
 excorticatum.
Hyoscyami albi, Bilsens.
Hyperici, Johanneskraut.
Hystopi, Hopfsamen.
Imperatoriae, Meisterwurz.
Grana Kermes, Scharlach-Beeren.
Lactucæ, Lattich.
Lapathi acuti, Wengelwurz.
Lentium, lentis, Linsen.
Levistici, Liebstöck.
Liliorum Antheræ, das Gelbe in den weißen Lil.
Limonum, Limonienkörner.
 excorticatum.
Lini, Leinsaamen.
Loti sativæ, Siebengezeit.
Lupinorum, Lupini, Feigbohnen.
Majoranæ, Majoran.
Malvæ, Pappel.
Melissæ, Melissen.
Melonum, Melonenkörner.
 excorticatum.
Milii, Hirs.
M. Solis, Meerhirs, Lithospermon.
Musci terrestris, lycopodii, Truten-Fuß.
Myrti, Myrtens.
Napi, Buniadis, Steckrüben.
Nasturtii (hortensis) Gartenkress.
Nigellæ, Melanthii, Nigellæ Romanæ, schwarz
 Kümmel, schwarz Coriander.
 præparat.
Nuclei Ceraforum excort. Kirschkörner.
N. Mespilorum, Mespelkörner.
N. Morellorum s. Perlicorum Armeniacorum,
 Marillen-Kern.
N. Perlicorum, Pfersingkern.
Olusatri, Petroselini Alexandrini, welsche Pe-
 tersilgensamen.
Orobi, Ervæ, Ervens.
Oryza, Reis.
Pæoniæ, Peonienkern weibl. und männl.
 excortic.
Papaveris albi, weißer Mags.
P. nigri, schwarzer Mags.
Pastinacæ sativæ, Pastinack.
P. sylvest. Vogelneß.
Perfoliata, Durchwachs.
Petroselini Macedonici, Massiliensis, Macedo-
 nisch Peterlein.
P. vulgaris, apii veri, Petersilgen.
Phaseolorum, Schminke-Bohnen.
Pimpinellæ, Bibenell.
P. Italica, sanguisorbæ, welsch Bibenell.
Pisorum, Pisa, Erbsen.
Plantaginis, Begerichsamen.
Polygoni, Begetrittsamen.
Porri, Lauch, Schnittlauchsaamen.
Portulacæ, Burzelkrautsamen.
Pseudomelanthii, Kornrathelsamen.
Psyllii, Flohsamen.
Raparum, Rübssamen.
Raphani, Rettigsamen.
Rosarum Antheræ, das Gelbe in den Rosen.
Rosmarini, Rosmariensamen.
Rulci, Rüstelnkörner, Mausbornsamen.
Rutæ, Weinrautensamen.
Sambuci, Holderbeersamen.
Sanctum vel sanctonicum, Wurmsamen.
Saturejæ, Satureysamen.
Saxifragiæ albæ, weiß Steinbrechsamen.
Sesami vulgaris, Flachsdotter.
Seseleos Cretici, Massiliensis, Cretischer Seesels.
S. Vulgaris, Sileris montani, Silermontans.
Sinapios, Senfsamen, rother Senf.
Spicæ nostratis, Spicanardsaamen.
Scaphidis agricæ, Lauskörner.
Sumach, siehe die Früchte.
Thlaspi, Baurensens, Wegkresssaamen.
Thymi, welsch Quendelsamen.
Trifolii odorati, edel Kleeamen.
Violarum Martiarum, blau Violettensamen.
Urticæ majoris, Nesselsamen.
U. Romanæ, Römisch Nesselsamen.
 N. Von diesen sind etliche in der Practic sehr be-
 rühmt, drum man sie auch insonderheit warm und
 kalt nennet, also sind
 Die vier grosse warme Saamen: Anis, Fen-
 chel, Wiesenkümmel, welscher Kümmel.
 Die vier kleinern: Zimmes-Saamen, groß Car-
 domonen (Amomi) Eppichs. und Möhrensaamen.
 Die vier grosse kalte Saamen: Cucumersamen.
 Kürbissamen, Citrullensamen, Melonenkörner.
 Die vier kleinern: Endivienamen, klein Endi-
 viensamen, Lattichsaamen, Burzelkrautsamen.
 Aus den Saamen kan man unterschiedliche
 bereite Stücke machen, z. E. Infusionen, De-
 coctionen, Emulsionen, &c.

Das

Das XVII. Capitel.
Von den Säften.

Der Gewächse nahrhafter Saft gleichet der Thiere Geblüte. Gleichwie nun von der Ausarbeitung des Geblüts und desselben Vermischung mit dem Körper unterschiedliche excrementa, als Koth, Schleim, Urin, Galle, ein Virriolischer oder melancholischer Saft, Schweiß, Fett, Stein abgefondert werden, ja bisweilen das Geblüt selbst hervor bricht; also sind in denen Gewächsen die Säfte von unterschiedenen Geschmack, die Del, Harz, Gummi, ꝛ. ꝛ. selbsten in etwas gleichförmig, doch mit diesem Unterscheide, daß die Thiere mit gewissen Orten begabet sind, durch welche sie besagte Sachen von sich geben: die Gewächse aber selten, wo man nicht sagen will, daß 1. die Gewächse auch Luftschleim haben, die zur subtilen Ausdampfung dienen, und daß 2. sowohl ein Saft von dem lieblichsten Geruch mit den Blumen hervor bricht, als auch je zuweilen ein starker Saft sich spüren lasse: daher bleibet das Gröbere in dem Gewächse, und muß durch die Kunst davon geschieden werden: jedoch geschieht es in etlichen, daß solcher Saft wegen Überfluß ihm selbst einen Ausgang suchet, besonders wenn man darein schneidet. Dergleichen sind 1. wässerricht, die Säfte, 2. irdisch, die Gummi, 3. schwefelicht, als Del, Balsam, Harze, Gummi Resinen, 4. salzig, Zucker, ꝛ.

N. Die Säfte, die von sich selbst, oder wenn man in die Bäume hauet, fließen, sind mancherley, 3. E. Birken-Wasser, das bey Frühlingszeit aus den verwundeten Birken lauffet, und in Finnland, Schweden, und andern Orten Teutschlandes, auch von vornehmen Personen getrunken wird; wie in gleichen der Saft, der aus den Neben fließet, ꝛ. doch stellen wir nur diejenigen, die in den Officinen gebräuchlich sind, allhier vor, aus welchen unter die natürlichen gezehlet werden,

Die alterirende Säfte:

Succus { Acacia, Schlehen
Glycyrrhiza, Eufholz
Hypocistid. Eisen
Opium, Mohl } Saft.

Derer Bereitungen siehe unten im 4. B.

Die purgirende:

Manna, Aloe, Eselkürbis-Saft.

Von diesen besiehe gleichfalls das 4. B.

Das XVIII. Capitel.

Von den Oelen und Balsamen.

Die in den Officinen natürliche Oele und Balsam sind:

Olivarum, Baumöl.

Petroleum, Petroleum, Stein-Öel.

Oleum Terræ, Erd-Öel.

Balsamus de Tolu.

Opopalsamum, siue

Balsamus de Mecha, der wahre gerechte Balsam.

Peruvianus.

Liquidambra, fließende Amber.

Styrax liquida, Storax, der fließet.

Derer Kräfte besiehe unten im 4. Buch.

Das XIX. Capitel.

Von den Resinen (Harzen.)

Resina ῥηνῶν Resina (Saft,) ist ein fetter und ölichter Liqueur, der theils vor sich selbst, theils durch Verwundung aus den Bäumen fließet, und ist zweyerley, fließend oder härtlicht.

Fließende Resinen sind:

Terebinthina Cypria s. Veneta, Cyprischer oder Benedischer Terbinthin.

Vulgaris, gemeiner.

Pix liquida, fließend Pech.

Härtlichte Resinen sind:

Resina Anima, Officin. Gummi Anime, Gummi Animá.

Caranna, Gummi Caranne.

Copal.

Elemi Offic. Gum. Elemi.

Lacca.

Pix Græca, Griechisch Pech. Colophonia.

Tacamahaca, Takamahak.

Thus, Beyrauch.

Die Kräfte: Alle Resinen erwärmen, trocknen, digeriren, lindern, und haben dünne Theile (weniger und mehr) dienen wider Husten und Schwindsucht, stillen die Schmerzen, heilen die Wunden und den Stein. Man gebrauchet die Resinen so wohl innerlich als auch äußerlich in Salben und Pflastern.

Die bereitete Sachen daraus: Die Resinen werden meistens destilliret, oder vielmehr rectificiret, weil man nicht anders denn in der Rectification derer Oele, erstlich mit gelindem Feuer den ölichten, reinen, subtilen und klaren Theil; alsdenn mit stärkerm Feuer den gröbern und farbichtern, nemlichen den gelben, und endlich mit noch mehrerm Feuer das rothe Del herüber treibet. Will man diese besonders auffangen, so bekommet man dreyerley Del, derer das 1. Spiritus genannt wird, das gelbe behält den Namen Del, das letztere rothe aber nennet man Balsam. Weil nun auch Resinen dicken Wesens sind, als hinterlassen sie auch was Dickes, deme man den Namen Colophonia, von einer so genannten Landschaft, woher es häufig vor Zeiten gebracht worden, zugeeignet.

2. Ausser der Destillation werden sie auch zuweilen extrahirt, welche Extrahirung aber viel eher eine Depuration und Reinigung zu nennen.

3. Wäschet man die Resinen auch, indem man sie in reines Wasser thut, und rühret, weßwegen man die Resinen beym Feuer wohl zerlassen, und alsdann ins Wasser werffen kan.

Das XX. Capitel.

Von den Gummi-Resinen.

Die Gummi-Resinen nenne ich die zusammen gewachsene Säfte der Bäume, die sich zwar in Del gerne, doch auch in Wasser, obwohl schwerlich, auflösen lassen, dergleichen sind:

Caphura, Camphora, Camfer.

Mastiche, Mastix.

Styrax calamita, Juden-Beyrauch.

Hieher gehöret auch Myrrha, die Myrrhen, und Bdellium.

Die

Die Kräfte und Bereitungen derer besiehe im vierten Buch.

Das XXI. Capitel.

Von den Gummien.

Die Gummien sind zusammen geronnene Säfte, die sich im Wasser leichtlich auflösen lassen, und aus denen Stauden und hohen Bäumen geflossen sind: aus diesen werden etliche *ferulacea* genannt, weil sie aus dergleichen gertichten Stauden gestossen, und heißen:

Gummi Ammoniacum, Gummi Ammoniac.

Galbanum, Euphorbium, Opopanax, Sagapenum, Sarcocolla.

Die Kräfte: Sie sind warm, erweichen, resorbieren die tartarische Schleimigkeiten. Den innerlichen Gebrauch besiehe im vierten Buch.

Die bereitete Sachen: 1. Gereinigtes Gummi. Dann weil die Gummi mit allerhand Sachen (Sand und Mist) vermischet, zu uns gebracht werden, als muß man selbige reinigen. Dieses geschieht durch Auflösen in einem wässerichten (warmen) Liquore, welchen man hernach seihet, austrucket und dicke machet bey gelinder Wärme.

2. Das klebrichte Extractum. besiehe unten von den Extracten.

Die Tugenden: Sie kommen mit den mucilaginosen, schleimichten Gummien überein, weil sie nichts anders, denn der von dem resinosen Theil gesonderte schleimichte Theile, sind.

3. Der harzigte Extract. Diesen besiehe gleichfalls unten bey den Extracten.

Die Kräfte: Die Tugenden, die dem ganzen Gummich zugeeignet werden, stecken insonderheit in der resina; daher gebrauchet man selbe auch innerlich und äußerlich mit gutem Glücke. Aus selben destilliret man gleichfalls ein Del, und zwar beser, dann aus dem ganzen Gummi.

4. Destillirt Del, siehe drunten bey den Delen.

Schleimichte, klebrichte Gummien sind:

Gummi Arabicum, Arabischer.

Cerasorum, von Kirschbäumen.

Sandaracha, Wacholder-Harz.

Tragacanthum, Tragant.

Die Kräfte: Diese sind Emplastisch, machen dicke, was flüssig ist, benehmen die Schärfe, lindern die Rauigkeiten, etc.

Das XXII. Capitel.

Von den ganzen officinalischen Thieren.

Apes sicca, gedörte Bienen.

Bufo exsiccatus, gedörte Kröte.

Cantharides sicca, Spanische Mücken.

Coccionella, Cochenille.

Cicada sicca, Heuschrecken.

Lumbrici siccati, gedörte Regenwürmer.

Millepeda sicca, aselli, Eselchen, Asselwürmer.

Scinci, Erd-Crocodill.

Scarabæi pilulares, Käfer, Schröder.

Serpens exsiccatus, Schlangen.

Viperæ Italicæ, Vipern.

Hierher gehöret auch Mumia, Mumie.

Das XXIII. Capitel.

Von den gebräuchlichsten fleischichten Theilen der Thiere.

Cor galerita, Herz von Lerchen.

Lupi, von einem Wolf.

Talpa, von einem Maulwurf.

Epar Lupi, Leber von einem Wolf.

anguilla, Aal-Leber.

Porci, Schweinen.

Ranarum, Fröschen.

Tauri, eines Stiers.

Splen bovis, Milz von Ochsen.

Pulmonis Agni, Lungen eines Lamms.

Suis, eines Schweins.

Ursi, Bären.

Vulpis, Fuchses.

Derer Kräfte: Wann die fleischichte Theile, ja ganze Thiere, todt oder lebendig, warm von außen einem Gliede aufgelegt werden, so besitzen sie eine fermentirende, Schmerzenstillende, zertheilende Kraft. Darum gebrauchet man selbe meistens in der Tollsucht, oder Zobsucht, Hauptweh, Schlaflosigkeit. Sie können dem Haupte, Nacken, Fußsohlen, etc. appliciret werden. Man kan selbe gleichfalls auf pestilenzische Geschwulsten, und giftiger Thiere Biß oder Stich legen, wo man nur vorhero andere gehörige Mittel appliciret und Schröpfköpfe aufgesetzt hat. Dann sie ziehen das Gift heraus. Sie nützen auch, wann einen der Schuh gedrucket. Besonders heilet ein jeder Theil seines gleichen, die Leber die Leber, das Milz das Milz, etc. Mehrers besiehe im fünften Buch.

Die gebräuchlichste bereitete Stücke aus den fleischichten Theilen sind Decocta, Extracta und Destillata. Diese besiehe an seinem Ort.

Das XXIV. Capitel.

Von den häutigten Theilen.

Intestina Lupi, Wolfsgedärm.

Vulpis, Fuchsgedärm.

Testiculi Apri, Schweins-Hooden.

Castoreum, Bibergeil.

Ceci Priapus, die Rutho von einem Wallfisch.

Priapus Cervi, Hirschruthen.

Tauri, von einem Stier.

Secundina cervi, Nachgeburt von einem Hirsche.

Umbilicus Infantis, Kindes-Nabel.

Rete s. omentum de Animalibus, Netz von Thieren.

Von diesen bes. das 5. B.

Das XXV. Capitel.

Von den Hörnern.

Cornu Alcis, Elendshorn.

Bovis, Ochsenhorn.

Bubali, Büffelshorn.

Cervi, Hirschhorn.

Typhi cervorum, die jungen Hirschhörner oder Hirschkolben.

Rhinocerotis, Nashorn, Horn von einem Rhinocerot.

Tauri, Stiershorn.

Monocerotis, l. Unicornu, Einhorn.

Derer