

T. I. 7.

6429

Dv 1653

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

- Mönchengladbach -

DÜSSELDORF

V 1442

ADALBERTI VINCENTII
Z A R D A
AA. LL. PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ
DOCTORIS

PHARMACA
VEGETABILIA
JUXTA
PHARMACOPOEAM
AUSTRIACO PROVINCIALEM.



P R A G Æ,
Apud Wolfgangum Gerle 1782.

PRÆFATIO.

Cum cognitio Pharmacorum vegetabilium basim sternat Materiæ Medicæ, atque hæc ultima Medici sit desideratum: hinc Pharinaca Vegetabilia juxta Pharmacopœam Aust. Provincialem ordine Systematico pertractare malui; idque præ-primis: quoniam novi plurimos Studium deficere aut Ill. Linnaei Systemate aut Celebratissima Bergii & Murray Materiæ Medica.

Supereft vero, ut tenuibus & invalidis ingenii mei viribus veniam flagitem. Non enim Eruditis, sed Erudiendis hocce opusculum decrevi, & hi si emolumenti, aut utilitatis quid ceperint, gaudebo.

CLAS-

C L A S S I S I.

MONANDRIA ORDO MONOGYNIA.

A *MOMUM ZINGIBER.* L.

Zingiber. Ph. Imber, Ingwer. Ʒázwor.

Anomum. Corolla 4 — fida: lacinia prima pa-

tente.

A. Zingiber. Scapo nudo, spica ovata.

Exoticum, Perennans,

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Frusta radicis circiter bipolli-
caria, ramosa, subdichotoma, utrinque com-
pressa, nodoso maniliformia, leviuscula, palli-
de cinerea: nodis ovatis. *Larenzyma* albidum,
subresinosum; transversaliter sectum æquale,
variegatum maculis lutescentibus; ad nodos
fragile: fractura filamentosa;

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor fragrans. Sapor
acris, pungens, fervidus, aromaticus, linguæ
inhærens. Radix siccata recente paullo fortior.

A

P RÆ.

PRÆPARATA. (a)

COMPOSITA. Aqua Embryonis.

Electuarium Diascordii. — Elect. seu Theriaca Andromachi, hoc pro spiritu Theriacali, & hic pro Spiritu Diatricon.

Pulvis specierum Aromaticarum pro mortuis Imperatoris. — Vitæ.

AMOMUM CARDAMOMUM. L.

Cardamomum minus. Ph. Kardamblein. Bar: damomum mensij.

A. Cardamomum. Scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis.

Exotico — Perenne.

Off. Semen.

FORMA. *Capsula* turbinato — subrotunda, unguicularis, vel oblonga, subpollicaris, triquetra, obtusa (sæpe cum acuminé), undique striata, pallida, trilocularis, dissepimentis membranaceis. *Semina* plurima, compacta, angulata, rufescentia. *Parencyma* album, submucilaginosum.

PROPRIETAS. *Odor* gratus, aromaticus. *Sapor* aromaticus, subcamphoratus, dein subnitrosus. *Masticata* comminuantur semina, corticali parte inter dentes subcrepula.

Com.
a) Olim Radix condite.

C_OMPO_SITA. Electuarium, seu Theriaca
Andromachi.

Emplastrum de Meliloto.

Pulvis specierum Aromaticarum pro
morsulis Imperatoris. — Vitæ.

A_MOMUM GRANA PARADISI. L.

Paradisi Grana. Ph. Große Kardamomen, Pa-
radeiskerner. Rágcsá Trna.

A. Grana Paradisi. Scapo ramoso brevissimo.

Exotico — Perenne.

Off. Semen.

FORMA. Semina brunea, turbinata, angu-
lata, truncata, rugosa, lucidiuscula, magnitu-
dine seminis Raphani, parencremate niveo sub-
farinoso.

PROPRIETAS. Odor aromaticus. Sapor aro-
maticus, calidus, pungens, inhærens : masticata
hæc grana comminuuntur, pungunt in lingua,
& fauibus, cum calore, Piperis instar.

COMPOS. Aqua seu Balsamum Embryonis.

Spiritus Aromaticus.

MARANTA GALANGA. L.

Galanga. Ph. Galgant. Balkán.

Maranta. Corolla ringens, 5 = fida ; laciñiis
2 alternis patentibus.

M.

M. Galanga. Culmo simplici, foliis lanceolatis subfessilibus.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Sicc. Radix teres, ramosa, crassitie digitii vel ultra, rufescens, annulis parallelis elevatis undique cincta; Parencremate cinereo — rufescente, solido.

PROPRIETAS. Sicc. Odor aromaticus, minus gratus. Sapor subacris, leviter aromaticus dein fervidiusculus, inhærens.

COMPOSITA. Aqua Embryonis. — Hysterica fœtida.

Elixir Vitrioli.

Essentia Carminativa.

Pulvis specierum Aromaticarum promorsulsi Imperatoris.

CURCUMA LONGA. L. (a)

Curcuma. Ph. Gilbwurz. Galgant.

Curcuma. Stamina 4 sterilia, quinto fertili.

C. Longa. Foliis lanceolato — ovatis: nervis lateribus rarissimis.

C. Rotunda. Foliis lanceolatis: nervis lateribus numerosissimis.

Exotica. Perennis.

Off.

a) Teste Vindobonensium Jacquinio Autopta una eademque planta utramque largitur **Curcumæ** radicem & longam, & rotundam.

Off. Radix.

FORMA. *Siccatae radicis binæ varietates in pharmacopoliis occurunt, longa scilicet, & rotunda, quæ commixtae sunt. Utraque dura, lutea, annulis parallelis cincta; longa cylindrica, digitalis; rotunda ovata, utrinque acutiuscula, pollicaris, saepe magnitudine Pyri fructus. Parenchymate luteo rubicundo, facie gummosa, splendente; transversaliter secto centro medullari orbiculato, disco æquali.*

PROPRIETAS. *Odor unguentaceus. Sapor subamaricans, subcalidiusculus, debiliter aromaticus. Mosticata radix comminuitur, emollitur, fere solvitur, salivam croceo colore tingens.*

COMPOSITA. Emplastrum Malacticum,

Unguentum Altheæ.

KÆMPHERIA ROTUNDA. L. (a)

Zedoarica. Ph. Bitwerwurzel. Cycvar.

Kampheria. Corolla 6 — partita: laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita, Stigma bilamellatum.

K. Rotunda. Foliis lanceolatis petiolatis.

Exotica, Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc. Cinerea, cylindrica, crassitie a 3 di-*

(a) Bergio Amomum scapo nudo, spica laxa truncata.

Author possidet plantam; hinc mirum quod Pharmacopeæ Svecicæ editio altera emendata Kæmpheriam retinuerit.

digitii minoris, subtorulosa. In officinis s^ep^e o-
ccurrit transversaliter secta, unde frusta orbicula-
ta.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* graviusculus, sub-
zingiberinus. *Sapor* aromaticus, fere Rosmarini,
amaricans, calidus.

COMPOSITA. *Aqua Cinnamomi* vinosa. —
Embryonis. — *Hysterica Fœtida.*
*Theriaca*lis.

Essentia Absinthii composita. — *Car-
minativa.*

Pulvis Vitæ.

Syrupus Emeticus.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

OLEA EUROPEA. L.

Olea. Ph. Oelbaum. *Oljwa prawá.*

Olea. Corolla. 4 — fida : lacinis subovatis. Drupa monosperma.

O. Europea. foliis lanceolatis.

Exotica. Arborea.

Off. Oleum (olivarum vulgo) pressum ex fructu.

FORMA. *Drupa* exquisite ovalis, utrinque obtuso rotundata, magnitudine glandis Quercus, glabra, viridescens. *Nux* ovali oblonga, rugosa, utrinque acutiuscula, fulcis longitudinalibus, & rugis scabrida, cinerascens. *Nucleus* albus, compressus, obvelatus tunica viridescenti venis albis reticulata, intra testam crassam osseam.

PROPRIETAS. *Fructus* recens immaturus valde acerbus, salsuginé vero conditus assuetis sapidus. *Oleum* expressum blandum, album vel subflavum odore vix ullo, sapore miti. Ætate ran-

cef-

cessit, atque acre fit. Respectu gradus rancoris. Cicius rancescit, si in loco calido servetur, vel in balneo digeratur. Oleum olivarum si genuinum, frigoris impatiens est, atque id cogitur ad gradum circiter duodecimum supra punctum congelationis in Thermometro Suelico; hinc quoque diutius se conservat absque rancore; illud vero oleum olivarum quod non cogitur nisi circa punctum congelationis aquæ, rancidum est.

PRÆPARATA. Oleum Philosophorum.

COMPOSITA. Balsamum Sulphuris Rulandi. Ex hoc adhuc Anisatum, & Terebinthinatum.

Cerata pro cereolis in quantum recipiunt Emplastra Diachylon cum gummatibus, aut de cicuta simplex.

Emplastrum Album coctum.—de Cicuta compositum & simplex. — Diabotanon. — Diachylon simplex & cum gummatibus. — Diapompolygos.— de Labdano. — de Minio. — Nericum. — Saponatum. — Vesicatorium.

Olea cocta sive infusa. *Composita.*

Oleum colocynthidis compositum sive Habacucinum vulgo dictum. — Hyperici. — Viride

Sim-

Simplicia. Herb. Absinthii. —

Anagalidis. — Anethi. — Hyosciami. — Florum chamomille — Liliorum alborum. — Verbasci.

Fruit. Momordicæ, Scorpi-
num.

Sapo Venetus.

Unguentum Basilicum. — Diapompo-
lygos. — Fuscum, — Lithargy-
rii sive Nitratum.

VERONICA OFFICINALIS. L.

Veronica. Ph. Ehrenpreis. Meronyka.

Veronica. Corolla limbo 4 — partito: lacinia in-
fima angustiore. *Capſula bilocularis.*

V. Officinalis. Spicis lateralibus pedunculatis, fo-
liis oppositis, caule procumbente.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA Rec. Caulis spithameus, procumbens,
filiformis, teres, simplex, pubescens, geniculatus.
Folia ad genicula opposita, subſeffilia, pubefcen-
tia, ferrata, policaria, dilute viridia, concaviuscula,
patentia; inferiora cuneiformia; superiora
ovali — oblonga, obtusa, paulo majora, remo-
tiora.

PROPRIETAS. Rec. Odor debilis. Sapor ama-
ricans *Sicc. odor nullus. Sapor amaricans, sub-*
adstringens.

PRAE-

PRÆPARATA. Conserva.

COMPOSITA. Herb. Pulvis Vitæ.

Species pro Thee Germanico.

Conserv. Electuarium Pectorale.

VERONICA BECCABUNGA. L.

Beccabunga. Ph. Bachbungen, Wasserbungen.

Potočnje.

V. Beccabunga. Racemis lateralibus, fol. ovatis planis, caule repente.

Indigena. Perennis.

Off. Herba virens.

FORMA. *Caulis* repens, cylindricus, teres, glaber, succulentus, spithameus, vel ultra, simplex vel subramosus: *ramis* oppositis, brevibus. *Folia* opposita, subcarnosa breviter petiolata, ovato — oblonga, obtusa, ferrata, dilute viridia utrinque glabra, punctata pollicaria vel ultra, patentia. *Petioles* breves, concavi, basi amplexicauli connati.

PROPRIETAS. *Odor* rec. foliorum contulorum debilis. *Sapor* amaricans, stypticus, acriuscalus. *Masticata* folia tenera, sapore nasturtii obscure imbuta, adstrunctionem stypticam in ore relinquentia, satis diu inhærentem. Caules masticati foliis congruunt.

GRATIOLA OFFICINALIS. L. (a)

Gratiola. Ph. Wibaurin. Bonj trub.

a) Desiderata in Pharmacopea nostra hæc planta, recensetur, quoniam usus ejus est in præceptis chirurgicis.

Gratiola. Corolla irregularis, resupinata. Stamina 2 sterilia. Capsula, 2 — locularis, Cal. 7 — phyllus : 2 exterioribus patulis.

G. Officinalis. Foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba.

FORMA. rec. *Radix cylindrica*, alba, geniculata, oblique horizontalis, instructa fibris filiformibus, descendantibus. *Caulis spithameus*, erectus, glaber, subramosus, teres, geniculatus ; internodiis alternatim opposite canaliculatis. *Folia adgenicula*, alternatim opposita, internodiis longiora, sessilia, lanceolata, obtusa, glabra, margine superne utrinque serrata, inferiora minora, integerrima, ovali — oblonga, apice revoluta ; superiora sensim majora, carinata.

PROPRIETAS. recent. Odor nullus. Sapor intensius amarus, ingratus, inhærens. Sicc. consimilis.

PRÆPARATA. Extractum.

* VERBENA OFFICINALIS. L.

Verbena. Ph. Eisenkraut. *Werbynēa*.

Verbena. Cor. infundibulif. subæqualis, curva.

Calycis unico dente truncato. Semina 2. f. 4. nuda. (stam. 2. f. 4.)

V. Officinalis. Tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, fol. multifido — laciñiatis, caule solitario.

Off.

Indigena. Annua.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* rectus, brachiatus, cubitalis, quadrangularis, lineatus. *Folia* patentia, rugosa, pleraque tripartita, lateralibus lobis minoribus, medio longiori, nonnunquam tripartito: ora profunde dentata, pene semipinnata; suprema *folia* simplicia sunt & ovata.

PROPRIETAS. Inodora & fere insipida.

ROSMARIMUS OFFICINALIS. L.

Rosmarinus Hortensis. Ph. Rosmarin, Rosmaryn.

Rosmarinus. *Corolla* inæqualis, labio superiore bipartito. *Filamenta* longa, curva, simplicia cum dente.

Hortensis. Frutex.

Off. Folia. Flores cum calycibus, atque summitates.

FORMA. *rec.* *Folia* opposita breviter petiolata, linearia, obtusa, pollicaria, supra dilute viridia, rugosa, scabra, lucidiuscula, subtus pariter rugosa, albido — tomentosa, patentia, internodiis longiora. *Carymbuli* florum in ramulis terminales, breves, simplices, vix foliis longiores, eretti, minutim tomentosi, nudiusculi. *Bractæ* ovatæ, acutiusculæ, concavæ ad pedicellos solitariæ, extus tomentosæ, intus glabræ, pedicellis breviores. **CAL.** *Perianth.* breviter tubulatum, tomentosum, bilabiatum: labiis subæquilibus, emarginatis

natis; superiore paullo breviore. COROLLA monopetala, dilute violacea. *Tubus* longitudine calycis, postice gibbus. *Limbus* ringens; labium superius oblongum, bifidum, erectum, margine utrinque revoluto; inferius trifidum, patens; lacinias lateralibus ovatis, obtusis, margine revolutis; intermedia duplo majore, pateriformi, convessa, obtuso — rotundata margine minutissime crenato. STAM. *Filamenta* 2. subulata, fauci corollæ inserta, adscendentia, longitudine corollæ; singula postice notata denticulo recurvo. *Anthærae* lineares, incumbentes. PISTILL. *Germen* quadripartitum, viride obtusum. *Styllus* subulatus, violaceus, corolla longior, recurvatus. Stigma acutum, bifidum: mucrone superiore breviore.

PROPRIETAS. *recent.* Odor fragrans, gratus, cephalicus. Sapor odori conformis, aromaticus, calidus.

PRÆPARATA. *Fl. cum calycibus.* Spiritus Rosmarini sive Aqua Reginæ Hungariæ.

Fol. Aqua destillata.

Conserva.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. *Fol.* Aqua vulneraria cum vino.

Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius variegatus.

Spe.

Species cephalicæ resolventes pro fo-
mentatione.

Spiritus Balsamicus, vulgo Balsamum
Schauerianum.

Unguentum Nervinum.

Summit. Acetum Antisepticum seu Cardia-
cum.

Ol. Balsamum Apoplecticum. — Saxo-
nicum.

SALVIA OFFICINALIS. L.

Salvia. Ph. Saltwey, Salver. Ssalwēg.

Salvia. Corolla inæqualis. Filamenta transverse
pedicello affixa.

S. Officinalis. Foliis lanceolato — ovatis integris
crenulatis, floribus spicatis calycibus acutis,
Hortensis. Suffruticosa.

Off. Folia.

FORMA. Folia opposita, petiolata, ovali ob-
longa, obtusa, pollicaria, utrinque minu-
tim villosa, supra rugosa: rugis convexiuscu-
lis; subtus reticulatim lacunulosa, margine cre-
nulata, patentia; summa brevius petiolata, sœpe
fessilia. Petoli teretes, villosi, supra canalicula-
ti, foliis breviores.

PROPRIETAS. rec. Odor fragrans, validus,
graviusculus. Sapor amaricans, calidus, aroma-
ticus. Sicc. consimilis.

PRÆ:

PRÆPARATA. Aqua simplex. Oleum æthereum. (a) Conserva, Syrupus (b)

COMPOSITA. Herb. Aqua vel Balsamum Embryonis. — Vulneraria cum aceto & vino.
Elixirium Vitrioli.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Vi-
ta.

Species pro Thee Germanico. — De-
cocti pro gargarilmate adstringen-
te.

Herb. Ungmentum Nervinum.

Summit. Acetum Anticepticum.

Aq. Tinctura Laccæ.

Ol. Balsamum Saxonicum.

ORDO TRIGINIA,

PIPER NIGRUM. L.

Piper rotundum. Ph. Schwarzer Pfeffer. Čes-
ký pěšť.

Piper. Cal. o. Cor. o Bacca monosperma.

a) Quoniam cum ceteris componit Balsamum Saxonicum.

b) Juxta Praecepta chirurgica,

P. Nigrum. Foliis ovatis subseptem nerviis gla-
bris, petiolatis, simplicissimis.

Exoticum. Frutex.

Off. Fructus.

FORMA. Sicc. Semina semimatura, sphærica,
nigricantia, rugosa, magnitudine fere feminis
minoris Pisi. Parenchymate albido.

PROPRIETAS. Odor aromaticus, validior.
Sapor fervidus, acris, inhærens. Masticata semi-
na comminuntur, ferventque in ore & faucibus.

COMPOSITA. Electuarium, seu Theriaca An-
dromachi.

PIPER LONGUM. L.

Piper Longum. Ph. Langer Pfesser, Dlauhý
pepr.

P. Longum. Foliis cordatis petiolatis sessilibus-
que.

Exoticum. Frutex.

Off. Fructus.

FORMA. Amentum frutiferum, integrum,
semimaturum, pollicare vel ultra, cylindricum,
obtusum, feminibus undique tuberculatum.

PROPRIETAS. Sicc. & ut apud nos obvenit.
odore & sapore debilior præcedenti. (a)

COMPOSITA. Electuarium Diascordii. Elect.
seu Theriaca Andromachi.

Pr-

a) Si Piper longum in officinis Pharmaceuphticis Suecæ
occurrens communitee situ debilitatum sit, juxta Bergium,
quid nostrum erit?

PIPER CAUDATUM. L. *Phar. Suecicæ.*

Cubebæ. Ph. Cubeben, Schwindelkerner. Bube-
by. (a)

Exoticum.

Off. Fructus.

FORMA. *Baccæ* subrotundæ, magnitudine
seminis minoris *Pisi*, fuscæ, pedunculatae, venis
elevatis undique reticulatae, vix acutiusculæ; pa-
renchimate ex nucleo albido, suboleoso.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans. *Sapor* aromati-
cus, acris, fervidus (sed Pipere nigro debilior)
Masticatæ comminuuntur, calent in ore, & fauci-
bus, salivam alliciunt. Nucleus corticali parte
longe acrior.

COMPOSITA: Aqua Embryonis,

Elixirium Vitrioli.

Pulvis Specierum Hieræ Picræ. — Ster-
nutorius viridis. — Vitz.

Spiritus Balsamicus vulgo Schaueria-
nus.

B

CLAS-

(a) Hujus characterem specificum in Ill. LINNÆI Sy-
stemate invenire non datur nec in recentissima ejusdem
editione per REICHARD;

CLASSIS III.

TRIANDRIA ORDO MONOGYNIA.

VALERIANA OFFICINALIS. L.
Valeriana vulgaris. Ph. Gemeiner Baldrian.
Božík obecný.

Valeriana. Cal. o. Cor. 1 — petala, basi hinc gibba, supera. Sem. 1.

V. Officinalis. Floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba. (a)

FORMA. Rec. Radix alba, truncō cylindrico, cincta geniculis annulatis, subciliatis, gemmiferis, apice soluta in fibras filiformes, teretes, descendentes, albas. Stolones sub terra repentes, ex apice radicis intra fibras exeuntes, albi, filiformi — teretes, geniculati: geniculis instructis squammis ovatis, acutis solitariis. Parencrema trunci radicis subcarnosum, album, transversaliter sectum centro medullari amplissimo, margine undulato.

PROPRIETAS. Recentis radic. Odor fragrans
gra-

a) Saltem oleum vivide recipit. herbam cum radice.

graveolens, fætidus. *Sapor* subdulcescenti — amaricans, gravis. *Siccatæ* rad. odor & sapor fere intensiores. *Masticata* radix comminuitur.

PRÆPARATA. Extræctum.

COMPOSITA. *Herb.* & *Rad.* Oleum viride.

Pulvis contra vermes, & ex hoc Trochisci contra vermes.

VALERIANA PHU. L.

Phu. Valeriana Major. Ph. Großer Baldrian.

Bözlje wëtſſj.

V. Phu. Floribus triandris, foliis caulinis pinnatis ; radicalibus indivisis.

Hortensis. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix* crassa, horizontaliter repens, fibris descendantibus extus coloris subbruni, interne albidi, vel viridescentis.

PROPRIETAS. Præcedenti amerior, odo e fætiore.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

VALERIANA CELTICA. L.

Spica Celtica. Ph. Celtischer Narbus. Celtycký Narbus.

V. *Celtica*. Foliis triandris ; foliis ovato — oblongis obtusis integerrimis,

Indigena. Perennis.

b 2

Off.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc. Radix cylindrica, crassitie pen-
næ anserinæ, undique involuta squamis mem-
branaceis, linearis oblongis, carinatis, glabris, la-
xiusculis; inferne obliqua, fibrilosa.*

PROPRIETAS. *Odor fragrans, fortis, gravius-
culus, præcedentium odore gravior. Sapor aro-
maticus, amaricans, satis gratus.*

COMPOSITA. *Electuarium seu Theriaca An-
dromachi.*

Pulvis Specierum Hieræ Picræ.

TAMARINDUS INDICA. L.

*Tamarindus. Ph. Tamarinden. Tamaryndy, In-
dyánské dáktyle.*

*Tamarindus. Cal. 4 — partitus. Petala 3. Necta-
rium setis 2. brevioribus sub filamentis. Legu-
men pulposum.*

Exotica. Arbor.

Off. Fructus.

FORMA. *Legumen digitale, oblongum, com-
pressum, ad semina torulosum, læviusculum. extus
ferrugineo — cinerascens, nebulosum : punctis
planis, squamosis, quibus undique adspersum ;
bilamellatum. Pulpæ inter lamellas ligamen-
tosa ; subuniloculare, subtrispernum. Semi-
na magna, subtetragona, cortice cartilagineo
brunneo, nitido, nucleo albo ; singula obvoluta
aril.*

arillo proprio tenuiore. *Fructus Tamarindorum*, ubi ad nos apportatur, semper contusus est, separatis lamellis leguminis, unde pulpani nigram & sicciorem refert, seminibus mixtis.

PROPRIETAS. *Odor subvinosus. Sapor intensius acidus, gratus.*

PRÆPARATA. *Pulpa.*

COMPOSITA. *Electuarium Lenitivum seu Tamarindorum.*

CROCUS SATIVUS. L.

Crocus. Ph. Safran. Ssaffrán.

Crocus. Cor. 6 — partita, æqualis. Stygma convoluta.

C. Sativus. Spata univalvi, corolla tubo longissimo.

Parce indigemus. Perennis. Austriacus nobis præstantissimus.

Off. Floris stulos.

FORMA. *Rec. Stigmata tria pollicaria filiformi — cuneiformia, inferne attenuata, lutea, in stylum desinentia, superne sensim incrassata, saturata rubra, apice truncata, crenata: crenis albido — lutescentibus.*

PROPRIETAS. *Sicc. Odor fragrans, similis alcali volatili urinoso mediocriter aromatico. Sapor aromaticus, subamaricans. Masticatus tenaciusculus, emollescit, saliva rubro — lutea, saturata tincta. Tritu contumax.*

PRÆ-

b 3

PRÆPARATA. Essentia.

Extractum.

COMPOSITA. Bacilli Liquiritiae.

Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum de Galbano Crocatum.
— Oxicroceum.

Essentia Anodina, seu Laudanum liquidum Sydenhami.

Oleum Hyperici.

Pilulae Balsamicæ Mortoni. — Russi.
— de Stirace.

Pulvis infantum absorbens. — Specierum Confectionis Hyacinthiae. — Specierum Hieræ Picræ. — ad Tufsim.

Syrupus Emeticus. — de Liquiritia,
seu Diacodii crocatus.

IRIS FLORENTINA. L.

Iris Florentina. Ph. Weigelwurz. Fialowy ko-
řen.

Iris. Cor. 6 — partita: Petalis alternis reflexis.
Stigmata petaliformia.

I. Florentina. Corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Rec. Radix tuberosa, oblonga, crassitie

sitie digiti vel ultra, compressiuscula, lutescenti — rubicunda, subtus fibrillosa. In officinis occurrit siccata, decorticata, undique scissa, alba, ponderosa.

PROPRIETAS. *Recens acris.* Sapore acri, in-hærente. *Siccata* leviter amaricans, *masticata* tandem subacris; *odore grato, violaceo.*

COMPOSITA, Bacilli Liquiritiæ.

Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum Diabotanon. — *Diachylon cum gummatibus.* — *de Melilotto.*

Hydromel Infantum.

Pulvis dentifricius albus. — *Specierum pro Cucupha.* — *Specierum Dia-*
reos. — *Sternutatorius variegatus,*
— *Sternutatorius viridis.* — *ad Tu-*
sim.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Trochisci Bechici albi & nigri.

* **IRIS GERMANICA. L.**

Iris nostras. Ph. Blauschwertel. Rosatec.

I. Germanica. Corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix recens.

FORMA. *Rec. Radix tuberosa, horizontalis subarticulata: articulis obovato — oblongis, obtusis, transversaliter sulcatis, laeviusculis, cinerae centibus, pollicaribus vel ultra, supra punctis obsoletis adspersa, infra radicans fibris plurimis, sparsis, filiformibus, albidis, descendantibus fibrilosis; apice ramosa: articulis 3 vel 4 tuberosis, ipsi radici conformibus, germinantibus. Paren cyma carnosum, firmum, album, transversaliter sectum centro medullari amplissimo, subrotundo vel oblongo, adsperso punctis ferrugineis sparsis.*

PROPRIETAS. *Rec. Odor subnauseosus. Sapor leviter amaricans, substypticus, acriusculus. Masticatur comminuitur, fauces constringit, & acris sentitur, faucibus inhærens.*

CYPERUS LONGUS & ROTUNDUS. L. (a)

Cyperus. Ph. Cypernwurzel. Planý galgan.

Cyperus. Gluma palleaceæ distiche imbricataæ.

Cor. o. Sem. i. nudum.

C. Longus. Culmo triquetro folioso, umbella foliosa, supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis.

C. Rotundus. Culmo triquetro subnudo, umbella decomposita: spicis alternis linearibus.

a) In nostris Pharmacopoliis longus & rotundus commixtum occurunt, licet Linneus & post eum Bergius adhuc distinguant.

Exoticus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA *Longi*: *sicca*. *Radix* subligneæ, tenuax, teres, ramosa, geniculata: annulis frequentibus circumaeuntibus, testa cortice rufescente, striato, glabro, saepius in squamas soluto. *Rotundi*: *siccata*. *Bulbi* s. *tubera* ovata, magnitudine vix ovi columbini, cortice rufescente, glabriusculo, undique cincta annulis frequentibus circumaeuntibus concatenata, saepe libera; parencymate solidiusculo, albo, friabili.

PROPRIETAS. *Longi*: *sicc.* *Odor* fragrans, gratus. Recens debilius odorata: *Sapor* americans, balsamicus, inhærens fauicibus. *Rotundi*: *recens* acris, sapore acrī, inhærente. *Siccata* leviter americans, mastificata tandem subacris; *odore* grato, violaceo.

O R D O D I G Y N I A.

SACCHARUM OFFICINALE. L.

Saccharum. Ph. *Zucker*. *Cuſter*.

Saccharum. *Cal.* lanugo longa extra calicem.

Cor.2 — *valvis*.

S.

S. Officinale. Floribus paniculatis, foliis planis.
Exoticum. Perenne.

Off. Sal essentialis dulcissimus.

FORMA. Saccharum albissimum, solidum, durum, subfriabile atomis micantibus, vix diaphanum. *Cantum* crystallisatum, album vel rubrum; crystallis columnata tetraedra, lateribus planis, duobus oppositis latioribus, utraque extremitate cuneatis, obtusiusculis.

PROPRIETAS. Sal essentiale dulcissimum, sapidissimum, solubile. Solvitur in aqua, disicilius in vino, disicillime in spiritu vini, nisi per calorem ignis, vel mediante aquæ pauxillo. In igne funditur: fusione limpida, sublutescente sub refrigeratione in fila ductili, refrigerata vero solidescente, subdeliquescente. In igne clauso, pariter ac in vase ferreo supra ignem funditur, spumescit cum bullis sponte delinquentibus, fumo copioso, fusco, grato; tandem in carbonem vertitur nigricantem, spongiosum, splendentem, friabilem, non inquinantem, sub refrigeratione subdissilientem, calcinatione subsequente parum alcali reddentem. Ignis flammæ addmorum accenditur, spumescit, flagrat cum strepitu: flamma cœrulea, fere saphirina, sumo grato relictis carbonibus. Saccharum in aqua solutum, lege artis fermentescit: fermentatione spirituosa, vino-fa vel acida. Saccharum uti reliqua salia essentia-

lia,

lia, quiete & mora tarde crystallisatur, unde syrupi saccharini temporis tractu & quiete crystallos ad fundum deponunt. Sed calore sacchari crystallisatio acceleratur. Ergo cum saccharum ad crystallisationem perducendum erit, idem in aqua decoquatur, usque dum decoctum, in aera projectum, veluti filia araneosa referat; tum vasis cupreis subcylindricis, laevissimis, filis transversalibus pertusis, calidissime immittatur, & in hypocausto per quam calido reponatur per nonnullos dies, sub quibus crystalli, summa sub quiete, filis inascuntur, quæ denique siccandæ.

PRÆPARATA. Spiritus sacchari, Tafia vulgo,
aut Rumi.

COMPOSITA. Aqua carminativa Regia.

Baccilli Liquiritiae.

Conservæ omnes.

Eleosacchara.

Eleætuaria quatenus syrups recipiunt.

Elixirium Vitæ. — Vitrioli.

Hydromel Infantum.

Infusum seu Tinctura Papaveris eratici

Morsuli Imperatoris.

Pasta de Althæa.

Pulpa Cassia. — Tamarindorum. —

Prunorum,

Pulvis Anodinus. — Haly. — Infan-

tum absorbens. — Sternutatorius

va-

variegatus. — Specierum Aquæ Perlarum — Specierum Diaireos. — Specierum Diatragacanthæ. — Stomachicus Birckmanni. — ad Tufsim. — Contra Vermes. — Vitæ. Roob. Ebuli. — Iuniperi. — Mororum. — Ribium. — Sambuci de Spina Cervina.

Rotula Berberum. — Menthae Piperita. Species Decocti Avenæ.

Syrupi omnes.

Tabula de Althæa.

Trochisci omnes.

Vinum Cydoniorum. — Granatorum.

Spir. Sacch. Essentia Quajaci.

A V E N A S A T I V A . L.

Avena. Ph. Haber. Owes.

Avena. Cal. 2 valvis, multiformis: arista dorsali contorta.

A. Sativa. Paniculata, calycibus dispermis, seminibus lœvibus altero aristato.

Colitur in agris. Annuæ.

Off. Semen integrum, & degluptum.

FORMA. *Semina cylindrica unguicularia, tecta cortice nigro vel albo, lœvi, hinc sulcato inde angulato; nucleo libero villoso, pallide cinereo, apice barbato; parenzymate niveo farinoso.*

PROPRIETAS. Farinacea, mucilaginosa, insipida, vix dulcescens.

Com.

COMPOSITA. Species decocti avenæ.

SECALE CEREALE. L.

Secale. Ph. Cal. oppositus, 2 — valvis, 2 — florusr, solitarius.

S. Cereale. glumarum ciliis scabris.

Colitur in agris. Annum vel Biennium.

Off. Seminis Farina.

FORMA. *Semina cinerascentia, conica, lineas 2 longa, acuta, glabra, dorso convexa, anticæ longitudinaliter sulcata, basi obtusa, versus apicem notata cicatrice ovata, carinata. Parenchyma album, farinaceum. Farina pura e parenchymate pulverato, sepatatis omnibus furfuribus, alba, subinsipida; mixta vero cinerascens, e corticali parte simul contrita.*

PROPRIETAS. Farinacea, viscosa.

PRÆPARATA. Fermentum. Panis. Spiritus Frumenti. (a)

COMPOSITA. Farin. Suppositoria composita.

HORDEUM DISTICHUM. L.

Hordeum. Ph. Gerste. Geimen.

Hordeum. Cal. lateralis. bivalvis, uniflorus, ternus.

H. Distichum. Flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam positis. (b)

Colitur in agris. Annum.

Off. Semen crudum & decorticatum.

Foa.

(a) Hæc omnia non raro in pharmacopoliis præsto esse debent.

(b) Nobis officinale hordeum vulgare.

FORMA. *Semina ovali — oblonga, utrinque attenuata, pallide citrina, semiunguicularia, undique obsolete angulata, antice fulcata, apice terminata arista linearis, retrorsum scabra, s^epius difracta ; parenzymate albo, farinaceo.*

PROPRIETAS. Farinacea, mucilaginos^a.

PREAPARATA. An Maltum? (a)

COMPOSITAA. *Crud.* Species pro Potu ordinario.

Mund. (b) Species decocti Pectoralis.

TRITICUM HYBERNUM. L.

Triticum. Ph. Weizen. P^ssenice.

Triticum. Cal. bivalvis, solitarius, subtriflorus.

Flos obtusiusculus, obtusus.

T. Hybernum. Calycibus quadrifloris ventricosis l^eribus imbricatis submuticis.

Colitur in agris. Bienn. (c)

Off. Seminis Farina. Seminis Fœcula.

FORMA. *Semina flavescentia, ovato — gibba utrinque obtusa, lineas 2 longa, glabra, dorso convexa, versus apicem notata cicatrice ovata prominula, antice longitudinaliter fulcata, basi tomentosa ; parenzymate albo, farinaceo. Farina nivea, sublutescens, ponderosa. Amylum albissimum*

a) Cum hodie magni aestimetur in medicis, & Potum nobis largiatur maxime Provincialem.

b) Quod decorticati Synonymon est.

c) Promiscue adhibetur annuum aut biennie.

mum, friabile, inquinans, tactu moliusculum, inter digitos fricatum crepulum.

PROPRIETAS. Farinacea, subinsipida, glutinosa.

PRÆPARATA. Amylum. Panis albus non raro.

COMPOSITA. Amyl. Baccilli Liquiritiae.

Pulvis Halij. — Specierum Diatragacanthæ, & hic pro Pulvere Specierum Diaireos.

Trochisci Bechici albi,

TRITICUM REPENS. L.

Gramen. Ph. Quecken, Graswurzel. Peyr, trawa.

T. Repens. Calycibus quadrisfloris subulatis acuminati, foliis planis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba. (a)

FORMA. *Radix recens* filiformis, teres simpliciuscula, subramosa, glabra, lavis, repens, longissima, centro perforato, geniculata: geniculis distantibus, vaginatis, emitentibus fibrillas capillares, ramosas.

PROPRIETAS. Recent. Et siccatur. Sapor debiliter dulcescens. Odor, ubi in thecis pharmacopolii concisa servatur, exacte idem ac ex acervo frumenti.

Com.

a) Quoniam ingreditur compositionem olei viridis.

PRÆPARATA. Extractum? (a)

COMPOSITA. Herb. Oleum viride.

Rad. Species decocti Althææ Ferne.
liii. — Antifebriles.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA. ORDO MONOGYNIA.

SCABIOSA SUCCISA. L.
Morsus Diaboli. Ph. Teufelsabiss. Cjertkus.
Scabiosa. Cal. communis polyphillus: proprius duplex superus. Recept. paleaceum, seu nudum.
S. Succisa. Corollis quadrifidis æqualibus, cavae simplici, ramis approximatis, lanceolato—ovatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Rec. Radix fibrosa; fibris plurimis

(a) Cum sèpius præscribitur.

mis filiformibus, verticillatis, descendenteribus,
lævibus; trunco radicis cylindrico, præmorsso,
intra fibras descendente, illisque breviore; *Pa-*
renzymate albo.

PROPRIETAS. *Odor debilis; Sapor amaricans.*

COMPOSITA. *Rad. rec. Unguentum Mendi-*
corum.

SCABIOSA ARVENSIS. L.

Scabiosa. Ph. Apostemkraut, Scabioſe. Kawiaſ.
S. Arvensis. Corollis quadrifidis radiantibus, fo-
liis pinnatifidis incisis, caule hispido.

Indigena, Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* pedalis vel ultra teres, sim-
plex, scaber, superne nudus, pubescens, inferne
nigro — punctatus, hispidus: pilis albidoſis. *Folia*
opposita, hispida, acuta; inferiora integra, ovali
— oblonga, spatulato petiolata, remote ferrata;
superiora lessilia, amplexicaulia, pinnatifida; laci-
niis linearibus, oppositis, subserratis; intermedio
duplo majore lanceolata, utrinque attenuata, in
medio ferrata.

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor herbaceus*
amaricans.

COMPOSITA. Species pro Thee Germanico.

RUBIA TINCTORUM. L.

Rubia. Ph. Färberrotthe. Mætens.

C

Ry.

Rubia. Cor. 1 — petala campanulata. *Buccæ* 2.
monosperma.

R. Tinctorum. Foliis annuis, caule aculeato.
Colitur. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. rad. cylindrica, teres, crassitie
pennæ anserinæ, repens, fibrillosa, parce ramosa,
geniculata: geniculis distantibus, subgenimiferis;
extus dilute sanguinea seu pallide rubra, glabra
vel fusca, membranis emortuis laxe obvelata, pro
gradu ætatis, furculos plures caulescentes profe-
rens, ubi sub terra latent sanguinei.* *Parencyma
junioris* radicis sanguineum; corticali parte car-
nosa, fragili, separabili; fibra centrali tenaci me-
dullata; transversaliter sectum centro medullari
ovali, atomis punctato, cincto annulo concentri-
co, tenuiore opaco, obducto umbone concentri-
co, dilutiore, & corticali parte saturatiore; *Senio-
ris* radicis: corticali parte subcarnosa, fragilius-
cula, facile secedente, bitunicata: tunica exterio-
re fusca, interiore sanquinea, magis carnosa; fi-
bra centrali lignea, lutescente, medulla parva;
transversaliter sectum, centro medullari orbicul-
lato, parvo, cincto lignea parte latiore, citrina,
porulis pluribus undique pertusa; obducta um-
bone concentrico, sanguineo, & corticali parte
fusca. In annosis radicibus medulla aut fusco —
nigricans est, aut penitus exesa, unde radices hæ
in

in centro plerumque longitudinaliter perforatae sunt.

PROPRIETAS. *Rec. odor* contusæ radicis remissior, fere corticis Sorbi. *Sapor amaricans*, leniter stipticus, ingratus. *Masticata* tenaciuscula, *saliva phœnicea*. *Sicc.* coasimilis, sed odor fortior, presertim ex radice comminuta.

PENÆA SARCOCOLLA. L. (a)

Sarcocolla. Ph. *Gleischleim*. *Sarkokolla*.

Pnæa. *Cat.* 2 — *phyllus*. *Cor.* *campanulata*. *Stylus* 4 — *angularis*. *Caps.* *tetragona*, 4 — *lo-*
cularis, 8 — *sperma*.

P. Sarcocolla. *Foliis ovatis planis, calycibus cilia-*
tis folio majoribus.

Exotica.

Off. Gummi — resina.

FORMA. *Gummi* — *resina lutescens*, subru-
bicunda, granulata: granis areniformibus, nitent-
ibus; sive in frustis solidiusculis, ponderosis,
subpolaribus, saepe magnitudine Pisi, vel Lentis
seminis; friabilis, fragilis: fracturis subgranulatis,
nitentibus.

PROPRIETAS. *Odor debilis*. *Sapor* primum
subdulcescens, tum amaricans, acriusculus; *softi-*
cata solubilis. In igne candelæccer ditur, irru-
mescit, flagrat, nigrescit. In aqua frigida omni-
no solubilis; in spiritu vini autem non nisi qua
partem.

C 2

PLAN.

a) Bergius statuit Penæam mucronatam L.

PLANTAGO MEDIA. L.

Plantago. Ph. Wegbreit, Wegerig. *Citrocel* proſteſednſ neb ſſiroky.

Plantago. Cal. 4 — fidus. Cor. 4 — fida limbo reflexo. Stamina longissima. Caps. 2 — locularis, circumscissa.

P. Media. Foliis ovato — lanceolatis, pubescen-
tibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. (a)
Indigena. Perennis.

Off. Herba. (Semen raro.)

FORMA. *Folia* omnia radicialia, palmaria,
petiolata, eretto — patentia, ovato — lanceolata
obtusa, subſculenta, margine ſubundulata, mi-
nūtim atque remotissime dentata, utrinque pubef-
centia, ſupſeptemnervea : nervis elevatis ; quo-
rum 5. validiores ; laterali utrinque minora, in me-
dio folii evanescente. *Petoli* foliis multo brevio-
res, pubescentes, ſubtus convexi, ſulcato — ſtriati,
ſupra concavi, baſi latiores, ſubvaginati : vagi-
na subſculenta, alba, concava.

PROPRIETAS. *Folior*. Odor. herbaceus ; Sa-
por rancidus ; mafſicata ſalivam rubro tingunt.

COMPOSITA. *Herb*. Species Decoſti Althææ
Fernelii. — Decoſti pro Gargarismatæ adſtrin-
gente.

PLAN-

a) Aliſcum paucō discriminē officinalis eſt *Plantago lati-ſolia* ; juxta Præcepta Chyrurgica etiam *Plantago acuta*,

PLANTAGO PSYLLIUM. L.

Psyllium. Ph. Flöhssamenkraut. Chmeljsk, Bless.
nje.

P. Psyllium. Caule ramoso herbaceo, foliis sub-dentatis recurvatis capitulis amphyllis. (a)

Indigenum. Perenne.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* parviuscula, ovali — oblonga, utrinque obtusa, hinc convexa, fusca, nitida, inde concava.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Sapor* nullus.

Masticata mucilaginosa.

PRÆPARATA. Mucilago? (b)

FAGARA OCTANDRA. L. (c)

Tacamahaca. Ph. Tacamahakharz. Gummi Ta-camahaca.

Fagara. Cal. 4 — fidus. Cor. 4 — petala Caps. 2 — valvis, monosperma.

F. Octandra. Foliolis tomentosis,

Exotica. Arbor,

Off. Resina.

FORMA. *Resina* solida, in frustis majoribus vix diaphana, fusca, variegata; maculis lutescentibus, rubescentibus, friabilis: fracturis planis, nitentibus.

c 3

PRO-

a) Sveci depromunt semen ex Plantagine Cynope.

b) Cum sepe usualis.

c) Juxta Bergium; juxta Pharmacopeam nostram Arbor adhuc ignota, an Papuli balsamifera resina sit? queritur.

PROPRIETAS. *Odor* gratus, ambrosiacus; *Sapor* nullus; *masticata* inter dentes friabilis. In ignis flamma fusibilis, accenditur, flagrat cum fusurro: flamma alba, fumo copioso, odore resinoso.

COMPOSITA. Emplastrum Diabotanon. — de Ladano.

DORSTENIA CONTRAJERVA. L. (a)

Contrajerva. Ph. Giftwurzel. Gedhog.

Dorstenia Receptacul. commune 1 — *phyllum*, carnosum, in quo semina solitaria nidulantur. *D. Contrajerva.* Scapis radicatis, foliis pinnatifido — palmatis serratis receptaculis quadrangularis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Sice. *Radix*, fusiformis, solida, pollicaris vel ultra sape digitalis, extus fulvo — cinerea, rugis transversalibus, undique fibrosa, præcipue inferne: fibris filiformibus, longissimis, descendantibus. *Larencyma* albidum, duriusculum, compactum; post sectionem transversalem annulo medullari notatum.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, gravis: *Sapor* subamarans. *Masticata* in ore non solubilis, verum compages tenax. *Recens* radix acris.

PRÆPARATA. Essentia.

Syrupus.

Com-

(a) Juxta Bergium Dorstenia Drakena; juxta Pharmaco-pez Siccicæ vero editionem alteram Drakena Contrajerva.

COMPOSITA. Aqua Theriacalis.

ALCHIMILLA VULGARIS. L.

Alchimilla. Ph. Sinau, Frauenmantel. Husy-
nūžka,

Alchimilla. Cal. 8 — fidus. Cor. o. Sem. 1.

A. Vulgaris. Foliis lobatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Folia reniformi — orbiculata, con-
cava plicata, novem nervea, minutim venulo-
sa, supra pubescentia, subtus villosa, novemlo-
bata: lobis obtuso — rotundatis, terratis; ra-
dicali longius petiolata, alterna, pauca distantia.
Petioli radicales teretes, palmates caulis eras-
titie. Stipulae radicales duæ, in petiolum decur-
rentes, membranaceæ, apice obtuse, pilosæ,
inciso — serratae, acutæ.*

PROPRIETAS. *Herba rec. Odor debilis, her-
baceus. Sapor herbaceus.*

O R D O D I G Y N I A.

CUSCUTA EUROPEA. L.

Cuscuta. Epithymum. Ph. Flachsseide. Thym-
seide. Bokotice. Cuf-

Cuscuta. Cal. 4 — *fidus. Cor.* 1 — *petala. Caps.*
2 — *locularis.*

C. Europea. Floribus sessilibus.

Indigena. Annua. Parasitica in stirpibus.

Off. Herba.

*FORMA. Caules filiformes, subdichotomi,
nudi implexi. Folia nulla. Glomeres florum sub-
rotundi, sessiles, distantes.*

*PROPRIETAS. Sicc. Odor debilis. Sapor vix
amaricans acriusculus. Masticata leniter rodens
in lingua & faucibus.*

COMPOSITA. Species Decoati Aperitivi.

CLASSIS V.

PENTANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. L.
Cynoglossum. Ph. Hundszunge. Pssy gazyé.
Cynoglossum. Cor. infundibuliformis, fauce clau-

se

*ſa fornicibus. Semina depreſſa, interiora tan-
tum latere ſtylo affixa.*

C. Officinale. Staminibus corolla brevioribus, fo-
liis lato — lanceolatis tomentofolis ſeſſilibus.

Indigenum. Annum.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. radix* majuscula, extus rubro
nigricans; inferne ſimplex, ſuperne ramosa; *Pa-*
renzymate albo, ſubcarnoſo; transverſaliter ſecto,
centro medullari orbiculato, ampliſſimo, circum-
dato annulo ſubſpongioso.

PROPRIETAS. *Recent.* Odor fœtido — hirci-
nus. *Sapor* subdulcescens, hircinus.

COMPOITA. Pilulæ de Cynogloſo Catharr-
hales.

SYMPHYTUM OFFICINALE. L.

Consolida Major. Symphytum. Ph. Schwarzs-
wurzel, groſſe Wallwurzel. Rostival,
Swálnjé, wysoký tráň.

Symphytum. Corollæ limbis tubulato — ventrico-
fus: fauce clauſa radiis ſubulatis.

S. Officinale. Foliis ovato — lanceolatis decurren-
tibus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix.* adulta magna, extus
nigricans, ramosa: ramis cylindricis, *Parencyma-*
ze albo carnoſo; transverſaliter ſecto, centro me-
dul-

dullari orbiculato, ampio, obsolete stellato, punctis adsperso.

PROPRIETAS. *Radix reccens* subdulcescenti — insipida, succo tenaci, glutinoso abundans; fere magis glutinosa quam radix Aithææ; *masticata* comminuitur, sed sub masticatione glutinosum copiose extrahitur; *siccata* (in taleolas longitudinales secta) duriuscula, fragilis, subinsipida; *masticata* pariter mucilaginosa; *Odor nullus.*

COMPOSITA. Emplastrum ad Rupturas.

ONOSMA ECHILOIDES. L.

Anchusa Lutea. Ph. Färber: Ochsenzunge. Wołowy gazyk cerwony.

Onosma. *Corolla campanulata*: fauce pervia.
Sennina 4.

O. Ecbioides. Fol. lanceolatis hispidis, fructibus erectis.

Indigena. Biennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix semipedalis*, saepè multo longior, digitum crassa, intus sordide pallens, cortice vestitur nigro, sublaceroque, sub hoc eleganter rubra, similique tingens colore.

PROPRIETAS. *Odor nullus*; *sapor nauseofus*, stipticus, non nihil adstringens; *masticata* arenulosa sentitur, salivam profunde rubro tingens colore.

COMPOSITA. *Rad.* (loco Alcannæ) Unguentum

tum Potabile rubrum. — de Uvis, seu ad Labia rubrum.

⊕ CYCLAMEN EUROPEUM. L.

Cyclamen. Arthanita, Ph. Sau - oder Schweinbrod. Swinsky wořech neb chléb.

Cyclamen. Cor rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. Bacca tecta capsula.

C. Europeum. Corolla retroflexa.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. (a)

FORMA. Radix recens, instar Rape, subrotunda, majuscula, depressa, extus nigricans, basi radicans: sibris filiformibus; parenchymate carnoso.

PROPRIETAS. Recentis Odor nullus. Sapor acris, pungens, fervidus, amaricans, ingratus. Recenter siccata adhuc acris; diu servata, fere insipida.

COMPOSITA. Rad, rec. Unguentum de Arthanita, sive contra Vermes.

MENYANTHES TRIFOLIATA. L.

Trifolium Fibrinum. Ph. Fiberklee, Bitterklee.

Hořký, wodný getel.

Menyanthes. Cor. hirsuta, Stigma 2 — fidum.

Caps. 1 — locularis.

M.

a) Hæc radix raro in usum vocatur a pharmacopeis nostris, ita, ut locum ejus occupaverit persæpe Solani tuberosæ Scrophulariæ nodosæ radix, imo & alia.

M. Trifoliata. Foliis ternatis,

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Folia cuncta radicialia, petiolata, ternata:* foliolis ovatis, obtusis, utrinque glabris, venosis, margine repandis, bipinnicaribus vel ultra, æqualibus, tenerioribus, oblongis. *Petioles teretes, striati, basi vaginati.*

PROPRIETAS. Rec. & sicc. Odor nullus. Sapor amariſſimus.

PRÆPARATA. Conserva.

Essentia.

Extractum.

COMPOSITA. Herb. Essentia Absinthii.

Extractum Americans, & hoc pro
Tinctura amaricante.

Conserv. Electuarium Antifebrile.

Extract. Liquor visceralis.

Pilulæ Balsam. Stahlii.

† ANAGALLIS ARVENSIS. L.

Anagallis. Ph. Hünerdarm, Gauchheil. Buti-
mor, ſabj ſtrewce.

Anagallis. Cor. rotata. Caps. circumscissa.

A. Arvensis. fol. divisis, caule procumbente.

Indigena. Annua.

Off. Herba.

FORMA. Cauliculi teneri, succulentí, qua-
drangulares, ramosi. *Folia conjugata, ex ovatis*
lanceolata, fucce plena.

PRO-

PROPRIETAS. *Odor nullus. Sapor* leniter acidulus & adstringens, succus inspissatus amarus, acris.

PRÆPARATA. Oleum coctum.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. L.

Scammonium. Ph. Scammonie. Skammonia.

Convolvulus. Cor. campanulata, plicata. Stigm:
2. Capsula 2 — locularis: loculis dispermis.

C. Scammonia. Foliis sagitatis postice truncatis,
pedunculis teretibus subtrifloris.

Exotico — Perenne,

Off. Gummi — Resina.

FORMA. *Gummi — Resina* in frustis, fusca, levis triabilis: fracturis nitidiusculis.

PROPRIETAS. *Odor* fœtidiusculus. *Sapor* subvitriolicus, nauseosus. *Masticata* hæc gummi — resina in ore difficulter solubilis, emollitur, & adhaeret dentibus, sæpe arenosa. Solvitur in aqua pura: solutione lactescente, subviridescente; lactescit etiam frictione digitii humidi. *Resinosa* pars solvitur in spiritu vini.

PRÆPARATA. Diagrydium præparatum, i. e. pulvis Scammonii subtilissimus. Resina.

COMPOSITA. *Diagryd.* Extractum Catholicum, hoc pro Pilulis Mercurialibus.

Unguentum de Arthanita sive contra Vermes,

Resin,

Resin. Electuarium Catharticum Regium, hoc pro Pilulis Anethinis & Cochiae.

CONVOLVULUS TURPETHUM. L.

Turpethum. Ph. Turbit. Turbit.

C. *Turpetum.* Foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris.

Exotico — Perenne,

Off. Radix.

FORMA. *Radix recens longissima, cylindrica, flexuosa, ramosa, extus fusca, succo lacteo turgida;* Siccata vero, qualis in officinis occurrit, secta in frusta digitalia, teretia subfragilia, corticali parte cinereo — fuscescente, parenchymate transversum secto, poris plurimis pertuso.

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor nullus. Sapor debilis subnauseosus.

COMPOSITA. Extractum Panchymagogum.
Pilulae Cochiae.

CONVOLVULUS JALAPA. L. (a)

Jalapa. Ph. Jalappe. Galapa.

C. *Jalapa.* Foliis diformibus, cordatis angulatis oblongis lanceolatis, caule volubili, pedunculis unifloris.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA *Radix siccata prout in pharmacopoliis occurrit, in taleolas transversales scissa, folia a) Mirabilis Dichotoma juxta Bergum & Phar. Svecicam.*

lida, ponderosa, sectione trasversali eodem modo piata ac in recente. Ceterum variat communiter in nostris officinis, ut nunc magis pallida, nunc prorsus nigrescens obveniat; praestantissima censetur, quae maxime resinosa.

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor debilissimus. *Sapor* acriusculus, diutius inhærens, haud ingratus. *Ma-*
sticata & deglutita pungit in faucibus. Quando contunditur, pulvis in auram ascendens valde titillat in naso & faucibus, atque irritat adusque sternutationem. Jalapæ frustum in candelæ flamma accenditur, & resinosa ejus funditur; sed simul ac flammarum removeris, extinguitur; fumat: fumo graveolente.

PREAPRATA. Extractum Jalapæ Gummosum, & Resinosum, seu Resina, aut Magisterium.

COMPOSITA. Rad. Electuarium Purgans, sive Hydragogum.

Pulvis Purgans.

Resin. Pilulae Anethinæ. — Mercuriales.

CONVOLVULS MECHOACANA. Berg. Mat. Med.

Mechoacana. Ph. Weise Galappe, Mechoakanewurzel. Bjla Galapæ.

C. Mechoacanna. Caule volubili, foliis cordatis, fructibus maxime tomentosis. Berg. Mat. Med.

Exotico — Perennis, luxurians.

Off.

Off. Radix.

FORMA. *Radix magna, carnosa, recens latescens, alba. Siccata in talleolas scissa leves, extus pallide cinereas, parenymate albo fragili, friabili.* (a)

PROPRIETAS. *Inodora, subinsipida. Mastica-
ta primum leviter dulcescens, deinde acriuscula
subnauseosa.*

PRÆPARATA. *Resina vulgo Magisterium,
aut Extractum Spirituosum.*

CINCHONA OFFICINALIS. L.

*China Chinæ. Ph. Gieberrinde, Chinarinde.
Chyna.*

Cinchona. Cor. infundibuliformis apice lanata.

Cap. infera, 2 locularis, dissepimento parallelo.

Exotica. Arbor excelsa.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex duriusculus, brunneo - rubescens, extus cinerascens, rugosus, sulcis transversalibus interuptis, saepe lichenibus deformatus, sectus in frusta semidigitalia, convoluta vel concava; fragilis: fractura leviuscula vel fibrosa scabra.*

PROPRIETAS. *Odor mucidus. Sapor. amarus,
austerus inhærens.*

PRÆ-

(a) Maxima analogia inter talleolas Mechoacanæ, & talleolas radicis Mirabilis Jalapæ observari valet demptam tantum magnitudine.

PRÆPARATA. Essentia.

Extractum Aquosum & Spirituosum.

Syrupus.

Sal essentialis chinæ. (a)

COMPOSITA. Cort. Electuarium Antifebrile.**VERBASCUM THAPSUS.** L.

Verba^{cum}. Ph. Wülfraut, Kriegskerze, Him-
melbrand. Divizna.

Verbascum. Cor. rotata, subinæqualis. *Caps* 2 —
locularis, 2 — valvis.

V. Thapsus. Foliis decurrentibus utrinque to-
mentosis, caule simplici,

Indigenum. Bienne.

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Folia* sparsa, sessilia, decurrentia,
spithamæa, oblonga, inferne attenuata, acutius-
cula, undique tomentosa, albido — viridescentia,
marginè crenata, erecta, supra rugosa, subtus
nervoso — venulosa; inferiora petiolata; supe-
riora sensim minora. *Spica* cylindrica, termina-
lis, subsessilis, palmaris vel ultra, constans bra-
cteis & floribus tempore inæqualibus. *Bracteæ*
lanceolatæ, terminatæ apice linearis, angusto;
subtus tomentosæ, supra glabrae, calyce fere lon-
giores. **CAL.** *Periantb.* tomentosum, ovato —
oblongum, basi angulatum, quinquefidum: la-
ciniis linearis — lanceolatis, subæqualibus, intus

D

læ-

a) Cum non desint, qui eum maximi estiment; si præsum-
spectetur, saltem non abs re.

lævibus, erecti. COROLLA infundibuliformis, calice longior. *Tubus* glaber, crassus, breviusculus. *Limbus* luteus, tomentosus, quinquefidus: laci-niis ovato — oblongis, obtuso rotundatis, subæ-qualibus; 4 erectis, apicibus inflexiusculis; insi-ma patente. STAM. *Fil.* 5, filiformia, tubo inserta, limbo breviora; 3 superiora paullo breviora, su-perne lanata, erecta; 2 inferiora longiora, gla-bra, declinata. *Antb.* oblongæ, didymæ, erectæ. PIST. *Germen.* subrotundum, tomentosum, obtu-sum. *Styllus* filiformis, inferne tomentosus, su-perne glaber, longitudine corollæ. *Stigma* ca-pitatum, compressum.

PROPRIETAS. *Folior.* rec. Odor debilis sub-narcoticus non gratus. Sapor herbaceus, suba-maricans, in folia Raphani incidens, sed longe debilior; *Flor.* rec. debilior; subnarcoticus, vix gratus. Siec. *Folior.* Odor debilis non ingratus. Sapor subrancidus. *Flor.* Odor saxeolus, fere Iri-dis Florentinæ; sapor gratus violaceus.

PRÆPARATA. *Flor.* Oleum Coctum.

Unguentum.

COMPOSITA. *Herb.* Species pro Gargaris-mate Emolliente. — Decocti Pectoralis.

Flor. Species Decocti Pectoralis.

DATURA STRAMONIUM. L.

Datura sive Stramonium. Ph. Dolläpfel. Geßko-wá palice, bodlawé gablkó.

D8a

Datura. Cor. infundibulif. plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus. Caps. 4 — valvis.

D. Stramonium. Pericarpiis spinosis, erectis ovatis, foliis ovatis glabris.

Indigena. Annua.

Off. Herba, etiam recens.

FORMA. *Caulis* subbipedalis, erectus, teres, glaber, lucidiusculus, inferne simplex, superne dichotomus. *Rami.* patuli, minutini pubescentes. *Folia* alterna subsucculenta, petiolata, vix spithamea, ovata, acuta, utrinque glabra, lucidiuscula, supra obscure viridia, venis lineata, subtus pallidiora, nervis validis, subalternis, margine undique inæqualiter sinuato — dentata, patentia. *Petoli* foliis breviores, teretes, supra superne canaliculati.

PROPRIETAS. rec. *Odor* narcoticus, fortior, præcipue e foliis fricatis. *Sapor* amarus. *Folia masticata* tenera. *Odor* recentis herbae narcoticus, adeo fortis & afficiens, ut, cum plantam describeret, ex odore narcotico, & ex eo quod masticaverat folii frustum, temulentus quasi evaserit, haud secus ac si intuetus fumum Tabaci hausisset BERGIUS.

PRÆPARATA. Extractum ex Herba recenti.

(a) d 2 HYA-

a) Hujus superficies frequenter nitro efflorescente obducitur, quod & per totam substantiam reperitur in veteri.

HYOSCYAMUS NIGER. L.**Hyoscyamus. Ph. Bilsenkraut. Blyn.*****Hyoscyamus. Cor. infundibulif. obtusa. Stam.*
inclinata. Caps. operculata, 2 — locularis.*****H. Niger, Follis amplexicaulibus, sinuatis, flo-*
ribus sessilibus.****Indigenus. Biennis. (a)****Off. Herba etiam recens. Semen.**

FORMA. *Caulis rec. (secundi anni) erectus,*
teres, bipedalis, villoso — lanatus, subglutinosus,
superne ramosus. Rami alterni, erecti. Folia al-
terna, sessilia, amplexicaulia, ovato — oblonga,
accuta, minutim tomentosa, mollia, pinnatifido
— dentata: lacinias lanceolatis, acutis integris.
Semina numerosa cinerea, ovata, obtusa, utrin-
que compressa, undique foveolis reticulata.

PROPRIETAS. *Herbae rec. Odor narcoticus,*
ingratus, contusorum foliorum tabacinus; ma-
scicata folia lubrica, submucilaginosa, sapore fa-
tuo. Folia siccata subinsipida, vix acriuscula,
odore debili; carbonibus ignitis immissa scintil-
lant, fremunt, & fulgurant ut Nitrum fumant:
fumo narcotico, tabacino.

PRÆPARATA. Herb. rec. Extractum.**Oleum coctum.****Semin. Oleum pressum.****Ccm.**

a) Nobis & annua & biennis, & etiam diutius durans ob-
servatur subinde,

COMPOSITA. *Herb.* Unguentum Populeum.

Sem. Pilulæ de Cynoglosso.

Extract. Ceratum pro Cereis exscantibus, & ad dolores leniendos.

NICOTIANA RUSTICA. L.

Nicotiana. Petu. Tabacum. Ph. Tabaci. Tabák.

Nicotiana. Cor. infundibulif. limbo plicato.

Stam. inclinata. Capſ. 2 — valvis, 2 — locularis.

N. Rustica. Foliis petiolatis ovatis integerimis, floribus obtusis. (a)

Colitur. Annua.

Off. Herba etiam recens.

FORMA. *Folia magna, alterna, pedalia vel ultra pro ingenio soli, patentia, ovali — lanceolata, acuta, inferne attenuata, sessilia, paullulum decurrentia, utrinque glabra, supra obscure viridia, subtus pallidiora, costa & nervis albido — viridescentibus, pubescentibus ; supræma minora sessilia, non decurrentia.*

PROPRIETAS. *Recent.* Odor debilius narcoticus. Siccat. vero fortior. Sapor recent. amari- cans, acriusculus ; masticata folia recentia, subglutinosa, linguam faucesque leviter mordentia ; saliva viridescente. Folia Tabaci recentia manibus tractata, digitos inquinant glutinosa qua- d 3 dam

a) Bergius & Pharmacopea Svecica indicant Nicotianam Tabacum officinalem ; an quia hæc species cedere in usus œconomicos ?

dam materia, fusco — brunea. In flamma candela flagrant folia siccata: fumo narcoticō asveris grato cinere albido relicto. Folia concisa, carbonibus ignitis injecta, fulgurant, & fremunt adinstar Nitri, nervi potissimum, & petioli.

PRÆPARATA. *Herb. rec. Extractum.*

COMPOSITA. *Pulvis sternutatorius variegatus.*

* **ATROPA BELLA DONNA.** L.

Solanum Furiosum. Ph. *Döllkraut.* *Lilek blá: znowý.*

Atropa. *Cor. campanulata.* *Stam. distantia.* *Bacca globosa,* 2 — locularis.

A. Bella Donna. *Caule herbaceo,* foliis ovatis integris.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* herbaceus 4 — vel 6 — pedalis, erectus, teres minutissime pubescens, ramosus. *Folia* alterna, gemina: altero minore, petiolata, ovata, utrinque acuta, spithamea vel ultra, molliuscula, integerrima, nervosa: nervis a costa alternis, obliquis.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* foliorum vix ullus; *Sapor* herbaceus, acriusculus subnarcoticus. *Baccae* recent. sapore dulcescente, fatuo subadstringente.

PRÆPARATA. *Extractum.*

So-

SOLANUM DULCAMARA. L.

Dulcamara. Ph. Hirschkraut, Bittersüß. Slad'ká hotčá.

Solanum. Cor. rotata. Anthereæ subcoalitæ, apice porogeminō dehiscentes. Baccæ 2 — locularis.

S. Dulcamara. Caule intermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis.

Indigena. Sufrutex.

Off. Caules. (stipites vulgo.)

FORMA. *Caulis (h. e. stipites) sufruticosus, flaccidus, teretiusculus, subangulatus, minutim rugoso — scabridus tuberculis sparsis exasperatus, ramosus. Rami pauci, alterni, erecti. Folia alterna, petiolata, ovata acuta, utrinque glabra, patentis; inferiora integra; superiora hastata. Petioli glabri, subtus convexi, supra canaliculati.*

PROPRIETAS. *Stipit. rec. Odor gravis, nauseosus; Sapor amaricans, postea subdulcescens. Sicc. Odor nullus; sapor magis amarus; mastici deinde dulcescunt.*

SOLANUM NIGRUM. L.

Solanum. Ph. Nachtschatten. Psý wjno.

S. Nigrum. Caule intermi herbaceo, foliis ovatis dentato — angulatis, racemis distichis nubantibus.

Indigenum. Annum.

Off.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis, teres, viridis nodosus, inter nodos angulatus: angulis & scabris, oppositis, a singulo pedunculo ad proximum decurrentibus; undique ramosus: ramis alternis, e nodis excurrentibus, erectis. *Folia* ad nodos, infra ramos, pariter alterna petiolata, ovata, acuta, angulata, subcarnosa, utrinque glabra, margine minutim ciliata, bipinnicaria vel ultra, pro ingenio soli, patentia. *Petioli* semiteretes, supra biangulati; *Umbellæ* laterales, ex ipso caule, & ramis infra folia, sed latere opposito, enatae, pedunculatae, minutim pubescentes, simplices cernuæ, nudæ, subsexflore.

PROPRIETAS. *Rec. Herbæ:* *Odor* foetidus; *sapor* herbaceus, subfatuus. *Masticata* folia tenebra, saliva viridi.

PRÆPARATA. Succus.

COMPOSITA. *Succ.* Emplastrum Diapompoligos. Hoc pro Unguento Diapompoligos.

Herb. rec. Unguentum Populeum.

RHAMUS CATHARCTICUS. L.

Spina Cervina. Ph. Kreuzbeere. Psý gahody, ézesseftlák.

Rhamnus. *Cal.* tubulosus: squamis stamina nutrientibus. *Cor.* nulla *Bacca.*

R. Catharticus. Spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis. In-

Indigena. Arbor.

Off. Fructus recens.

FORMA. Rec. Baccæ immaturæ virides; maturæ magnitudine seminis Pisi, subrotundæ, apice depresso-ovaliæ puncto elevato, loco umbilici, undique læves, nitidæ, nigricantes; parenchymate viridi, pulpo-oso succoso, tetraspermo. Ut ut pulpa ipsa viridis, cortex tamen baccæ latere interiore obducitur succosa substantia, velut in baccis Ribium nigrorum, violaceo tingente. Semina ovata obtusa, dorso convexa, antice carinata, hinc subtrigona, fusca, læviuscula.

PROPRIETAS. Recent. baccarum: Odor Padi. Sapor primum dulcescenti — nauseosus, odori congruers, dein substypticus. Masticatæ salivam viridi — purpurascente tingunt. Seminum sapor amaricans; masticata salivam lutescenti colore insificant,

PRÆPARATA. Roob.

Succus. ex hoc

Syrupus.

COMPOSITA: Syrup. Electuarium Purgans,
sive Hydragogum.

RHAMNUS ZIZYPHUS. L.

Jujubæ. Ph. Brustbeerlein. Guguby.

R. *Zizyphus*. Aculeis geminatis: altero recurvo,
floribus digynis, foliis ovato — oblongis.

Indigenus. Arbor.

Off.

Off. Fructus.

FORMA. *Drupa ovalis*, utrinque obtusa, magnitudine fructuum Olivæ fere excedens, rubra. *Nux ovali* — turbinata, utrinque acuta, rugosa, bilocularis. *Parencyma drupæ*: Pulpa molis, alba; spongiosa in siccata.

PROPRIETAS. *Odor nullus*. *Sapor dulcis*, subviscosus.

RIBES RUBRUM. L.

Ribesium Rubrum. Ph. Rothe Joannesbeer, Ribesel Rybes, nebo vino S. Jana cerwené. *Ribes*. Petala 5 & flamina calyci inserta. *Stylus* 2 — fidus. *Bacca polisperma infera*.

R. Rubrum. Inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis.

Hortense. Frutex.

Off. Fructus recens pro succo.

FORMA. *Baccae rec. globosæ*, magnitudine seminis Pisii, rubræ, glabræ, nitentes, apice umbilicatae: umbilico emarcido, convexo, nato e calyce marcescente, & contracto uniloculares; *parencymate succoso*, polispermo. *Semina intra pulpam baccæ*, pedicellata, altera receptaculi extremitate singula affixa, ovata, obtusa arillata: arillo membranaceo, diaphano, turgido succo aequo, limpidissimo, intensius styptico, a vitriolo martis subito nigrescente.

PROPRIETAS Rec. *Odor vix ullus*. *Sapor subvinosus*, dulcescenti — acidus.

PRÆ.

PRÆPARATA. Roob.

Syrupus.

† RIBES NIGRUM. L.

Ribesium Nigrum. Ph. Schwarze Ribesel. Rybes, neb wjno S. Jana černé.

R. Nigrum. Inerme racemis pilosis, floribus oblongis.

Hortense. Frutex.

Off. Folia.

FORMA. *Folia rec. alterna bipinnicaria, petiolata, subcordata, trilobata, utrinque glabra, supra lineata, dilutius viridia, subtus pallidiora, punctis elevatis areis adspersa, venulosa, margine minutim ciliata, undique grossius ferrata: ser. raturis puncto calloso terminatis. Petioli teretes, longitudine foliorum, minutim pubescentes, supra fulcati, basi clavati, concaviusculi, superne notati dentibus & subulatis, opositis.*

PROPRIETAS. *Rec. & sicc. Odor fragrans; Sapor subausterus.*

HEDERA HELIX. L.

Hedera Arborea. Ph. Ephēj, Ephēū, Břečtan.

Hedera. Petala 5, oblonga. Bacca 5 — sperma, calyce cincta.

H. Helix. Foliis ovatis lobatisque.

Indigena. Frutex arborescens.

Off. Resina (Folia raro.)

FORMA. *Gummi: massa resinosa in glebu-*

lis, duriscula, uniformis, scabra, fusco — nigricans, instar mineræ ferri tophaceæ, fragilis: fracturis splendentibus, purpurascenscentibus, granulis diffractis, subdiaphanis. *Folia* alterna, petiolata, utrinque glabra, firma, venosa, junioris fruticis quinqueloba: lobis acutis; intermedio producente; media etatis fruticis triloba; senioris vero cordata seu ovata, acuta, integerrima, supra lucida, subtus pallidiora.

PROPRIETAS. *Gummi* potius *Resina* masticata arenacea, friabilis, sicca in saliva non solubilis. *Sapor* debilis, resinofus. *Odor* debilis, subfragrans, resinofus. In candelæ flamma accenditur, flagrat: flamma albido — lutescente, fumo graviusculo, resinoso. Candela remora, fiammam sponte sustinet. In oleo expresso non solvitur, sed tingit oleum colore lactescente, & emollitur; nec in oleo styllatitio solvitur, sed tingit oleum colore aureo.

COMPOSITA. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

VITIS VINIFERA. L.

Vitis. Ph. Wein, Weinrebe. Winné émen, nek keč, rýwíj winné.

Vitis. Petala apice cohærentia, emarcida, Baccæ — sperma, supera.

V. Vinifera. Foliis lobatis spinatis nudis. Hortensis. Frutex.

Off.

Off. Integra Planta exsiccata. Fructus re-
cens & passus, vulgo Passulæ Majores.
Grosse Weinbeeren, Bibern. Welke rozyn-
ky. Passulæ Minores. Kleine Weinbeeren.
Malé rozynky. Vinum generosum, al-
bum, rubrum. Spiritus. Tartarus cru-
dus. Acetum.

FORMA. *Cyma nuda, pendula, ovata, ob-
tusa, pedunculata : pedunculo instructo cirrō
solitario. Bracteæ solitariæ, lineares, obtusiuscu-
lae, concavæ, ad ramos cymæ suæ. Pedicelli bac-
cis fere breviores, teretes, adspersi punctis par-
vis, callolis, apice margine incrassato. Baccæ ova-
to — globosæ, colore, sapore & magnitudine
variantes, subdiaphanæ, baccis uvæ crispæ vix
majores, undique glabré rore glauco tinctæ, quo
abraso nitidiusculæ, apice instructæ puncto par-
vo, elevato, umbilici loco ; parenchymate molliç-
simo, pulposo — succoso ; post sectionem trans-
versalem æquali, annulo tenui solitario, interup-
to, subflexuoso ; uniloculari, pentaspermo. Se-
mina obcordato — cylindrica, basi emarginata,
glabra receptaculo cylindrico intra baccam insi-
denta, breviter pedicellata.*

PROPRIETAS. Baccar. recent. Odor nullus.
Sapor acidulus, humectans. Baccar. recent. Unc.
1 dat drachm. 6 succi expressi tenuis, viridescen-
tis

tis (e baccis viridibus,) aciduli. *Passular.* *Sapor dulcis,* subacidulus.

PRÆPARATA. *Ex Planta integra.* Sal vitis
alcalinus.

Ex Tartaro. Tartarus depuratus vul-
go Cremor, aut Crystalli, ex hoc ite-
rum Sal Segnette. Tartarus Tartari-
sus. Tartarus emeticus.

Spiritus Tartari.

Oleum Tartari fœtidum.

Sal Tartari & inde Liquor Salis Tar-
tari seu Oleum Tartari per deli-
quium,

Ex Aceto. Acetum destillatum.

Syrupus Aceti.

COMPOSITA. *Uv. recent.* Unguentum de
Uvis seu ad labia.

Uv. pass. Major. Elixirium Salutis.

Hydromel Infantem.

Species decocti Althææ Fernelii.

Minor. Species decocti Aperitivi.

Vin. generos. Elixirium Stomachicum-
Temperatum.

Syrupus Chinæ Corticis.

Alb. Syrupus Corticum Auranthio-
rum. — Citri.

Rubr. Unguentum Potabile rubrum.

Spirit. *Vin.* Acetum Antisepticum.

Aqua Castorei. — Cinnamomi vinosa.

— Embrionis. — Hysterica Fœtida.
 — Melisæ composita, sive Spiritus Carmelitarum, & hic pro Essentia Ambrae liquida. — Theriacalis. — Vulneraria cum Vino.

Elixirium Salutis. — Vitrioli simplex & compositum.

Emplastrum Oxycroceum, pro irratione croci. — Vesicans, pro reductione Camphoræ in pulverem.

Essentia Absinthii composita. — Aurantiorum corticum. — Castorei. — Catchu. — Cinnamoni. — Corticis Citri. — Corticis Chinæ. — Croci. — Quajaci. — Lignorum. — Macis. — Myrræ. — rad. Contrajervæ. — rad. Eulæ. — rad. Gentianæ. — rad. Serpentariæ Virginianæ. — Succini.

Extractum amaricans conservationis gratia. — Catholicum. — Croci. — Panchymagogum.

Globuli ad Erysipelas pro reductione Camphoræ in pulverem.

Liquor Anodinus Mineralis Hoffmanni Oleum Benzoinum. — Myrræ per diluum conservationis gratia.

Pilulæ Mercuriales.

Spi.

Spiritus Anisi. — Aromaticus. — Baccharum Jniperi viridium. — Balsamicus vulgo Balsamum Schauerianum. — Carvi seminum. — Cochlearia. — Formicarum. — Lavendulae. — Menthæ. — Matricalis. — Nitri dulcis. — Rosmarini seu Aqua Reginæ Hungariæ. — Salis Ammoniaci Anisatus. — Salis Ammoniaci Lavendulatus vulgo Aqua Anodyna. — Salis ammoniaci vinosus. — Salis dulcis. — Serpilli. — Theriacalis Camphoratus. — Vini Camphoratus. Tinctura Aloes. — Anodina. — Antimonii anisata. — Balsamica. — Tinct. seu Balsamum Commentatoris. — Benzoes. — Martis cum succo Pomerum. — Salis Tartari. — Tartari Aurantiæ, quatenus priorem recipit. *Tartarus crudus.* Regulus Antimonii simplex. *Tartarus depuratus* seu *Cremor aut Crystalli*. Ele&varium Catholicum Regium. — Lenitivum seu Tamarindorum. Globuli Martiales. Infusum sive Aqua Angelica. — Laxativum. Pulvis dentifricius albus, & ruber. — Deoppilans sive digestivus. — Vitæ. Tin-

- Tinctura Martis Tartarisata.
Spiritus Tartari, Spiritus Diatriion seu
 Mixtura simplex.
Sal Tartari. Electuarium sive Confectio
 Kermesina, vulgo Alkermes.
Elixirium Salutis. — Stomachicum
 Temperatum.
Essentia Castorei.
Extractum amaricans, & hac pro Tin-
 etura Amaricante.
Hepar Sulphuris.
Infusum sive Sanguis Cichorei sim-
 plex & cum Rheo.
Kermes minerale.
Lapis Causticus.
Sal Digestivus seu Febrifugus Silvii.
Syrupus Cichorei cum Rheo. — Ker-
 mesinus, & hic pro Electuario sive
 Confectione Kermesina. — Manatus.
Tartarus Vitriolatus, & hic pro Pulve-
 re Antispasmodico communi, &
 stahlii. — Deoppilante sive digesti-
 vo. — Purgante. — Stomachico Birk-
 manni.
Tinctura Antimonii Anisata, sim-
 plex. — Palsamica. — Rebarbaria quo-
 fa ex tempore paranda. — Salis Tar-
 tari.

E

Cum

*Cum Sale Tartari adhuc parantur: Spiritus
Salis Amoniaci Lavendulatus vulgo
Aqua Anodina. — Vinosus.*

*Oleum Tartari per deliquium, seu Liquor
Salis Tartari.*

Terra foliata Tartari.

Unguentum ad scabiem.

*Acetum. Acetum Antisepticum. — Colchi-
ci. — Lavendulæ. — Lithargirii. —
Rosarum. — Rutæ. — Sambuci —
Squilliticum.*

Aqua vulneraria cum Aceto.

*Emplastrum Diabotanon. — Diachy-
lon cum gummatibus. — de Gal-
bano crocatum. — Malaëticum. —
Noricum. — Oxycroceum. — Sa-
ponatum.*

Oxymel Colchicum. — Simplex. —
Squilliticum.

Sacharum Saturi.

Syrupus Aceti. — Emeticus.

Terra foliata Tartari sicca, & delique-
cens, unde Liquor Terræ foliatæ
Tartari.

Unguentum Ægyptiacum.

*Cum Aceto Vini adhuc parantur: Magiste-
rium vel Lac Sulphuris.*

Sulphur Auratum Antimonii.

Tar-

Tartarus Tartarisatus. Infusum sive Aqua
Angelica.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. L.

Hirundinaria. Ph. Schwalbenwurzel. Lassos-
wičnjk.

*Asclepias Contorta. Nect. 5, ovata; concava, cor-
niculum exserentia.*

*A. Vincetoxicum. Foliis ovatis basi barbatis,
caule erecto, umbellis proliferis.*

Indigeno — Perenne.

Off. Radix.

FORMA. Rec. Radix oblonga, cylindrica,
seu planiuscula, horizontalis, repens, breviuscu-
la, bipinnicaris, superne cinerea, scabra, notata
cicatricibus, callosis, truncatis, rugosis, subtus
obsessa fibris numerosis, aggregatis, filiformibus,
albis, subcarnosis, glabris, descendantibus, elon-
gatis. Gemmæ e radice progerminantes, incar-
natae, sparsæ, undique imbricatae: squamis ova-
tis, obtusis adpressis. Parencrema radicis solidius-
culum, transversaliter sectum variegatum; pa-
rencrema vero fibrarum album, transversaliter
sectum puncto centrali, subrotundo.

PROPRIETAS. Rad. rec. Odor graveolens,
Sapor graviusculus, vix americanus; fibrarum sa-
por subdulcescens; Odor fortis, graveolens, vali-
dior quam radicis. Siccatae radicis Odor inten-
sius graveolens, quam recentis; Sapor americanus,
gravis.

e 2

CHE.

CHENOPODIUM BOTRYS. L. (a)

Botrys. Ph. Traubenkraut. Groznowá bylina,
neb grozniček.

*Chenopodium. Cal. 5 — phyllus, 5 — gonus. Cor.
o. Sem. 1, lenticulare, superum.*

C. Botrys. Foliis oblongis sinuatis, racemis nu-
dis multifidi.

Hortensis. Annua.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis rec. erectus, vix pedalis, ra-
mosus, angulatus, striatus, hirto — scaber. Rami
alterni, erecti. Folia alterna, petiolata, oblonga,
obtusa, glabriuscula, runcinata; lobis alternis,
obtusis, angulatis; sinubus obtuse excavatis.*

PROPRIETAS. *Herb. rec. Odor fragrans, for-
tis, graviusculus, balsamicus, non ingratus. Sa-
por odori congruens, aromaticus. Recens plan-
ta manibus tractata, leviter viscida est, manus in-
quinans; diutius olfacta, temulentiam excitat.
Sicc. odor & sapor consimiles.*

*** CHENOPODIUM VULVARIA. L.**

Vulvaria Ph. Stinkende Melte. **Lebeda smre-
dlawá.**

C. Vulvaria. Fol. integerrimis romboideo-
ovatis, flor. conglomeratis axillaribus.

Indigena. Annua.

Off.

a) *Chenopodium Ambrosiades loco Botryos potissimum
usurpatur, quod multi insuper præstantius estimant.*

Off. Herba.

FORMA. *Caulis ramosus & foliosus, procumbens. Folia lanceolata margine integro aut rariter dentato, polline farinaceo adspersa, & albicantia. In summa planta ramuli florigeri breves ex aliis foliorum erecti, ad quos glomeruli rotundi florum sessiles adhaerent.*

PROPRIETAS. *Odor & Sapor vehemens pisi-
cium salsorum, subputridorum, qui digitis tenax
adhaeret.*

SALSOLA SATIVA. L.

*Salsola Col. 5 — phyllus. Cor. o. Caps. 1 — sper-
ma. Sem. cochleatum.*

*S. Sativa. Herbacea diffusa, fol. teretibus gla-
bris, flor. conglomeratis.*

Exotica. Annua.

Off. Soda Hispanica. Alicantisches Aschen-
salz. Sul alicanteská lauhová.

FORMA. *Massa solida, durissima, griseo —
nigricans, subcærulescens, ponderosa, sicca, so-
nora fragmentis poris pertusis.*

PROPRIETAS. *Odor non ingratus ; cum sal-
via fricata Souda, odor excitatur violaceus, alca-
li urinoso mixtus. Sapor intense salsus, acris.*

PRÆPARATA. Sal Soudæ depuratus.

e 3

GEN-

Souda ex plurimis plantis marinis parari potest, sed optima
habetur e Salsolis & speciatim e Salsola Kali & Sativa ; at

præ-

—

GENTIANA LUTEA. L.

Gentiana. Ph. Enzian. Hōtēc.

Gentiana. Cor. 1 petala. Caps. 2 — valvis, 1 — locularis; Receptaculis 2, longitudinalibus.

G. Lutea. Corollis subquinquefidis rotatis ver- ticillatis, calycibus spathaceis.

Indigena. Perennis.

Off.

præstat Salsola sativa, quoniam hæc planta verum alcali minerale semper præbet, etiam ubi locis a mari remotis conseritur, modo id in climate calido fiat, ut expertus est Cl. Abbas Mazeas; tamet si non diffidendum, ut Cel. Duhamel etiam observat, cum alcali vegetabili commixtum iri, si nimis longe a mari seratur. Ea vero Souda, quæ ex aliis plantis marinis conficitur, vix semper punctum fert. Ægyptii tamen satis bonam parant e Melembryanthemo nodifloro, & Reaumuria vermiculata; Angli vero suam Soudam, sub nomine Kelp notam, e Fuci Ceranoide aliisque Fuci speciebus vesiculosis. Souda, quam præbet Salsola Kali, communissima nobis, est que illa massa uniformis, siccæ fragilis, sapore salso, obscure cærulea, nigricans; adulteratur, si loco Salsolæ Kali, Salsola Tragus sumatur. Salicornia Soudam dat griseo — cæralescentem, cinereum, porosum pertusum, fragilem, vix persistentem. Ceterum præstantissima censetur Souda alicantina, quæ e salsola sativa perficitur; hanc excipit Souda e Carthagena; Souda vera Bourdina mala est, ut recte observat Cl. Marcorelle, est vero hæc massa nigra, maculis viridibus variegata, humida, odore fœtido, deterrima tandem Souda, Varec diða, quæ in Normandia ab omnibus plantis marinis, indisceret sumptis, præcipue Fucis, paratur; immo illa in eo damnoſa est, quod linteæ macular. Ita Bergius, Mat. Med.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc. Radix.* pedalis vel ultra crassitie digitii, saepe pollicis, vel longe ultra, cylindrica, rugosa: rugis annularibus approximatis, fusca, subannulata. ramosa; *Parencremata rubrolucentia.*

PROPRIETAS. Essentia.

Extractum.

COMPOSITA. *Radic.* Electuarium Dialcor-
dii, — Elect. seu Theriaca Andromachi, — Elect. seu Theriaca Diatefferon.
Oleum Colocynthidis compositum,
vulgo Habacucinum.

Extract. Elixirum Stomachicum Tem-
peratum.

GENTIANA CENTAURIUM. L.

Centaarium Minus. Ph. Tausendguldenkraut.

Zemē žluč mensī.

G. Centaurium. Corollis quinquefidis infundi-
buliformibus, caule dichotomo pistillo simplici.
Indigenum, Annum.

Off. Herba. Summitates floridæ.

FORMA. *Folia radicalia congesta, cuneiformi* — oblonga, obtusa, integerrima, subsucculenta, in petiolos breves, desinentia, glabra, vix pollicaria, patentia; *caulina opposita, se-
filia, linearia, obtusa, erecta internodiis breviora.*

PROPRIETAS. *Siccata. Odor debilis, vix ullus.*
Sapor amarissimus.

PRÆ-

PRÆPARATA. Extractum.

Sal Alcalinus & Medius.

COMPOSITA. Flor. Extractum American.

Flor. c. Fol. Electuarium s. Theriacæ
Andromachi.

Herb. Extentia Absinthii composita.
Pulvis Vitæ.

Herb. c. Flor. Oleum Viride.

Summit. Species Decocti Antifebriæ.

Extract. Elixirum Stomachicum
Temperatum.

ERYNGIUM CAMPESTRE. L.

Eryngium. Ph. Manstreuwurzel. Mäcta hornis,
mujská vrba.

Eryngium. Flores capitati. Receptaculo paleaceo.

E. Campestre. Floribus radicalibus amplexicauli-
bus pinnato-lanceolatis.

Indigenum. Perenne.

OF. Radix.

FORMA. Radix cylindrica, crassie vix digi-
ti, geniculis annularis, fuscescens; parncymate
albo. Siccata fragilis.

PROPRIETAS. Odor leviter aromaticus; Sa-
por recentis dulcescens; Sicc. leniter aromaticus,
parum dulcescens, subamaricans.

TORDYLIUM OFFICINALE. L.

Seseli Creticum. Ph. Cretischer Sesel, Sesel.
Lomikámen řecký, salezowé, neb olesni-
kové semeno. Tor.

Tordilium. Cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ.

Fructus suborbiculatus, margine crenatus. Involucra longa, indivisa.

F. Officinale. Involucris partialibus longitudine florum. foliolis ovatis laciniatis.

Indigenum. Annum.

Off. Semen. (a)

FORMA. Semina linearia, crassa, utrinque obtusa, 3 lineas longa, hinc concava, angulis tribus parallelis, inde convexa, angulis 4 alatis, interjectis angulis 3 aliis, longe minoribus, singulo intra singulam alam.

PROPRIETAS. Odor aromaticus, gravis. Sapor aromaticus, amarus, fortis, in semina Cyni incidentes.

DAUCUS CAROTA. L.

Daucus Sylvestrus. Ph. Gemeiner = Bogelnest. Deyworec domácý, oleſník.

Daucus. Cor. subradiata. Flosculi disci abortivi.

Fructus pilis hispidus.

D. Carota, Seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis.

Colitur. Biennis.

Off. Semen.

For-

a) Semen Seseli Cretici; quod vulgo prostat in officinis apud mercatores venale plurimum differt a semine Tordilli officinalis, licet utrumque semen ex planta umbellifera, quod etiam Murray in Aparat. Medic. T. I. jam adnotavit.

FORMA. *Semina rec.* ovalia, longitudine 1 vel 2 linearum, utrinque obtusa, hinc plana, lineis tribus elevatis, minutim ciliatis, inde convexa margine & angulis 2 spinoso — ciliatis, lineis 3 elevatis minutim ciliatis, singulis inter singulum angulum interjectis.

PROPRIETAS. *Semina* aromaticā, calidiuscula, amaricantia.

COMPOSITA. *Semina IV Calida minora.*

CONIUM MACULATUM. L.

Cicutā vulgaris. Ph. Schierling. Bolehlaw.

Conium. Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, 5 — striatus, utrinque crenatus.

C. Maculatum. Seminibus striatis.

Indigenum. Biennē. (a)

Off. Radix. Herba. Flores.

FORMA. *Radix rec.* fusiformis, crassitie radicis Dauci, palmaris, sēpe dotrantalis, alba striis annularibus approximatis undique rugosa, fibris & fibrillis sparsis, odore inter Daicum & Chærophillum, junior radix lactescit. *Caulis* tri vel quadrupedalis, erectus, teres geniculatus, crassitie dīgitī minoris, sēpe pollicis, maculatus, ramosus, diffusus. *Rami* alterni, axillares e foliis, erecti, ramulosi, foliosi. *Folia* ad genicula, alterna, varinqne glabra saturate viridia, lucidiuscula, linea

(a) Etiam annua si Semina primo vere terræ comittantur.

neata, subtus pallidiora, erecto — patentia, tri-pinnata: pinnis oppositis, pinnulis pinnatis, pinnulis secundariis oppositis; inferioribus distin-
ctis, sessilibus, pinnatifidis: laciniis oblongis, ob-
tusis, inciso — seratis: superioribus confluenti-
bus, simplicibus, inciso pinnatifidis: laciniis lan-
ceolatis, obtusis; folia ramea minora, vaginis pe-
tiolata. Petiolæ communes teretiæ sculi, fistulosi,
striati, glabri compressiæ sculi, latere superiore
maculati, & inter pinnas infimas carinati; inter
pinnas vero superiores sulcati: fulco longitudi-
nali; basi vaginati: vagina concava, amplexicauli
extus undique sulcata. Umbellæ terminales, pe-
dunculatæ; priores axillares e ramulis; universa-
lis 12 — vel 14 partitæ, concava, glabra; partia-
lis plana, circiter 16 — partita. Involucrum uni-
versale tetraphyllum: foliis parviusculis, lanceo-
latis, acutis, margine inferne utrinque membra-
naceis, glabris deflexis; partiale triphyllum, la-
tere exteriore situm, foliolis ovato — acutis, mar-
gine membranaceis, patentibus. Perianth. pro-
prium vix ullum. Margo superus. COROLLA uni-
versalis æqualis, uniformis; flosculi omnes ferti-
les; propria alba, petalis 5, obcordatis, supra ca-
rinatis, sinu infexo, patentibus. STAM. Filam. 5
subulata, alba patentia longitudine corollæ. Anth.
didymæ. PIST. Germen. subrotundum, compres-
siæ sculum, viride, undique striato — angulatum:

an.

angulis tuberculatis. *Nectarium superum*, album, planum, germen superne tegens, crenatum. *Styliz*, albi, erecti; patentes. *Stigmata* obtusa.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* plantæ totius foetidus, murinus; *siccat.* fortior. *Sapor.* *rec.* leniter aromaticus, herbaceus, subnauseosus.

PRÆPARATA. *Aqua.*

Conserua.

Extractum.

COMPOSITA. *Pulv.* & *Succ.* Emplastrum de *Cicuta simplex* & compōsitum.

Extract. Emplastrum Diabotanon.

ATHAMANTA CRETENSIS. L.

Daucus Creticus. Ph. Cretisch = Bogelnest. Deyworec kretisch.

Atbamanta. Fructus ovato — oblongus, striatus, Petala flexa, emarginata.

A. Cretensis. Foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis.

Indigena. Perennis.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* subulata, 3 lineas longa basi obtusa, apice stilo persistentia coronata, hinc sulco concavo notata, inde semiteretia, tomentosa.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, gratus, fere *Origani.* *Sapor* gratus aromaticus, in *Daucum* incidens, calidiusculus.

COPPOSITA. Ele&tuarium seu Theriaca Andromechi.

FE-

FERULA ASA FOETIDA. L.

Asa Fœtida. Ph. Stinkender Asand, Teufels-dreck. Czertowò howno.

Ferula. Fructus ovalis, compresso — planus, striis utrinque 3.

F. Asa fœtida. Foliis alternatim sinuatis obtusis.

Exotica. Perennis.

Off. Gummi — Resina.

FORMA. Gummi — Resina in glecis, plastica, conflata e variis gummis lucidis, albidis, lutescentibus vel rubicundis.

PROPRIETAS. *Odor fœtidissimus, aliaceus.*
Sapor amaricans, acris, mordens, diutissime inhærens, etiam si os faucesque compluries eluantur aceto vini vel spiritu vini diluto. Masticata primum plastica, dein sensim soluta: saliva latea, instar cremoris lactis, linguam & palatum albo tingente.

COMPOSITA. Aqua Hysterica fœtida.**LIGUSTICUM LEVISTICUM.** L.

Levisticum. Ph. Liebstöckel. Apich welify, libecek.

Ligusticum. *Fructus oblongus, 5 — sulcatus, utrinque. Corollæ 2 quales. Petalis involutis integris.*

L. Levisticum. Foliis multiplicibus: foliolis superne incisis.

Colitur. Perenne.

Off.

Off. Radix. Semen.

FORMA. *Radix rec. fusiformis, dodrantalis vel ultra, extus feruginosa, undique notata rugis parvis reticulatis, apice fuscō — rugosa, fibrosa. Parencrema carnosum, album, transversaliter sectum centro medullari ampliore, lutescente, ovato undique dentato, versus marginem striato: striis obsoletis; cinctum corticali parte alba, obsolete striata; succo limpidiusculo. Semina ovalia, lineas fere 2 longa, subincurva, basi truncata — retusa, apice tuberculo piramidali terminata, glabra, hinc plana, carina obsoleta, inde convexa, dorso angulis tribus parallelis, latere undique margine subulato.*

PROPRIETAS. *Radic. rec. Odor fragrans, fortis, gravis in odorem Meliloti cærælei incidens sed longe gravior, & ingratior. Sapor fortis, gravis, calidus, Angelica ingratior. Semina siccata. Odor fortis aromaticus, graviusculus fere Angelicæ. Sapor fortior calidus, aromaticus Angelicæ ingratior.*

COMPOSITA. *Rad. Aqua Hysterica Fœtida.*

ANGELICA ARCHANGELICA. L.

Angelica Sativa. Ph. Angelika, Heil. Geistwurzel. Angelika, archangelika.

Angelica. Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stylis reflexis. Corolle æquales: petalis incurvis.

A. Archangelica. Foliorum impari lobato, Indigena. Biennis.

Off. Radix. Semen.

FORMA. *Radix rec.* fusiformi — cylindrica crassitie pollicis vel longe ultra pro varietate soli & ætatis, rugosa, cinereo — rufescens, undique instructa fibris elongatis, teretibus, descendentibus, crassis. *Parenecym. rec.* carnosum, albidum, lactescens: succo lutecente; sicc. subspongiosum. *Semina* ovalia, utrinque obtusa, 2 vel 3 lineas longa, pallido cinerea, hinc plana falco longitudinali, inde convexa, dorso elevato: angulis tribus parallelis, latere undique marginato.

PROPRIETAS. Radic. *Odor aromaticus*, fragrans, gratus. *Sapor aromaticus*, fortis. *Masti-*
cata primum subdulcescens, mox graviusculus, calidus acris; sub masticatione salivam sollicitat, mordet in lingua & faucibus cum calore. *Seminum Odor aromaticus*, fragrans, gratus. *Sa-*
por calidus, aromaticus.

PRÆPARATA. Extraætum Spirituosum.

COMPOSITA. *Rad.* Aqua Melissæ composita
— Theriacalis.

Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Spiritus Aromaticus

Sem. Tinctoria, sive Balsamum Comentatoris.

Syrupus Emeticus;

SI-

SISON AMMI. L.

Ammi Verum. Ph. Ammen. Ammi.

Sison. Fructus ovatus, striatus. Involucra sub 4 — philla.

S. Ammi. Foliis tripinnatis : radicalibus linearibus ; caulinis setaceis : stipularibus longioribus.

Indigenum. Annum.

Off. Semen.

FORMA. *Semen linea breviora, ovata, utrinque obtusa, undique striata, bipartibilia; plerumque partita occurunt, hinc plano — concava, inde convexa, quinquangulata.*

PROPRIETAS. *Odor aromaticus, gratus. Sapor aromaticus, amaricans, calidus.*

COMPOSITA. *Electuarium, seu Theriaca Andromachi.*

Semina IV. Calida minora.

SISON AMOMUM. L. (a)

Amomum. Ph. Amomlein. Woffecto Korens.

S. Amomum. Foliis pinnatis, umbellis erectis.

Exoticum. Arbor.

Off. Semen.

FORMA. *Semen rotundum ex fusco nigricans; piperis imo pisii saepe magnitudine, in PRO-*

a) *Semen Amomi, quod officinæ nostræ habent omnino differt a semine plantæ umbeliferæ, qualis est Sison Amomi Linnei; probabilius ad Myrti speciem refertur ab aliis.*

summo umbilicatum, includens sub tenui pellicula & substantia fungosa, binos acinos nigros, parvos tenui membrana vestitos.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* ad caryophylum accedit.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi,

BUBON GALBANUM. L.

Galbanum, Ph. *Gummigalban*. *Galbánum*.

Buhon, *Fructus ovatus, striatus, villosus*.

B. Galbanum. Foliolis rhombis dentatis glabris triatis, umbellis paucis.

Exoticum, Frutex,

Off. Gummi — Resina.

FORMA. Gummi — resina in massa, plastica inter digitos ductilis instar ceræ, digitis tenaciter adhærens, facie resinosa, fulvo — cinerascente, fragmentis splendentibus instar colophonii. Occurrit varietas magis pallida, sicca fragilis : fragmentis maculosis, parum splendentibus, digitis, quibus tractatur, vix adhæret.

PROPRIETAS. *Odor* gravis, ad Ammoniacum accedens. *Sapor* gravis amaricans. *Masticæ* plastica vix solubilis, sed fere ut cera cum saliva circumvolubilis, & diutius in ore retenta palato adhæret.

COMPOSITA. Aqua Hysterica Fœtida.

Electuarium seu Theriaca Andromachi. F Em-

Emplastrum Diabotanon. — Diachylon cum gummatibus. — de Galbano Crocatum. — Malacticum. — Oxycroceum. — Filii Zachariae a vulgo de Spermate Ceti. Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

CUMINUM CYMINUM. L.

Cyminum. Ph. Römischer Kümmel. Bmfn. Cuminum. Fructus ovatus, striatus; Umbellulæ 4: Involucra 4 — fida.

Exoticum. Annuum.

Off. Semen.

FORMA. Semina ovali — linearia, hinc plano concaviuscula, inde convexa, undique sulcata, scabrida, duas lineas longa, fusco — cinerea. Sæpe fructus integri occurunt, h. e. semina duo composita.

PROPRIETAS. Odor fortis gravis. Sapor aromaticus, in Carum incidens, sed acutior, gravior, ingratus.

PRÆPARATA. Oleum destillatum.

COMPOSITA. Sem. Aqua Hysterica foetida.

Emplastrum Diabotanon.

Semina IV. Calida majora;

Suppositoria Composita.

OI. Emplastrum de Labdano.

Unguentum Carminativum.

ATHA-

ATHAMANTA MEUM. L. (a)

Meum. Ph. **B**ärwurzel. **B**oprnſe.

Æthusa. *Involucella* dimidiata, 3 — phylla, pendula. *Fructus* striatus.

Æ. **M**eum. Foliis omnibus multipartito setaceis.

Indigenum. Perenne.

Off. **R**adix.

FORMA. *Radix* sec. fusiformi — cylindrica apice ramosa, crassitie digitii minoris, fuscocinerea, rugis transversalibus, annularibus approximatis, vertice instrueta setis numerosis, fasciculatis, penicelli instar raforii; *parencremate ferruginea*.

PROPRIETAS. *Odor & Sapor aromaticus, gracilis cum levitate, fere Dauci Carotæ.*

CORIANDRUM SATIVUM. L.

Coriandrum. Ph. **K**oriander. **B**öryander, nebo **K**oliander.

Coriandrum. *Cor.* radiata: *Pet.* inflexo — emarginata. *Involuer.* universum, 1 — *phyllum*. *Partia* dimidiata. *Fructus* sphericus.

C. **S**ativum. *Fructibus* globoſis.

Colisur. Annum.

Off. **S**emen.

FORMA. *Semina* globoſa, apice umbilicata, minutim rugosa, undique fulcato — angulata, linea paullo longiora.

f 2

PRO-

a) Hodie **Æ**thusa Meum L.

PROPRIETAS. *Odor rec.* graveolens, fætidiusculus. *sicc.* *Odor aromaticus*, graviusculus, subgratus; *Sapor congruens*.

COMPOSITA. *Aqua Carminativa communis* & *Regia*. — *Melissæ composita*.

Elixirium Salutis.

SCANDIX CEREFOLIUM. L.

Cerefolium. Ph. *Kerfelfraut*. *Berblßt*, *třebule*.

Scandix. *Cor.* Fructus subulatus. *Petala* emarginata. *Flosculi* disci sèpius masculi.

S. Cerefolium. Seminibus nitidis ovato — subularis, umbellis sessilibus lateralibus.

Hortense. Annum.

Off. Herba. (a)

FORMA. *Rami* ad genicula, solitarii, alterni, erecto — patentes, cauli similes, ad singula genicula inferne subpubescentes. *Folia* ad genicula, alterna petiolata, utrinque glabra, tenera, duplicito — pinnata: pinnis remotis: pinnulis propriis ovatis, acutiusculis, inciso pinnatifidis, margine minutissimo ciliatis; costa subtus pubescente: pilis rectis, albis. *Petiol.* comunes striati, canaliculato — vaginati, subamplexicaules, late re utrinque excurrente in membranam tenuissimam, ciliatam; partiales teretusculi, subtriangulares, supra canaliculati, glabri.

PRO.

a) *Herba recentis etiam usus copiosus.*

PROPRIETAS. *rec.* *Odor gratus balsamicus,*
debilis nisi fricetur; in siccata penitus evanescit.
Sapor aromatico balsamicus, ad Anisum accedens,
gratus. Sicc. debilior.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucu-
pha.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM. L.

Imperatoria. Ph. Meisterwurzel. Wissedobr.

Imperatoria. *Fructus subrotundus compressus,*
medio gibbus, margine cinctus. Petala infl-
xo emarginata.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec. carnosο — tuberosa,*
ovalis, bipollcaris, rugis elevatis fuscis, & sulcis
annularibus glabris profundis, proferens ramos
undique excrescentes, simplices, palmares tere-
tes, crassitie pennae anserinæ, geniculatos, sæpe
ramos, albos, erectos, apice desinentes in tuber,
primario simile, subrotundum, vel cylindricum,
sæpe polliferum. Fibrae radicantes filiformes e
geniculis exeuntes. Radix stolones repentes sub
terra edit, sæpe pedales, cylindricos, tandem in
folia excrescentes. Parenyma carnosum, trans-
versaliter sectum centro medulari amplissimo,
orbiculato, centro solido, peripheria punctata:
punctis lacunosis; circumdato annulo fusco;
corticali parte cinerea. Radix recens secta lac-

fun-

fundit albidum, sublutescens, amarum, e punctis lacunosis parencymatis proveniens.

PROPRIETAS. rec. radicis Odor gravis. Sapor gravis, acris, amarus; masticata acris & calida sentitur, fauces & lingam pungit.

COMPOSITA. Aqua Theriacalis.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerinus.

*PASTINACA SATIVA. L.

Pastinaca. Ph. Pasternak. Passerina.

Pastinaca. Fructus ellipticus, compresso — planus. Petala involuta, integra.

P. Sativa. Foliis simpliciter pinnatis.

Hortensis. Biennis.

Off. Semen.

FORMA. Semina ovalia, utrinque compresso — plana obtuso — rotundata, utrinque marginata, glabra, hinc concaviuscula, subcarinata, inde striata.

PROPRIETAS. Rec. Semina. Odor debilis, gravis; Sapor intensius gravis, empyreumaticus.

PASTINACA OPOBANAX. L.

Opopanax. Ph. Gummioopanax. Opobanax, nebo gummi panaxoré.

P. Opopanax. Foliis pinnatis: foliolis basi antica excisis.

Exotica. Perennis.

Off. Gummi — Resina.

f 3

[For-

FORMA. *Gummi — resina* in glebulis s. frustis, rubro — lutescens; massa conglomerata e grumulis & glandibus, friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* hujus *Gummi* gravis ad **G.** ammoniacum accedens. *Sapor* amaricans, diu inhærens, nauseosus; *masticatum* inter dentes primum friabile, dein solubile, *Levisticum referens*; *saliva lactea*.

COMPOSITA. *Aqua Hysterica Fœtida.*

Electuarium seu *Theriaca Andromachi.*

Emplastrum Diachylon cum *gummatibus.*

ANETHUM GRAVEOLENS. L.

Anethum. Ph. Dille. *Bopr zahrádní.*

Anethum. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Petala* involuta, *integra.*

A. Graveolens. *Fructibus* compressis.

Hortense. *Annuum.*

Off. *Herba*, etiam *recens.* *Semen.*

FORMA. *Rec.* *Caules* sæpius plures ex una radice, bipedales, glabri, undique striati: striis parallelis, alternis albis, glabris, rore glauco & tenui tinctis, alternis rubicundis, punctatis; geniculatus, parcus ramosus: ramis alternis, erectis, remotis. *Folia* ad genicula, alterna, glabra, petiolata, dublicitato — pinata: pinis pinatifidis: aciniis subulatis, acutis, supra planiusculis. *Petioli*

tioli teretes, viridi — rubicundi, striis albis, bæsi vaginati: vagina lanceolata, concava striata, arcta, basi amplexicauli.

PROPRIETAS. *Foliorum rec. Odor gratus fragrans; contusæ vero herbæ graviusculus, vix gratus. Sapor aromaticus, odori congruens, gratus; masticata folia calidiuscula, satis tenera, sentiuntur, saliva rubicundo — viridescente. Semina aromate herba, odore item & sapore, at magis calida.*

PRÆPARATA. Oleum Coctum. — Destillatum. Aqua dest. (a)

COMPOSITA. Herb. rec. Oleum Viride.

Unguentum Carminativum. — Nervinum.

Semin. Aqua Carminativa Communis & Regia.

Ol. dest. Oleum Viride.

Pilulæ Anethinæ.

Unguentum Carminativum.

ANETHUM FOENICULUM. L.

Fœniculum Dulce. Majus. Ph. Römischer Fen-chel. Ŝenyk, Wlaſký neb Ržmstý, neb ſladký ſopr.

A. Fœniculum. Fructibus oyatis.

Hortense. Biennie.

Off. Semen.

FOR.

a) Aquæ Anethi apud nos usus frequens a vulgo, eam nobis fecit officinalem.}

FORMA. *Semina ovali — lineária, teretiuscula, undique profunde sulcata, bipartibilia, 2 lineas longa.*

PROPRIETAS. *Seminum odor aromaticus, savis; Sapor aromaticus, dulcescens, calidiusculus, gratus.*

PRÆPARATA. *Aqua destillata.*

Oleum destillatum.

Syrupus.

COMPOSITA. *Sem. Aqua Carminativa Communis & Regia.*

Electuarium Pectorale. — Elect. f.

Theriaca Andromachi.

Pulvis Infantum Absorbens. — Vitæ.

Semina IV. Calida Majora.

Species Dectocti Aperitivi. — Lignum. — pro Potu Ordinario.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Suppositoria Composita.

Trochisci Bechici nigri.

Aq. Looch sanum ac expertum.

Ol. Unguentum Carminativum.

Syrup. Pilulae Cochiae.

ANETHUM FOENICULUM, varietas prioris

L.

*Fœniculum vulgare, minus. Gemeiner Fenchel.
Bopre.*

Hor.

Hortense. Perenne sive Bienne *Pbar. Svec.* aut
Trienne Bergi. (a)

Off. Rad. Herba. Semen.

FORMA. *Radix rec.* tenera fusiformis, alba;
adulta ramosa. *Caules* plures ex una radice 3 —
vel 4 — pedales, saepe ultra, erecti; teretes, undi-
que striati: striis rubro — viridibus, longitudi-
nalibus, alternis glabris, dilutioribus, alternis
punctatis; rore glauco tinti, geniculati, ramosi:
ramis alternis. *Folia* adgenicula saturate viridia,
glabra, diffusa, bipinnata: pinnis pinnatifidis:
laciinis filiformibus, acutis, supra sulco longitudi-
nali, subtus striis tribus remotis. *Petioli* tere-
tes undique striati, basi vaginati: vagina cylin-
drica, concava, undique sulcata, basi amplexicau-
li. *Semina* ovali — linearia, teretiuscula, undi-
que profunde sulcata, bipartibilia, 2 lineas lon-
ga sunt exiliora, quam dulcis, bruna magisque
aromatica Murray Mat. Med.)

PROPRIETAS. *Rec. folior.* Odor debilis, nisi
fricata fuerint, tunc vero fragrans, aromaticus,
gratus. *Sapor* aromaticus, subdulcescens, debi-
lier; masticata subsucculenta, comminuuntur,
saliva rubro — viridi. *Radix rec.* & tenera, se-
cundum aroma & saporem, herbæ conformis,
sed gravior & dulcior; adulta vero radix debili-
ter aromaticæ; *Seminum* Odor aromaticus, dul-
cescens, calidiusculus, gratus.

COM-

a) Quod etiam nobis non raro observatur.

COMPOSITA. *Rad. Radices V. aperientes, hæ pro Speciebus Decocti aperitivi & Syrupo rad. quinque aperitivo.*

Herb. Aqua seu Balsamum Embryonis — Vulneraria cum Vino.

Herb. rec. Unguentum Carminativum.

CARVUM CARVI. L.

Carvi. Ph. Kummel, Kümm. Amfn Iauēnij.

Carvum. Fructus ovato — oblongus, striatus.

Involucrum 1 — phyllum, Petala carinata, inflexo — emarginata.

Indigenum. Biennie. (a)

Off. Semen.

FORMA. *Fructus rec. ovatus, compressus, utrinque obtusus, glaber, undique sulcatus, coronatus stylis duobus persistentibus, divisoricatis; bipartibilis in Semina parviuscula, lineæ longitudine, vel paulo ultra, subincurva, hinc plano concaviuscula, carinata, inde convexa, quinquangulata: angulis pallidis glabriusculta, fusco brunea, utrinque obtusa.*

PROPRIETAS. *Odor aromaticus, subgravius. culus. Sapor aromaticus, calidus, satis gratus.*

PRÆPARATA. *Aqua.*

Oleum destillatum.

Spiritus.

COMPOSITA. *Sem. Aqua Carminativa communis, & Regia.* Eli-

(a) Sæpe perennat.

Elixirium Salutis.
Essentia Carminativa.
Pulvis Vitæ.
Semina IV. Calida Majora.
Suppositoria Composita.

Ql. Unguentum Carminativum.

PIMPINELLA SAXIFRAGA. L.

Pimpinella Alba. Ph. Weißbibernel. Bedrnsk.
Pimpinella. Fructus ovato — oblongus. Petala in-
flexa. Stigm. subglobosum.

P. Saxifraga. Foliis pinnatis: Foliolis radicali-
bus subrotundis; summis linearibus.

Indigera. Perennis.

Off. Radix. Herba (a)

FORMA. Radix rec. cylindrica, subfusiformis, bi — vel tripolicaris vel ultra, undique alba, striis anularibus, approximatis rugosa, par-
tius fibrillosa; parenchymate subcarnoso, albo post
sectionem transversalem cetro medullari orbicu-
lato, radiato striato; obducto disco albo, poris
pertuso.

PROPRIETAS. Radicis rec. Odor fragrans,
subgraviusculus. Sapor amaricans primum, ma-
ticata radix subdulcescens, aromatica, calida,
fauces linguamque calefaciens.

COMPOSITA. Rad. Pulvis Stomachicus Birk-
manni.

Herb.

a) Saltem quoniam cum ceteris componat Aquam Vulne-
rariam cum acero.

Herb. Aqua Vulneraria cum acetō.

PIMPINELLA ANISUM. L.

Anisum Vulgare. Ph. Gemeiner Anets. Anyz.

P. Anisum. Foliis radicalibus trifidis incisis.

Hortense. Annum.

Off. Semen.

FORMA. Semina pedunculata, exquisite ovata bipartibilia, minutim villosa, striata, linea vix longiora.

PROPRIETAS. Odor aromaticus, suaveolens.

Sapor aromaticus dulcescens, calidiusculus, gratus.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum destillatum.

Spiritus.

COMPOSITA. Sem. Aqua Carminativa Communis, & Regia.

Elethuarium Pectorale. — Elect. seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Salutis.

Pulvis Vitæ.

Semina IV. Calida Majora.

Species Decocti Aperitivi. — Decociti Lignorum.

Spiritus Aromaticus. — Balsamicus vulgo Schauerianus. — Salis Ammoniaci Anisatus.

Trochisci Bechici nigri.

Ol. Balsamum Sulphuris Anisatum.

Pulvis Purgans.

Sp.

Spirit. Essentia Carminativa.

Pilulæ Anethinæ. — Balsamicæ Mertonii.

APIUM PETROSELINUM. L.

Petroselinum. Ph. Petersilie. Petrjel.

Apium. Fructus ovatus, striatus. Involuc. 1 — phyllum. Petala 2 qualia.

A. Petroselinum. Foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis.

Colitur. Bienn. *Bienn.*

Off. Radis. Semen.

FORMA. *Radix rec. fusiformis, alba, spathamæa, extus rugis annularibus approximatis, parenzymate albo, carnolo, post sectionem transversalem centro medullari orbiculato, radiato — striato, obducto disco obsolete striato — radiato corticali parte teneriore, albidiore. Semina linea longitudine, hinc plana, inde convexa, quinqueangulata.*

PROPRIETAS. *Rad. rec. Odor & Sapor leniter aromatici; siccata. fragilis, subfriabilis; masticata in ore emollitur, sapore dulci, levius aromatico. Semina aromatica, calida.*

COMPOSITA. *Rad. Radices V. aperientes.*

Sem. Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Pulvis Vitæ.

APIUM GRAVEOLENS. L.

Apium. Ph. Eppig, Zeller, Apich. Mieje.

A. Graveolens. Foliis caulinis cuneiformibus.

Colitur. Bienne.

Off. Radix. Semen.

FORMA. *Radix rec.* alba, fusiformis, subovata; ramosissima: ramis simplicibus; *parenchymate* carnosō albo, firmo, fragiliusculo, post sectionem transversalem marmorato. *Semina* parvula, hinc plano — concava, inde convexa, quinquangulata; angulis tribus intermediis majoribus.

PROPRIETAS. *Radix rec.* Odor aromaticus, intensior, subgraveolens; Sapor subdulcescens subaromaticus. *Siccata radix* fragilis, magis calida, magis graveolens: *masticata* duriuscula, tandem emollitur, sapore graviusculo. *Seminum.* odor gravis; Sapor ingratus americanus, calidus.

COMPOSITA. *Rad.* Radices V. aperientes.

Sem. Emplastrum de Meliloto.

Semina IV. Calida Minora.

O R D O T R I G Y N I A.

RHUS CORIARIA. L.

Sumach. Ph. Sumach, Gärberbaum. Su-
mach. *Rhus*

Rbus. Cal. 5 — partitus. *Petala* 5. *Bacca* 1 — sperma.

R. Coriaria. Foliis pinnatis obtusiusculae ferratis ovalibus subtus villosis,

Indigena, Arbor,

Off. Semen.

FORMA. *Semen* unicum lentiforme, subrotundum, compressum, glabrum; *capsulae* adnatum hilo.

PROPRIETAS. *Semina* secca dura.

SAMBUCUS EBULUS. L.

Ebulus. Ph. Attig. Chebdf.

Sambucus Cal. 5 — partitus. *Cor.* 5 — fida. *Bacca* 3 — sperma.

S. Ebulus. Cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo.

Indigenus, Perennis.

Off. Radix raro. Fructus recens. Semen.

FORMA. *Radix* rec. teretiuscula, repens subcarnosa, elongata, crassitie digitii vel ultra, alba.

Baccae orbiculatae, apice depresso, umbilico parvo 5 — fido, adpresso, undique glabrae nitidiusculae, nigricantes, magnitudine seminis Pisii minoris; per encymate succoso, purpureo, trispermo. *Semina* undique rugosa, ovata, subtrigona, dorso convexa, antice subcarinata.

PROPRIETAS. *Radix* sicc. Odor debilis; *Sapor* aromaticus, ingratus, nauseosus; *masticata* sub-

Subligneum sentitur. Baccar. rec. Odor nullus; Sap-
por acidulo — amaricans; masticatæ succolæ, sa-
liva purpurea. Succus baccarum recens, chartæ
albæ illinitus, illam colore pulchre violaceo in-
ficit.

PRÆPARATA. Fruct. rec. Roob.

COMPOSITA. Sem. Extractum Panchyma-
gogum.

Roob. Electuarium Purgans, sive Hy-
dragogum.

SAMBUCUS NIGRA. L.

Sambucus. Ph. Holder, Holunder, Flieder,
Holder. Bez.

S. Nigra. Cymis 5 — partitis, caule arboreo.

Indigenus, Frutex excelsior arborescens.

Off. Cortex interior. Flos. Fructus etiam
recens.

FORMA. Caulis rec. fruticoso — arborea, Ra-
mi cinerei, scabridi: punctis sparsis, elevatis:
Ramuli oppositi, teretes, geniculati, viridescentes
erecti, scabridi. Flores albi, sessiles & pedicellati
CAL. Perianth. superum, parvum, album, 5 —
dentatum: laciniis ovatis, obtusis. Tubus nullus.
Stam. Filam. 5, alba infra sinus corollæ adnata,
subulata, corollæ longitudine, patentissima. Anth.
luteæ, didymæ. PIST. Germen inferum turbina-
tum, glabrum, album; superum ovatum, glabrum
niveum, longitudine calycis. Styli nulli. Sti-

G

ma-

gmatæ 3. subrotunda, carnosa, alba. *Baccæ* magnitudine seminis Pisi minoris, ovales nigræ, nitidiusculæ, apice obtusæ, submucronatae, umbilicatae; umbilico convexo, stellato: radiis quinque obtusis; parenchymate succoso, trispermo.

POPRIETAS. *Corticis intermed.* rec. Color viridis, *Sapor* primum dulcescens, dein amaricans, acris, nauseosus. *Florum* rec. *Odor* fragrans, fœtidiusculus, subnauseosus.; *Sapor* amaricans, odo-ri congruens; *sicc.* flores consimiles, fere fortiores. *Baccar.* rec. *Odor* debilior; *Sapor* acidulus; *masticatæ* non ingratæ, succolæ, saliva purpurascente. *Succus* baccarum viridescenti — rubicundus, non tingens; sed pulpa mollis, tenuis, corticem baccæ latere interiore obliniens, charta alba fricatus, illam, pariter ac manus quibus tractatur, violaceo colore inficit pertinaci-ter inhærente.

PRÆPARATA. Acetum.

Aqua florum.

Roob.

COMPOSITA. *Flor.* Pulvis Fumalis Arthriticus,

Flor. rec. Unguentum Carminativum.

Fruct. Eleætuarium Lenitivum, sive

Tamarindorum. — Purgans, sive

Hydragogum.

TA-

TAMARIX GERMANICA. L. (a)

Tamariscus. Ph. Tamarisken. Tamarix.

Tamarix. Col. 5. — partitus. Pet. 5. Caps. 1 — locularis, 3 — valvis. Sem. papposa.

T. Germanica. Floribus decandris.

Indigena. Frutex.

Off. Cortex radicis.

FORMA. Cortex sicc. extus fusco — cinerascens, glabriusculus, semiconvolutus, latere inferiore fusco — rufescens, lineolis elevatis, abruptis, undique scaber, parum crassus.

PROPRIETAS. Sicc. Odor vix illus. Sapor leviter austerus; masticatus salivam rubro tingit.

COMPOSITA. Species Decocti aperitivi.

ORDO

PENTAGYNTIA.

LINUM USITATISSIMUM. L.

Linum. Ph. Lein. Lein.

Linum. Cal. 5 — phylles. Petala 5 Caps. 5 — valvis, 10 — locularis. Sem. solitaria.

L. Usitatissimum. Calycibus capsulisque mucronatis,

a) Juxta Bergium in Svecia officinalis est Tamarix Gallica.

natis, petolis crenatis, foliis lanceolatis, alternis, caule subsolitario.

Colitur. Annum.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovato — oblonga, compressa, apice sensim attenuata, obtusiuscula lèvia, nitida, linea paulo longiora, olivacea.

PROPRIETAS. *Odor* vix ullus; *Sapor* fatuus, *masticata* mucilaginosa.

PRÆPARATA. Mucilago? (a)

Oleum Pressum.

COMPOSITA. *Sem.* Emplastrum Malacticum
Species Emollientes.

Mucilag. Emplastrum Diachylon,
Unguentum de Althæa.

C L A S S I S VI. H E X A N D R I A O R D O M O N O G Y N I A.

A *Allium sativum.* L.
Allium. Ph. Knoblauch. Česnek

Allium

(a) Hujus in Pharmacopea usus.

Allium. Cor. 6 — partita, patens. *Spathe* multi-flora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera.

A. Sativum. Caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis.

Colitur. Perenne.

Off. Radix sive Bulbi recentes.

FORMA. *Bulbus* rec. subrotundus obvelatus tunica integra, quadrivalvis, sicca, chartacea, alba; conflatus ex bulbis plurimis, dupli vel triplici ordine fasciculorum: singulo fasciculo propria tunica obvelato. *Bulbili* circiter 5 vel 6 subæquales, paralelli, oblongi, incurvi, acuti, hinc plani, inde convexi, singuli propria tunica involuti, bivalvi: valvula exteriore chartacea; interiorie tenui. *Bulbili* in fasciculo supremo, membrana vaginiformi interstincta. *Perencyma* album, carnosum, spongiosum, subvariegatum, succo limpidissimo prægnans.

PROPRIETAS. Rec. *Bulb.* Odor fragrans, validus, graveolens. Sapor subdulcetens, acris; masticatus comminuitur, habitu oris fragrantissimo diu inhærente.

COMPOSITA. Acetum Antisepticum.

LILIUM CANDIDUM. L.

Lilium Album. Ph. Weisse Lilie. *Lilium blsé.*

Lilium. Cor. 6 — petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Caps.* valvulis pilo cancellato connexis.

L. Candidum. Foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris.

Hortensie, Perenne.

Off. Flores.

FORMA. Flores plures terminales, alterni, pedunculati, cernui. Bracteæ lineares, acutæ, carinatæ, in medio pedunculi solitariae. CALIX nullus. COR. nivea, campanulata — turbinata, trigona, hexapetala: petalis lanceolatis, obtusis, erectis apicibus revoluto — patentibus, inferne attenuatis; tribus alternis paulo angustioribus, margine utrinque erecto concaviusculis; tribus aliis alternis planis, paulo majoribus, extus carinatis, juxta carinam utrinque longitudinaliter fulcata, intus longitudinaliter canaliculata. STAM. Fil. 6, subulata, alba, erecta, corolla breviora Anth. subcylindricæ, incurvantes, luteæ. PIST. Germen cylindrico — trigonum, obtusum, glabrum, viride, sexulatum. Stylus cylindricus, albo — viridescens, apice incarnatus, trigonus, longitudine corollæ. Stygma clavatum, trigonum, obtusum, tomentosum.

PROPRIETAS. Florum rec. Odor fragrans, validus, temulentus. Sapor subdulcescens, glutinosus; petala rec. masticata, tenera, lubrica. Sicc. flores inodori.

PRÆPARATA. Oleum Coctum.

COMPOSITA. O/. Emplastrum ad Fonticulos.

SCILLA MARINA. L.

quilla, Ph. Meerzwiebel. Moesia cybule.

Scilla. Cor. 6 — petala, patens, decidua. *Filamenta filiformia.*

S. Marina. Nudiflora, bracteis refractis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Bulbus rec. magnitudine pugni vel ultra, conicus, extus vestitus tunicis membranaceis, aridis, adpressis, nervosis: nervis parallelis; quarum exteriōres, tenuiores, interiores basi succulentæ. Parencrema albido — lutescens, tunicatum, constans tunicis carnosis, inæqualibus; transversaliter sectum succo viscoso plenum, centro medullari subrotundo, laxo. Siccata radix in officinis occurrit e separatis tunicis, siccatis, oblongis, subdiaphanis, nerosis, fragilibus.*

PROPRIETAS. *Rec. Odor vix ullus. Sapor intensius amarus, acris, nauseosus, diu inhærens. Sicc. pariter amarus, minus acris. Ergo siccatione manet amarities, perditur acredo.*

PRÆPARATA. Acetum.

Oxymel.

COMPOSITA. Electuarium, seu Theriace Andromachi.

ASPARAGUS OFFICINALIS. L.

Asparagus. Ph. Spargel. Gromowé korenj.

Asparagus. Cor. 6 — partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Baccæ 3 — locularis, 2 — sperma.

A.

A. Officinalis. Caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus.
Hortensis. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix* rec. junior fibrosa: fibris plurimis cylindricis, simplicibus, crassitie pennæ anterinæ, cinerascentibus, fibrillosis, ex uno capite aggregatis, horizontali — descendenteribus, longius exporrectis. *Parencyma* carnosum, subsucculentum, album, vestitum corticali parte; transversaliter sectum æquale, puncto centrali parvo.

PROPRIETAS. *Rad. rec.* Odor graviusculus, non ingratus. Sapor primum dulcescens, tum amaricans, subgraviusculus; masticata pulposa sentitur.

COMPOSITA. Radices V. aperientes.

Species Decocti Althææ Fernelii.

CONVALLARIA MAJALIS. L.

Lilium Convalium, Ph. Mayenblümel, Zauchen, Galtrian. Bonwalium.

Convallaria. Cor. — fida. Bucca maculosa, 3 — locularis.

C. Majalis. Scapo nudo.

Indigena. Perennis.

Off. Flores.

FORMA. Flores albi, nutantes. CAL. nullus. COR. campanulata, alba, magnitudine seminis Pisii,

Pisi, 6 — fida : laciniis ovatis, acutiusculis, revolutis. STAM. Filam. 6, brevia, alba, basi latiora, tubo corollæ basi adnata. Ant. tetragono — pyramidales, acutæ, in stylum convergentes, erectæ latere utrinque longitudinaliter hiantes; pistillo duplo breviores. Glandulæ germinæ obsoletæ, lineares, subviolaceæ, basi filamentorum singulorum, ubi corollæ adnatæ sunt. PIST. corolla brevius. Germen superum ovatum, albido — lutescens, desinens in stylum crassum, cylindrycum, album, subtrigonum. Stigma trigonum, obtusum, minutim villosum, album.

PROPRIETAS. Rec. Odor svaveolens, gratus ; siccatur. subnauseosus. Sapor rec. intensius amarus, acriusculus, inhærens ; sicc. minus amarus.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius Variegatus.

— Sternutatorius Viridis.

ALOE PERFOLIATA. L.

Aloe. Ph. Aloe. Aloë.

Aloe. Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero.

Filamenta receptaculo inserta.

A. Perfoliata. Floribus pedunculatis carymbosis carinis subcylindricis.

Exotica. Perennis.

Off. Succus inspissatus. Aloe Succotrina.

(a)

FOR-

-) Prostat quidem apud Mercatores Aloe Succotrina, Hepatica, & Cabalina; in usus autem medicos juxta Pharmacopeam nostram præter Succotrinam nulla habenda.

FORMA. *Succus concretus gummoso — resinofus, in frustis solidis, compactis, ponderosis, fragilibus, Succotrina aloe purissima est, fusco — rubicunda vix subdiaphana, undique nitida, maculis & venis aureis immixtis, fragmentis planis hinc convexis, inde concavis.*

PROPRIETAS. *Succotrinæ Odor graveolenti nauseosus, in crocum incidens, inhærens, mitior tamen hepaticæ. Sapor amarissimus, fere bilis animalis, diu inhærens.*

PRÆPARATA. Extractum Aloes aquosum, sive Aloe lota.

Tinctura.

COMPOSITA. *Suce. Extractum Catholicum hoc pro Pilulis Mercurialibus. — Panchymagum.*

Oleum Colocynthidis Compositum.
Pilulae Anethinæ. — Rufi. — de Succino Crocaris.

Pulvis Specierum Hieræ Picræ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Suppositoria Composita.

Tinctura, sive Balsamum Comentatoris.

Unguentum de Arthanita, sive contra Vermes.

Extract. Pilulae Balsamicæ Stahlii,

Tin-

Tinctur. Elixirium Proprietatis Dulce.

ACORUS CALAMUS EUROPEUS. L.

Acorus Vulgaris. *Calamus Aromaticus.* Ph.

Kalmes, Kalmus, Prustworec, prsn̄skōen.

Acorus. Spadix cylindricus, tectus flosculis.

Cor. 6 — petalæ, nudæ. Stylus o. Caps. 3 — locularis.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec. cylindrica, compressa uscala, ramosa, crassitie digitii vel ultra, geniculis vestitis squama fusca, filamentosa; repens: fibris numerosis, filiformibus, albis, descendentibus, e latere inferiore exeuntibus, fibrilis capillaribus instructis. Parenyma carnosum, album, post transversalem sectionem porulis minimis undique pertusum; centro medullari ovali, pariter porulofo, adsperso punctis ferrugineis. Siccata radix in taleolas longitudinales sicca occurrit, undique alba, extus punctis elevatis scabra, parenymate subfarinoso, fragili, solido, transversaliter secto porulis pertuso innumeris.*

PROPRIETAS. *Rec. & Siccata. Odor fragrans, fortior, nauseosus, Sapor aromaticus nauseosus, acris, leniter amaricans. Masticata fauces & linguam stimulat, & calefacit. Recens radix magis acris.*

PRA.

PRÆPARATA. Radix condita (a)

COMPOSITA. Acetum Antisepticum.

Elestuarium, seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Vitrioli.

Essentia Absinthii composita. — Caminativa.

Pulvis Stomachicus Birckmanni.

PETOCARPUS DRACO. L. (b)

Draconis Sanguis. Ph. Drachenblut. Drakowętrew.

Calamus. Cal. 6. — phyllus. Cor. o. Baccæ exarida, i — sperma, retrorsum imbricata.

Exotico — Arborescens. Frutex. Berg. Arbor. Pb. Svec.

Off. Resina. (c)

FORMA. *Resina* in frustulis solidis, ovatis, magnitudine fructus Pruni; singulis obvelatis foliis arundinaceis, unde longitudinaliter undique striata est, nigro — rubicunda, opaca, dura, non splendens, subfragilis, difficilis triabilis: fracturis subgranulatis, vix nitidiusculis.

PROPRIETAS. Odor nullus. Sapor nullus Masti.

ca-

a) Uti olim, sic adhuc, hodie in usu est.

b) Juxta Bergium Calamus Rotang. L.

c) Prostas quidem apud Mercatores Sanguis Draconis in lachrimis & in tubulis, cum vero Pharmacopea nostra non distinguat, præstas adhibere eundem in lachrimis sic dictum, tanquam præstantiorem.

cata hæret resina in ore non emollitur, nec solvitur, sed limpidea sentitur, inter dentes friabilis, arenacea, comminuitur absque sapore, saliva rubra. Grossius pulverata abit in pulverem nigrantem, sed si terratur, fit pulvis ruber. Inter digitos comminuta, illos colore pulchre sanguineo inficit.

COMPOSITA. Emplastrum ad Rupturas.

⊕ **BERBERIS VULGARIS.** L.

Berberis. Ph. Saurach, Weinschädlung. Drac, dīstal.

Berberis. Cal. 6 — phyllus. Pet. 6. ad ungues glandulis 2. Stylus o. Baccæ 2 — sperma.

B. *Vulgaris.* Pedunculis racemosis.

Indigena. Frutex.

Off. Fructus recens.

FORMA. Baccæ ovali — oblongæ, utrinque obtuse, lineas 3 vel 4 longæ, sanguineæ, leviusculæ, nitidiusculæ, apice umbilicatae: umbilico parviusculo, fuscescente, subrotundo, convexo, centro cavo. Parencrema carnosæ — succosum, sanguineum, tenuem, centro cavo, amplio, uniloculari, dispermo. Semina inclusa in communia rillo, membranaceo, sicco, laxo, rubro — fusca, ovali — oblonga, undique minutim rugosa, hinc convexa, inde plana, saepe teretia, inferne sensim attenuata, apice obtusa, subnitidiuscula, & circiter lineas longa.

PROPRIETAS. Baccar. rec. Odor nullus. Sa-
por intensius acidulus; masticatæ grossius com-

minuuntur, & insimul exsugitur succus acidus,
saliva rubicundo tincta. Semin. Sapor subamari-
cans, graviusculus, substypticus.

PRÆPARATA. Rotula.

Syrupus.

LORANTHUS EUROPEUS. L. (a)

*Viscum Quercinum. Ph. Fichenmistel. Dubowē
melij*

*Loranthus. Germen inferum. Cal. o. Cor. 6 —
fida, revoluta. Stam. ad apices petalorum.
Bacca 1 — sperma.*

*L. Europeus. Racemis simplicibus terminalibus,
flor. dioicis.*

Indigenus Fruticulus.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum truncī diametro interdum
unciam supernantis, basis loco radicis est, subal-
bidum, fragile, cortice fulso, æquali, crasso,
tuberculis a foliis delapsis magis minusve notatum.*

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor leviter ad-
stringens, & aquam maceratione inficiens colo-
re rubiginoso.*

COMPOSITA. Pulvis Marchionis.

*) Bergio & Ph. Svec, *Viscum album. L.*

O R D O
T R I G Y N I A.

RUMEX ACUTUS. L.

Lapatum acutum. Ph. Grindwurzel. Bonstę
ſtowſk.

*Rumex. Cal. 3 — phyllus. Petala 3, conniven-
tia. Sem. 1. triguertum.*

*R. Acutus. Floribus hermaphroditis : valvulis
dentatis graniferis, foliis cordato — oblongis
acuminatis.*

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec. dodrantalis, cylindrica,
crassitie digitii, flavescens ; Siccata extus brunnea,
parencymate pallide flavescente, striis gummosis.*

PROPRIETAS. *Odor nullus. Sapor radicis ama-
ricans, subausterus ; masticata radix comminui-
tur, saliva crocea.*

RUMEX ACETOSA. L.

Acetosa vulgaris. Ph. Gemeiner Sauerampf.

Sztowſk.

*R. Acetosa. Floribus dioicis, foliis oblongis fa-
gittatis.*

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix. Herba. Semen.

FORMA. *Radix rec. ramosa, fibrosa; ramis & fibris cylindricis, luteis, glabris descendantibus parenzymate subcarnoso, albo, post sectionem transversalem minutim striato — radiato, annullo medulari ampio. Caules plures ex una radice bipedales, erecti, teretes, striato — angulati, glabri, geniculati. Folia alterna, subcarnosa, lanceolata, acuta, sagittata, palmaria, saepe spithamea, pro diverso solo, utrinque glabra, margine undulata; auriculis postice dentatis; inferiora folia petiolata; superiora sessilia, suprema linearia. Semina verticillata, pendula, triquetra, spadicea, nitida, glabra, obvelata valvulis tribus orbiculatis, planis, rugosis, margine levibus, incarnatis, pericarpium triquetrum efformantibus, basi fulcitum squamis calycinis 3 reflexis.*

PROPRIETAS. *Radix rec. Odor nullus; Sapor debilis, vix amaricans; foliorum Odor nullus. Sapor intensius acidus, gratus; masticata folia tenera, saliva viridescente; siccata folia sapore herbaceo vix acidulo.*

COMPOSITA. *Rad. Electuarium Diascordii.*

Species Decoeti Antifebriles.

† COLCHICUM AUTUMNALE. L.

Colchicum. Ph. Zeitlose. Ocun, planý ſafrán. *Colchicam. Spatha. Cor. 6 — partita: tubo radiato. Capsulæ 3. conexæ, inflatae.*

C. Autumnale. Foliis planis lanceolatis erectis. Indigenum. Perenne. **Off.**

Off. Radix recens, succulenta non marcida.

FORMA. *Bulbus rec.* oblique subrotundus, antice gibbus, vix conicus, magnitudine Pomi minoris, vestitus tunica coriacea, extus brunea, nervosa: nervis parallelis; obvelatus membra na tenuiore lutescente; dorso profunde canaliculatus s. longitudinaliter excavatus; latere anēctens bulbum parvulum, futuro anno — florentem, ipsi bulbo intrusum. *Parencyma* solidum album; transversaliter sectum æquale, carnosum subsucculentum, præcipue tempore autumnali, postquam bulbus annotinus evanuit; hinc si tempore vernali bulbi colchici effodiantur, & colligantur, annotini non sumendi.

PROPRIETAS. *Rec.* tempore æstivali. *Odor hircinus*; sed recenter reflectæ radicis odor simul irritans, nares faucesque feriens. *Sapor acris*; *masticatus* bulbus acris, linguam faucesque fortius rodens, rigidas faciens, diu inhærens; tempore vero autumnali sapor longe debilior, subfarinosus. *Bulbus resectus* non lactescit, sed scatet succo albido ex amylo imixto, in cultro se deponente.

PROPRIETAS. Acetum.

Oximel.

H

CLAS.

C L A S S I S VIII.

OCTANDRIA.
ORDO
MONOGYNIA.

AMYRIS ELEMIFERA. L.
 Elemi. Ph. Elemiharz. Elemi.
Amyris. Cal. 4 — dentatus. *Petala 4*, oblonga.
Stigma tetragonum. Baccæ drupacea.
A. Elemifera. Foliis ternatis quinato — pinna-
 tisque subtus tomentosis.

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. *Resina* in massa solida, subponde-
 rosa, discolor; variegata, e cinereo — viride-
 scente & granis albicantibus vel luteis marmorea,
 immixtis glandulis quartziformibus, subdiapha-
 nis, albo viridescentibus, maculisque fuscis; con-
 sistentia ceræ, frigore dura, subfriabilis, cultro
 sectilis; secamentis albis.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, ad Galbanum
 accedens. *Sapor* gravis, amaricans; *masticata*
 plastica, emollitur, dentibus non adhæret, & non
 solvitur in ore. Inter digitos agitata, emollitur,
 plastica evadit, & tenax illisque adhæret.

Com-

COMPOSITA. Spiritus Balsamicus vulgo
Schauerianus.

Unguentum sive Balsamum Arcæi.—
de Styrace.

AMYRIS OPOBALSAMUM. L. (a)

Balsamum de Mecha. Opobalsamum. Ph. Opo-
balsam. **Opobalsam.**

A. Opobalsamum. Foliis pinnatis sessilibus.

Exoticum. Arbor.

Off. Balsamum.

FORMA. Resina liquida, consistentia syrapi,
vel tenacior, pro diversa ætate, limpida, lutes-
cens; ætate spissa, tenax fit, vix fluida.

PROPRIETAS. Odor Menthæ gentilis. Variat
odor pro diversa bonitate; vidit Cl. Bergius
Balsamum Meccæ odore terebinthinato, etiam
odore in Macin incidente. Sapor aromaticus,
amaricans, calidiusculus, acriusculus, odori con-
gruens. Tactu pinguiusculum sentitur balsa-
mum.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca An-
dromachi.

Tinctuta Balsamica.

SANTALUM CITRINUM. L. (b)

Santalum Citrinum. Ph. Geldes Sandeholz.

Žlutý Santal neb žluté santalowé dřevo.

h 2 San-

*) Juxta Pharmacopeæ Svecicæ editionem alteram Amy-
ris Gileadensis. L.

*) Bergio Santalum album. L.

Santalum. *Cor.* 4 — petala : petalis calyci innatis, præter glandulas 4. *Cal.* 4 — dentatus.
Bacca infera monosperma.

Exoticum. Arbor.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* durum, ponderosum, longitudinaliter fissile, nitidiusculum, ferrugineo — citrinum vel pallidum.

PROPRIETAS, *Odor* fragrans, urinosus, subambrosiacus, perrinaciter inhærens. *Sapor* leniter aromaticus, vix amaricans.

COMPOSITA. Essentia Lignorum.

Electuarium sive Confectio Kermesina vulgo Alkermes.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Specierum Confectionis Hyacinthinæ.

VACCINIUM MYRTILLUS. L.

Myrtillus. Ph. Heidelbeere. Myrtus, gahody cerné, wranj oka.

Vaccinium. *Cal.* superus. *Cor.* 1 — petala. Filamenta receptaculo inserta. *Bacca* 4 — locularis polysperma.

V. Myrtillus. Pedunculis unifloris, foliis feratis ovatis deciduis, caule angulato.

Indigenus. Sufruticosus.

Off. Fructus recens pro succo.

FORMA. *Baccae* rec. globosæ, nigro — purpleæ, nitideæ, magnitudine seminis Pisii, apice

umbilicatae: umbilico duplo, depresso; exteriore cincto margine parvo, integerrimo, erecto; interiore in centro exterioris, convexiusculo, margine crenulato, centro concavo, undique cincto margine minuto, adpresso, minutim crenulato. *Parencyma* carnosum — succulentum, polyspermum. *Semina* plurima, rufescentia, compresa, linearis — reniformia, dorso convexa, antice acutiuscula, minutissime rugosa.

PROPRIETAS. Rec. Odor nullus. Sapor acidulus. Masticatæ baccæ succosæ, saliva saturate purpurea; lingua labiisque colore cœruleo — purpureo, inhærente, tinctis.

PRÆPARATA. Syrupus.

DAPHNE MEZEREUM. L.

Mezereum. Timelæa. Laureola. Ph. Zeidelbast.

Polysty wlej pepř menſſi.

Daphne. Cal. o. Cor. 4 — fida, corollacea, marcescens, stamina includens. *Bacca* 1 — sperma.

D. Mezereum. Floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.

Exoticum. Frutex.

Off. Cortex. (a)

FORMA. *Cortex* sicc. albidus, sectus in segmenta longitudinalia, tenacissimus, sericeus, quasi e fibrillis tenuissimis contextus, tectus epidermidie olivacea, lavi.

h 3

PRO-

(a) Hujus semina sub nomine coccungnidii olim officinalis.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. Masticatus indisolubilis, sapore vix ullo, sed si diutius in ore retineatur, valde acris sentitur, faucesque exan-defacit, effectu diu inhærente, etiamsi fauces cum aqua frigida bene elutæ fuerint.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA ORDO MONOGYNIA.

LAURUS CINNAMOMUM. L.
Cinnamomum. Ph. Zimmet. Skofice.
Laurus. Cal. o. Cor. calycina, 6 — partita. Nectarium glandulis tribus, bisectis, germen cingentibus. Filamenta interiora glandulifera Drupa 1 — sperma.

L. *Cinnamomum. Foliis trinerviis ovato — oblongis, nervis versus apicem evanescentibus.*

Exoticum. Arbor.

Off. Cortex. (a)

FOR-

(a) Est cortex interior inter lignum & crustam seu pelliculam cinereum tenuem sebarum. Geoffroy. T. II. pag. 166. Cum Cinnamomum quod nobis venale habetur, saepe fit valde iners, hinc frequenter substituuntur in parandis Pra-

FORMA. *Cortex sicc.* intermedius, tenuis,
quarra parte lineæ vix crassior, pallide rubro —
bruneus, glabriusculus, in segmentis spithameis
vel pedalibus, in cylindrum convolutis, fragi-
liusculus: *parenzymate* paullo pallidiore: fractu-
ra fibrosa scabra.

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor fragrans, aroma-
ticus, svavissimus. *Sapor* dulcescens, aromati-
cus, gratus, dein acris, *calidiusculus*.

PRÆPARATA. Aqua simplex & vinosa:

Essentia.

Oleum destillatum.

Syrupus.

COMPOSITA. *Cort.* Acetum Antisepticum.

Aqua seu Balsamum Embrionis. — Me-
lissæ composita.

Electuarium Diascordii. — Elect. seu
Theriaca Andromachi.

Elixirium Vitrioli compositum.

Essentia Absinthii composita.

Pilulæ de Cynoglosso.

Pulvis Specierum Aromaticarum pro
Morsulis Imperatoris. — Spec. pro

Cucupha.

Aqu.

paratis semina sic dicta Cassiae, quæ nihil aliud sunt,
quam flos Cinnamomi inapertus, imaturus, uti caryophilli
aromatici juxta Dissertationes Physico Chymico Medicas
Cartheüseri citatas in Bibliotheca Medico — practica Mur-
ray T. II. pag. 92.

Aq. simpl. Aqua Perlarum.

Emulſio Laxativa.

Syrupus Kermesinus.

Tinctura Martis Tartarisata.

Aq. vinos. Essentia Anodina.

Syrupus Cinnamomi.

Ol. Balsamum Apoplecticum.

Electuarium seu Conſectio Kermesina.

Essentia ſive Balsamum Vitæ Hoffmanni.

Liquor ſeu Sal volatilis oleofus.

LAURUS CASSIA. L.

Cassia Ligneæ. Ph. Mutterzimmet. Bassye, wonné koenj.

L. Cassia. Foliis triplinerviis lanceolatis.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex* intermedius crassus, linea crassior, glabriusculus, ſectus in segmenta spithamea vel pedalia, in cylindrum convoluta, rubro — brunneus, rigidus, fragilis : fractura plana; parencymate ſolido, fuligineo.

PROPRIETAS. *Odor* cinnamomeus, debilis. *Sapor* gratus, dulcescens, cinnamomeus, debilior, vix acris.

LAURUS CAMPHORA. L.

Camphora. Ph. Kampfer. Kaffer.

L. Camphora. Foliis triplinerviis lanceolato — ovatis. Exo.

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. *Resina* purificata in placentis hæmispericis, hinc concavis, inde convexis, albissima, homogena, subdiaphana, lœvis, subflexibilis, fragiliuscula.

PROPRIETAS. *Odor* fragrantissimus, penetrans, ad Rosmarinum accedens. *Sapor* calidissimus Menthae piperitidis, americans. *Masticata* indissolubilis, fauces linguamque calefaciens. Purificata Camphora omnino volatilis est, inflammabilis.

PRÆPARATA, Spiritus Vini Camphoratus.
Oleum Camphoræ? (a)

COMPOSITA. Acetum Antisepticum.

Emplastrum Defensivum rubrum.—

Diabotanon. — Noricum. — Sapori-
natum. — Vesicatorium.

Globuli ad Erysipelas.

Pulvis Fumalis Arthriticus.

Spiritus Theriacalis Camphoratus.

Unguentum album Camphoratum.

— de Liquiritia. — Nihili sive de
Tutia.

LAURUS NOBILIS. L.

Laurus. Ph. Lorbeerbaum. Bob.

L. No-

(a) Quod cum acido Nitri paratum, chirurgis in usu est
tanquam summum escharoticum.

L. Nobilis. Foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis, dioicis.

Hortensis. Arbor.

Off. Folia. Fructus.

FORMA. *Folia rec.* petiolata, sempervirentia, ovato — lanceolata, acuta, integerrima, palmaria, glabra, sublucidiuscula, sed utraque pagina venulis minimis undique reticulata, pallide viridia, nervis suboppositis, obliquis. *Baccæ* ovales, utrinque obtuse, nigricanti — fuscæ, anastomosi venularum, undique reticulato — rugosæ, lucidiusculæ, magnitudine vix fructus *Cerasi minoris*, uniloculares, continentes *Nucleum* majusculum figura baccæ bipartibilem; *recentens* cotyledoneum, *siccatum* vero solidiusculum.

PROPRIETAS. *Folior.* *Sapor amaricens*, balsamicus, graviusculus; *recentium* fortior, subamaricens. *Odor* foliorum fricatorum fragrans, *recent.* fortior. *Baccarum nucl.* *Sapor amarus* balsamicus, pinguiusculus, calidiusculus, odore congruente; *masticatæ* in ore sensim solubiles. *Corticalis* pars baccæ etiam aromaticæ.

PREPARATA. Oleum pressum.

COMPOSITA. *Bacc.* Electuarium seu Theria-
ca Diateffaron.

Emplastrum Diabotanon. — de Meli-
loto.

Essentia Carminativa.

Spi-

Spiritus Balsamicus, vulgo Schauerianus.

Ol. Unguentum. Carminativum. — Nervinum. — ad Phthiriasim seu contra pediculos. — ad Scabiem.

LAURUS SASSAFRAS. L.

Sassafras. Ph. Sassafrasholz. Sassafrasowé diewo.

L. Sassafras. Foliis integris trilobisque.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex. Lignum. (a)

FORMA. *Lignum* leve, mollius, cinereo-ferrugineum, extus colore magis saturato, fragile. *Cortex ligni* crassiusculus, ferrugineus, mollis, friabilis, levis, extus cinereo — fuscus, rugosus. *Cortex radicis* tenuiusculus, fragilis rubicundus.

PROPRIETAS. *Ligni.* Odor fragrans, fortior, non ingratus, ad Fœniculum accedens sed gravior. *Sapor* aromaticus. *Corticis* utriusque odor saporque ligno consimiles, sed fragrantiores.

PRÆPARATA. Oleum destillatum.

COMPOSITA. Lig. Elixirium Salutis.

Essentia Lignorum.

Species Decocti Lignorum.

RHEUM RHAPONTICUM. L.

Rhaponticum. Ph. Rapontike. Reupontykum, zeměšluč wetssj. *Rheum*

a) An Radicis?

Rheum. Cal. o. Cor. 6. — fida, persistens. *Seneca*
1, triquetrum.

R. Rhabonticum. Foliis glabris, petiolis subsulcatis.

Exoticum? Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix oblonga, crassa, ramosa, extus brunnea, intus lutescens, transversaliter secta parenymate variegato.*

PROPRIETAS. *Radicis sicc. Odor debilior, fere Rhei; Sapor amaricans, stypticus, subrhabarbarinus; masticata linguam & fauces tingit colore rubro — croceo, tanquam Rheum verum.*

RHEUM PALMATUM. L.

Rhabarbarum. Ph. Rabarbare. Rabarbara.

R. Palmatum. Foliis palmatis acuminatis.

Exoticum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix sicc. ab exteris advehitur in frustis palmaribus, læviusculis subrotundis, saepe foramine majusculo pertusis, decorticatis; parenymate fragiliusculo, subriibili, molliusculo, ex albo & luteo — viridescente variegato.*

PROPRIETAS. *Sicc. Odor fragrans, gravis, subnauseosus. Sapor amaricans, odori congruens. Siccata radix in ore detenta emollitur, masticata sensim solvit, atque inter dentes, masticatione repetita, arenulofum quid mentitur;*

cete-

ceterum linguam, totum os, fauces & salivam
croceo colore tingit.

PRÆPARATA. Extractum.

Tinctura Rhabarbari Aquosa ex Tem-
pore paranda. Radix tosta? (a)
Com.

(a) Cum sepe adhuc prescribatur.

Rheum palmatum producit Rhabarbarum, in officinis Sibi-
ricum appellatum; certe e seminibus, a Bucharis e mon-
tosis Tibeti in Russiam apportatis, & postea satis, hocce
Rheum palmatum enatum est; PALLAS (Reise durch ver-
schiedene Provinzen des Rus. Reichs, f. 3 p. 157) Rha-
barbarum vero Chinense ex alia specie Rhei desumptum
esse videtur. Ex observatione CL. JOH. GOTTL. GE-
ORGI. (Bemerkungen einer Reise im Rus. Reich. T. I.
p. 211. 212.) annesior radix Rhei undulati simillima
evadit Rhabarbaro Chinensi, facie, colore, fragrantia, &
vi purgante. Et vero credit Cel. PALLAS (l.c. p. 156)
hocce Rheum undulatum, quod in montosis Sibiricis frigidis
ac humidis ut plurimum laborat radicibus corruptis, in mon-
tibus regni Tibet siccioribus, apricis, magisque australibus,
felicius provenire, radicesque genere excellentiores, que
forte Rhabarbarum Chinense eximium efficiunt. Plures
varietates Rhabarbari Chinensis observavi, scilicet pon-
derosiorum, leviorem, pallidiorem rubescensem, immo om-
nino fuscescentem. Generatim omne Rhabarbarum Chi-
nense occurrit in fructis oblongis seu subrotundis, hinc
planis, inde convexiusculis, palmaribus vel supra, sat
ponderosis; parenchymate solido, minus friabili, e rubicun-
do luteo & albo variegato; quod, recenter pulveratum,
abit in pulverem, mox croceum, sed post fermentum rubescen-
tem, dum servatur. Masticatum solvit in ore, si bonum
quemadmodum etiam Sibicum; deterior autem varietas

sub

COMPOSITA. *Rad.* Electuarium seu Theria-
ca Andromachi,

Elixirium Salutis.

Extractum Amaricans; hoc pro Tin-
ctura Amaricante. — Panchyma-
gogum.

Infusum sive Sanguis Cichorei cum
Rhabarbaro.

Pulvis contra Vermes. — Vitæ.

Species Decocti Aperitivi cum Rheo.
Syrupus Cichorei cum Rheo.

Extract. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

CLAS.

sub masticatione tenax & indissolubilis deprehenditur.
Sibiricum Rhabarbarum magis spongiosum, friabile, leve,
pallidum s. albescenti — luteoens; *Chinense* vero magis so-
lidum, ponderosum, durum, & saturatius tinctum. Hyc-
omes nostras bene perserit hæc planta, frigoris patiens;
semina etiam heic maturat. Sed requiruntur 10 aut 12
anni ad incrementum & maturationem radicis PALLAS
l. c. p. 157. Sub autumno effodi possunt radices, tunc
enim fragrantes sunt. Sed siccatio radicis apud nos dis-
ficillima, quod putredini valde obnoxia est radix recens.
Bergius M. Med.

C L A S S I S X.

DECANDRIA ORDO MONOGYNIA.

HYMENÆA COURBARIL. L.

Anime. Ph. Animeharz. Anyme.

Hymenea. Cal. 5 — partitus. Pet. 5, subæqualia.

*Stylus intortus. Legumen repletum pulpa fa-
rinacea.*

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. *Resina* in frustis subrotundis, inæ-
qualibus magnitudine nucis Avellanæ vel ultra
pallide lutescens, superficie undique subfarina-
cea, intus diaphana succini instar, nitida, splen-
dens, fragilis: fracturis planiusculis; friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, balsamicus, in
baccas juniperi incidens. *Sapor* debilius resino-
sus. *Resina masticata* primum friabilis inter den-
tes, dein emollitur & coit in massam duriuscu-
lam, ceræformem, flexilem, opacam, pallidam;
ore exempta in ære libero mox indurescit.

CAS.

CASSIA FISTULA. L.

Cassia Fistula. Ph. Mohrfassie. *Bassya fistula.*

Cassia. Cal. 5. — phyllus. Petala 5. Antheræ superne 3 steriles, infimæ 3 rostratæ. Legumen.

C. Fistula. Foliis quinqueiugis ovatis acuminatis glabris petiolatis eglandulatis.

Exotica. Arbor.

Off. Legumen lignosum univalve?

FORMA. *Legumen* sicc. cylindricum, cubitale, crassitie policis, subfalcatum, obtusum cum tubere subrotundo, obductum cortice sublignoso, fragili tectum epidermide fusco — nigricante, leviusculo, minutim & interrupte transversaliter striato, sutura longitudinali latere altero, altero vero obsoleta; multiloculare: dissepimentis transversalibus, pluribus parallelis, tenuibus, rigidis, papyraceis, sutura centrali, longitudinali; singulo-dissepimento utrinque obducto *pulpa* melliginea, nigricante, nitidiuscula, strato teniore. *Semina* magnitudine seminis Phaseoli, ovata, obtusa, utrinque compressa, sutura in medio longitudinali, semiunguicularia, ferruginea, nitidiuscula, in singulo loculamento solitaria.

PROPRIETAS. *Pulpa.* Odor nullus; Sapor dulcis, leniter acidulatus, vix nauseofus.

PRÆPARATA. *Pulpa.*

CAS-

CASSIA SENNA. L.

Senna. Ph. Sennesblätter. Sena, neb senowé
lſtſ.

C. Senna. Foliis ſeiugis ſubovatis, petiolis eglan-
dulatis.

Exotica. Annua. (a)

Off. Folia. Legumina. (Foliculi vulgo.)

FORMA. Sicc. Foliola (folii pinnati) ovali
lanceolata, acuta, integerrima, ſemipollicaria,
ſæpe pollicaria, pallida, ſupra minutim pubef-
centia, subtus glabriuſcula, costa pubefcente,
venulosa, nervis alternis. Foliculi: Legumina
bivalvia, pollicaria, falcata, utrinque plana, linea
laterali utrinque longitudinali interrupta, fulvo
— cinerea, venulosa, ſemina ſecundum lineam
lateralem anectentia. Semina 6 vel 7, turbinato
cordata, acuta, cinerea.

PROPRIETAS. Odor subaromaticus. Sapor
amaricans, naufeofus; mafticata ſubglutinosa
fentitur.

COMPOSITA. Electuarium Lenitivum ſive
Tamarindorum.

Elixirium Salutis.

Extractum Panchymagogum,

Hydromel Infantum.

I

In-

a) In Hispania jaffu Regio Sennæ quædam species in ma-
gna copia colitur, & proba invenitur Gazette ſlitaire
Année 1777. citato in Bibliotheca Medicina — Chirurgi-
ca Tode Tom. VII. pag. 374.

Infusum sive Aqua Laxativa.

Pulvis Vitæ.

Species Deco&ti Aperitivi.

Syrupus Mannantus cum Senna. — Rosatus Solutivus cum Senna.

GUAJACUM OFFICINALE. L.

Sanctum Lignum. Ph. Franzosenholz. Fran-
cowé d'ewo.

Guojacum. Cal. 5 — fidus, inæqualis, petala 5, ca-
lici inserta. Caps. angulata, 3 l. 5 — locularia.

G. Officinale. Foliis bijugis obtusis.

Exoticum. Arbor.

Off. Cortex. Lignum. Resina.

FORMA. *Cortex* durus, ligneus, rigidus, cras-
sus, in frustis planis, latere exteriore læviuscu-
lus, olivaceus; interiore pallidus, longitudina-
liter substriatus, fragilis: fractura sublamellata.

Cortex, solis luci expositus, latere interiore &
in fractura undique micat atomis albis. *Lignum*
solidum, ponderosum, in aqua subsidens, commu-
niter ex truncis vel ramis grandioribus desum-
ptum, durissimum, parte medullari fusco — vi-
ridescente, alburno pallide lutescente. *Resina*
Guajaci bonæ notæ debet esse ponderosa, friabi-
lis, rubro — brunnea, subpellucida.

PROPRIETAS. *Corticis:* Odor debilius resi-
nosus; Sapor amaricans, debiliter resinosus; ma-
ficatus inter dentes friabilis. *Ligni:* Scobs ligni
odo-

odore debili resinoso; *masticata* sapore leniter amaricante, tum acrisculo. *Resinæ: Oder gratus, cephalicus.*

PRÆPARATA. Essentia.

COMPOSITA. *Lign.* Essentia Lignorum.

Resin. Ceratum pro Cereolis digestivis fortius.

DICTAMNUS ALBUS. L.

Dictamnus Albus. Ph. Weißer Diptam. *Dyp-*
tam, trewdawæ blá.

Dictamnus. Cal. 5 — phyllus. *Petala* 5, patula.
Filamenta punctis glandulosis adspersa. *Caps.*
5, coalitæ.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Corticalis pars radicis undique alba crassitie lineæ vel ultra, convoluta in cylindrum, digitali longitudine 5, parenchymate albo, fragili, friabili.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor nullus;* *recentis* vero fortis gravis. *Sapor debilis,* rec. amarus.

COMPOSITA. *Aqua Hysterica Fœtida.* — Theriacalis.

Electuarium seu Theriaca Andreomachi.

Pulvis Marchionis. — Specierum Confectionis Hyacinthinæ. — Contra Vermes.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerius-
nus.

RUTA GRAVEOLENS. L.

Ruta. Ph. Raute, Weinrute. Rauta.

Ruta. Cal. 5 — partitus. Petala concava; Recep-
ptac. punctis melliferis decem cinctum. Caps.
lobata.

R. Graveolens. Foliis decompositis, floribus late-
ralibus quadrifidis.

Hortensis. Suffrutex.

Off. Herba.

FORMA. *Caules rec. plures ex una radice,*
herbacei, teretes, atrichodes, punctulis elevatis
scabridi, simpliciusculi, pedales vel ultra. Folia
alterna, petiolata, duplicato — pinnata: pinnis op-
positis; inferioribus longis pedunculatis: pin-
nulis pinnatifidis: laciniis linearis — lanceolatis, ob-
tusis, glabris, subtus punctatis, margine minutim
crenatis; extima majore, cuneiformi. Petoli te-
retes, supra obsolete sulcati.

PROPRIETAS. *Rec. Odor fortis, gravis, non*
tamen ingratus. Sapor amarus, gravis, acris. Sicc.
Odor & Sapor debiliores.

PRÆPARATA. Acetum.

Aqua.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. *Herb. Acetum Antisepticum.*

Aqua Castorei. — Hysterica Foetida
The-

— Theriacalis. — Vulneraria cum
Aceto. — Vulneraria cum Vino.

Oleum Colocynthidis vulgo Habacu-
cinum.

Pulvis Vitæ.

Species Cephalicæ.

Spiritus Balsamicus, vulgo Schäue-
rianus.

Unguentum Carminativum. — Ner-
vinum.

Ol. Balsamum Apoplecticum. — Saxo-
nicum.

Essentia sive Balsamum Vitæ Hoff-
manni.

TOLUIFERA BALSAMUM. L.

Balsamum de Tolu. Ph. Tolutanischer Balsam;
Tolutsey balsam.

Toluifera. Cal. 5 — dentatus, campanulatus. *Pe-*
tala 5, infimo maximo, obcordato. *Stylus nul-*
lus.

Exoticum. Arbor.

Off. Balsamum.

FORMA. *Resina semiliquida, aureo — rubra,*
plastica, tenax, diaphana, teste cucumerinæ in
clusa.

PROPRIETAS. *Odor gratus, fragrans, balsa-*
micus. Sapor balsamicus. In frigore hiemali so-
lidefecit, sed æstate aeris calore emollitur, spon-
te
i 3

te defluit, instar picis Nquidæ; digitis tractatum
hoc balsamum illis adhæret, in fila ductile. *Masticatum* non solvitur sed mollescit, dentibusque
adglutinatur. Ætate penitus solidescit in massam
rubram variegatam maculis dilutionibus rubris,
particulis quasi deauratis immixtis, fragilem, di-
gitis non adhærentem, sub masticatione tardissi-
me, & vix perfecte, emollescentem, odore &
sapore recentiori congruente.

COMPOSITA. Tinctura Balsamica.

SIMARUBA AMARA. L. (a)

Simaruba. Simaruba. Großer Terpentinhbaum.

Simaruba, neb welikj terpentinowý strom.
Quassia. Cal. 5 — phyllus. Petala 5, Nectarium
5 — phylum. Pericarpia 5, distantia, 1, sperma.
Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex* coriaceus, tenax, flexibilis,
superficie exteriore rubro — cinereus, scaber ve-
rucis polymorphis & rugis transversalibus eleva-
tis; superficie interiore pallida, ut & parency-
mate vimineo.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Saper* amarus,
subadstringens; *masticatus* minime solubilis, **vix**
communitur.

ARBUTUS UVA URSE. L.

Uva ursi. Ph. Sandbeere.

Arb.

a) Quassia Dicots Borgius, Quassia Monoica Phar. Soc.,
editio altera. Quassia Amara, Sist. Lin.

Arbutus. Cal. 5 — partitus. Cor. ovata; ore basi pellucida. Baccæ 5 — locularis.

A. Uva urſi. Caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.

Indigena. Fruticulus.

Off. Folia. (α)

FORMA. *Folia* rec. petiolata, semi pollicaria obovalia, obtusa, integerrima, utrinque glabra, lucidiuscula, supra rugosa, subtus venulosa, subrugosa : venulis seniidiaphanis.

PROPRIETAS. Rec. & Sicc. Odor nullus. Sa-
per stypticus.

COMPOSITA. Pulvis ad Calculum.

STIRAX OFFICINALIS. L.

Styrax Calamintha. Ph. *Storax. Styrax.*

Styrax. Cal. inferus. Cor. infundibulif. *Drupa*
z — spermia.

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. *Gummi — resinæ* in massa brunea, subrubicunda, mollis, fragilis : fracturis facie glebae, turfaceæ densæ, undique repletis punctis albicantibus, micaceis, scintillantibus ; inter digitos laxius fricata pulverulenta, digitis vero subacta in pastam concrescens.

PRO.

α) In nostris officinis folia *Uvæ Ursi* vix unquam occur-
runt, omnia enim quæ videre datur in pagina inferiori
punctata sunt, quod foliis *Vaccinii Vitis* Ideæ proprium est.

PROPRIETAS. *Odor fortis, fragrans, unctuosus.* *Sapor consimilis, resinosis, vix subamaricans;* masticata primum pulverulenta, deinde in pastam subigitur, dentibus non adhaerens, tandem in saliva solubilis; saliva lactescens — rubescente.

COMPOSITA. Candelæ Fumales.

Electuarium Diascordii. *Elect.* seu
Theriaca Andromachi.

Emplastrum de Meliloto.

Pilulae de Cynoglosso. — *de Styrace.*
Pulvis Fumalis Ordinarius. — *Specie-*
rum pro Cucupha.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.
Tinctura, sive Balsamum Comentato-
ris — Benzoe.

Co-

- Tres vero species *Styracis* hodie distinguuntur, quarum :
1. *Styrax in granis*, quæ est lacryma gummi — resinosa, purissima, pellucida, pisiformis magnitudine, albicans vel pallida, odoris suavissimi, & fragrantissimi, vix compressionem digitorum admittens, quin statim deliquescat. Hæc vix extra musea conspicienda datur (Kirsten l. c. p. 18) prout in museo Cl. Sebz fuit. Hanc præcisæ speciem esse, quam ager Tiburtinus suppeditat, Mazeas (l. c.) refert.
 - II. *Styrax praestantior vulgaris*, ad veterum calaminten vel gabaliten (a Gabala urbe) proxime accedens, tenax, facile liquefcens, nullis sordibus inquinata, sed ex albis rufis luteis, hisque pinguibus purissimis particulis constans ad speciem Benzoes L. Ammoniaci, varia magnitudinis & figuræ, odoris jucundissimi Opobalsamo similis, saporis balsamici & aromatici grati. Vesicis inclusa transferitur sed vix unquam ob pretium in officinis obvia (Kirsten, l. c.)

COPAIFERA OFFICINALIS. L.

Balsamum Copaivæ. Ph. *Copaibalsam*. Bopag.
Pé balsam.

Copaifera. Cal. o. Petala 4. Legumen ovatum. Se-
men 1, arillo ovato.

Exotica. Arbor.

Off. Balsamum.

FORMA. *Balsamum liquidum*, consistentiæ
olei olivarum, lutescens, limpidum.

PRO-

I. c. p. 19.) existimo esse illam speciem, quæ a myropolis
vulgo *Styrax* in granis vocatur. Hæc species nobis offi-
cialis.

III. *Styrax vulgaris*. Est massa badio rufa, tursæ speciem
habens, levis, quæ inter digitos facile conteritur, com-
pressione autem in pastam compingi se patitur, constana
ex gummi — resinosis partibus, scrobe lignea sibulo ali-
isque quisquiliis, odoris fragrantis grati, instar *Balsami*
peruviani, saporis aliquantis per amari. Glebis multarum,
libraram pondere ad nos transvehitur, quæ ipse pressio-
nis prægressæ notas in se ferunt. Igne ardet, combusta
gratiam eundem odorem spargit, qui styraci integro inest.
Fatendum & hujus historiam adhuc esse mancam, nec
nisi nova peregrinatorum indagine perficiendam. Alienæ
ista a lucri unice causa addita, an necessitate massam inde
solidam formandi? non dixerim. Hæc species solet in
officinis *styrax colamita* vocari, licet a *colamita* veterum,
sive nomen veniat ab arundine vel calamo, cui gummi
— resinam indiderunt, sive ab urbe differrat. Sed haec se-
re unica est species in officinis obvia. Artem variam qua
styrax corrompi solet Discorides jam Pliniusque conque-
sti sunt. *Murray Mat. Med.*

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, balsamicus,
non ingratus. *Sapor* pinguis, amaricans, subgra-
viusculus, subaromaticus, resinosus, subinhærens.

COMPOSITA. Ceratum pro Cereolis Dige-
stivis.

Tinctura Balsamica.

ORDO

DIGYNIA.

SAPONARIA OFFICINALIS. L.
Saponaria. Ph. Seifenkraut. Мыдлј коен.
Saponaria. Cal. 1 — phyllus, nudus. Petala 5.
unguiculata. Caps. oblonga, 1 — locularis.
S. Officinalis. Calycibus cylindricis, foliis ovato-
— lanceolatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA, *Caulis* pedalis vel ultra, teres ere-
ctus, geniculatus, internodiis inferioribus uerin-
que compressis; superioribus rotundato terrago-
nis; scabridus, simplex, superne ramosus. *Rami*
brachiatim oppositi, simplices, patentes, pubes-
centi — scabridi. *Folia* adgenicula brachiatim op-
posita, brevius petiolata, ovato — lanceolata,
acuta, glabra, trinervia, partius venoso — linea-

m margine scabrida, patentia. Petiolæ breviusculi, lati, trinervii, connati. Stipulæ nulla; verum margo e petiolis connatis utrinque ad genicula, minutum ciliatus.

PROPRIETAS. Herba recent. Odor debilis.
Sapor amaricans.

DIANTHUS CARYOPHYLLUS. L.

Tunica. Ph. Nölke, Nägelein. Baraffilát.
Dianthus. Cal. cylindricus, 1 — phyllus : basi squamis 4. Petala 5, unguiculata. Capsula cylindrica 1 — locularis.

D. Caryophyllus. Floribus solitariis : squamis calycini subovatis brevissimis, corollis crenatis.

Hortensis. Perennis.

Off. Flos ruber.

FORMA. Flores rec. terminales, subcorymbosi, pedunculati. Bractæ oppositæ, ovatæ, acutæ, marginibus inferne conniventibus, calyci subjectæ. CAL. Perianth. cylindricum, longum, pollicare, utrinque striatum, glabrum, basi cinctum squamis 4. subæqualibus, ovatis, acutis, margine tenuioribus, oppositis, arcte imbricatis ; apice 5 — fidum : laciniis ovato — acutis, concaviusculis, erectis. COR. rubra, pentapetala : unguibus albis, longitudine calycis, obverse ensiformibus ; carina latere interiore sulcata ; Limbo plano : Lamina obovatis, obtuso rotundatis grosse ferratis. STAM. alba. Filam. 10, subulata, longitudine unguium,

gium, apice purpureæ. *Anth.* cordato — sagittatae, obtuse, erectæ. *Pist.* Germen superum, ovato — oblongum, inferne pallidum, subangulatum, superne viride, quadrisulcatum, obtusum. *Styli* 2, subulati, purpurei, latere interiore sulcati, corolla paulo longiores. *Stigm.* obtusa, longitudinaliter pubescentia, revoluta.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor. gratus, caryophylleus; *sicc.* nullus. Sapor unguium recent. dulcis, laminarum vero amaricans, leniter stypticus.

PRÆPARATA. *Conserv.*

Syrpus.

COMPOSITA. *Flor.* Aqua seu Balsamum Embryonis.

Conserv. Electuarium Catharticum Regium.

Syrup. Pilulae de Succino Crocatae.

O R D O P E N T A G Y N I A.

SEDUM TELEPHIUM. L.
Crassula. Faba inversa. Telephium. Ph. Fette Henne. Prutřínsk, rozchodník, swinstý kořen.

Se-

Sedum. Cal. 5 — fidus. *Cor.* 5 — petala. *Squamae nectariferæ* 5, ad basim germinis.

S. Telephium. Foliis planiusculis ferratis, corymbo foliolo, caule erecto.

Indigeno — Perenne.

Off. Herba recens.

FORMA. *Caules* rec. plures ex una radice, spithamæi, inferne subprocumbentes, teretes glabri, rubro — purpurascientes, adspersi punctis elevatis, simplices, rarius ramosi: ramis alternis, *Folia* frequentia, carnosa, sessilia, opposita, plana, ovata, obtusa, inæqualiter ferrata, pollicaria utrinque glabra.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor debilis. Sapor nullus; planta pene insipida. *Masticata* folia tenerima, subsuccosa, lubrica sentiuntur, saliva viridescente.

COMPOSITA. Unguentum Populeum.

⊕ **SEDUM ALBUM.** L.

Sedum Minus. Ph. Kleine Hanswurzel. Vses třesk, tučný mužský mensíj.

S. Album. Foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa.

Indigenum. Perenne?

Off. Herba.

FORMA. *Caules* pedales, in summitate ramosi: foliis tecti numerosis: teneribus, obtusis, ovatis, maculatis, crassis, glabris, ut tota planta.

PRO.

PROPRIETAS. *Odor debilis; sapor herbaceus, acris; masticata mordet in faucibus.*

COMPOSITA. *Herb. rec. Unguentum Populeum.*

* SEDUM ACRE. L.

Sedum Vermiculare. Ph. Mauerpfiffer. Netřesk, tučný mužský neymenší.

S. Acre. Fol. subovatis adnato — sessilibus gibbis erectiusculis sezariam imbricatis.

Indigenum. Perenne.

Off. *Herba recens raro.*

FORMA. *Caulis filiformis, vix digitalis, basi repens, ramosa, dein erectus, teres, glaber pallidus, succulentus, undique imbricatus: Folii ovatis, obtusis, carnosis, supra planiusculis, subtus convexo — gibbis, sessilibus, erectis, subpunctatis, minutim subrugosis, interioribus emarcidis.*

PROPRIETAS. *Rec. Odor debilis. Sapor herbaceus, acris; planta masticata mordet in faucibus.*

⊕ OXALIS ACETOSELLA. L.

Acetosella. Ph. Sauerklee, Gauchampfer. Alselunga, bětel kyselý zágecí.

Oxalis. Cal. 5 — phyllus. Petala unguibus connecta. Caps. angulis dehiscens, 5 — gona.

O. Acetosella. Scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Herba.

FORMA. *Folia rec. 3, radicalia, petiolata, ternata*: foliis obcordatis: sinu subtus recurvo; patentibus & reflexis, glabriusculis, sed pube sparsa notatis, ciliatis lutea — viridescentibus. *Petiolae* semidigitales, teretes, minutim pubescentes, nudi, erecti; pallidi.

PROPRIETAS. *Rec. herbae*: Odor nullus; Sapor grate dulcescenti — acidus; masticata dentes sensibiles facit. *Sicc.* debilissime acidulata.

PRÆPARATA, *Herb. rec. Conserva.*

Sal Essentialis. (a)

CLASSIS XI.

DODECANDRIA ORDO MONOGYNIA.

ASARUM EUROPEUM. L.
Asarum. Ph. Haselwurz. Dopytnsk.

A/a.

*) Vulgo venalis nisi in pharmacopoliis paretur potissimum adulteratus est.

Ajarium. Cal. 3 f. 4 — fidus germini insidens,
Cor. o. Caps. coriacea, coronata.

A. Europeum. Foliis reniformibus obtusis binis.
Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba.

FORMA. Radix repens, filiformis, tetragona, geniculata, bruneo — cinerea. Vaginæ radicales obovatae concavæ, obtuse minutim ciliatae, imbricatae. Folia radicalia, longius petiolata, reniformia obtuso — rotundata, vix pollicaria, venosa utrinque pubescentia, præcipue venis, erecta.

PROPRIETAS. Sicc. radic. Odor fortis, fere valerianæ, sed magis nauseosus; Sapor aromatico — gravis, acris, in Ipecacuanham incidens, sed magis aromaticus, minus amaricans; masticata in lingua & faucibus leniter mordet, subnauseosa. Herbae Odor nullus; Sapor subamaricans, nauseosus, acriusculus; masticata leniter merdet in faucibus; recentia foria acriora.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Pulvis Specierum Hieræ Picreæ.

WINTERANIA CANELLA. L.

Canella Alba. Cortex Magellanicus, sive Winteranus. Ph. (a) Weißer Zimmet. Bjlá řečice.

a.) Parkinsonius corticem hunc à Canella alba diversum esse, contra multorum opinionem ostendit. Ab ea enim

Winterania. Cal. 3 — lobus. Petala 5. Antheræ 16, adnatæ, Nectario urceolato. Bacca 3 — locularis.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex sicc.* undique albidus, in cylindrum convolutus, crassitie lineæ, fragilis, late re interiore glabriusculo, exteriore subluteſcente, subrugoso.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, aromaticus; *Sapor* calidus, aromaticus, acriusculus, amari cans; *masticatus* subfriabilis inter dentes, fauces & linguam calefaciens.

K

Com-

differit crassitie majore, colore obscuriore & ad Cinnamomum accedente, sapore acreiore quasi Piperis & Zingiberis. Geoffroy. Mat. Med. T. II. pag. 177. Inter recentiores legitur notabilior Corticis Winterani & Canellæ albae differentia in *Medical. observations and Inquiries. By a Society of Physicians in London.* Recensitis in Bibliotheca Medico — Præctica Murray. T. III. pag. 329. A. D. Solander, qui occasionem optimam in Terra del fuego habuit arborem examinandi; qui præter locum natalem, qui alteri est America septentrionalis, alteri vero Jamai ca, & ceteræ ei adjacentes insulæ, sequentia refert: *Vetus Winteranus Cortex* crassitiem uni vel tribus quartis digitii cubici referrens, coloris est ex fusco bruneo — cinnamonomei, qui contusus spargit odorem caryophilaceum talem quoque saporem acrem, diu inharentem. Contra vero Canella alba colorem refert palide bruneum, & crassitiem habens duabus octavis circiter digitii cubici, ejus sapor affinis magis est caryophyllis, quam cinnamono.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca An-dromachi.

LYTHRUM SALICARIA. L.

Salicaria. Lismachia Purpurea. Ph. Weiderich.
Wrbina brunatna.

Lytbrum. Cal. 12 — phyllus. *Petala* 6, calyci in-serta. *Caps.* 2 — locularis, polisperma.

L. Salicaria. Foliis oppositis cordato — lanceo-latis, floribus spicatis dodecandris.

Indigena. Perennis.

Off. Herba florida.

FORMA. *Caulis* rec. bipedalis, eretus, infer-ne glaber, tetragonus, superne pubescens, pen-tagonus: angulis acutis, membranaceis, scabris; ramosus. *Rami* superiores sparsi; inferiores op-positi, tetragoni, scabri, minutim pubescentes, eretti, breviusculi, frequentes. *Folia* sessilia, amplexicaulia, lanceolata, acuta, tripollucaria, supra glabra, subtus minutim pubescentia, sca-briuscula, venosa, margine scabra, patentia; in-feriora opposita, superiora sparsa; ramea op-posita. *Spicæ* terminales, sessiles, cylindricæ, e glomeribus florum compositæ: conglomeribus sparsis, remotiusculis, circiter octo floris, bractea fulcitis; terminalis spica duplo major, prior. *Bladæ* glomerum solitariæ, ovatæ, longius acu-tæ, subtus villosæ, calycibus longiores, subpur-pureæ; *florum* linearis — subulatæ, parviusculæ,

CAL.

CAL. Per. tubulatum, turbinato — cylindricum, striatum, hirsutum: ore truncato, 12 — fido: lacinis purpurascensibus; quarum 6 alternæ subulatæ, hirsutæ, erectæ; 6 aliæ alternæ parvæ, ovato — acutiusculæ, inflexæ, concavæ, apice minutim barbatæ. COR. purpurea. Petala 6. cuneiformi — oblonga, obtuso — rotundata, erecta, calyce longiora, margine calycis intra lacinias calicis longiores inserta, patentia. Petala ante eruptionem calycis tubo intrusa sunt & recondita; hinc postmodum erumpunt, & quasi e calyce extrahuntur. STAM. Fil. 12, subulata, albida, calycis parieti intra tubum inserta; quorum 6 longiora, tubo calycis paulo longiora; 6 breviora, intra tubum recondita. Anth. ovata, luteæ, incumbentes. PIST. Germen superum ova- tum, acutum, utrinque sulcatum, glabrum, viri- descens. Stilus cylindricus, albus, corolla vix longior. Stigma capitatum, exsertum. Anthesis incidit sub prima eruptione petalorum.

PROPRIETAS. Rec. Odor nullus. Sapor her- baceus; masticata folia recentia lubrica sentiuntur.

O R D O D I G Y N I A,

AGRIMONIA EUPATORIA. L.

k 2

Agri-

Agrimonia. Ph. Odermenig. Ržepiček, starček.

Agrimonia. Cal. 5 — dentatus, altero obvallatus

Petala 5. Sem. 2, in fundo calycis.

A. Eupatoria. Foliis caulinis pinnatis : impari petiolato, fructibus hispidis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Caulis rec. pedalis vel ultra, erectus, teres, simplex vel subramosus, hirsutus. Folia alterna, petiolata, cum impari pinnata, 4 vel 5 — juga : pinnis oppositis, plano patentibus, sessilibus, ovalioblongis, acutiusculis, pollicaribus, supra viridibus, lineatis, adspersis atomis elevatis, pubescentibus, subtus cineasis, hirsutis, venis suboppositis, margine inciso — serratis : ferraturis ciliatis, suberectis. Pinnæ aliæ parvæ, pariter ciliatæ, inter singulum par pinnarum majorum, sessiles, inæquales, quarum majores suboppositæ, ovatæ, inciso — serratæ ; minores parvæ, ovatæ integerrimæ, alternæ. Petiolæ subtus convexi, supra concavo — canaliculati ; quorum inferiores longiores, basi vaginati. Stipulae 2, oppositæ, ciliatæ, hirtæ ; inferiorum petiolorum integræ, lanceolatæ, acutæ ; superiorum vero majusculæ, amplexicaules, patentes, undique incisa.

PROPRIETAS. Rec. Odor debilius aromaticus ; Sapor subaromaticus, herbaceus. Sicc. Odor vix

vix ullus; *Sapor* subaromaticus, leviter stypticus.

O R D O.

T R I G Y N I A.

EUPHORBIA OFFICINALIS. L.

Euphorbium. Ph. *Euphorbium*. *Euforbiūm*.
Euphorbia. *Cor.* 4 — *l. 5* — petala, calyci insi-
 dens. *Cal.* 1 — phyllus, ventriculus. *Caps.* 3
 — COCCA.

E. Officinalis. Aculeata nuda multangularis; acu-
 leis germinatis.

Exotica. Arbor.

Off. Gummi — resina. (a)

FORMA. *Gummi* — *resina* in lachrymis *l.* fru-
 stulis subrotundis vel oblongiusculis, s̄epe sub-
 ramosis, perforatis, sordide citrino — rufescens,
 facie tere ceræ flavæ, non splendens, leviuscula,
 magnitudine circiter seminis Pisii vel supra, fra-
 gilis friabilis.

PROPRIETAS. Odor debilis, vix ullus, *Sapor*
 primum nullus, deinde valde punctarius, cali-
 dus, nauseosus, inhærens; *masticata* hæc G. re-
 k 3 resina

(a) Nobis potissimum impurum capsulorum valvulis, imo
 capsulis integris,

fina inter dentes friabilis, solvit in ore, linguam & fauces pungit uti mille acus, fere ut radix Ari, sed fervida insimul sentitur, & diutissime inhæret, quamvis fauces aqua frigida sèpius eluantur.

ORDO.

PENTAGYNIÆ.

SEMPERVIVUM TECTORUM. L.
Sedum Majus. Sempervivum. Ph. Große Hauswurzel. Metresk, tučný mužík wětší.
Sempervivum. Cal. 12 — partitus. *Petala* 12.
Caps. 12, polyspermæ.
S. Tectorum. Foliis ciliaris, propaginibus patentibus.
Indigenum. Perenne.
Off. Planta.

FORMA. *Folia rec.* omnia radicalia, in formam Rosæ plenæ disposita, sessilia, cuneiformia, plusquam pollicaria, carnosæ, crassæ, supra plana, subtus convexiuscula, utrinque glabra, dilute viridescentia, inferne albida, margine ciliata, superne fusca, acuminata, erecta; exteriora majora, interiora sensim minora. *Propagines longius petiolatae, globosæ magnitudine ovi columbinæ*

bini vel ultra, strobiliformes, imbricatae foliis erectis. Petioli propaginum cylindrici, teretes, ferruginei, lanuginosi, longius exporrecti, nudi, e basi radicis, prope folia, exeuntes.

PROPRIETAS. Rec. Odor debilis. Sapor subfalsus; masticata folia recentia valde succosa, subfalsa, leniter styptica.

COMPOSITA. Plant. rec. Unguentum Populeum.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA. ORDO MONOGYNIA.

PUNICA GRANATUM. L.
Balaustium. Granatum. Ph. Granatbaum, Granathblüthe, Granatäpfel. Pomaprán, gránátové jablko.

Punica. Cal. 5 — fidus, superus. Petala. 5. Pommum multiloculare, polyspermum.

P. Granatum. Foliis lanceolatis, caule arboreo. Axoticum. Arbor.

OF.

Off. Flores. Fructus recens pro succo.
Cortex exsicatus sub titulo Malicorii.

FORMA. *Flores pleni: CAL. Perianth. monophyllum, campanulatum, glabrum, coriaceum, 5 — fidum: laciniis lanceolatis, acutis. COR. rubra, polypetala semierupta. Pomum magnitudine fere pugni, subglobosum, ab apice ad basim usque compressiusculum, apice umbilicatum: umbilico prominente, tubulosi, intus vestito staminibus emarcidis; undique obductum Cortice coriaceo, firme, rigido, crassitie lineaæ unius, olivaceo, subrugoso, lucidiusculo; 9 loculare: loculamentis subbilocularibus, refertis seminibus plurimis, oblongis, albidis, acutis, hinc convexiusculis, inde angulatis, gibbis, arillatis: arillo crasso, angulato, succoso rubro.*

PROPRIETAS. *Corticis: Odor vix ulla; Sapor intensius stypticus. Pulpæ seminum: Odor debilis subvinosus; sapor gratus, acidulus, leniter stypticus: masticata hæc pulpa succosa, inter dentes substridula. Florum siccata. Odor vix ullus; Sapor stypticus; masticati salivam rubro — violaceo tingunt.*

PRÆPARATA. Vinum Granatorum.

AMYGDALUS PERSICA. L.

Persica. Ph. Pfirsche. Bēssew.

Amygdalus. Cal. 5 — fidus, inferus. Petala 5. Drupa nuceporis perforata.

A.

A. Persica. Foliorum serraturis omnibus accutis,
floribus sessilibus solitariis.

Hortensis. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nux* ovata, acutiuscula, rubescens
undique lacunulosa. *Nucleus* ovatus, acutus,
utrinque compressus, substriatus, rubicundus,
pulverulentus, unguicularis, intra testam osleam,
crassam; *parencymate* albo, cotyledoneo. bipar-
tibili.

PROPRIETAS. *Nuclei odor* nullus; *Sapor amy-*
gdalarum amararum.

AMYGDALUS COMMUNIS. L.

Amygdalæ Dulces. Ph. *Mandelbaum, sūsse Man-*
deln. Sladké mandle.

A. Communis. Foliorum serraturis insimis glan-
dulosis, floribus sessilibus geminis.

Exoticus. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nux* pollicaris, ossea, tenerior,
fragilis, ovato — acinaciformis, obtusa f. acutius-
cula, latere utrinque compressa, lāviuscula, poris
plurimis pertusa, dorso rotundato, antice mar-
gine prominulo, secante; testa bilamellari: di-
ploë sulcato — rugosa, instructa rete fibrillari,
in sulcis lamellorum depresso. *Nucleus* ovatus,
utrinque compressus, acutiusculus, tectus epider-
mide rubro — brunea, pulverulenta, scabrius-
cula,

cula, sulcato — striata, nervosa; parenzymate cotiledoneo, niveo, æquali, firmo, bipartibili.

PROPRIETAS. *Odor debilis. Sapor dulces-*
cens, mitis; Masticatæ comminuuntur, saliva
emulsiva.

PRÆPARATA. *Oleum pressum.*

COMPOSITA. *Nucl. Emulsio Laxativa.*

Loch Sanum & Expertum.

Morsuli Imperatoris,

Ol. Emplastrum Noricum.

AMYGDALUS COMUNIS. L. *varietas prioris.*
Amygdalæ Amaræ. Ph. *Mandelbaum, bittere*
Mändeln. Hörké mandle.

Exoticus. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Amigdalæ dulcis, verum minor.*

PROPRIETAS. *Odor debilis. Sapor amari-*
cans, Laurocerasi.

PRÆPARATA. *Oleum Pressum.*

PRUNUS CERASUS. L.

Cerasa Nigra. Ph. *Schwarze Kirschen. Tréz-*
ffné černé.

Prunus. Cal. 5 — fidus, inferus. Petala 5. Dru-
pæ. Nux suturis prominulis.

P. Cerasus. Umbellis subpedunculatis, foliis lan-
ceolatis glabris conduplicatis.

Hortensis. Arbor.

Off. Fructus. Nuclei.

[FOR-

FORMA. *Drupa rec.* pendula, subrotunda, pondere circiter drachmæ 1, apice obtuso — rotundato, depressusculo hilo pusillo notata, basi concava, undique lăves, nitida, atomis adspersa, nigræ; parenchymate carnosæ — succulento, venoso, tenerrimo, succo sanguineo. *Nux* subrotunda, vix rugosa, ossea altero margine acuto, altero vero incrassato, gibbo, angulis tribus obfoletis, basi cicatrisata. *Nucleus* albus, amygdalinus, ovatus, acutus, striatus. Variant fructus Cerasi diverse, colore nimis rimum, sapore, magnitudine &c.

PROPRIETAS. *Fructuum: Odor nullus; Sapor* magis vel minus acidulus, pro ingenio cujusque varietatis; ex his Cerasi autumnales subamari, substyptici sentiuntur. *Nucleorum* proprietas fere amygdalarum amararum.

PRÆPARATA. Aqua.

COMPOSITA. *Aq.* Aqua Perlarum.

PRUNUS DOMESTICA. L.

Prunus. Ph. Zweschpen, Pflaumen. Ślwestka, ślwa.

P. Domestica. Pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato — ovatis convolutis, ramis muticis.

Hortensis. Arbor.

Off. Fructus, etiam exsiccatus. Nuclei.

FORMA. *Drupa rec.* ovalis, utrinque obtusa, apice puncto parvo, subrotundo, vix elevato,

vn-

undique tecta epidermide tenera, glabra, nitidiuscula, rore hyalino tincta diverso modo varians, colore, sapore, magnitudine. *Parencyma carnosum* — molle, succosum; transversaliter sectum æquale venosum. *Nux ossea*, scabriuscula, ovata, utrinque compressa, margine altero acutiusculo, altero incrassato, sulcato; unilocularis. *Nucleus oblongus*, amygdalinus.

PROPRIETAS. *Odor rec.* debilis. *Sapor acidulo* — dulcescens. *Masticata* succosa; solvitur fere corticali parte remanente, subamaricanti — acidula comminuenda. *Nuclei* sapor cum amygdalis amaris conveniens.

PRÆPARATA. Pulpa.

COMPOSITA. *Pulp.* Electuarium Lenitivum sive Tamarindorum.

PRUNUS SPINOSA. L.

Acacia Nostras. Fh. Schlehen. Trnky.

P. Spinosæ, Pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis.

Indigena. Frutex.

Off. Flores. Fructus. (a)

FORMA, *Flores rec.* solitarii ad ramulos tenellos, nuper eruptos, oppositi, propria gemma, in ipso ramo siti, pedunculati. *Pedunculi* filiformes, teretes, nudi, uniflori longitudine vix folioli-

(a) Hujus Pulpam inspissatam pro succo Accaciæ divendunt mercatores fraudulentí.

liorum, patentes. CAL. Perianth. inferum, turbinatum, angulatum, glabrum, 5 — fidum : lacinis ovato — oblongis, obtusis, concaviusculis, patentibus. COR. nivea. Petala 5, ovata, obtusa, patentia, calice duplo longiora, eique infera ; unguibus minutis. STAM. Filam. plura, erecta, calyci inserta, alba, longitudine corollæ, Antb. ovatæ, didymæ, incumbentes. Pist. viride. Ger. men. superum, ovatum parviusculum, glabrum. Stylus cylindricus, longitudine staminum. Stigma incrassato — truncatum, orbiculatum, emarginatum. Drupa subrotunda, glabra, nigra, magnitudine Cerasi minoris ; Nuce ovata, compressiuscula, rugosa ; Nucleo amygdalino.

PROPRIETAS. Florum recent. Odor gratus ; Sapor amaricans in amygdalas amaras incident. Fruct. rec. Odor nullus ; Sapor acidus, acerbus. Nucl. amygd. amar. emuli.

PRÆPARATA. Syrupus florum Acaciæ. (b)

ORDO PENTAGYNTIA.

PYRUS MALUS. L.

Poma

(b) Pulpa Prunorum silvestrium in officinis nostris etiam praesto est cum non raro prescribatur.

Poma Borsdoriana. Ph. Borsdorfer, oder Ma-
schanßer Äpfel. Missenré gablko.

Pyrus. Cal. 5 — fidus. Petala 5. *Pomum* inferum,
5 — loculare, polyspermum.

P. Malus. Foliis ferratis, umbellis sessilibus,
Hortensis. Arbor.

Off. Fructus recens pro succo &c. (a)

FORMA. *Pomum* rec. ovali — subrotundum,
majuscum, utrinque obtusum; viride, pallide
luteum, inde rúbicundum, glabrum; parenchy-
mate carnosò, albido 5 — loculari, transversali-
ter secto notato punctis 10 subrotundis, circum
loculamenta seminum in orbem dispositis. Semi-
na plerumque bina in singulo loculamento, ova-
to subgibbo, acutiuscula, fusca, glabra.

PROPRIETAS. Odor debilis Sapor acidulo dul-
cis, gratus, subrosaceus, subvinosus.

COMPOSITA. Succ. Extractum Martis cum
succo Pomorum: hoc pro Liquore Viscerali.

Tinctura Martis cum succo Pomorum,

PYRUS CYDONIA. L.

Cydonia Cotoneum. Ph. Quitten, Kütten. Bdu-
le neb gdaule, kütta.

P. Cydonia. Foliis integerrimis, floribus solita-
riis.

Hortensis. Arbor.

Off.

a) Adhibentur etiam alia Poma acidula in usus,

Off. Fructus recens pro succo &c. Semen.

FORMA. Pemum rec. subrotundum vel turbinatum, magnitudine pomi vulgaris, cortice tomentoso, luteo, apice umbilicatum : umbilico depresso, 5 — fidus; parenzymate firmo lucente, 5 — loculari; Semina plerumque bina in singulo loculamento, ovata, acutiuscula, hinc plana inde convexa, sape subtriquetra, ferruginea.

PROPRIETAS. *Pomi:* Odor maturorum fragrans, subcephalicus. Sapor immaturorum; austerus; maturorum vero adstringens, acidulus, vinosus. Seminum mucilaginosa.

PRÆPARATA. Succ. Vinum Cydoniorum.
(a)

SPIRÆA ULMARIA. L.

Barba Capræ. Ph. Geißbart. Rožy brádka.
Spiræa. Cal. 5 — fidus. *Petala* 5. *Caps.* polysperma.

S. Ulmaria. Foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Radix rec. subcylindrica, 2 — vel 3 — polycaris, extus nigra, squamula undique obsessa fibris plurimis, filiformibus, nigris, subspicata.

*) Pag. 101 & 102. Pharmacopeæ nostræ editionis quartæ & Miva & Panis Cydoniorum sit mentio.

spithameis, fibrillosis, descendantibus. *Parency-*
ma subcarnosum, post sectionem transversalem
 centro medullari amplissimo æquali, albido, ato-
 mis rufescentibus saepe adsperso, circumdato an-
 nulo ferrugineo, punctato, intra corticalem par-
 tem sita.

PROPRIETAS. *Radix* rec. *Odor* debilis; *Sa-*
por stypticus.

COMPOSITA. Emplastrum ad rupturas.

O R D O.

P O L Y G Y N I A.

ROSA CENTIFOLIA. L.
Rosa Rubra. Ph. Rothe Rose. Růže červená,
 neb domácí.

Rosa. *Petala* 5. *Cal.* urceolatus, 5 — *fidus*, carno-
 sus, collo coarctatus. *Sem.* plurima, hispida,
 calycis interiori lateri affixa.

R. Centifolia. Germinibus ovatis pedunculisque
 hispidis, caule hispido aculeato, petiolis iner-
 mibus.

Hortensis. Frutex.

Off. Flores. Damarcena. (a)

FORMA. *Flores* rec. in ramulis terminales.

(a) Flores Rosarum Damascenarum nobis deponuntur ex
rosa gallica, L.

Pedunculi teretes, hispidi; aculeolis & pilis brevibus capitulatis. CAL. Periant. 1 — phyllum: tubo ovato — oblongo, inferne hispido aculeolis, superne singulo glabro, collo coarctato; limbo s — fido: lacinias reflexis, integris, subtus hispidis, ovato acutis, desinentibus in apicem linearrem, carinatum. COR. plena, dilute rubro — violacea, calyce longior: petalis obovatis, retusis, patentibus. Stam. Fil. plurima, calyci inserta, erecta. Antb. cordatae, obtusa. PIST. Germ. plurima intra tubum calycis, subcylindrica, lanata. Styli subulati, pilosi, collo calycis paullo longiores. Stigm. digesta in hemisphaerium planiusculum, laxum, singula turbinata, truncata, emarginata. Recept. germinum hirsutum.

PROPRIETAS. *Petalorum rec. Odor gratus, fragrans; Sapor subacidulus, debiliter rosaceus, masticata substyptica, saliva violacea.*

PRÆPARATA. Acetum.

Conserua.

COMPOSITA. *Flor. Electuarium Diascordii, Elect. seu Theriaca Andromachi.*

*Pulvis Fumalis Ordinarius. — Specie-
rum pro Cucupha. — Sternutato-
rius variegatus.*

*Species Cephalice resolventes pro Fo-
mento. — Decocti pro Decocto Ad-
stringente.*

L

Ro-

RÓSA CANINA. L.

Cynosbatos. Rosa Sylvestris. Ph. Hagebutten,
Wilde Rosen, Hetschepetsch. Szypka, plas-
ná růže.

R. Canina. Germinibus ovatis pedunculisque
glabris, caule petiolisque aculeatis.

Indigena. Frutex.

Off. Flores. Fructus. an Acini? (α)

FORMA. Flores rec. 2 vel 3 congesti, axilla-
res, brevius pedunculati. Bracteæ oppositæ, lan-
ceolataæ, sessiles, acutæ, pubescentes, ciliatae longi-
tudine pedunculi, erectæ. CAL. Perianth. 1 —
phyllum: tubo ovato, lœvi, collo coarctato; lim-
bo 5 — partito: laciniis reflexis, ovatis supra minu-
tim tomentosis, subtus dorso glabris, notatis
punctis elevatis, margine dentatis: laciniis par-
vis, linearibus, suboppositis, remotis, erectis, utrin-
que communiter 2; terminali elongata, linearis
acuta, concaviuscula, subintegerrima. COR. in-
carnata. Petala 5, sessilia, obcordata, patentia,
calyce longiora, basi albida. STAM. lutea. FIL.
plurima, setacea, decumbenti — patentia, corol-
la breviora. ANBT. incumbentes, ovatae, utrin-
que retusa, concavae, utrinque bimarginatae. PIST.
Germ. plurima intra tubum calycis paullo lon-
giores, pilosi. Stigm. plurima, arcta coniventia
in capitulum collum calycis coronans; singula
tur.

α) Juxta Praecepta Chirurgica;

turbinata, subbarbata, truncata, concaviuscula.
Receptac. seminum hirsuta. *Baccæ* (*Cynosbasti*
fructus) ovales, inferne angulatæ, apice obtusæ,
coronatæ margine e calycis laciniis deciduis, sta-
minibusque emarcidis, barbatæ, magnitudine glan-
dis quercinæ vel ultra, undique læves, nitidæ,
coccineæ, intus cavæ, uniloculares: cavo undi-
que obpresso *seminibus pallidis*, subovatis, oblon-
giusculis, dorso convexis, lanatis, apice barbatis;
quorum inferiora pedicellata, superiora subfeli-
filia. *Parencyma* baccæ carnosum, firmum coc-
cineum.

PROPRIETAS. *Florum rec.* Oder gratus, de-
bilius; Sapor debilis subaceſcens; *Baccæ acidulæ*;
masticatæ firme comminuuntur, saliva coccinea;
cocctæ teneriores, solvuntur secundum partem tin-
gunt aquam, sapore magis acidulo instruuntur.

ROSA ALBA. L.

Rosa Pallida. Ph. Weisse Rose. Bjalá růže.

R. Alba. Germinibus ovatis glabris, pedunculis
hispidis, caule petiolisque aculeatis.

Celitur. Frutex.

Off. Flores.

FORMA. *Flores rec.* circiter 3. in ramis ter-
minales, pedunculati, nutantes. *Pedunculi* teretes,
hispidi; pilis rigidis, capitulatis. *CAL.* Fer.
monophyllum, tubo ovato, glabro, collo coarcta-
to; limbo utrinque minutim tomentoso, subtus

scabrido: pilis rigidis, subalbidis, brevibus, subulatis, fusco — capitulatis; 5 — partito, foliolis lanceolatis, pinnatis: pinnis foliaceis, inæqualibus, ciliatis, linearibus s. lanceolatis, subintegris; terminali longe majore, elongata, ovali — oblonga, dentato — pinnatifida. COR. nivea, calyce longior, plana: petalis numerosis, obovatis, venosis, calyce brevioribus; unguibus parvis, lutescentibus. STAM. lutea. Filam. plurima, subulata, corolla longe breviora, calyci inserta. Anth. ovales, supra concavæ, subtus convexiusculæ, utrinque emarginatæ, incumbentes. PIST. Germ. numerosa, intra tubum calycis, subcylindrica, lanata. Styl. subulati, pilosi. Stigm. conniventia in hæmisphærium planiusculum, supra collum calycis paullo elevatum, laxum; singula turbinata, truncata, vix echinata.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans Rosæ; Sapor debilis, substypticus; sicc. amarus, rosaceus.

PRÆPARATA. Aquæ.

Infusum Rosarum; hoc pro Melo Rosarum, & Syrupo Rosarum solutivo cum Senna.

COMPOSITA. Aq. Syrupus Kermesinus.

Unguentum Rosatum album.

Mel. Electuarium Dentifritium.

RU-

⊕ RUBUS IDÆUS. L.

Rubus. Ph. Hinbeere. Maliny, ostružiny.

*Rubus. Cal. 5 — fidus. Petala 5. Baccæ composita.
sciniis monospermis.*

*R. Idæus. Foliis quinto — pinnatis ternatisque,
caule aculeato, petiolis canaliculatis.*

Indigenus. Suffrutex.

Off. Fructus recens pro Succo &c.

FORMA. Baccæ rec. rubræ, magnitudine fere fructus Cerasi, minutim lanuginosæ, hemisphæricæ, basi cavæ: receptaculo clavato, albo, villoso, carnosæ, echinato, cavo baccæ intruso; facile decerpendæ, absque laceratione; conflatæ et drupulis subrotundis, obtusæ, magnitudine seminis Cannabini, confluentibus, dispositis serie quadruplici annulari; singula drupula succulenta, monosperma, apice instrueta stylo setaceo, ferrugineo, persistente, longitudine drupulæ, erecto, stigmate capitulato; parenzymate succoso: succo rubro. Nuculæ parvæ, subreniformes, rugosæ, obductæ mucilagine succosa; testa fragiliuscula, nucleo oleoso.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans, suaveolens, gratissimus. Sapor grate acidulus, odori congruens. Masticatæ baccæ succulentæ, sapidissimæ; extrahitur succus, remanent semina, & corticalis pars, comminuenda; saliva tingitur colore dilute purpurascente. Sæpius vermiculis scant baccæ.

PRÆPARATA. Aqua.

Syrpus.

⊕ FRAGARIA VESCA. L.

Fragaria. Ph. Erdbeere. Gahody, neb gahod-
njé.Fragaria. Cal. 10 — fidus. Petala 5. Recepta-
culum seminum ovatum, baccatum, deciduum.

F. Vesca. Flagellis reptantibus.

Indigena. Perennis.

Off. Fructus recens pro Aqua & succo &c.

(Herba raro.)

FORMA. Caulis ree. herbaceus, erectus, te-
res, piloso — pubescens, simpliciusculus, palma-
ris. Stolones repentes, filiformes, nudi, pubes-
centes, fusco — viridescentes, spithamæi, apice
foliosi, fibriculis tandem radicantes. Folia lon-
gior petiolata, ternata: foliolis ovatis, obtusis,
serrato — incisis, supra glabris lineatis, subtus
glaucis, nervosis, pubescentibus, præcipue ner-
vis. Petoli teretes, pubescentes, supra canalicu-
lati, basi vaginati: vaginis membranaceis, albi-
dis, concavis desinentibus in stipulas 2, lanceo-
lates, acutas, subpubescentes. Baccæ ovato — sub-
rotundæ, obtusæ, e Receptaculo succulento natæ,
magnitudine seminis Pisi majoris, nitidæ, hinc
sanguineæ, inde albido — pallidæ: Seminibus sel-
filibus, rubris, nitidis, parviusculis, ovatis utrin-
que compressiusculis, dorso minutim carinatis,

scu-

acutiusculis, latere interiore stylo instructis persistente, subulato, truncato, subfuscō, bacca vix longiore; singulis in singula foveola solitariis; prope basim inserto, gelatinoso, albo baccæ intruso. *Parencyma* baccæ carnoso — succulentum, molle, albidum; transversaliter sectum æquale, in centro foveola vacua.

PROPRIETAS. *Herbæ rec.* Odor nullus; *Sapor* herbaceus, austriuscus; *masticata* comminuitur, saliva dilute viridescente; *Baccæ* Odor fragrans, swaveolens, gratissimus. *Sapor* leniter acidulus. *Baccæ* recentes facile corrumpuntur, brevi, h. c. intra diem unum alterumve mollescant, fulcescant, odorem deponunt gratissimum, mucronem contrahunt.

PRÆPARATA. Aqua.

TORMENTILLA ERECTA. L.

Tomentilla, Ph. *Tomentille*. *Uátržnſké, trjené, ſořenj.*

Tomentilla. Cal. 8 — fidus. Petala 4. Sem. subrotunda, nuda receptaculo parvo ex succo affixa.

T. Erecta. Caule erectiusculo, foliis sessilibus.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* subcylindrica, superne crassior, sœpe subrotunda, fibrillosa, crassitie diti, 2 — vel 3 — pollicaris, extus fusca, superne squamata; *parencymate* firmo, rubicundo; post se.

sectionem transversalem centro medullari subrotundo, cum punctis 5 in margine; peripheria striis concentricis & radiis ternis longitudinalibus, ex singulo punto centri ad corticem.

PROPRIETAS. Rec. & Sicc. radicis: Odor nul-
lus; Sapor stypticus.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. Eleutherium Diaſcordii.

Species Decocti pro Gargarismate.
Adstringente.

GEUM URBANUM. L.

Caryophyllata. Ph. Benediktwurzel. Benedyk-,
neb benedyktowý kořen.

Geum. Cal. 10 — fidus. Petala 5. Sem. arista ge-
niculata.

G. Urbanum. Floribus erectis, fructibus globo-
sis villosis; aristis uncinatis nudis, foliis lyratis.
Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. Radix rec. truncо oblongo, cras-
siusculo, bipollicari vel ultra, extus fusco, squa-
mis emortuis obducto, undique præcipue in api-
ee, instructo fibris filiformibus, rubicundis, elon-
gatis, glabris parce fibrillosis, subhorizontalibus.
Parencyma firmum, post sectionem transversalem
centro medullari fusco, angulato, obducto peri-
pheria fasciis concentricis nebulosa; in aerere-
licita radix recens, transversaliter secta, sensim

ru-

rubescit, linea concentrica alba, validiore, versus peripheriam existente.

PROPRIETAS. *Radicis rec.* *Odor caryophyl-*
læus (scilicet radicis tempore verno, in solo sic-
co lectæ); *Sapor stypticus*.

COMPOSITA. *Electuarium seu Theriaca An-*
dromachi.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

CAPPARIS SPINOSA. L.
Capparis. Ph. Kappern. Kappary.
Capparis. Cal. 4 — phyllus, coriaceus. Petala 4.
Stam. longa. Bacca corticosa, 1 — locularis pe-
dunculata.
C. Spinoso. Pedunculis unifloris solitariis, stipu-
lis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus.

Exotica. Arbor.

Off. *Cortex radicis.* FOR-

FORMA. *Cortex sicc.* radicis convolutus, in frustis digitalibus, cinereus, subrugosus, annulis notatus transversalibus, parallelis, crassitie lineæ vel supra.

PROPRIETAS. *Odor nullus;* *Sapor amarus,* acerbiusculus.

COMPOSITA. Species Decocti Aperitivi.

CHELIDONIUM MAJUS. L.

Chelidonium Majus. Ph. Gross Schellkraut. Celdonya, nebeský dar, raupowé korenj, wlašskawičnje wětſſj.

Chelidonium. Cor. 4 — petala. Cal. 2 — phyllus. Silqua 1 — locularis, linearis.

C. Majus. Pedunculis umbellatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. (Herba raro;)

FORMA. *Radix rec. cylindrica, descendens,* palmaris fibrillosa, subramosa, superne bifida, extus rubicunda, pelliculis nigricantibus, emortuis, laxe tecta; parenchymate subcarnoso, luteo; transversaliter secto lactescente, centro medullari orbiculato, circumdato disco corticali. *Caules* plures ex una radice, erecti, subtetragoni, scabridi, minutim pubescentes, inferne simplices, nudi, superne ramoso — dichotomi, foliosi. *Rami* divaricati, teretiusculi, subangulati, pubescentes. *Folia* pinnata, supra glabra subtus villoſa; foliolis suboppositis, petiolatis, ovatis,

ob.

obtusis, venosis, lobatis : sinibus obtuso — rotundatis ; lobis obtusis, obtuse serratis ; terminali foliolo obovato, e pinnis confluentibus nato, apice trifido ; radicali longius petiolata ; superiora sessilia, ramis opposita. Petoli ad axillas pubescentes, subtus convexi, supra concavi, basi axilla lanati. Axille nodosæ.

PROPRIETAS. *Radic. rec. Odor graviusculus.*
Sapor amarus, acris ; masticata salivam croceo tingit ; Herba Odor subgraviusculus ; Sapor leniter amaricans, acris. Tota planta, utpote rami, caules, petioli & foliorum nervi, lactescens ; latte croceo, quod, cuti s. papyro illinitum, maculas croceas facit, aqua facile eluendas ; vasculo exceptum hoc lac, siccescit, & abit in massam penitus fusco — nigricantem, intensius amaram. Sicc. planta magis amara, minus acris, ingrata, faucibus inhæret.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. Ext. Emplastrum Diabotanon.

PAPAVER SOMNIFERUM. L. (*a*)

Papaver Album. Ph. Weißer Mohn. Bílá máka.

Papaver. Cor. 4 — petala. *Cal. 2* — phyllus. *Caps.*

I — locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.

P. Somniferum. Calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis.

Hortense. Annum.

Off.

a) Sunt, qui opium ex Papavere orientali derivant.

Off. Capsulæ (Capita vulgo) Semen. Herba recens.

FORMA. *Caulis* rec. subbipedalis, erectus, teres, minutim angulatus, glaber, rore glauco obductus, ramosus. *Rami* alterni, erecti, teretes, vix angulati. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, spithamea, ovato — oblonga, obtusa, margine incisa s. grosse crennata, utrinque glabra, supra viridescens, subtus glauca, venosa, venulis reticulata. *Pedunc.* terminalis in ramis, subsolitarii, elongati, erecti, hispidi, ceterum nudi, uniflori. *Capsula* (l. caput) globosa, magnitudine fere Pruni fructus, glabra, rore glauco — cærulescente tincta coronata stigmate persistente, subdecemlocularis, apice substigmata, decemfariam hians: lacinii totidem ovato — obtusis, subrevolutis; dissepimentis utrinque planis, dorso incrassatis, undique rugosis, ad centrum capsulae non attingentibus. *Semina* millena, parviuscula, fusca, subrotundo — reniformia, punctis excavatis undique rugosa, colore albo. *Opium* crudum: *Gummi* — *resina* in frustis majoribus, ponderosa, æqualis, pura, extus rufo fusca, subsplendens, fractura intus viridescens, vel nigricans, pro gradu siccitatis, opaca plastica, digitis subadherens.

PROPRIETAS. *Herba* rec. Odor debiliter narcoticus, opio congruens. *Folia* odore sunt debiliora; rami fortiore; pedunculi vero apices &

cap-

capsulæ juniores adhuc validiore. *Sapor* herbae-
ceus. Peduncularum apices & capsulæ juniores,
dum sauciuntur, e corticali parte *lac* stillat al-
bum, cremori lactis simillimum, caulis tenerior,
rami & costæ atque nervi foliorum lac fundunt
dilutius. Capita ætate proiectiora parum lactef-
cunt, matura autem nihil. Hoc lac (ex nostro
papavere nigro), collectum, & vasculis immis-
sum validius spirat Opium, dum recens; in aere
siccatum abit in gummi — resinam rubicundam,
subpellucidam, quæ inter digitos tractata plasti-
ca deprehenditur, digitis subadhæret, odore
Opii remissiore in candelæ flamma accensa fla-
grat: flamma vivida, lucida, fuliginosa, odore non
narcotico relatio carbone atro, subsplendente.
Opii orientalis Odor validus *Papaveris*; *Sapor*
nauseosus, amaricans, acris, calidiusculus. *Ignis*,
flamma accensum opium flagrat: flamma vivida,
odore minime narcotico.

PRÆPARATA. Oleum pressum ex Seminibus.

Opium.

Syrupus Papaveris albi sive e Mecanio.

COMPOSITA. *Herb.* Unguentum Populeum,

Capit. Syrupus de Siliquis sive Dia-
codii Crocatus, & Liquidus; hic pro Electua-
rio Infantum seu Requie Nicolai & Pilulis Bal-
samicis Mortonii.

OI. Balsamum Sulphuris Rulandi.

Op.

Opi. Electuarium Diascordii. — Elect.
seu Theriaca Andromachi.

Essentia Anodyna, seu Laudanum li-
quidum Sydenhami.

Extractum Opii, hoc pro Tinctura
Anodina.

Pilulae de Cynoglosso. — de Styrace,
Pulvis Anodinus.

Syrup. Pilulae de Styrace.

PAPAVER RHOEAS. L.

Papaver Eraticum. Rhoeas. Ph. Klapperrose,
Røthe Kornblume. Planý neb wléj mak.

P. Rheeas. Capsulis glabris globosis, caule pilo-
so multifloro, foliis pinnatifidis incisis.

Indigenum. Annuum.

Off. Flores.

FORMA. Flores rec. longius pedunculati. CAL.
Perianth. diphylum: foliolis æqualibus, ovatis,
obtusis, concavis, conniventibus, extus adspersis
tuberculis feriseris, scabro — hispidis, corol-
lam nondum eruptam includentibus, sub erup-
tione corollæ deciduis. COR. phœnica, pulcher-
rima, sèpius plena. Petala lemiorbiculata, obtuso —
rotundata, fessilia, basi venosa, erecto — pa-
tentia. STAM. purpurascens. Filam. plurima,
fusculata, corolla longe breviora, erecta. ANTH.
lineares, truncatæ, utrinque planæ, purpureæ,
fulco longitudinali luteo. PIST. Germen. ovato —
glo-

globosum, glabrum, longitudine staminum, glaucum. *Stellus* nullus. *Stigma* hemisphaericum, sessile, latitudine germinis, undique striatum : striis radicantibus elevatis, purpureis, minutim pubescentibus.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor satis fortis, papaverinas; sapor debilis, vix ullus; *magistata* petala tenera, lubrica, mucilaginosa : saliva violacea. *Siccata* flores purpurascentes, inodori fere.

PRÆPARATA. Aqua.

Conserva.

Syrpus.

COMPOSITA. *Flor.* Infusum seu Tinctura Papaveris Erratici.

Species Decocti Pectoralis.

Aq. Infusum seu Tinctura Papaveris Erratici.

Conserv. Electuarium Infantum, seu Requies Nicolai, — Pectorale.

CAMBOGIA GUTTA. L.

Gummi Gutta. Ph. *Gummi* gutt. *Gummigutta*.

Cambogia. Cor. 4 — petala. Cal. 4 — phyllos.

Pomum 8 — loculare. Sem. solitaria.

Exotica. Arbor.

Off. Succus inspissatus gummoso — resinofus.

FORMA. *Gummi* — *resina* in massa solida, duriuscula, homogenea, purissima, croceo — rubra,

bra, opaca, levissima, nitida, fragilis; fracturis planis.

PROPRIETAS. *Odor nullus. Sapor vix ullus. Masticatum primum friabile, dentibus dein adhæret, tum solvit, & sensationem siccatis cunctis fauicibus imprimit, salivam tingit colore aureo luteo.*

BIXA ORLEANNA. L.

Orlean. Ph. Orlean. Orlean.

Bixa. Cor. 10 — petala. Cal. 5 — dentatus. Caps. hispida, 2 — valvis.

Exotica. Arbor.

Off. Fœcula croceo — tincta, orta ex pulpa semen circumdante.

FORMA. *Massa coccinea in frustis majoribus, solida, æqualis pura, fragiliuscula, subinquinans.*

PROPRIETAS. *Odor ingratus, etiam recenter parata orleanæ, cum tota arbor ingratum spargat odorem; ea vero, quæ apud nos venditur, saepe Tabacum redolet, forte a præparacione. Sapor debilis, obscure salitus; masticata in ore solubilis, salivam coccineo colore tingens.*

COMPOSITA. Unguentum de Uvis sive ad Labia.

TILIA EUROPEA. L.

Tilia. Ph. Linde, Lindenbaum, Lipa.

Tilia. Cor. 5 — petala. Cal. 5 — paritus. Baccæ sicca globosa, 5 — locularis, 5 — valvis, basi dehiscens. T.

T. Europea. Floribus nectario destitutis.

Indigena, Arbor

Off. Flores.

FORMA. *Corymb.* florum simplices, axillares e foliis, prope gemmam futuri anni, longius pedunculati, patentes, solitarii, glabri, subsexfiori. *Pedunculi* proprii versus basim cingulo notati, e punctis circiter tribus constante. *Bractea* linearis, solitaria, membranacea, albido — subviridescens, glabra, venulis reticulata, apice obtuso rotundata, inferne attenuata, basi saepe dimidiata, palmaris, longitudine corymbi, a medio inferne pedunculo adnata, superne libera. CAL. *Perianth.* 1 — phylum, 5 — partitum: lacciniis albidis ovato — lanceolatis, acutis, concavis, extus glabris, intus villosis, reflexo — patentibus. COR. *Petala* 5, oblongo — cuneiformia, obtusa, inferne in ungues lineares breves attenuata, calyce paulo longiora, patentissima, concaviuscula, albida. STAM. *Filam.* plurima subulata, albida, corolla longiora, erecta. ANTH. lutea, cordatae. PISTIL. *Germen* superum, subrotundum, tomentosum. *Stylus* cylindricus, albus, staminibus paulo brevior. *Stigma* subcapitato — truncatum, rugosum.

PROPRIETAS. *Florum rec.* Odor siveolens, præcipue tempore vespertino, in flores Naphæ incidens. Sapor debilis, subglutinosus; masticati

M

flo-

flores recentes lubrici sentiuntur, mucilaginosi.
Petala, peracta anthesi, rubescunt; decerpta etiam
rubescunt inter siccandum. Siccati flores fere
inodori, sapore pariter subglutinoso.

PRÆPARATA. Aqua florum.

COMPOSITA. Flor. Aqua seu Balsamum
Embrionis.

Aq. Aqua Perlarum.

THEE BOHEA. L.

Thee Orientale. Ph. Orientalischer Thee. Ori-
gentálſký Thee.

Thee. Cor. 6 — l. 9. — petala. Cal. 5 — l. 6 —
phyllus. Caps. 3 — cossa.

T. Bobea. Floribus hexapetalis.

Exoticum. Arbuscula,

Off. Folia.

FORMA. Folia subadulta, alterna, breviter
petiolata, ovali — oblonga, obtusa, pollicaria vel
ultra, venosa, margine serrata: serraturis accu-
tis, fuscis, adpressiusculis; utrinque glabra, saepe
subtus pubescentia: pilis raris, tenuibus.

PROPRIETAS. Sicc. Odor gratus. Sapor ama-
ricans, acerbus, non ingratus tamen. Folia echi-
na ad nos apportantur convoluta, siccissima, ful-
ca, rarissime integra, saepe extremitatibus difra-
ctis.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS. L.

Caryophyllus. Ph. Červená gelein. Krámský
hřebíček.

Anthophylli. Ph. Mutternägelein. Matka hē-
bičkowá.

Caryophyllum. Cor. 4 — petala. Cal. 4 — phyllus,
duplicatus. Bacca 1 — sperma, infera.

Exoticus. Arbuscula.

Off. Flos immaturus. Fructus.

FORMA. *Caryophyll. sicc.* Flores inexplicati, ferruginei, unguiculares vel ultra, germine infero cylindrico, teretiusculo, subtetragono, minutim rugoso, terminato *Peryantheo* fructus 4 — partito : laciniis lanceolatis, acutis, concavis, erectis, germine multum brevioribus. Perianthium floris & *Corolla*, nondum explicata, in sphærulam imbricata, longitudine calycis fructus. STAM. plura, intra corollam latentia.

Fructus (*Anthophylli*) capsula ovali — cylindrica, apice umbilicata : calycis laciniis persistentibus; minutim rugosa, magnitudine glandis quercentarum, unilocularis, monosperma, continens *Nucleum* magnitudine fere & figura capsulae, fuscum, bipartibilem : futura anfractuosa ; siccatum solidum, durissimum.

PROPRIETAS. *Caryophyll.* Odor fragrans validus, aromaticus, svavis. Sapor. aromaticus, fortis, calidus, acriusculus, subamaricans ; masticati fauces linguamque calefaciunt, halitu fragrantissimo. *Antophyll.* Odor debilis caryophyllicrum ; sapor substypticus, aromatico — caryophylleus, debilior.

m 2

PRÆ-

PRÆPARATA. Oleum Caryophyllorum de-
stillatum.

COMPOSITA. Fl. Acetum Antisepticum.

Aqua seu Balsamum Embryonis. —

Melissæ composita.

Elixirium Vitrioli.

Essentia Carminativa.

Pilulæ de Cynoglosso.

Pulvis dentifricius albus. — Specie-
rum Aromaticarum pro Morsulis
Imperatoris. — Specierum pro Cu-
cupha. — Sternutatorius Variega-
tus, & Viridis. — Vitæ.

Spiritus Aromaticus.

Tinctura Laccæ aromatica.

Ol. Balsamum Apoplecticum. — Caryo-
phyllorum.

Emplastrum de Labdano.

Essentia, sive Balsamum Vitæ Hoff-
manni.

Liquor seu Sal volatile oleosum.

CISTUS RETICULUS. L.

Ladanum. Ph. Gummiladan. Ladanum.

Cistus. Cor. 5 — petala, *Cal.* 5 — phyllus: folio-
lis duobus minoribus.

C. Creticus. Arborescens extypulatus foliis spa-
tulato — ovatis petiolatis enerviis scabris, ca-
lycinis lanceolatis.

Exoticus, Arbor.

Off.

Off. Resina.

FORMA. *Resina* in massa subcylindrica, crassitie pollicis, sape in spiram torta, solida, dura, sublapidea, ponderosa, homogena, sicca, opaca, fusca, in frusta secta & luci exposita subsplendens atomis micantibus, sparsis.

PROPRIETAS. *Odor balsamicus, gratus; Sapor debilis, balsamicus; masticata hæc resina inter dentes dura, friabilis, comminuitur, arenulosa sentitur non solvitur.*

COMPOSITA. Candelæ Fumales.

Emplastrum de Labdano.

Pulvis Fumalis ordinarius.

O R D O D I G Y N I A.

POEONIA OFFICINALIS. L.

Poeonia. Ph. Pfingstroze, Peonie. Piwonka.

Poeonia. Cal. 5 — phyllus. Petala 5. Stylo. Caps, polyspermae.

P. Officinalis. Foliolis oblongis.

Hortensis. Perennis.

Off. Radix. Flos. (Semina raro.)

FORMA. *Radix rec. majuscula, informis, subramosa, breviuscula, extus rubra, parencrema-*
m 3 te

te incarnato. striis radiantibus; tuberosa: tuberibus ex radice excurrentibus, peduncularis, fusiformibus, palmaribus vel ultra, saepe spathulatis, simplicibus vel proliferis, saepe maniliformibus, extus dilute rubicundis, laeviusculis, parenchymate albo, carnosum, solidum. Flores pleni. Bracteae 2, foliaceae, calyci subiectae & approximatae. CAL. Perianth. 5 — phyllum: foliolis ovatis, obtusis, nervosis, minutim villosis, concavis, patentibus, inaequalibus. COROLLA plena, hemisphaerica, magnitudine pugni, kermesina: petalis sessilibus, numerosis, cuneiformibus, obtusis, subincisis. STAM. in petala mutata. PIST. Germinalia 2 vel 3, ovato — oblonga, tomentosa — sericea, alba, angulata. Styli nulli. Stigm. lanceolata, compressa, subcarnosa, kermesina. Semina ovata, magnagine seminis Pisii, cineta cortice nigro — fusco, nitido; parenchymate cotyledoneo, solidum, extus villosum, post sectionem transversalem notato puncto centrali.

PROPRIETAS. Radicis rec. Odor gravis, narcoticus, floribus congruens; Sapor acrisculus; tuberum rec. Odor fortis, fere Raphani, sed simul graviusculus, hircino — narcoticus, cum floribus conveniens. Sapor dulcescens, acris instar Raphani: acrimonia fugaci. Sub refectione tuberum rec. in taleolas, culter corripitur, uti sollet ex refectionis malis citreis. Tubera cocta mollescunt,

cunt, masticata tenera, sed simul firmiuscula, odore alimentari, aliquantum tamen hircino, sapore dulcescente, ex Nasturcio participante. *Florum rec. Odor* narcoticus; *Sapor* narcoticus, americans; *masticati* teneri, saliva rubro — violacea.

PRÆPARATA. Syrupus.

COMPOSITA. *Rad. Aqua Embryonis.* — *Hysterica Fœtida.*

Pulvis Marchionis. — ad Tussim.

Flor. Pulvis Sternutatorius variegatus.

* DELPHINIUM CONSOLID A. L.

Calcatripa. Ph. Kittersporn. Královský sváleček, rytířská ostruha, černohlávek.

Delphinium. Cal. o. Petala 5. *Nectarium* bifidum, postice cornutum. *Siliquæ* 3. f. 1.

D. Consolida. *Nectarii monophyllis,* caule subdiviso.

Indigenum, Annum.

Off. Flores.

FORMA. CAULIS nullus. *Corolla* violacea.

Petala 5, ovata, acutiuscula, patentia, æqualia, subtus minutim pubescentia, linea longitudinali; supremum basi productum in cornu filiforme, retum, obtusum, cinerascens, patens. *Nectarium* monophyllum, dilutius violaceum, concavum, compressiusculum, antice margine utrinque auriculato, rotundatum, apice erectum, obtusum, bifidum, fauce striata, basi cornutum : cornu pe-

tali

tali supremi cornu intruso. STAM. plurima, alba, inferne plana, ciliata, superne subulata, longitudo nectarii, coniventia, erecta. Antheræ luteæ, subrotundæ, erectæ, obtusæ, compressæ, didymæ, margine pubescentes. PIST. Germen. cylindricum, glabrum, viridescens. Stylus cylindricus, albus, staminibus brevior. Stygma obtusum.

PROPRIETAS. Rec. Odor debilis, aphrodisiacus. Sapor amarus.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius variegatus.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. L.

Staphisagria. Ph. Steffenskörner, Laussaamen.

Wsiwec, plané wjno, bleßnje.

D. Staphisagria. Nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis : lobis obtusis.

Indigeno — Biennie.

Off. Semen.

FORMA. Semina majuscula, angulata, tetragona, saxe trigona, basi truncata, apice acutiuscula, incurvata, dorso plano — convexa, antice carinata, undique rugosa punctis excavatis ; parenchymate constante ex nucleo albido.

PROPRIETAS. Sicc. Odor fœtidus ; Sapor intense amarus, acris, nauseosus, diu inhærens ; masticata fauces rodunt.

COMPOSITA. Unguentum ad Phtiriasim, seu contra pediculos. Aco-

A CONITUM NAPELLUS. L. (a)

Napellus. Ph. Eisenhüttel, Bürgerig (b) Sfas
Iomunek.

Aconitum. Cal. o. Petala 5: supremo fornicato.

Nectaria 2, pedunculata, recurva. Siliquæ 3. f. 5.

A. Napellus. Foliorum lacciiniis linearibus superne latoribus, linea exaratis.

Hortense. Perenne.

Off. Herba recens.

FORMA. Rec. *Caules plures ex una radice, tripedales, vel ultra, erecti, teretiusculi, subangulati: angulis solitariis, obsoletis, e dorso petioli decurrentibus, inferne glabri, superne minutim pubescentes, simplices. Folia alterna, petiolata, utrinque glabra, supra obscure viridia, lineata, subtus pallidiora, circumscriptione rotunda, 5 — partita: lobis cuneiformibus, bitrifidis, incisis, laciiniis mucronatis. Petioli glabri, subtus teretes, supra concavi. Racemus terminalis, elongatus, erectus, inferne compositus, foliosus, floribus pedunculatis, erectis.*

PROPRIETAS. Recent. *Odor fortis, herbaeus. Sapor herbaceus.*

PRÆPARATA. Extractum.

NI-

a) Etiam alia species flore cœruleo promiscue adhibentur.

b) Ita incolis montium Kreonostorum vulgo Giganteorum, cum caprae eo devorato quasi strangulentur.

NIGELLA SATIVA. L.

Nigella. Ph. Schwarzer Kummel, Gretel in der Staude. *Czerny* neb zahradn^í kmjn.

Nigella. Cal. o. Petala 5. Nectar. 5, trifida, intra corollam. Caps. 5, connexæ.

N. Sativa. Pistillis quinis, capsulis maricatis subrotundis, foliis subpilosis.

Exotica. Annuæ.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* trigona, compressissimula, apice obtusa, basi obliqua, undique rugoso — scabra, nigra.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans; *Sapor* aromaticus in Sassafras incidens.

COMPOSITA. Pulvis contra Vermes, ex hoc Trochisci contra Vermes.

O R D O.

P O L Y G Y N I A.

I

ILLICIUM ANNISUM. L.

Annisum Stellatum. Ph. Stermaneis. Badian.

Illicium. Cal. 6 — phyllus. Petala. 27. Caps. plures in orbem digestæ, bivalves, 1 — spermæ.

I. Annisum. Floribus flavescensibus.

Exoticum. Arbor.

Off.

Off. Fructus.

FORMA. *Fructus sicc.* pollicaris, infra rugosus, supra glaber, 8 — partitus: *Capsulis stellae* instar in orbem dispositis, ovatis, compressis, rigidis, duriusculis; fragilibus, unilocularibus, superne hiantibus, monospermis. *Semina* majuscula, ovata, compressissima, utrinque obtusa, hilo in apice, dorso convexa, antice carinata, undique nitida, duriuscula, fragilia; *nucleo* cotyledoneo, sordide albo.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Capsulae*: *Odor* Anisi, fortis; *Sapor* Anisi, dulcescens, gratus, *Seminum* cortex anisatus, capsulis debilior. *Nucleus* oleofus, odore & sapore valido Anisi; *masticatus* pinguisculus.

PRÆPARATA. Essentia.

COMPOSITA. Infusum, sive Aqua laxativa.

Hydromel Infantum.

Syrupus Mannatus.

* ANEMONE HEPATICA. L.

Hepatica nobilis, Ph. Edel-Lebertraut. Götternjē.

Anemone. Cal. o. Petala 6 — 9. Sem. plura.

A. Hepatica. Foliis trilobis integerrimis.

Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Folia* radicalia, annotina, petiolata, cordato — trilobata, utrinque glabra, supra lucidiuscula,

diuscula, margine pilosa, pollicaria, magis lata quam longa: lobis ovatis, obtusis.

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor debilis.*
Planta recens masticata, acrimoniam levem prodit.

ANEMONE PRATESIS. L.

Pulsatilla nigricans. Ph. Schwärzliche Rüchen-schelle. Boniklec černý.

A. Pratensis. Pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis.

Indigeno Perennis.

Off. Herba. Flos.

FORMA. *Caulis* solitarius (vel etiam plures ex una radice) simplicissimus, erectus, dodrantalis, striatus, subangulatus, hirsutus, subnudus. *Folia* composita, subtus pilosa; laciiniis linearibus, acutis; radicalia bipinnata, longius petiolata; caulina sessilia, opposita, in medio caulis sita, magis hirsuta, *Pedunc.* terminalis, hirsutus, nudus, uniflorus. *Flor.* nutans. CAL. nullus. COR. campanulata, polypetala, sordide rubro violacea, extus hirsuta, intus glabra: petalis ova-to — oblongis, obtusis, venis pictis. STAM. *Filam.* plurima setacea, corolla breviora. ANTH. didymæ, erectæ, luteæ. PIST. *Germ.* plurima, subulata, albido — hirsuta. *Styli* setacei, erecti, purpurascentes, pubescentes, longitudine corollæ. *Stigmata* obtusa, subcapitata, fusca.

PRO-

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* vix ullus. *Sapor acris*, inhærens. *Masticata* fauces & linguam corrodit. *Siccat.* *Sapor* herbaceus, *masticata* tandem acris, acrimonia diu inhærente, etiamsi fauces aqua frigida eluantur.

PRÆPARATA. Aqua.

Extractum.

CLEMATIS ERECTA. L.

Flamula Jovis. Ph. Brennbraut. Plamýnek,
vryskeňsk.

Clematis. Cal. o. Petala 4. rarius 5. Sem. caudata.
C. Erecta. Foliis pinnatis: foliolis ovato — lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis, tetrapetalisque.

Indigena. Perennis.

Off. Folia. Flores.

FORMA. *Folia* opposita petiolata, pinnata: foliolis oppositis, ovato — lanceolatis, integerrimis, acutis, subbipollicularibus, supra glabris, subtus nervosis; grossius reticulatis, pube rara adspersis, subrectis. *Umbellæ* florum plures, terminales subfastigiatae, striatae, erectæ, glabriuscule, quarum universales vestitæ sunt involucro foliaceo: foliolis pinnatis seu simplicibus; partiales vero nudæ. CAL. nullus. COROLLA ochroleuca. Petala 5, linearis — cuneiformia, obtusa, vix semiunguicularia, minutim villosa, nervosa — venosa, patent — reflexa. STAM. Filam. plurima, sub-

subulata, erecta, corolla paulo breviora. *Ai-*
theræ lineares, utrinque canaliculatæ, erectæ.
 PIST. *Germina* plura, subrotunda, villosa. *Styli*
barbari, staminibus fere breviores, erecti. *Stig-*
mata cylindrica, glabra, obtusiuscula.

PROPRIETAS. *Sicc.* *herbæ*. Odor debilis; *Sa-*
por herbaceus, acriusculus, diu inhærens, *Re-*
cens acris; *Folia* recentia *masticata* fauces linguam-
 que rodunt, & diutius in ore retenta, fauces sub-
 inflammant.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. Ceratum pro Cereolis dige-
 stivis.

HELLEBORUS NIGER. L.

Helleborus niger. Ph. (a) Schwarze Nießwurz:
 zel. Ellebor černý, svateho ducha kořenj,
 černá čemeřice.

Helleborus. Cal. o. Petala 5 f. plura. *Nectararia* bi-
 labiata, tubulata. Caps. polysperma, erectius-
 cula.

H. Niger. Scapo subbifloro subnudo, foliis pe-
 datis.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Radix nigra — fusca, subcy-
 lindrica, subtorulosa, subramosa; undique obse-
 sa fibris filiformibus, nigris; pārencymatē albido.

PRO-

*) In nostris pharmacopoliis sub hoc titulo habentur radi-
 ces Adonis vernalis.

PROPRIETAS. Tota Radix (una cum fibris) acris, nauseosa, leviter amaricans, inhærens. *Re-*cens acrior, masticata linguam acrimoniam obstupe-facit. *Siccata* mitior, in pharmacopoliis diu affer-vata vix acris, nisi diutius masticata.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. *Rad.* Extractum Catholicum, hoc pro Pilulis Mercurialibus. — Panchimago-gum.

Emplastrum Diabotanon.

Oleum Colocynthidis compositum
vulgo Habacuccinum.

Extract. Pilulæ Anethinæ. — Balsami-
æ Stahlii.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

ORDO

G Y M N O S P E R M I A,

TEUCRÍUM CHAMÆPITYS. L.

Chamæpitys. Ph. Feldcypresse, Wilder Hanf,

Rwa, polnij cypris.

Tea.

*Teucrium. Corolle labium superius (nullum) ultra basim bipartitum, divaricatum ubi *stamina*.*

T. Chamæpitys. Foliis trifidis linearibus, integrerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso.

Indigenum. Annum.

Off. Herba.

FORMA. Caules plures ex una radice, eretici; saepe subprocumbentes, tetragoni, pilis albis hirsuti (in spontanea magis quam inculta) spithamei vel ultra, ramosi. Rami pauciores, oppositi, cauli conformes. Folia adgenicula opposita, sessilia, linearia, hirsuta (in culta subglabriuscula, exceptis summitatibus) pollicaria, in medio fissa, in 3 lacinias lineares, acutiusculas, foliis conformes; suprema congesta, erecta.

PROPRIETAS. Sicc. Odor fragrans, debilior, cephalicus; Sapor amarus, aromaticus, in Rosmarinum incidens.

COMPOSITA. Herb. tot. Pulvis Fumalis Arthriticus.

Flor. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

TEUCRIUM MARUM. L.

Marum verum. Ph. Schlagkräutlein. Voćicj ſorenj.

T. Marum. Foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis: subtus tomentosis, floribus, racemosis secundis.

Hor-

Hortense. Suffrutex.

Off. Folia.

FORMA. *Folia opposita, adgenicula, petiolata, ovata, acuta, integerrima, subcarnosa, supra viridia, vix pubescentia, subtus minutim tomentosa, vix semiunguicularia, persistentia.*

PROPRIETAS. *Sicc. Odor fragrans, cephalicus, fortis balsamicus bituminosus. Rec. fortior; Fricata folia nares stimulant, & sternutationem movent. Sapor intensius amarus, bituminoso — aromaticus.*

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi,

TEUCRIUM SCORDIUM. L.

Scordium. Ph. Lachtnoblauch, Wasserlauch.

Planý neb wodnj česnek.

T. *Scordium. Foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto.*

Hortense. Perenne,

Off. Herba.

FORMA. *Rec. culte: Caulis erectiusculus, tetragonus, spithameus, pubescens, ramosus. Rami alternatim oppositi, elongati, longitudine caulis, simplex cauli conformes. Folia opposita, sessilia, pollicaria, lineari — oblonga, obtusa, utrinque glabra, supra viridia, lineata, subtus glauca, nervis subpubescentia, margine undique grossius ferrata, patentia.*

N

PRO-

PROPRIETAS. *Sicc.* & *rec.* Odor alliato —
cephalicus, gravis; *Sapor amaricans*, odori con-
gruens, inhærens.

COMPOSITA. *Herb.* Electuarium Diascordij.
Spiritus Balsamicus vulgo Schäuerni-
nus.

Fol. Electuarium seu Theriaca Andro-
machi.

THEUCRIUM CHAMÆDRYS. L.

Chamædrys. Ph. Gamanderle. Ozanka menss.,
Famanderle.

T. Chamædrys. Foliis cuneiformi — ovatis inci-
sis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulis
procumbentibus subpilosis.

Indigenum, rarius hortense. Perenne.

Off. Herba.

FORMA, *Caulis* erectus, tetragonus, spitha-
mæus vel ultra, geniculatus, pubescens, ramosus.
Rami opperti, cauli conformes, subpurpurascen-
tes, erecti. *Folia* ad genicula, opposita, brevi-
ter petiolata, ovali — oblongiuscula, obtusa, in-
ferne abrupte angulata, utrinque pubescentia,
marginie inciso — crenata, semipollicaria, paten-
tia. *Foliola* tenera in axillis foliorum, utrinque
gemina, cuneiformia, ferrata.

PROPRIETAS. *Rec.* & *Sicc.* Odor leviter fra-
grans. *Sapor amarus.*

PRÆPARATA, Extractum.

Com-

COMPOSITA, Fol. Electuarium seu Theria-
ca Andromachi.

Extractum Americans, hoc pro Tin-
cura amaricante.

Extr. Liquor Visceralis.

SATUREJA HORTENSIS. L.

Satureja. Ph. Saturej. Satureye.

Satureja. Corolla laciniæ subæquales. Stamina
distantia.

S. Hortensis. Pedunculis bifloris.

Hortensis. Annua. Phar. Svec. Perennis. Bergio.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caulis dodrantalis, erectus,
subtetragonus, minutim pubescens purpureo —
viridescens, ramosus, diffusus. Rami brachiatim
oppositi, erecti. Folia opposita, subfessilia, vix
pubescentia, linearis — lanceolata, acutiuscula,
vix pollicaria, patentia, utrinque adspersa ato-
mis excavatis, subtus instructa punctis subrotundis,
majoribus sparsis, supra vero marginalibus,
longitudinaliter dispositis.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans, validus,
cephalicus; Saper aromaticus, calidus, vix ama-
ricans; Siccata planta odore & sapore fere for-
tior.

PRÆPARATA. Oleum destillatum? (a)

COMPOSITA. Ol. Balsamum Saxonicum.

n 2

Hys.

(a) Cum ingrediatur compositionem Balsami Saxonici,

HYSSOPUS OFFICINALIS. L.**Hyssopus. Ph. Hyssop. Ηζοπ.***Hyssopus. Cor. labium inferius lacinula intermedia crenata. Stam. recta distantia.**H. Officinalis. Spicis secundis, foliis lanceolatis, Hortensis. Suffrutex.***Off. Herba.**

FORMA. *Rec. Caulis tetragonus: angulis obsoletis; scabriusculus: pube minutissima; geniculatus, pedalis, erectus, ramosus. Rami alternatim oppositi, erecti, elongati, lateribus, alternatim oppositis superne canaliculati. Folia ad genicula alternatim opposita, subsessilia, ovalilanceolata, obtusa, utrinque punctata, subitus scabriuscula, margine minutissime ciliata, patentia, pollicaria. Axillæ foliorum foliolis onustæ.*

PROPRIETAS. *Sicc. & rec. Odor fragrans, graviusculus, non ingratus; Sapor calidiusculus, aromaticus, amaricans, subcamphoratus; herba recens masticata subsucculenta, tenerior, linguam faucesque calefacit in modum fere Camphoræ, verum debilius.*

PRÆPARATA. Fol. Aqua.*Herb. Syrupus.***COMPOSITA. Herb. Aqua Vulneraria cum aceto & vino.***Syrup. Electuarium Pectorale.*

NE-

NEPETA CATARIA. L.

Nepeta. Ph. Ráthenmünze. Poleg, nátkowé
kořenj, marulka polnjs.

Nepeta. Corolla labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. Stamina approximata.

N. Cataria. Floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis rec. erectus, geniculatus, villosus, cinereus, tetragonus; lateribus oppositis plano — canaliculatis, angulis obtusis; ramosus, pedalis vel ultra. Rami alternatim oppositi, erecti, cauli conformes. Folia ad genicula, opposita, petiolata, cordata, supra viridia, pubescens, subtus villosa, cinerea, bipinnicaria, dentato-ferrata, patentia. Petioli foliis breviores, teretes villosi.*

PROPRIETAS. *Recent. Odor fragrans, in Melissam citrinam incidens. Sapor foliorum aromaticus, fortis, calidus, fere Melissæ citrinæ, sed longe calidior.*

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius viridis.

Species Cephalicæ.

LAVANDULA SPICA. L.

Lavandula. Spica. Ph. Lavendel. Lawendule.

n 3

La

Lavandula. Cal. ovatus, subdentatus, bractea suffultus. Corolla resupina. Stamina intra tubum.

L. Spica. Foliis lanceolatis integerrimis, spicis nullis.

Hortensis. Suffrutex.

Off. Folia. Flores.

FORMA. Rec. *Spica* florum terminalis, cylindrica, erecta, pedunculata, constructa e verticillis 10 — floris vel ultra, nudis, pubescentibus; quorum inferiores remoti; superiores proximiiores; floribus subsessilibus. Bracteæ oppositæ sessiles, cordatæ, nervoso — striatæ, longius acutæ, cinerascentes, calycibus breviores. CAL. Per.. tubulatum, cylindricum, undique striatum, cinereo tomentosum, superne cæruleum, truncatum; 4 — crenatum; lacinia unica, superiore, subrotunda, plana, concaviuscula, erecta. COR. violacea, infundibuliformis, pubescens. TUBUS striatus, calyce paullo longior, intus pilosus, extus minutim pubescens, LIMB. 5 — fidus, inæqualis. LAB. super. majus, obcordatum s. bifidum: lacinii obovatis, subcrenulatis; infer. 3 — fidum: lacinii ovatis, obtusis, patentibus, æquilibus. STAM. FIL. 4, intra tubum superne inserta; quorum 2 paullo longiora. ANTH. parviusculæ, peltatæ, subconiventes, subrotundæ, planæ, violaceæ, centro luteo, margine obsoletæ quadrilobæ, piloso — ciliatæ, os tubi obturantes. PIST. Germi-

4 — fidum

4 — fidum : labiis subrotundis, basi cinctum perihætio. *Styl.* cylindricus, longitudine staminum, vix pubescens. *Stigm.* 2, ovato — oblonga, obtusa.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sicc.* *Odor* fragrans, fortis cephalicus, svaoleolens. *Sapor* aromaticus, amaricans, calidiusculus, odori congruens. *Flores* recentes masticati leniter in ore calefaciunt.

PRÆPARATA. Acetum.

Aqua.

Oleum destillatum.

Oleum Spicæ. (a)

Spiritus.

COMPOSITA. *Flor.* Acetum Antisepticum.

Aqua seu Balsamum Embryonis. —

Vulneraria cum Vino.

Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Pilulæ Cochlearia.

Pulvis Fumalis Ordinarius. — Sternutatorius variegatus & viridis. —

Specierum pro Cucupha.

Species Cephalicæ.

Ol. dest. Balsamum Apoplecticum. —
Saxonicum.

Essentia sive Balsamum vita Hoffmanni.

Un-

(a) Hoc ut plurimum tantum est oleum Terebinthina exigua genuini Lavendulae olei quantitate odorum, juxta Geoffroy. In Actis Parisinis ; inde pretio tam exiguo.

Unguentum Rosatum album.

Ol. Spic. Oleum Colocynthidis compositum.

Unguentum ad Phthiriasim seu contra pediculos.

MENTHA CRISPA. L.

Mentha Crispa. Ph. (a) Krausmünze. Badeťavá máta, balsam zahradní.

Mentha. Cor. subæqualis, 4 — fida: lacinia latiore emarginata. Stamina erecta distantia.

M. Crispa. Spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus.

Hortensis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caules plures ex una radice, pedales vel ultra, erecti, 4 — goni, geniculati, pubescenti — scabridi, ramosi. Rami oppositi. Folia ad genicula, opposita, breviter petiolata, ovato subrotunda, acutiuscula, pollicaria, subtus pubescentia, supra glabriuscula, rugosa, margine inciso — ferrata, ferraturis minutim ciliatis, erectis crispa. Capitulum terminale oblongum s. ovatum, obtusum, conflatum e verticillis subsessilibus, subapproximatis; inferiore magis remoto, pedunculato; floribus brevius pedunculatis.

PROPRIETAS. Rec. & sicc. Odor fragrans, fortis, spirituosus; Sapor calidus, aromaticus;

(a) Persæpe adhibetur ejus loco hirsuta.

masticata in lingua & faucibus calefacit, fere ut spiritus vini. Exsiccatione intenditur odor & sapor.

PRÆPARATA, Aqua.

Conserva,

Oleum.

Spiritus.

Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua sive Balsamum Embryonis. — Carminativa Communis. — & Regia. — Hysterica Foetida.

Elixirium Vitrioli.

Unguentum Carminativum. — Nervinum.

Sumit. Acetum Antisepticum.

Ol. Balsamum Saxonicum.

Emplastrum de Labdano.

MENTHA AQUATICA. L.

Mentha rubra. Ph. Rothe Münze. Čerwenčí máta.

M. Aquatica. Flor. capitatis, fol. ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caules* pedales, cubitales, erecti, ramosi. *Folia* lata, ex ovatis acuminata, ferrata, subtus nervosa, lanuginosa, obscura; superne alias glabra, alias pariter lanuginosa. *Verticilli* in

in summo ramo pauci, unus alterve densus, & capitulum denique globosum ramum terminat.

PROPRIETAS. *Odor paludosus; sapor acris, aromaticus, amarus.*

COMPOSITA. *Pulvis Sternutatorius viridis,*

* *MENTHA PIPERITIS. L.*

Mentha Piperitis. Ph. Pfaffermünze. Peperowæ máta.

M. Piperitis. Spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. Hortensis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis spithameus, pedalis vel ultra, tetragonus: lateralibus 2 oppositis canaliculatis; hirsutus, gemiculatus: geniculis barbatis; superne ramosus: ramis inferioribus brevioribus. Folia opposita, brevius petiolata, ovato—oblonga, acutiuscula, acute serrata, ciliata, bipinnata, utrinque pubescentia, supra vero minus, molliuscula, subtus punctulis excavatis punctata, internodii longitudine, patentia; ramea rotundiora:*

PROPRIETAS. *Sicc. & rec. Odor fragrans, spirituosus, subcamphoratus; Sapor aromaticus, fervidus, camphoræ; masticata linguam & fauces valde calefacit, subsequente sensu frigidusculo. Recentis odor fere debilior, quam siccatae; sapor siccatae fortior.*

PRÆPARATA. *Aqua.*

Oleum destillatum.

Com-

COMPOSITA. *Aq. & Ol.* Rotulæ Menthæ
Piperitis.

MENTHA PULEGIUM. L.

Pulegium. Ph. Poter, Poteg.

M. Pulegium. Floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus.

Hortense. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis* spithameus, procumbens tetragonus, geniculatus, pubescens, ramosus. *Rami* alternatim oppositi, erecti, cauli conformes, simpliciusculi. *Folia* ad genicula, opposita, brevius petiolata, ovalia, obtusa, ferrata, glabra, supra lineata, subtus punctata, nervis minutim pubescentia, unguicularia, patentia.

PROPRIETAS. *Rec. & Sicc.* Odor fragrans, spirituosis, graviusculus. Sapor aromaticus, calidus; mastifata linguam faucesque calefacit, subcamphorata.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum. (a)

COMPOSITA. Aqua Carminativa, Regia & Communis.

Ol. Balsamum Saxonicum.

GLECOMA HEDERACEA. L.,

Hedera Terrestris. Ph. Gundermann, Gundel-reben. Poponec. Gle-

(a) Ob compositionem Balsami Saxonicæ.

Glecoma. Antherarum singulum par in formam crucis conivens. *Cal.* 5 — fidus.

G. Hederacea. Foliis reniformibus crenatis. Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. *Caulis* tetragonus, repens, spithameus, pubescens scabriusculus, ramosus. *Rami* oppositi, erecti, cauli conformes. *Folia* alternatim opposita, petiolata, reniformia, crenata, ciliata, rugosa, supra scabriuscula, subtus minutim punctata, nervis pubescentia, unguicularia, erecto — patentia. *Petoli* teretiusculi, scabri, supra sulco longitudinali. *Stipulae* nullæ, sed margo utrinque inter petiolos, obtusus, ciliatus.

PROPRIETAS. Rec. *Odor* debilior fragrans, graviusculus, non ingratus. *Sapor* leniter aromaticus, odori congruens, leniter amaricans.

PRÆPARATA. Conserva.

COMPOSITA. Herb. Species Decociti Pectoralis. — pro Thee Germanico.

Conser. Electuarium Pectorale.

* **LAMIUM ALBUM.** L.

Lamium. Urtica Mortua. Ph. Taube Nessel. Glu-
chá, metwá, smradlavá kopřívá.

Lamium. Corolla labium sup. integrum, forniciatum; lab. inf. 2 — lobum; faux utrinque margine dentata.

L. *Album.* Foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. In-

Indigenum, Annuum.

Off. Flores.

FORMA. *Verticilli* florum ad genicula cito-
citer 10 — flori, *Macula* purpurascens, obverse lu-
nulata, utrinque ad geniculum, variegata, verticil-
lum distinguens. *Flores* sessiles. **CAL.** *Periantb.*
tubulatum, 10 — angulatum, pubescens, basi ex-
tus violaceum, ore ampliato, 5 fido ; lacinis
lineari — subulatis, carinatis, patentibus, margi-
ne minutim ciliatis, carina hirsutis. **COR.** rin-
gens, alba. **Tubus** calyce longior, incurvus, pu-
bescens, superne gibbus. **Limbus** ringens. **Lab.**
super villosum, ciliatum, forniciatum, obovatum
concavum, retusum, nutans ; *infer.* ovatum, gla-
brum, bilobum, utrinque deflexum, basi notatum
lineis 3 longitudinalibus, lutescentibus, basi decus-
satis. **Faux** amplior, compressa, margine utrin-
que rotundato, instructo dente subulato, recto,
solitario. **STAM.** *Filam.* 4, subulata, alba, pube-
scens, sub labio superiori recondita, paralella ;
quorum 2 paullo breviora. **Anthæ.** oblongæ, ful-
cæ, dorso albo hirsutæ, erectæ. **PIST.** *Germ.* 4,
trigona, truncata, coniventia. **Styl.** subulatus,
albus, glaber, longitudine staminum, illisque pa-
rallelus. **Stigma** bifidum lacinis subulatis, acutis,

PROPRIETAS. *Rec.* Odor fortior, mucidus.

Sapor herbaceus ; *masticata* folia teneriuscula, sa-
liva viridi.

PE.

BETONICA OFFICINALIS. L.

Betonica. Ph. Béthonie. Bułwice.

Betonica. Cal. aristatus. Corollæ lab. sup. adscen-
dens, planiusculum; tubus cylindricus.

B. Officinalis. Spica interrupta, corollarum la-
bii lacinia intermedia emarginata.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caulis erectus, pedalis vel
ultra, tetragonous: angulis obtusis, lateribus pla-
nō canaliculatis, obsolete striatis, geniculatis;
hirto-scaber, simplex, superne s̄epe ramosus: ra-
mis oppositis, erectis, intermedio brevioribus.
Folia ad genicula, opposita, petiolata, cordato —
oblonga, obtusa, undique minutim puncta-
ta: punctis excavatis; utrinque pubescentia,
venoso — rugosa, margine dentato — ferrata:
ferraturis obtuso — rotundatis, ciliatis; summa
subfessilia, reflexa; Petioli pubescentes, subtus
rotundo carinati supra concavi. Spica terminalis,
subfoliosa, constructa e verticillis fessilibus, op-
positis, approximatis; quorum inferiores re-
motiores. Folia 2 opposita reflexa, caulinis si-
milia ad basim spicæ.

PROPRIETAS. Rec. Odor berbæ subamari-
cans, subnarcoticus, in odorem cimicis incidens;
Sapor foliorum ingratus, fatuus, sed simul cali-
diusculus, vix amaricans. Siccatæ herbæ odor gra-
vis, debilior; Sapor amaricans, ingratus;

MARRUBIUM VULGARE. L.

Marrubium album. Ph. Weißer Undorn. Ga-
blečný býlý.

*Marrubium. Cal. hypocrateriformis, rigidus, ro-
striatus. Corollæ lab. sup. bifidum, lineare,
rectum.*

M. Vulgare. Dentibus calycinis setaceis uncinatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis vel ultra,
tetragonus, villosus, sēpe albido — tomentosus,
ramosus. *Rami* oppositi, erecti, cauli conformes.
Folia ad genicula opp̄ita, petiolata, ovalia, sēpe
ovata, l. subrotunda, pollicaria patentia, rugosa,
pubescentia l. villosa, grossius crenata, obtusa.

PROPRIETAS. *Sicc.* & rec. *Odor* fragrans,
vinosus, gratus. *Sapor* amarus, inhærens.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca An-
dromachi.

ORIGANUM DICTAMNUS. L.

Dictamnus Creticus. Ph. Cretischer Diptam.

Bretský Dyptam.

*Origanum. Strobilus tetragonus, spicatus, caly-
ces colligens.*

*O. Dictamnus. Foliis inferioribus tomentosis,
spicis nutantibus.*

Exotico — Suffrutex.

Off. Folia.

For-

FORMA. *Folia* petiolata, suborbiculata, obtusa, nervis depresso lineata, punctis nigricantibus s. excavatis utrinque adspersa, tomentosa s. lanata, albida, unguicularia.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* fragrans, cephalicus, gratus; *Sapor* amaricans, aromaticus, calidus, odori congruens.

COMPOSITA. Electuarium Diaſcordii.

ORIGANUM VULGARE. L.

Origanum. Ph: Wohlgemuth. Dobrá mysl.

O. Vulgare. Spicis subrotundis panniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* pedalis, erectus, tetragonus, purpurascens, pubescens, ramosus. *Rami* oppositi, erecti, caule teneriores, in ceteris conformes; superiores longiores. *Folia* ad genicula opposita, petiolata, ovata, nervosa, semipollucaria, supra glabra, subtus minutim pubescentia, utrinque punctata, margine minutim ciliata, patentia.

PROPRIETAS. *Sicc.* & *rec.* *Odor* fragrans, graviusculus, non ingratus, fere Serpylli. *Sapor* aromaticus, in Mentham incidens, sed debilior.

PRÆPARATA. Oleum destillatum.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua Carminativa communis & Regia. — *Vulneraria* cum Vino,

Spe-

Species Céphalica.

Ol. Balsamum Saxonicum.

ORIGANUM MAJORANA. L.

Majorana. Ph. Majoran. Margran. Maryáns.
ka.

O. Majorana. Foliis ovalibus otusis, spicis sub-
rotundis compactis pubescentibus.

Hortensis. Annuæ, etiam fruticosa.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, spithameus vel ul-
tra, obsolete tetragonus, geniculatus, pubescen-
ti — villosus, inferne ramosus. *Rami* alternatim
oppositi, simplices, erecti, cauli conformes.
Folia ad genicula caulis & ramorum, opposita,
subsucculenta, petiolata, ovalia, obtusa, vix pol-
licaria, minutum villosa, obsolete punctata, li-
neata, margine obsolete repanda. *Axillæ* florum
onustæ foliolis quaternis. *Floralia* folia ad ra-
mos paniculæ atque ad capitula, opposita, sessi-
lia, ovalia, concava, pedunculo breviora.

PROPRIETAS. Rec. & Sicc. Odor fragrans,
fortis cephalicus, obscure graviusculus, gratus.
Sapor aromaticus, subamaricans, calidiusculus;
masticata folia recentia subsucculenta, molliuscula.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum. (a)

COMPOSITA. Herb. Emplastrum de Meliloto.

O

Pul-

a) Ob componenda Balsama!

Pulvis Specierum pro Cucupha.

Species Cephalicae.

Unguentum Majoranæ. — Nervinum.
Fol. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Pulvis Sternutatorius Variegatus, & Viridis.

Ol. Balsamum Apoplecticum. — Saxonicum.

Essentia sive Balsamum Vitæ Hoffmanni.

THYMUS SERPYLLUM. L.

Serpillum. Ph. Quendel, Rüttelfraut. Matejdausse.

*T*hymus. Calycis. bilabiati faux villis clausa.

T. Serpyllum. Floribus capitatis, caulis repentinibus, foliis planis obtusis basi ciliatis.

Indigenum. Suffrutex.

Off. Herba etiam recens.

FORMA. Rec. Caulis filiformis, teres, minutim pubescens, fusco — cinereus, inferne repens, superne procumbens, ramosus. Rami oppositi, adscendentes, tretragoni, albido — villosi; inferiores longiores, ramosi, superiores sensim breviores, simplices. Folia caulina vix ulla; ramea opposita, breviter petiolata, obovata, obtusa, utrinque punctata, lineas duas longa, inferne albo — ciliata, patentia.

PRO.

PROPRIETAS. Rec. & siccata. Odor fragrans, cephalicus, gratus. Sapor aromaticus, calidiusculus, subcamphoratus, subamaricans.

PRÆPARATA. Aqua.

Spiritus.

COMPOSITA. Aqua Vulneraria, cum Aceto.

Pulvis Sternutatorius viridis.

Species Cephalicæ.

Herb. rec. Unguentum Nervinum.

THYMUS VULGARIS. L.

Thymus. Ph. Thymian, Némischer Dwendel.

Welsches Küttel-Kraut. Wlaſtá nebo Kijm-ſta materj davška.

T. Vulgaris. Erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillo spicatis.

Hortensis. Suffruticoso — Annuus.

Off. Planta florida.

FORMA. Fru&iculus parvus, ramosissimus, Iphithamæus vel ultra, erectus. Rami oppositi, oblonge tetragoni, pubescentes; tenelli villosi. Folia opposita, petiolata, ovali — oblonga, obtusa, undique punctata, circiter 2 lineas longa, patentia, glabriuscula s. albida villosa. Flores subcapi-tati. Capitula terminalia, obtusa, foliosa, constan-tia e floribus pedicellatis. Calyces hirsuti, 5-fidi.

PROPRIETAS. Rec. & siccata. Odor fragrans, fortis, cephalicus, gratus; recentis syavor. Sapor aromaticus, calidus.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucu-
pha.

Species Cephalicæ.

MELISSA OFFICINALIS. L.

Melissa. Ph. Melisse. *Melissa, medunka.*

Melissa. *Calix* aridus, supra planiusculus; *labio* superiore subfastigato. *Corolla* lab. super. subfornicatum, 2 — fidum; lab. inf. lobo medio cordato.

M. Officinalis. Racemis axillaribus verticillatis; pedicellis simplicibus.

Hortensis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, tetragonus, geniculatus, dodrantalis vel ultra, minutim pubescens, inferne ramosus, diffusus. *Rami* alternatim oppositi, cauli conformes, ramosi, erecti. *Folia* alternatim opposita, petiolata, cordata, obtusa, grossius & obtuse serrata, rugosa, pollicaria, supra viridia, minutim pubescentia, punctis parvis elevatis scabriuscula, subtus glauca, punctis excavatis adspersa, patentia, superiora obovata, acutiuscula, pubescentia, superne ferrata, patenti — revoluta.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sicc.* *Odor* fragrans, fere flavedinis corticis citri. *Sapor* herbaceus, calidiusculus, citratus. *Herba* ante florescentiam lecta gratior.

PRÆ-

PRÆPARATA. Aqua Melissæ Simplex, &
Composita, sive Spiritus Carmelitarum.

Conserua.

COMPOSITA. Aqua sive Balsamum Embryonis.—Histerica fœtida.

Essentia Ambræ liquida.

Species pro Thee Germanico.

MELISSA CALAMINTHA. L.

Clamintha Montana. Ph. Bergmünze. Planá
máta, poleg, nátkové kočenj, marulka hor-
ní.

M. Calamintba. Pedunc. axillaribus dichotomis
longitudine foliorum.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus. *Folia* grandiora,
petiolata, ex ovatis.—acuminata, manifeste & acu-
te serrata. Flores in pedunculis ramosis ex alis
foliorum in majori parte plantæ, quam folia, bré-
vioribus: in, plerisque tamen ramis longioribus,
ut in laxam paniculam abeant. *Stipulae* similes.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* gratae aromati-
cus, menthæ adfinis.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua Vulneraria cum
Aceto, & Vino.

Species Cephalicæ resolventes.

Fol. Electuarium seu Theriaca Andro-
machi

OCYMUM BASILICUM. L. (α)**Basilicum. Ph. Bazillie. Bazylka.**

Ocymum. Calix labio superiore orbiculato; inferiore quadrisido. Corolla resupinata alterum labium 4 — fidum, alterum indivisum. Filamenta exteriora basi processum emittentia.
O. Basilicum. Foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis.

Hortense. Annum.**Oss. Herba.**

FORMA. Rec. *Caulis spithameus, erectus minutim pubescens, teres, ramosus, diffusus. Ramii alternatim oppositi, ramosi, erecti, cauli conformes. Folia subsucculenta, opposita, petiolata, ovata, acuta, glabra, subtus notata punctis excavatis, pollicaria vel ultra, integerrima, patentia. Petioles subtus convexi, supra canaliculati, foliis breviores.*

PROPRIETAS. Sicc. & rec. *Odor fragrans, gratus; recentis favorior. Sapor aromaticus, gratus, subanisatus. Masticata folia recentia subsucculenta, molliuscula.*

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius Viridis.

PRUNELLA VULGARIS. L.

Prunella. Ph. Braunelle. Černohláwek, swał-
nij mensji.

a) Hujus loco in officinis nostris potissimum occurrit Ocy-
 num gratissimum.

Prunella. Filamenta bifurca: altero apice antherifera. Stygma bifidum.

P. Vulgaris. Foliis omnibus ovato — oblongis ferratis petiolatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba florida.

FORMA. Rec. *Caulis* palmaris, ascendens, tetragonus: angulis oppositis planis, oppositis aliis canaliculatis; simpliciusculus, basi infima parce ramosus: ramis oppositis cauli similibus; inferne glaber, superne unguis pubescenti — scabridus. *Folia* alternatim opposita, petiolata, ovato — oblonga, acutiuscula, ferrata, utrinque scabriuscula, lineata patentia, pollicaria; summa lanceolata, subfessilia. *Petio*li supra canaliculati foliis breviores. Spicæ terminales, sessiles, ovato — cylindricæ, pollicares, truncatæ, e floribus verticillatis, breviter pedicellatis, & bracteis constantes. Verticilli 6 — flori. Pedicelli compresi — tetragni. Bracteæ oppositæ, cordatæ, latæ, planæ, membranaceæ, sessiles æquales, albidæ, striis viridescentibus parallelis pictæ, extus pubescentes, intus glabræ, ciliatæ, apice acutæ, singulos verticillos foventes. CAL. Perianth. tubulatum, bracteis longius, biangulatum, supra glabrum, trinerveum, subtus striatum, pubescens, angulis ciliatum, bilabiatum; labio super. depresso — plano, truncato, crenato, minutim trident.

dentato, margine utrinque reflexo, compresso;
infer. lanceolato, angustiori bifido; laciinis acuminatis. **COR.** cœrulea. *Tubus* calyce longior,
inferne albus, superne sensim ampliatus, cœrulea-
cens, striatus, *Limbus* cœruleus, ringens, bilabia-
tus. *Lab.* super. fornicatum, obtusum, erectum,
inferius patens, trifidum; laciinis ovatis obtuso —
rotundatis; exterioribus reflexis; inter media
patente, denticulata. **STAM.** sub labio superiori
recondita. *Filam.* 4, subulata, violacea; quorum
2 superiora breviora; 2 inferiora longiora, om-
nia terminata dente subulato, divaricato. **Anth.**
bilobæ; lobis divergentibus, subovatis; pedicel-
latæ: pedicello lateralí e filamento, sub, dente;
PIST. *Germ.* 4 — paritum, glabrum, obtusum,
basi cinctum perihætio. *Stylus* subulatus, viola-
ceus, staminibus paullo brevior. *Stigma* bifidum,
acutum.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* nullus, *Sapor* her-
baceus, amaricans; *masticata* folia subglutinosa.

COMPOSITA. Species Decociti pro Garga-
rismate ad stirngente.

O R D O

A N G I O S P E R M I A.

ANTIRRHINUM LINNARIA. L.

Linnaria. Ph. Leinkraut. Len Matky boží.

Antirrhinum. Cal. 5—phyllus. Corolla basis deorsum prominens, nectarifera, Caps. bilocularis.

A. *Linnaria*. Foliis lanceolato,—linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis.

Indigeno.—Biennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. *Caulis*, pedalis, erectus, teres, glaber, foliosus, obsolete striatus, superne ramosus. *Rami* sparsi, paniculati, erecti. *Folia* frequentia, sparsa, linearia, acuta, sessilia, pollicaria, glabra, superne integerrima, patentia.

PROPRIETAS. Rec. Odor foetidus fere Scrophulariæ; Sapor herbaceus, americanus. Sicc. odor fatuus, sapor americanus, fatuus.

PRÆPARATA. Unguentum Linnariæ.

SCROPHULARIA NODOSA. L.

Scrophularia. Ph. Braunwurzel. Swinský nebo říčnískový kořen, rozechodný, aneb prusťajský.

Scrophularia. Cal. 5—fidus. Cor. subglobosa, refupinata. Caps. 2—locularis.

S. Nodosa. Foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo,

Indigena. Perennis.

Off. Radix. (Herba raro.)

FOR.

FORMA. *Rec.* *Radix* albida, composita e tuberibus pluribus aggregatis, inæqualibus, sessili- bus, obliquis, conicis, sœpe ovatis, obsolete angu- latis, undique notatis tuberculis vel nodulis sparsis magnitudine nucis avellanæ, sœpe ovi colum- bini, parce fibrillosis: fibris filiformibus, palma- ribus, albis descendantibus. *Parencrema* albidum, transversaliter sectum æquale: centro medullari maximo; corticali parte tenui, concolore. *Cau- les* plures ex una radice, bipedales, erecti, sim- plices vel ramosi, fuscæ, variegati atomis palli- dioribus, glabri, lucidiusculi, tetragonii: angu- lis parviusculis, acutis. *Folia* opposita, petio- lata, internodiis paullo longiora, ovata, sœpe basi truncata, acutiuscula glabra, triplicaria vel ultra, nervosa, lineata, venulosa, rugosa, margi- ne serrato—dentata, sœpe inferne incisa, paten- tia. *Petiolæ* subtus convexi, compressiusculi, su- pra canaliculati, foliis breviores.

PROPRIETAS. *Recent.* *radic.* *Odor* fœtidus, in Raphanum & Pœoniam incidens; *Sapor* con- similis, amarus, acriusculus; *masticata* radix fir- ma, fragilis, instar Raphani comminuitur. *Folia.* *Odor* fœtidus; *Sapor* amarus, acriusculus, gra- viusculus. *Siccatae* radicis odor debilis, sapor lon- ge mitior quam in recente.

* **ACANTUS MOLLIS.** L.

Branca Ursi vera. Ph. Barentzæ, Bärnklaue.
Afant, nedwēdjs paznocht. Alan.

*A*canthus. *Cal.* bifol. bifidus. *Cor.* 1 — labiata, deflexa, 3 — fida. *Caps.* 2 locularis.

A. Mollis. Foliis sinuatis inermibus.

Indigeno — Perennis.

Off. Folia. (a)

FORMA. Rec. *Folia* petiolata, spithamea, oblonga, utrinque glabra, lucidiuscula, superne lobata, inferne pinnatifida: lobis oppositis, ovatis, obtusis s. acutiusculis, obtuse dentatis, margine minutim ciliatis. *Petiali* teretes, supra canaliculato — plani.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor debilis. Sapor glutinosus, herbaceus; masticata lubrica sentiuntur.

CLASSIS XV.

TETRADYNAZIA

ORDO

SILICULOSA.

T *HLASPI ARVENSE.* L.

a) Loco hujus habebantur semper in pharmacopoliis folia Helaelii Sphondillii, de quo jam olim conquæstus sibi Matthiolus, hodie autem Pharmacopei Pragenses omnes plantis Acanti mollis per Hortum Botanicum dixites sunt.

Tblaspi. Ph. Bauernsenf; Penszel, aneb sedl.,
ská horčice.

Tblaspi. *Silicula* emarginata, obcordata, polysperma:
valvulis navicularibus, marginato — catinatis,

T. Arvense. *Siliculis* orbiculatis, *foliis*, *oblongis*,
dentatis glabris.

Indigenum, Annuum.

Off. Semen.

FORMA. *Siliculae* orbiculatae, undique mar-
ginatae, utrinque compresso — planae apice ro-
tundatae, bifidae, albidæ, venulosæ, biloculares,
dissepimento transversali. *Semina* 6 vel 8 in sin-
gulo loculamento, pedicellata, subimbricata, ova-
lia, obtusa, compressissimæ, rubicundo — bru-
nea, lucidissima, undique striata: striis ovalibus
concentricis.

PROPRIETAS. *Odor & Sapor* alliacei.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca An-
dromachi.

COCHLEARIA OFFICINALIS. L.

Cochlearia. Ph. Löffelfraut. Lžjénſe.

Cochlearia. *Silicula* emarginata, turgida, scabra:
valvulis gibbis, obtusis.

C. Officinalis. *Foliis* radicalibus cordato — sub-
rotundis, *caulinis* oblongis subsinuatis.

Hortensis, Annua.

Off. Herba. (Semen raro.)

FOR-

FORMA. *Rec.* *Caulis* plures ex una radice, simplices, spithamei, eretti, 5—angulares, glabri. *Folia* alterna, glabra, succulenta; *radicalia* longius petiolata, cordata, obtusa, rotundata, subintegra vel angulata, unguicularia; *caulina* ova-to—oblonga, obtusa, dentata, quorum inferiora spatulata, superiora sessilia, amplexicaulia.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* subnasturcinus, debilior; *sapor* amarus, in Nasturtium incidens, acris, masticata acris sentitur in ore & faucibus, effectu subfugaci, saliva viridescente. *Siccata* folia amara, ingrata, vix acriuscula.

PRÆPARATA. *Aqua.*

Conservæ.

Spiritus.

Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* *Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.*

Aq. *Tinctura Laccæ.*

Conf. *Electuarium Antifebrile.*

⊕ COCHLEARIA ARMORACEA. L.

Armoracia. Raphanus rusticana. Ph. Kreen Meerrettig. Bñen.

C. Armoracea. Foliis radicalibus lanceolatis cre-natis, caulinis incisis,

Colitur. Perennis.

Off. Radix recens.

For.

FORMA. *Rec.* *Radix* filiformi — cylindrica, pedalis, crassitie pollicis vel ultra, saepe instruata nodulis lateralibus subrotundis, sparsis, remotis, fibras emittentibus, undique alba, extus laeviuscula, rugis transversalibus, subannularibus, remotis, apice punctis depresso notata. *Parenchyma* album, carnosum, firmum; post sectionem transversalem notatum annulo marginali tenui, concentrico; centro medullari conflato e punctis sparsis, subdiaphanis.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* fragrans, pungens, penetrans, oculos feriens. *Sapor* fervidus, acris dulcescens, saepe subamaricans. *Masticata* fauces & linguam pungit, & calefacit, tussim irritat narres ferit, oculos lachrymantes facit, effectu fuga-
ci. *Cotta* radix mitis, dulcescens, subodorata; *siccata* debilis odore & sapore.

O R D O.

S I L I Q U O S A.

F S ISYMBRUM NASTURTIUM. L. (a)
Nasturtium Aquaticum. Ph. Brunnenkresse. Kies-
ticha wodnjs neb votočnj. Si-

a) Juxta Bergium Cardamyc Pratenſs, quod etiam ne-
bis non raro substituitur.

Sisymbrium. Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis. *Calyx* patens. *Corolla* patens.

S. Nasturtium. Siliquis declinatis, foliis pinnatis & foliolis subcordatis.

Indigenum. Annum.

Off. Herba recens.

FORMA. *Caulis* rec. erectus, simplex, spithameus, teres, glaber. *Folia* alterna, subcarnosa, glabra, petiolata cum impari; inferiora circiter 6 — juga: foliolis subrotundis, angulatis, extimo paullo majori, cuneiformi, saepe lobato; superiora, circiter 4 — juga: foliolis linearibus, concavis acutiusculis, subcarinatis; petiolo communi linearie — concavo. *Racemus* terminalis, oblongus, pedunculatus, nudus, glaber.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor debilior; *Sapor* subamaricans, leviter acriusculus. *Caules* fortiores, acriores quam *folia*.

PRÆPARATA. Conserva.

* *ERYSIMUM ALLIARIA*. L.

Alliaria. Ph. Knoblauchkraute. Česneková bylina.

Erysimum. Siliqua columnaris, exakte tetraedra. *Calix* clausus.

E. Alliaria. Foliis cordatis,

Indigena. Biennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* rec. simplex, erectus, bipedalis

dalis, teres, obsolete striatus, inferne lanuginosus,
superne glaber: Rami pauci, alterni, in speci-
mine vegetiore. Folia alterna, petiolata, corda-
ta, venosa, subrugosa, glabra, venis subpubescen-
tia; inferiora longius petiolata, obtusa repanda;
superiora acuta, inæqualiter dentato ferrata.

PROPRIETAS. Rec. Odor (foliorum contuso-
rum) Cepæ oleraceæ; Sapor cepaceus, leniter
amaricans, subnasturtinus. Quo magis vegete
crescent plantæ, eo fortior odor cepaceus. Sic-
cata fere effœta.

CHEIRANTHUS CHEIRI. L.

Cheiri. Ph. Gelbe Biolen. Žlutá řiola.

Cheiranthus. Germen utrinque denticulo glan-
dulato. Cal. clausus: foliis duobus basi gib-
bis. Semina plana.

C. Cheiri. Folii lanceolatis acutis glabris, ramis
angulatis, caule fruticoso.

Hortense. Bienne, sëpe Subperenne.

Off. Flores.

FORMA. Rec. Pedunculi minutim pubescentes,
obsolete tetragoni, uniflori. CAL. Perianth.
tetraphyllum, pallide viridescens: foliolis linea-
ri — lanceolatis, obtusis; erectis, 2 oppositis paulo
altioribus, carinatis, apice compressis. COR.
cruciformis; petalis 4. obovatis, obtusis. STAM.
Fil. 6. subulata, longitudine calycis; quorum 2
exteriora opposita breviora. ANTH. lineares, acu-
tae,

tz, basi bisidæ, incumbenti erectæ. Nectarifera glandula utrinque ad stamina breviora. PIST. Germen cylindricum, obsolete tetragonum, Stylus brevis. Stigma obtusum, bisidum, patens, crassiusculum.

PROPRIETAS. Rec. *Odor siveolens; Sapor amaricans, in Nasturtium incidens, acriusculcus.*
Sicc. *Odor nullus; Sapor amaricans.*

COMPOSITA. Puvis Specierum pro Cucu-
pha.

BRASSICA NAPUS. L.

Napus. Ph. Steckrüben, Scherübel. Bolnßk.
Brassica. Cal. erectus, conivens. Sem. globosa.
Glandulæ inter stamina breviora & pistillum,
interque longiora & calycem.

B. *Napus. Radice caulescente fusiformi.*

Colitur Biennis.

Off. Semina.

FORMA. *Semen parvum, rotundum tubu-
fum semini Brasice simile.*

PROPRIETAS. *Odor subfragrans; Sapor acris
aromaticus.*

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca An-
dromachi.

BRASSICA RAPA. L.

Rapa alba. Ph. Weiße Rüben. Bslá rjpa.

B. *Rapa. Radice caulescente, orbiculari depressa
carnosa.*

P

Co-

Colitur. Biennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* orbiculata, latitudine palmæ vel ultra, utrinque depresso, læviuscula, subtus albicans, apice rugosa, incarnata vel purpurascens, pro ingenio soli, superne viridescens, basi radicans: trunculo cylindrico prodotto, descendente fibrilloso: fibrillisque capillaribus, dispositis in serie longitudinali opposita, per radicem ascendentem. *Parenyma* carnosum, firmum, album, post sectionem transversalem subæquale, notatum striis subspongiosis, radian-tibus, obsoletis; punctis subrotundis verlus peripheriam per series dispositis; corticali parte tenuiore.

PROPRIETAS. *Rec.* Oder subfragrans; *Sapor* congruens, dulcescenti subamaricæ; *masticata* molliuscula, subsuccosa, comminuitur, saliva non tincta.

BRASSICA ERUCA. L.

Eruca. Ph. Weisser Senf. *Bslá horčice.*

B. *Eruca.* Foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris.

Indigena. Annua.

Off. Semen. (a)

FORMA. *Semina* globosa, pallide subcitrina, glabra, magnitudine seminis Sinapis. PRO-

a) Mercatores nostri loco seminis Erucæ semen Sinapis exhibent.

PROPRIETAS. *Odor* graviusculus. *Sapor* minimum Sinapis, verum longe remissior.

SINAPIS NIGRA. L.

Sinapi. Ph. Schwarzer Senf. Horčice.

Sinapis. Cal. patens. Cor. ungues erecti. Glandula inter stamina breviora & pistillum, inter que longiora & calycem.

S. Nigra. Siliquis glabris racemo appressis.

Indigena. Annua.

FORMA. *Semina* parviuscula, subrotunda, fulvo — ferruginea, undique minutim rugosa.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* subamericans, calidus, acris, subfugax; *masticata* facile comminuantur, mordent & calent in lingua & fauibus; saliva subemulsiva.

PRÆPARATA. Farina? (a)

RAPHANUS SATIVUS. L.

Raphanus Niger. Ph. Rettig. Riekev černá.

Raphanus. Cal. clausus. *Siliqua* torosa, subarticulata, teres. *Glandulæ melliferae* 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem.

R. Sativus. Siliquis teretibus torosis bilocularibus.

Colitur. Biennis.

Off. Radix recens. (Semina raro.)

FORMA. rec. *Radix* globoſa s. cylindrica, alba, magnitudine ovi columbini vel supra, lăvis

p 2

infl.

(*) Cum ſepulture praescribatur

insima basi fibra filiformi, fibrillosa, descendente; parenchymate carnosio, succulento, fragiliusculo, albo; post sectionem transversalem centrali parte amplissima, radiato — stellata: radiis subdianaphanis; corticali parte firmiore.

PROPRIETAS. *rec.* Odor subfragrans; sapor calidiusculus, vix amaricans, acri; corticalis pars acrior; masticata non solvit, sed comminuitur succo aqueo, sapore acri, fugaci. *Cotta* fere insipida. *Siccata* absque odore est, & tantum non sine sapore.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

ORDO POLYANDRIA.

ALTHÆA OFFICINALIS. L.

Althæa. Ph. Eypisch. Wysoký řez.

Althæa. Cal. duplex: exterior 9 — fidus. Arilli plurimi, monospermi.

*A. Officinalis. Foliis simplicibus tomentosis.
Indigena. Perennis,*

Off.

Off. Radix. Herba. Flores.

FORMA. *Radix rec. majuscula, superne versus caulem ramosa: ramis pedalibus, descenditibus, teretibus, simplicibus, crassitie digitæ vel policis, extus cinereo — albida, subrugosa: rugis transversalibus. Parencrema subcarnosum, album; post sectionem transversalem striatum: striis radiantibus, albidiорibus, subobsoletis, a centro ad peripheriam undique spectantibus; centro medullari ampliore, notato annulo incarnato, subcrenato; corticali parte subcarnosa. Caules plures ex una radice, bipedales, erecti, teretes scabri, hirsuti, inferne rugosi, ramosi. Rami alterni erecti. Folia alterna, petiolata, patentia, cordato — subrotunda, utrinque villosa s. tomentosa, mollia, 5 — loba: lobis rotundatis, inæqualiter & grosse serratis; 5 — nervia, venosa. Petioli longitudine foliorum, semiteretes scabri, supra plano — canaliculati. Stipulae 2, lanceolatae, acutæ, oppositæ, ciliatae, pubescentes. Racemus terminalis, subcompositus, floribus pedunculatis, cernuis. Folia tenera loco bractearum lobata. Pedunculi teretes, tomentosi, uniflori. CAL. Perianth. exterius 1 — phillum, tomentosum, concavum, cinereum, venulis viridibus reticulatum, trifidum: sinibus exstantibus: laciniis ovatis, trifidis: lateralibus rotundatis; intermedia acuta, longius producta, interius 1 — phyl-*

rum, densius tomentosum, molle, campanulatum, intus glabrum, annulo elevato in medio calycis longitudine exterioris, 5 — fidum : lacciniis ovato — acutis, erectis. Cor. incarnata. Petala 5, calyce duplo longiora, unguiculata, obcordata, erecto patentia, striata, venis parallelis, apice ramosis ; biloba : lobis obtusis ; sinus profundo, rotundato ; unguibus brevibus, margine utrinque ciliato — barbato. STAM. Filam. plurima, monadelpha, corolla duplo breviora, alba ; columna cylindrica, tomentosa, e receptaculo corollæ surgens, filamentis superne liberis, glabris, inferne pilosis, undique patentibus. Aetheræ undique echinatae. PIST. Germen inferum respectu corollæ, sed superum respectu calycis, orbicularum, depresso, margine crasso, undique longitudinaliter striato. Stylus cylindricus, breviusculus. Stigmata plurima, subulata, staminibus breviora.

PROPRIETAS. Rec. & Sicc. Radic. Odor nullus ; Sapor subdulcescens ; masticata emollitur, lubrica & valde mucilaginosa sentitur. Herbae nempe foliorum & florum : Odor nullus ; sapor herbaceus ; inter masticandum mucilaginosum exhibet.

PRÆPARATA. Mucilago,

Pasta.

Syrupus.

Unguentum

Com.

COMPOSITA. *Rad.* Emplastrum Malacticum,
— de Meliloto.

Pulvis Infantum absorbens:

Species Decocti Althææ Fernelii, &
Vulgares.—Emollientes.—pro Gar-
garismate Emolliente.—Decocti Pe-
ctorales.

Tabulæ de Althææ.

Herb. Species Decocti Althææ Fernelii,
& Vulgares (*Ex his Syrupus Al-
thææ*) — Emollientes.—pro Garga-
rismate Emolliente.

Mucil. Emplastrum Diachylon Simplex.

ALCEA ROSEA. L.

Malva Arborea. Ph. Gartenpapeln, Schwarze
the Papeln. Zahradní neb Křížové řezy.

Alcea. Cal. duplex : exterior 6 — fidus. Arilli
plures monospermi.

A. Rosea. Foliis sinuato angulosis.

Hortensis. Biennis. (a)

Off. Flores.

FORMA. Rec. Racemus terminalis, floribus
magnis, brevius pedunculatis. CAL. Perianth.
exterius 1 — phylum, tomentosum, hirtum : pi-
lis rigidiusculis, palmatis ; profunde 6 — fidum,
fæpe subnoveum fidum : laciniis ovato — lanceo-
latis, acutis, striatis, laxiusculis ; interius 1 — phyl-
lum,

(a) Nobis petiolum perennis.

lum, pariter tomentoso — hirsutum, striatum, exteriori longius, 5 — fidum: laciniis ovato - lanceolatis, margine undulatis, acutis, erectis. COR. calyce duplo longior, 5 — petala (sæpe plena) purpurea. Petalis imbricatis, patentibus. obovatis, latis, subtruncatis, vix retusis, venosis, brevius unguiculatis: unguibus viridescentibus, utrinque barbatis. STAM. Filam. plurima, monodelphia, corolla duplo breviora; columna pentagona, glabra, viridescens, e receptaculo corollæ surgens, filamentis superne liberis, glabris, undique patentibus. Antheræ subrotundæ undique echinatae. PIST. Germen intra receptaculum orbiculatum, depresso, viridescens, glabrum, superne minutim tomentosum. Styli plurimi, rubri, intra columnam staminum, illisque longiores. Stigmata simplicia.

PROPRIETAS. Rec. Odor nullus; Sapor debilissimus, vix ullus; masticata petala lubrica, mucilaginosa.

MALVA ROTUNDIFOLIA. L. (a)

Malva vulgaris. Ph. Gemeine Räsepapeln. Tas
gecjs slez.

Malva. Cal. duplex: exterior 3 — phyllus. Arib-
li plurimi monospermi.

M. Rotundifolia. Caule prostrato, foliis cordato —

OR-

a) Malva rotundifolia ad ruderata & vias crescens exiguoſ
& valde pallidos exhibet flores, quæ translata in hortum,
eosdem præbet & majores & rubicundiores.

orbiculatis obtuse quinquelobis, pedunculis
fructiferis declinatis.

Indigena. Annuā. (a)

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Rec. Caules plures ex una radice,*
patente procumbentes, teretes, spithamei, pube-
scentes. Folia alterna petiolata, utrinque minu-
tim pubescentia, scabriuscula, subrotundo —
reniformia, 5 — vel 7 — lobata: lobis rotundatis,
margine serrata, subitus subseptemnervia, supra
nervis lineata, vix pollicaria. Petiolae teretes, elon-
gati, pubescenti scabri, supra sulcati. Stipulae 2,
oppositae, parviusculae, lanceolatae, acutae, ciliatae,
pubescentes. Flores gemini, pedunculati, axilla-
res e foliis, pedunculis petiolis brevioribus, fili-
formibus, teretibus, pubescentibus, s̄epius inæ-
qualibus. CAL. Perianth. exterius triphyllum:
foliolis linearie — subulatis, obtusis; interius cam-
panulatum, pubescenti scabrum, 5 — fidum: la-
ciniis ovato — acutis, erectis, carinatis, margine
ciliatis, subundularis. COR. alba. Petala 5, linearie
cuneiformia, obtusa, emarginata, calyce paullo
longiora, erecta subsessilia. STAM. Filam. pluri-
ma monadelphia; columna cylindrica, glabra,
corolla breviore, superne breviter libera. ANTAE.
parvae, subrotundae, echinatae, undique nutantes.
PIST. *Germen orbiculatum, depresso, intra re-*
cep-

(a) Imo duratione non raro annum superat.

ceptaculum corolla, Styli plures, subulati, erecti,
vix pubescentes, longitudine staminum. Stigma-
ta simplicia.

PROPRIETAS. Rec. Odor nullus; Sapor her-
baceus, debilis; masticata folia lubrica, mucila-
ginosa.

COMPOSITA. Herb. Species Decocti Althææ
Fernellii — Emolientes. — pro Gargarismate
Emolliente.

Flor. Species Decocti Althææ Vulgares.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA. ORDO PENTANDRIA.

FUMARIA OFFICINALIS. L.
Fumaria. Ph. Erdrauch. Polnſ nebst planarautka.
Fumaria. Cal. diphyllo. Cor. ringens. Filamen-
ta 2, membranacea, singula Antheris 3.
F. Officinalis. Pericarpis monospermis, race-
matis, caule diffuso.
Indigena. Annua.

Off.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis succulentus, fragilis, erectus, dodrantalis, subflexuosus, pentagonus, laevis ramosus. Rami alterni, erecti, cauli conformati, prope radicem diffusi. Folia alterna, petiolata, duplicato — pinnata : pinnis & pinnulis alternis, distantibus, petiolatis : lobis subsucculentis, cuneiformibus, inciso — pinnatifidis ; laciniis ovali — linearibus, obtusis, submucronatis, dilute viridescientibus, undique glabris, subtrus pallidioribus. Petiolii communes triangulares, recti ; partiales subflexi.*

PROPRIETAS. *Rec. Odor contusæ herba tanquam oleris ; Sapor subingratus, amarus ; mastigata subsuccosa, saliva virididescente. Sicc. fere amrior.*

PRÆPARATA. Conserva.

Extractum.

Syrupus.

COMPOSITA. Herb. Species Decocti Aperitivi.

Extract. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

Syrup. Electuarium Antifebrile.

ORDO. OCTANDRIA

POLYGALA AMARA. L. (a)

(a) In nostris pharmacopoliis semper substitutur Vulgaris, nisi Vienna alata fuerit Amara radix.

Polygala. Senega Nostras. Ph. Kreuzblümlein.

Vstawač, zejhultča, mudatka.

Polygala. Cal. 5 — phyllus: foliolis duobus alæ-formibus, coloratis. Legumen, obcordatum, biloculare.

P. Amara. Floribus cristatis racemosis, caulis erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus.

Ingena. Perennis.

Off. Radix. (Herba raro.)

FORMA. Radix. lignosa, tenuis, semipedalis, ex fusco pallens, & fibris aucta. Tota planta glabra est, multiceps in caulinos breves procumbentes plures in cespitem sœpe densum difficitur, rosulam gerentes foliorum, quæ sunt obverse ovata, etiam acutiuscula, firmula, crassula, versus basin attenuata. Caules herbacei, suberecti, semipedales vel breviores, etiam fuscunciales, angulati, foliis vestiti sparsis, anguste sublanceolatis, acutis ceterum simplicissimi, rarissime ramosi, terminati racemo florum plerumque ex coeruleo violaceorum, paucioribus individuis ex purpureo rubentium. Calycis corollaæ concoloris, foliolaæ sunt ferme æqualia, oblonga, concava, petiolis fere duplo breviora.

PROPRIETAS. Rad. Odor vix ullus; sapor subaromaticus & subamarus. Herbae Odor; uti radix; sapor intense amarus, diuque ori inhærens.

OR-

O R D O
D E C A N D R I A.

* **S**PARTIUM JUNCEUM. L.

*Genista. Ph. Genester, Pfrimenkraut. Ganoffst
neb Janoffst, beyls aneb räkosý.*

Spartium. Stigma longitudinale, supra villosum.

*Filamenta germini adhærentia. Cal. deorsum
productus.*

*S. Junceum. Ramis oppositis teretibus apice flo-
ribus, fol. lanceolatis.*

Hortense. Frutex arborescens.

Off. Virgula pro Cineribus. Flores.

*FORMA. Frutex arborescens diversæ altitu-
dinis, cuius trunco rami tenues oriuntur, virgu-
larum adinstar, quæ angulosæ virentes, flecti ne-
ctique faciles, non raro quoque in alias divisæ,
in quibus folia crebra, hirsuta, priora Trifolii,
alia simplicia, acuminata.*

*PROPRIETAS. Odor nullus; sapor amarus,
nauseosus.*

PRÆPARATA. Sal Alcalinus.

* **G**ENISTA CANARIENSIS. L.

Rhodium. Ph. Rosenholz. Růžové dřevo.

*Genista. Cal. bilabiatus. $\frac{2}{3}$. Vexillum oblongum a
pistillo staminibusque deorsum reflexum.*

*G. Canariensis. Foliis ternatis utrinque pubes-
centibus, ramis angulatis. Exo-*

Exotica. Arbor.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* in frustulis cylindricis, distortis, crassitie 1 vel 2 pollicum, ponderosum, solidum, durum; alburno albido, tenuiore; medullari parte amplissima, viridi — rubescente; post sectionem transversalem notatum disco distico, undique distincto, striis minutissimis, a centro ad peripheriam tendentibus, parallelis, undique etiam ad perso punctulis parvis, frequentibus sparsis; centro medullari amplissimo, in medio saturatius tincto, versus marginem vero dilutius. *Lignum vestitum est corice cinereo-bruneo, rugoso, tenuiore.*

PROPRIETAS. *Ligni* rasi & fricati: *Odor* fragrans, fere Rose Damascenæ, gratus; *Sapor* ligni pulverati gratus, rosaceus, leniter amaricans, lingue inhærens calidiusculus. *Pulvis* e ligno raso flavescit. *Corticis* odor & sapor debiles non rosacei.

PRÆPARATA. Oleum Destillatum.

COMPOSITA. *Ol.* Unguentum Rosatum album.

* LUPINUS ALBUS. L.

Lupinus. Ph. Feigbohne. Ržímský aneb řecká: wičný hráč.

Lupinus. Cal. 2 — labiatus. Antæræ 5 oblongæ; 5 subrotundæ, Legumen coriaceum.

L.

L. Albus. Calyc. alernis inappendiculatis: labio superiore integro; inferiore tridentato.

Exoticus — Annuus.

Off. Semen. (a)

FORMA. *Semin* majusculum, orbiculatum, & nonnihil angulosum, compressum, qua parte siliquæ adhæret cavitatem quandam velut umbicum exiguum habens, foris album, intus luteum.

PROPRIETAS. *Odor nullus*; *sapor amarus*, qui vero maceratione in aqua calida perit.

VICIA FABA. L.

Faba. Ph. Bohne. *Bob, aneb bjlé fasoly.*

Vicia. *Stigma latere inferiore transversale barbatum.*

V. Faba. Caule erecto, petiolis absque cirrhis.

Hortensis. Annuas.

Off. Semen. (b)

FORMA. *Rec.* *Legumen* viride glabriuscum, lucidiusculum, tereti — compressum, palpare vel ultra, subtorulosum, sutura utrinque marginali, basi paullulum attenuatum, fulcitum calyce persistente & emarcido, apice obtuso — rotundatum cum mucrone conico subulato, incurvo, e stylo persistente orto, s^epe terminato stigmate reflexo; uniloculare, subtetrappermum,

bi-

a) Lupini Hirſuti variegata semina divendere solent mercatores loco Lupini albi.

b) Phascolus vulgaris apud nos fere semper locum Fabæ occupavit.

bivalve : valvis carnosis : tomento spisso, spongioso, succoso. Semina pedicellata, magna, reniformi — ovata utrinque compresso — plana, glabra, alba, apice obtuso rotundata, basi obtusa, utrinque gibbosa, hilo linearis notata, orto e pedicelli apice clavato — linearis, longitudinaliter semini adnato. Farenzyma cotyledoneum, viride, intra tunicam firmam.

PROPRIETAS. Rec. Leguminum. Odor leguminis Pisii. Sapor consimilis ; tenella tenera, cocta sapida. Seminum immaturorum Sapor dulcescens ; masticata tenera, succosa, saliva viridecente ; ipsa tunica subsucculenta.

PRÆPARATA. Töt. Plant. Sal Alcalinus.

COMPOSITA. Pulv. Sem. Emplastrum Malacticum.

CICER ARIETINUM. L.

Cicer. Ph. Rüchern, Ziserlein. Cyzerna.

Cicer. Cal. 5 — partitus, longitudine corollæ : laciinis 4 superioribus vexillo incumbentiibus. Legumen rhombeum, turgidum, dispermum.

C. Arietinum. Foliolis serratis,

Indigenum. Annum.

Off. Semen.

FORMA. Semina subrotunda, magnitudine seminis Pisii, alba vel rubra, postice sulcato-depressa, antice breviter rostrata ; puncto exca-

va-

vato proxime sub rostro; elevato autem punto
subtus, longius a rostro. *Parencyma* lutescens,
uniforme, cotyledoneum.

PROPRIETAS. Eadem quæ seminis Pisii.

COMPOSITA. Species Decocti Althææ Fer-
nelii.

GLYCYRRHIZA GLABRA & ECHINATA. L.
Liquiritia. Ph. Süßholz. Lekotice, sladký ko-
řen neb dřevo.

Glycyrrhiza. Cal. bilabiatus: L. Legumen ovatum,
compressum.

G. Glabra. Leguminibus glabris, stipulis nullis,
foliolo impari petiolato.

G. Echinata. Leguminibus echinatis, foliis, fo-
liolo impari sessili.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Rec. Radix Glycyrrhizæ Glabræ. sar-
tentosa, profunde descendens, sub terra repens,
ramis teretibus, extus ferrugineis, crassitie pen-
næ anserinæ, digiti minoris vel pollicis, instru-
ctis fibris radicantibus sparsis; parencymate sub-
carnoso, lutescente, post sectionem transversa-
lem notato centro medullari subrotundo, par-
viusculo, disco undique punctato, radiato — stria-
to: radiis a centro medullari ad peripheriam;
constante ex circulis 2, quorum interior magis
flavescit. Siccata radix dura.

Q

Fro

PROPRIETAS. *Rec.* Odor crudus, exacte leguminum rec. Phaseoli vulgaris; *Sapor* intense dulcis simul in legumen Pisii incidens; *masticata* mucilaginosa. *Siccatae* odor nullus; *Sapor* intense dulcis; *masticata* emollitur & subpulposa fit.

PRÆPARATA. Extractum seu Succus insipitus.

COMPOSITA. *Rad.* Baccilli Liquiritiae ex his Trochisci Bechici Citrini.

Elixirium Salutis.

Infusum Laxativum vulgo Hydromel

Infantum.

Pulvis Haly. — Spec. Diatragacanthæ, hic pro Pulvere Spec. Diaireos. — Vitæ.

Species Decocti Althææ Fernelii & Vulgares. — Decocti Aperitivi. — Decocti Lignorum. — Decocti Pectoralis.

Syrpus de Siliquis sive Diacodii Liquidus & Crocatus. (Liquidus pro Electuario Infantum seu Requie Nicolai & Pilulis Balsamicis Mortoni.)

Trochisci Bechici Nigri.

Unguentum Liquiritiae.

Extract. Electuarium Pectorale. — Elec. seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Asthmaticum seu Pectorale Dulce. Pi-

Pilulae de Styrace.

Trochisci Bechici Nigri.

ASTRAGALUS TRAGACANTHA. L.

Tragacantha. Ph. Ecksdorn. **Tragant.**

Astragalus. Legumen biloculare, gibbum.

A. Tragacantha. Caudice arborecente, petio-
lis spinescentibus.

Exotico — Fruticosa.

Off. Gummi.

FORMA. Gummi pallidum, subdiaphanum,
læve, facie cornea, subsplendens, fragile, poly-
morphum: frustulis compressis, communiter fle-
xuosis s. intortis, saepe angulatis, linearis ver-
miformibus, saepe in grumulis oblongis s. subro-
tundis.

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor nullus;*
masticatum durum, comminuitur, plenarie solvi-
tur. In ore retentum absque masticatione, emol-
litur, tardius accenditur.

PRÆPARATA. Mucilago.

COMPOSITA. Gum. Pulvis Haly. — Specie-
rum Diatragacanthæ.

Mucil. Baccilli Liquiritiae.

Candelæ Fumales.

Tabulae de Althæa.

Trochisci Alchandar. — Bechici albi
— contra Vermes.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. L.

Melilotus. Ph. Steinklee. Bononice.

Trifolium. Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius non dehiscens, deciduum.

T. Melilotus Officinalis. Leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto.

Indigeno — Biennis.

Off. Herba cum Flore. (a)

FORMA. Rec. Caules plures ex una radice, erecti, bi vel tripedales vel ultra, teretes, glabri, virides, angulis tribus instar linearum elevatarum, a singulo ramo decurrentibus, parallelis, remotis; ramosus. Rami alterni, erecti, ungulati, glabri, striati. Folia alterna, petiolata, ternata; foliolis ovali — oblongis, apice truncatis, margine acute serratis, subpollicaribus, utrinque glabris, supra obscure viridibus, subtus pallidioribus, nervis tenuibus suboppositis, a costa obliquis; in inferioribus subsessilibus; intermedio paullo majore, petiolato petiolelli apice sursum flexo. Petiolii superne sulcati, basi ovati, concaviusculi, amplexicaules. Stipulae 2, oppositae, linearisubulatae, parvae. Racemi florum axillares, pedunculati, erecti, subcylindrici, nudi, pubescentes, secundi, floribus pedicellatis, nutantibus. Bracteae parvae, linearisubulatae, subpillose, ad pedicellos

(a) Flore albo apud nos sepiissime variat in agris & pratis, atque duratione annum superare solet.

los solitariæ, illisque breviores. CAL. Perianth. campanulatum, parviusculum, minutim pubescens : ore 5 — fido, acuto, erecto. COR. lutea, calyce triplo longior. Vexillum obovatum, obtuso — rotundatum, emarginatum, planum, carinatum, subrevolutum, ungue concavæ. ALÆ, lineares, obtusæ, longitudine vexilli, basi semi-fagitatæ. Carina navicularis, dorso convessa, longitudine fere alarum, ungue linearis. STAM. Filam. 10, simplex & novemfidum, carinæ inclusa. ANTH. subrotundæ. PIST. Germen. linearis — ovale, utrinque acutum, viridescens, compressum. Stylus subulatus, longitudine staminum. Stigma simplex. Legumen pendulum, calyce longius, ovale, utrinque acutum, dorso convexum, antice margine acuto, undique rugosum, uniloculare, dispermum. Semina subrotunda.

PROPRIETAS. Rec. Odor suaveolens, in Af. perulam odoratam incidens ; Sapon herbaceus, amaricans, simul in Pilum incidens ; Sicc. fere consimilis ; odor paullo fortior.

COMPOSITA. Herb. Emplastrum de Meliloto.

Species Emollientes.

Flor. Unguentum Nervinum.

TRIGONELLA FOENUM GRÆCUM. L.

Fœnugræcum. Ph. Bochhorn. Seno Rjecké.

Trigonella. Vexillum & Alæ subæquales, patentæ formæ corollæ tripetalæ.

T. *Fænum Græcum*. Leguminibus fessilibus stria-
tis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule
erecto.

Hortense. Annum.

Off. Semen.

FORMA. *Semina oblonga*, teretiuscula, com-
pressiuscula, utrinque truncata, glabra, brunnea,
undique adspersa atomis excavatis, incisura late-
rali utrinque stria depræssa decurrente, magni-
tudine seminis Cannabis vel ultra, *parenzymate co-*
tyledoneo, lutescente; cotyledone bifido, laci-
niis ovalibus, obtusis, basi cylindrica, inflexa.

PROPRIETAS. *Odor fragrans*, unguentaceus;
Sapor seminis Pisii; *odorè congruens*; *masticata*
mucilaginosa.

COMPOSITA. *Pulv.* *Sem.* Emplastrum Ma-
lacticum, — de Meliloto.

Species Emollientes,

Mucilag. *Sem.* Emplastrum Diachylon.

Unguentum Althææ,

CLAS.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ORDO

PENTANDRIA.

THEOBROMA CACAO. L.

Cacao. Ph. Cacau. Backau.

Theobroma. Cal. 3 — phyllus. Petala 5, fornicate, bicornia. Nectarium 5 — phyllo, regulare. Stam. nectario innata, singula antheris 5.

T. Cacao. Foliis integerrimis.

Exoticum. Arbor.

Off. Semen.

FORMA. *Nuclei* ovato — oblongi, undique obtusi, utrinque compressi, magnitudine nucis avellanæ, inclusi cortice papyraceo, cinereo — olivaceo, fragiliusculo; *parenchymate* cotyledoneo, pingui; fusco nigricante, violaceo, constante lobulis intortis & coniventibus, tenui pellicula interstinctis.

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor vix ullus, nisi nuclei tosti & tunc debilis; *Sapor* pinguiusculus, leniter subadstringens, amaricans, satis gratus; *masticati* nuclei comminuuntur, in ore sensim sol-

vun-

vuntur saliva fusco brunea. Hi nuclei ignis flammæ admoti, accenduntur, flagrant: flamma lumenosa, non fumante vix fuliginosa.

PRÆPARATA. Butyrum? (a)

O R D O D O D E C A N D R I A.

CITRUS MEDICA. L.

Citrus. Limonia. Ph. Citrone. Cytryn, cytrynowé gablko.

Citrus. Cal. 5 — fidus. Petala 5, oblonga. Antheræ 20, filamentis connatis in varia corpora. Bacca 9 — locularis.

C. Medica. Periolis linearibus.

Exotica. Etiam Hortensis Arborea.

Off. Fructus recens pro succo &c. Fructus. Cortex.

FORMA. Rec. Pomum ovale, utrinque attenuatum, magnitudine ovi anserini vel supra, unidique rugosum, punctatum, ad tactum leviusculum, colore pallide luteo; cortice coriaceo — carnoso, albo, subinsipido; epidermide (flavedine) crassiusculo, celluloso; cellulis subrotundis, oleo essentiali gratissimo fœcundis singulis terminatis

(a) Saltem, si non & Chocolada.

po.

poro, occluso membrana tenui. *Parencyma* — loculare : loculis dispermis ; vesiculatum : vesiculis parallelis, pedunculatis, cylindricis, teneris, diaphanis, succo limpidissimo turgidis. *Semina* albida, ovato — gibba, undique minutim, rugosa, dorso & basi convexa, striata, antice submarginata, apice acuta, undique obducta gelatina lubrica ; *parencymate* cotyledoneo, bipartibili.

PROPRIETAS. *Rec.* Flaved. Odor fragrans, gratissimus ; *Sapor* consimilis, calidiusculus, vix amaricans. *Pulpæ* odor debilis, gratus, ab epidermide infectus ; *Sapor* intensius acidus, purus.

PRÆPARATA: *Aqua Citri Corticis*. — *Citri Totius*.

Eleosacharum.

Essentia Corticum Citri.

Oleum Corticis destillatum.

Syrupus Acetositatis Citri, — *Corticum Citri*.

COMPOSITA. *Cort.* *Aqua Carminativa Communis* & *Regia*. — *Melissa composita*. — *Thegiacalis*.

Elixirium Vitrioli.

Essentia Carminativa.

Infusum seu Aqua Angelicae.

Morsuli Imperatoris.

Species pro Potu Ordinario.

Succ. Infusum seu Aqua Angelicae.

Le-

Lapides Cancerorum Citrati? (a)

Aq. Liquor Visceralis,

Syrupus Kermesinus,

Ol. Essentia sive Balsamum Vitæ Hoffmanni.

Unguentum Rosatum Album, — de Uvis sive ad Labia.

Syrup. Eleētuarium sive Confectio Hyacinthina.

CITRUS AURANTIUM. L.

Aurantium. Ph. Pomeranze. Pomoranē.

C. Aurantium. Petiolis alatis, foliis acuminatis, Exoticus etiam Hortensis, Arboreus.

Off. Folia. Flores. Fructus. Fructus cortex.

FORMA. *Rec.* Folia alterna, petiolata, coriacea, sempervirescentia, ovato — oblonga, utrinque attenuata, acutiuscula, margine subserrata: ferraturis remotis obsoletis, adpressis; utrinque lœvia, lucidiuscula, undique punctata: punctis subdiaphanis, excavatis, disci folii parvis, marginis vero majoribus, triplicaria, patentia, saturate viridia; tenera citrina. Petoli foliis quadruplo breviores, basi teretes, superne alati: ala plana, cuneiformi, apice obtuso — rotundato, petiolo breviore. *Flares* in ramulis terminales, 2 vel 3 congesti, saepe solitarii, axillares, peduncula-

a) Quoniam eorum usus adhuc hodie frequens.

culati. *Fedunculi* petiolis breviores, albi punctati,
 superne sensim incrassati. *Bractæ* 2, parvæ, op-
 positiæ, lineari — subulataæ, ciliataæ, ad basim pe-
 dunculi, erectæ. *CAL.* *Perianth.* 1 — phyllo-
 um, album, punctatum, minutum pubescens, parvius-
 culum, 5 dentatum: iaciniis ovato — acutis, subca-
 rinatis, erectis; 3 proximioribus. *COR.* alba, car-
 nosa. *Petala* 5, sessilia, lineari — lanceolata, obtu-
 sa, calyce plures longiora, utrinque plana, gla-
 bra, subtus punctata, patentia. *STAM.* alba, car-
 nosa. *Fil.* glabra, in orbem posita, connexa in 5
 vel 6 corpora linearia, apice fissa, corolla bre-
 viora, erecta. *Antb.* circiter 20, lineari — cor-
 dataæ, erectæ, luteæ. *PIST.* *Germen*, superum, glo-
 bosum, viride, glabrum, subangulatum, subru-
 gosum. *Stylus* cylindricus, crassus, longitudine
 staminum. *Stigma* capitatum, globosum, colore
 aurantio, summo apice depresso. *Pomum* glo-
 bosum, apice & basi compressissimum, apice um-
 bilico minuto, colore fusco, magnitudine ovi
 anserini vel pugni, undique adspersum punctis
 excavatis, glabrum; cortice coriaceo — carnosio,
 albido, epidermide crassissimo, celluloso: cellu-
 lis discretis, subrotundis, oleo essentiali foecundis,
 singula terminata poro, membrana tenui testo.
Parencrema 8 vel 10 — loculare: loculis disper-
 mis; vesiculatum vesiculis pedunculatis, cylin-
 dricis, acutis, parallelis, turgidis succo diaphano,

lim.

lūpidissimo. Semina subovata, basi oblique truncata, apice obtusiuscula, hinc striata, inde planiuscula, lœvia, parenchymate cotyledoneo, bipartibili : *Collumella cernosa, albida.*

PROPRIETAS. *Rec. folior. Odor debilius fragrans graviusculus ; Sapor aromaticus, amaricans, calidiusculus ; Florum : Odor fragrantissimus, sva-veolens, temulentans ; Sapor amaricans, gratus, aromaticus ; masticati amari, mox aromate odori congruente, tum aromate corticis fructus, debiliore tamen. Mali flavedinis Odor fragrans, integrator citro ; Sapor amarus, aromaticus, masticata linguam & fauces calefacit ; caro corticis amara ; pulpa acida, amaricans.*

PRÆPARATA. *Flor. Aqua Naphæ.*

Cort. Eleosacharum.

Essentia.

Oleum destillatum.

Syrupus Corticum Aurantiorum. —

Mali Aurantii.

Tinctura Tartari Aurantiata.

Conservæ. (a)

COMPOSITA. *Cort. Aqua-Carminativa Communis, & Regia.*

Elixirum Stomachicum temperatum.

Essentia Absinthii composita. — Carminativa. Li-

a.) *Conservæ flavedinis aurantiorum valde usualis. Conditum. Corticis hujus atque prioris dum præscribitur a Conditoribus sibi vindicant Pharmacopei.*

Liquor Visceralis.
Aq. Pasta de Althaea.
 Morsuli Imperatoris.
 Syrupus Capillorum Veneris.

O R D O P O L Y A N D R I A.

HYPERICUM PERFORATUM. L. (a)
 Hypericum. Ph. St. Johanneskraut. S. Janæ
 bylina, zwoneček čerwený.
Hypericum. Cal. 5 — partitus. *Petala* 5, *Filamen-*
ta multa, in 5 phalanges basi connata. *Capsula.*
H. Perforatum. Floribus trigynis, caule ancipi-
 ti, foliis obtusis, pellucido — punctatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Rec.* *Caulis* erectus, glaber, tetra-
 gonous : unguis acutis, adspersis punctis parvis,
 nigricantibus, sparsis ; *pedalis*, inferne simplex,
 superne ramosus : ramis alternatim oppositis,
 breviusculis, inferne tetragonis, superne ancipi-
 tibus. *Folia* opposita, sessilia, ovali — oblonga,
 obtusa, pollicaria, internodii longitudine,
 glabra, supra viridia, lineata, rugosa, utrinque

a) Promiscue usurpatur *Hypanicum Perforatum* & *Quar-*
drangulare.

nervulosa, subtus pallidiora, nervosa, patentia, adspersa punctis diaphanis, parcus sparsis per discum, & punctis aliis nigris, undique sub margine; ramea folia minora. *Corymbus terminalis*, glaber, fastigiatus, simpliciusculus, foliolus, constructus e ramis caulis erectis, superne floriferis, pedunculis alternatim oppositis, bifloris, intermedio flore solitario, priore. *Bracteæ ovali—oblongæ, obtusæ, oppositæ ad pedicellos, patentes.* CAL. *Perianth. 5* — partitum: laciniis ovali — oblongis, obtusis, glabris, trinerveis, nigro — punctatis. COR. *Petala. 5*, ovali — oblonga, obtusa, sessilia, patentia, calyce duplo longiora, lutea, venosa, subtus adspersa punctis parvis nigris, polymorphis, frequentibus. STAM. *Filam. plurima, lutea, basi in fasciculos cohærentia, corolla breviora. Antb. subrotundæ, didymæ, singulæ terminatae puncto nigro. Pist. Germen superum, viride, ovatum, glabrum, majusculum, longitudine calycis, trigonum: angulis rotundatis; desinens in Stylis 3, subulatos, longitudine staminum. Stygma simplicia, nigricantia.*

PROPRIETAS. Rec. Florum: Odor debilis; Sapor amaricans, balsamicus; masticoti salivam pureo tingunt. Foliorum: Odor debilis, in odorem angelicæ sylvestris incidens; Sapor amaricans, substypticus, subbalsamicus; masticata salivam viridescentem tingunt.

PRÆ-

PRÆPARATA. Oleum coctum.

COMPOSITA. Flor. Electuarium seu Theria-
ca Andromachi.

Emplastrum Defensivum rubrum.

Unguentum Digestivum.

Herb. c. Flor. Oleum Viride.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

ORDO

POLYGAMIA ÆQUALIS.

SCORZONFRA HISPANICA. L.

Scorzonera. Ph. Schlangennord, Scorzonere.

Ładż mordowy Łočen.

Scorzonera. Receptaculum nudum. *Pappus* plu-
mosus. *Calyx* imbricatus squamis margine
scarioſis.

S. Hispanica. Caule ramoso, foliis amplexicauli-
bus integris ferrulatis.

Hortensis. Perennis,

Off. Radix.

For.

FORMA. *Rec.* Radix fusiformi — cylindrica, spithamæa, descendens, extus vestita nigro corice & rugoso : rugis annularibus, parte fibrillosa ; parenchymate carnosæ, albo ; post sectionem transversalem notato centro medullari orbiculato, ample, striato : striis radiantibus, obsoletis ; obducto annulo incarnato, punctato ; corticali parte alba lactescente. *Sicc.* Radix in officinis secta in taleolas longitudinales occurrit, extus rubras, intus albas, flexili — fragiles.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor nullus. Sapor aquosus succulentus, subinsipidus. *Siccata.* radix cenisca & inter digitos tractatata, subadhæret, quod ex principio melligineo derivatur ; masticata communivit, pulposa fit, sapore dulcescente, grato, absque omni aromate.

COMPOSITA. Species pro Potu ordinario.

LACTUCA SATIVA. L.

Lactuca. Ph. Lattig. Salát, locyka.

Lactuca. Recept. nudum Calyx imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex, stipatus. Sem. levia.

L. Sativa. Foliis rotundatis, caulinis, cordatis, caule corymboso.

Hortensis. Annua.

Off. Herba recens. Semen.

FORMA. *Rec.* Caulex brevissimus. Folia petiolata, approximata, subrotunda s. ovalia, apice obtuso — rotundata, utrinque glabra, luteo — vi-

ridescentia basi pallida, disco bullata s. plicato — rugosa, margine plana, vix plicata, tenuia, repanda, denticulato — ferrata; exteriora magis rotunda, patentia interiora magis oblonga, obovata, pallidiora, citrina, coniventia in caput laxiusculum, magnitudine pugni vel ultra. Petioli breviustuli, lineares, supra plani, subtus carinati, albi, fragiles, in caudice imbricati. Semen parvum oblongum, compressum, pallidum utrinque acuminatum.

PROPRIETAS. Rec. Odor nullus; Sapor debilissime oleraceus, vix subamaricans. Masticata folia fragilia, subsucculenta, comminuantur: saliva subviridescente, Sem. Odor & Sapor aqueus.

COMPOSITA. Herb. rec. Unguentum Populeum.

LACTUCA VIROSA. L.

Lactuca Sylvestris. Ph. Wilder Lattig. Locyca
lesnij neb planā.

L. Virosa. Fol. horizontalibus carina aculeatis
dentatis.

Indigena. Annuā.

Off. Herba.

FORMA. Caulis bi — aut tricubitalis, rectus,
simplex, rarissime, nisi interdum in locis cultis,
ramosus, inferne rubellus, ceterum ex albido
virens, glaber & ab infra ad unam fere tertiam
aculeis tenellis obsitus. Hic foliis vestitur alter-

R

na-

natim positis caulem amplexantibus, inferioribus (uno altero ve) oblongis, integris, ex angustia sese dilatantibus denticulatis, in planta adulta, facile marcescentibus, ac deciduis; reliquatio-
lia caulem ornantia sunt sinuato — lanciniata, ve-
noso — reticulata, coloris glaucini, glabra, costa
vero dorsali aculeata, margine spinulosa : omnia
in caule plus minus ita torta, ut margo alter cœ-
lum, alter terram quodammodo spectet ; in supre-
ma parte caulis dividitur in paniculam.

PROPRIETAS. *Odor* narcoticus, virosus, pa-
paver, aut opium ipsum satis mentiens ; *Sapor*,
amaricans. Hæc planta vulnera fauia lac fundit
copiosum, acre, amaricans.

LEONTONDON TARAXACUM. L.

Taraxacum. Ph. Löwenzahn, Röhrelkraut, Pfaf-
fenrohrel. Plessa.

Leontondon. Recept. nudum. Cal. imbricatus squa-
mis laxiusculis. Pappus plumosus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba raro.

FORMA. Rec. Radix cylindrica, albido — ci-
nerea, rugis transversalibus, subannulatis, crassi-
tie vix digitæ minimi, spithamea, subramosa, fi-
bris capillaribus serie longitudinali simplici utrin-
que disposita. Parencrema carnosum, e tunicis
congestis constans, fibra centrali rigida, tenaci,
post sectionem transversalem toto disco annu-
la-

Iatum; annulis concentricis, puncto centrali e fibra abscissa; lactescens. *Folia* cuncta radicalia, plura congesta, petiolata palmaria, utrinque pubescentia, patentia, acuta, runcinato — pinnatifida: lobis oppositis, confluentibus triangularibus, acutis, tursum excurrentibus, basi rectis, undique dentatis, costa tenaci, albida, teretiuscula. *Petioli* marginati, basi vaginato — plani, albi.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sec.* *rad.* *Odor* nullus. *Sapor* initio obscure dulcescens, tum amarus. Primo vere minus americanus, magis abundans succo melligineo;estate magis americanus. *Herbae* *Odor* debilis; *Sapor* amarus.

COMPOSITA. Species Decociti Antifebriles:

CICHORIUM INTYBUS. L.

Cichorium. Ph. *Wegwart*, *Cichorie*. *Czekań-ka*, *sterbáč*.

Cichorium. *Recept.* *subpaleaceum*. *Calyx* calyculatus, *Pappus* sub 5 — dentatus, obsolete pilosus.

C. Intybus. *Floribus geminis sessilibus*, *foliis runcinatis*.

Indigenum. *Perenne*.

Off. *Radix*. *Herba*.

FORMA. *Rec.* *Radix* fusiformi — cylindrica crassitie digitii, spithamea, saepe pedalis, descendens fibrillosa, fibrillis sparsis; *parenchymate* albo, post sectionem transversalem notato centro me-

dullari orbiculato, duriusculo, striato — radiato ; corticali parte carnosa, lactescente : lacte albo. *Folia* radicalia primi anni tenera, longius petiolata, cuneiformi — oblonga, obtusa, subfusculenta, integra, subdentata, pollicaria vel ultra, utrinque glabra, inferne attenuata, in petiolum decurrentia. *Petioli* supra concavi, subitus convexo — teretes.

PROPRIETAS. *Rec. rad.* Odor nullus ; Sapor intensius amarus. *Folior.* tener. Odor nullus ; Sapor gratus americanus ; masticata tenera, comminuantur : saliva viridi — lutescente.

PRÆPARATA. *Herb.* Extractum.

Infusum seu sanguis Cichorei simplex.

Herb. & Rad. Syrupus Cichorei cum Rheo.

COMPOSITA. *Rad.* Species Decocti Antifebriles. — Decoct Avenæ.

Herb. Species Decocti Aperitivi.

Herb & Rad. Extractum Americanum, & hoc pro Tinctura Amaricante.

Infus. Liquor Visceralis.

ARCTIUM LAPPA. L.

Bardana. Ph. Klette. Lupen aneb řepšť wětší neb hořčí.

Ardium. Cal. globosus : squamis apice hamis inflexis.

A. Lappa. Foliis cordatis inermibus petiolatis. Indigeno. Perennis. Off.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix. cylindrico* — fusiformis, majuscula, subpedalis, descendens, instructa fibris filiformibus, serie longitudinali, opposita, extus fuscō — cinereo, apice squamis dentatis, emarcidis. *Parencyma* album, post sectionem transversalem distinctum centro medullari orbiculato, spongioso, in annosioribus cavo.

PROPRIETAS. *Rec. rad.* Odor vix ullus; Sapor debilis vix americanus, sicc. in taleolas longitudinales fissa, dura, fragilis, colore sordido; mastigata emollitur in ore, comminuitur, non ingrata.

COMPOSITA. Species Decocti Lignorum.

* **CARDUUS MARIANUS.** L.

Cardus Mariae. Ph. Frauendistel. *Cardus Mariae*, rye, ginēcē ostropes.

Cardus. Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis. Recept. pilosum.

C. Marianus. Foliis amplexicaulibus hastato — pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis : spinis canaliculatis duplicato — spinosis.

Hortensis. Annuus.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovata, obtusa, utrinque compressiuscula, ex albido & fuscō nebulosa, nitida, coronata. *Pappo* setaceo, simplici, instar penicilli. *Receptac.* carnosum, setaceum.

PROPRIETAS. *Seminum* : Odor debilis ; Sapor

por leniter dulcescenti — subamaricans, vix acriusculus.

* CARTHAMUS TINCTORIUS. L.

Carthamus. Ph. Gassor, Wilder Safran. Brokos, planý safrán.

Carthamus. Cal. ovatus, imbricatus squamis apice subovato — foliaceis.

C. Tinctorius. Foliis ovatis integris serrato — aculeatis.

Exoticus. Annuus.

Off. Flos. Semen.

FORMA. Petala corollæ compositæ rubra, infundibuliformia, tubo filiformi, elongato; limbo 5 — partito: laciniis linearibus, acutiusculis, erectis, binerveis nervo utrinque marginali, fulvo. Semina alba, nitida, conica, subincurvata, sub-tetragona, basi latiora, apice oblique obtusa, puncto excavato ad latus apicis, magnitudine seminis Pyri Malii vel ultra, ponderosa. Parenchyma: nucleus oleosus, intra corticem cartilagineum.

PRÓPRIETAS. Sicc. Florum: Odor & Sapor debiles. Seminum: Odor nullus; sapor subdulcescens; mastigata leniter nauseosa, acriuscula. Semina aquæ imissa subsidunt.

OR-

O R D O.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM VULGARE. L.

Tanacetum. Ph. Reinsaren, Wurmkraut. Wtr.
tjē.

Tanacetum. Recept. nudum. *Fappus* submarginalis. *Cal.* imbricatus, hæmisphæricus. *Cory.* radii obsoletæ, 3 — fidæ : interdum nullæ omnesque flosculi hermaphroditi.

T. Vulgare. Foliis bipinnatis incisis serratis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba. Flores.

FORMA. Rec. *Caules* plures ex una radice erecti, teretes, striato — angulati, glabri, biv. tripedales, superne ramosi. *Rami* alterni, erecti, simplices, pariter striato — angulati. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, utrinque viridia, glabra, punctata : punctis excavatis, opacis; pinnata : pinnis sessilibus, linearis — lanceolatis, inciso — pinnatifidis, serratis; inferioribus sessilibus, superioribus in rachi communi usque ad pinnum proximam decurrentibus; costa plana, utrinque dentata, serrata. *Corymbus* terminalis, in caule & ramis, sessilis, fastigiatus. *Bracteæ* linearis — subulata, in pedunculis. *Cal.* communis hæmisphæricus, glabriuscus, luteo — viridescens, imbricatus : squamis ad- pref.

pressis, lanceolatis, acutis, apice scariosis, cinerascentibus. COR. composita convexa, lutea, subæqualis, discoidea, calyce paullo longior. Propria hermaphrodita, tubulata, striato — angulata; ore truncato, 5—fido, acuto, erecto; fæmineæ paucissimæ in radio, angustiores, trifidæ. STAMINA singenesiæ, corolla breviora. PIST. Germen oblongum, glabrum, nudum. Stylus setaceus, corolla longior. Stigmata 2, revoluta. Receptaculum nullum.

PROPRIETAS. Rec. Folior. Odor fortis, gravis, acutus; Sapor aromaticus, odori congruens, amarus, acutus. Flor. rec. & siccata. Odor foliis conveniens, paulo tamen gravior; Sapor a foliis vix ablundens, sed magis aromaticus, magis cavidus.

PRÆPARATA. Fol. Aqua.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. Flor. Pulvis contra Vermes, ex hoc Trochisci contra vermes.

TANACETUM BALSAMITA. L.

Balsamita. Mentha Saracenica. Ph. Frauenblatt, Frauenminze. Rjecká máta, Ríjmská ſsalwégi, Matky Boží bylina, máta kadeřavá. T. Balsamita. Foliis ovatis integris ferratis. Hortensis. Perennis.

Off. Folia.

FORMA. Rec. Folia alterna, petiolata, integra, ovata, obtusa, margine undique obtuse serrata,

rata, utrinque viridia, punctata, minutim pubescentia, palmaria vel ultra, erecto — patentia; tenera villosa. Petioli foliis multo breviores, laevisculi, supra plano — concavi, subtus carinati, basi subdecurrentes.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor fragrans, in salviam incidens, sed longe gravior; *Sapor* amaricans, aromaticus, ab odore non abludens, calidus; *masticata* folia rec. in lingua calefaciunt, fere ut *Camphora* sed debilius.

COMPOSITA. *Aqua Vulneraria cum Vino,*

ARTEMISIA JUDAICA. L. (a)

Cina. Contra. Santonicum. Ph. Zitiversaamen,
Wurmsaamen. Cycwárowé semeno.

Artemisia Recept. subvillosum, vel nudiusculum.
Pappus nullus. CAL. imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. COR. radii nulla.

A. Judaica. Fruticosa, foliis obovatis obtusis lobatis parvis, floribus panniculatis pedicellatis.
Exotica. Perennis.

Off. Semen.

FORMA. Sicc. Summitates plantæ derasæ, constantes e frustulis ramulorum & foliis plantæ, viridis, parvis, subulatis, obtusis, utrinque compressis, supra & infra linea elevata carinatis, glabriusculis, atque e capitulis parvis subaggregatis, viridulis, subrotundis, obrusis s. turbinatis, mi-

(a) Bergio & Phar. Svec. *Artemisia Contra*, L.

minutum pubescentibus, imbricatis: squamis, ovatis, obtusis, concavis, vix ciliatis, erectis, adpressoſe; quarum inferiores sensim minores.

PROPRIETAS. Sicc. Odor fragrans, fortis, graviusculus, subnauseosus, balsamicus, fere Chenopodii Botryos; Sapor odori congruens, americans, calidiusculus, aromaticus, inhærens; mastigata facile comminuuntur, calent in lingua, subsequentे sensu quasi frigoris.

ARTEMISIA ABROTANUM. L.

Abrotanum. Ph. Gariheil, Stabwurzel, Gürtel. Brotán.

A. Abrotanum. Fruticola, foliis setaceis ramosissimis.

Hortense. Suffrutex.

Off. Folia.

FORMA. Rec. Folia sparsa, petiolata, utrinque punctata, minutum lanuginosa, duplicato — pinnatifida, laciñis linearī — angustis, elongatis, obtusis, integerrimis, supra bisulcatis, subtus obsolete carinatis; ramea simpliciora, longius petiolata. Petiolī lineares supra plani, bisulcati, subtus convexiusculi. Axillæ omnes foliorum secundæ ramulis & eorum rudimentis.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans, validior, subtemulentans, gratus; Sapor aromaticus, odori congruens, americans, calidiusculus.

PRÆPARATA. Conserva.

COMPOSITA. Unguentum Carminativum.

ARTEMISIA PONTICA. L.

Absinthium-Ponticum. Ph. Römischer Wermuth.

Pelynék Ríjmský.

A. Pontica. Foliis multipartitis, tomentosis, foliis subrotundis nutantibus: receptaculo nudō.

Hortense. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caules plures ex una radice, teretes minutim angulati, pedales, superne pubescentes, ramulosi. Rami alterni, breviusculi, axillares e feliis parentes. Folia alterna petiolata, plana, supra minutim villosa, viridefcentia, obsolete punctata, subtus cinerea, minutim tomentosa, pollicaria vel ultra, duplicato-pinnatifida: laciniis linearī — subulatis, acutiusculis, simplicibus vel dentatis; superiora trifida. Petioli foliis breviores, supra canaliculari. Stipulae loco foliola 2, opposita, pinnatifida, laciniis subulatis, petiolo breviora, erecta.

PROPRIETAS. Rec. & Sicc. Odor fere Abrotani, sed gravior, in Absinthium vulgare incidens, verum gratior; Sapor aromaticus, calidiusculus, in Tanacetum incidens, amarus; mastigata folia recentia debilius calent in ore & faucibus, saliva viridefcente.

COMPOSITA. Herb. Aqua Carminativa Communis & Regia.

Sumit. Acetum Antisepticum.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. L.

Absinthium Vulgare. Ph. Gemeiner Wermuth
Delynek obecnj.

A. Absinthium. Foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pedunculis: receptaculo villoso. Indigenum. Perenne.

Off. Herba etiam recens, atque Summitates & Herba cum floribus.

FORMA. Rec. *Caulis* erexit, bipedalis, teres, villosus, albidos, striato — angulatus, paniculatim ramosus. *Rami* sparsi, axillares e foliis. simplices, striati, superiores breviores. *Folia* alterna, petiolata, plana, minutim punctata, & villosa, mollia, pinnatifida: pinnis alternis cuneiformibus, pinnatifidis: laciniis linearibus, obtusifusculis; *summa* sessilia, cuneiformia, trilobata; *suprema* integra, linearis — lanceolata, *Racemi* florum terminales in rimis, compositi, foliosi, secundi, virgati, floribus pedicellatis, nutantibus magnitudine semenis Cannabis. *Bracteæ* linearis — subulata, ad pedicellos. *CAL.* communis subglobosus; imbricatus: squamis exterioribus, subulatis, obtusis, superne concaviusculis, tomentosis, paucioribus, interioribus ovatis, scariosis, ferrugineis, carina villosis, adpresso usculis. *Cor.* composita convexiuscula, calyce paullo longior, ferrugineo lutescens; *propria disci* hermaphrodita, tubulosa, ore 5 — fido; *radii* fœminea, subulata,

uleta, obtusa. STAM. *Filam.* 5, capillaria. *Antb.*
 tubulosa, corolla brevior. *PIST.* utrisque. *Ger-*
men. obovatum, glabrum, nudum. *Stylus* subula-
 tus, corolla paullo longior. *Stigma.* 2, patentia;
 disci linearia, truncata, radii subulata. *Receptac.*
villosum.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sicc.* Odor fortis, fra-
 grans, graviusculus, temulentans; Sapor inten-
 sius amarus.

PRAEPARATA. Extractum.

Oleum Costam.

Herb. c. Flor. Oleum destillatum.

Sal Absinthii Alcalinus. — Medius.

Conserva? (d)

COMPOSITA. *Herb.* Emplastrum de Meli-
 loto.

Essentia Absinthii Composita.

Herb. rec. Oleum Colocynthidis sive Ha-
 bacuc.

Spiritus Balsamicus vulgo Schaueria-
 nus.

Unguentum Carminativum.

Summit. Acetum Antisepticum.

Extra&. Elixirium Stomachicum Tem-
 peratum.

Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

ARTEMISIA VULGARIS. L.

Artemisia, Ph. Beyfuz. Cjernobyl.

A.

w) Juxta Precepta chyurgica.

A. Vulgaris. Foliis pinnatifidis planis incisis
subtus tomentosis, racemis simplicibus recur-
vatis, florum radio quinquefloro.

Indigena, Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caulis erectus, bi — vel tripe-
dalis; teres, striato — angulatus, lanuginosus, ra-
mofus. Rami virgati, simplices, striati, pubescentes,
erecto — patentes; inferiores sensim minores.
Folia plana, alterna, sessilia, bipinnicaria, superne
viridia, glabra, lineata, subtus tomentosa, ci-
nerea, pinnatifida: lobis suboppositis, lanceolatis,
acutis, pinnatifidis: *laciiniis* linearis — lanceolatis,
acutiusculis, subdentatis; lobis inferioribus inte-
gris; insimis lunulatis, stipulae loco circum cau-
lem reflexis.

PROPRIETAS. Rec. fol. Odor subfragrans, sub-
rancidus; Sapor herbaceus, vix amaricans; ma-
cetata folia tenacia, saliva viridi.

COMPOSITA. Aqua Vulneraria cum Aceto
& cum Vino.

TUSSILAGO FARFARA. L.

Farfara. Tussilago. Ph. Huflattig. Bonné Ed:
pyto.

Tussilago. Recept., nudum. Pappus simplex. Cal.
squamæ æquales, discum æquales, submembra-
naceæ.

T. Farfara. Scapo imbricato unifloro, foliis sub-
cordatis angulatis denticulatis, In-

Indigena. Perennis.

Off. Herba. Flores.

FORMA. Scapi vernalis, radicales, plures ex una radice, eretti, simplices, subspithamei tenuisculi, undique angulati, pubescentes, uniflori, squaminosi: squamis sparsis, membranaceis, viridescentibus, lanceolatis, concavis, obtusiusculis, subpatentibus, glabris. **Folia** post florem, astivalia, radicalia cuncta, longius petiolata, subrotundo — cordata, margine undique obsolete lobata, denticulata: denticulis subpurpurascensibus, spithamea, vel ultra, plana, patentia, supra glabra, venosa, subtus tomentosa, cinerea. **Petoli** teretes, supra plani, tomento raro adspersi. **CAL.** communis cylindricus, undique sulcatus, pubescens, utrinque trucatus, basi tumidiussculus, multipartitus: segmentis linearibus, parallelis, subæqualibus, convexis, marginibus membranaceis inflexis apice pariter membranaceo, explanato, erecto obtuso. **COR.** composita radiata, lutea, calycis longitudine. **Radius** foemineus, multiflorus, corollis linearibus, angustis. **Discus hermaproditus**, corollis infundibuliformibus, tubo filiformi, elongato, limbo subdiaphano, campanulato, 5 — fido, revoluto. **STAM.** syngenesia, corolla paullo longiora. **PIST.** **Germ.** utrisque cylindricum, coronatum **Pappo** piloso. **Styl.** cylindricus, foemineis elongatus. **Stigma** hermaphtod.

sim-

simplex; fœmineis 2, acuta. Receptaculum nullum.

PROPRIETAS. *Rec. Folior.* Odor debilis; Sapor amaricans; masticata folia lubriuscula. *Flor. rec.* Odor debilis; sapor amaricans, subgraviusculus.

COMPOSITA. Species pro Thee Germanico.

* TUSSILAGO PETASITES. L.

Petasites. Ph. Pestilenzwurzel. Dewesyl, wēt: ssi konseké kopyto.

T. Petasites. Thyrso ovato, flosculis fœmineis nudis paucis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* vivax, majuscula, crassitie digitii, longa, descendens, nudiſcula, glabra, apice incrassata, ovata, fibris plurimis filiformibus, descendantibus, e capite radicis exentibus. *Parencyma carnosum*, post transversalem sectionem notatum disco medullari, orbiculato, cincto annulo composito e punctis geminis, oblongis.

PROPRIETAS. *Rec. Radic.* Odor gravis; Sapor ingratus, amaricans, leniter stipticus.

SOLIDAGO VIRGAUREA. L.

Consolida Saracenica. Virga aurea. Ph. Heynd: nisch Wundkraut. Swäljst prest' edn, wy: soły tranſ.

Soli-

Solidago. Recept. nudum. *Pappus simplex.* Cor.
radii circiter 5. Cal. squamæ imbricato clausæ.

S. Virgaurea. Caule subflexuoso angulato, race-
mis paniculatis erectis confertis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. *Caulis* erectus, pedalis vel ul-
tra, simplex vel ramosus, striato — angulatus, gla-
ber. *Folia* alterna, ovali — oblonga, acuta, argu-
te serrata, minutim ciliata, venosa, utrinque gla-
briuscula, supra adspersa atomis cinereis, bipol-
licaria; inferiora caulinæ petiolata, superiora spa-
thulata, summa sessilia, ovato — lanceolata,
utrinque attenuata, integerrima; radicalia, h. e.
Folia primi anni novi surculi, longe majora, pal-
maria vel ultra, longius petiolata: petiolo pro-
funde canaliculato.

PROPRIETAS. Rec. Odor debilis, aromaticus;
sec. fortior. Sapor amaricans, calidiusculus.

COMPOSITA. Aqua Vulneraria cum Aceto
& cum Vino.

INULA HELENIUM. L.

Enula. Ph. Plant. Woman.

Inula. Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Antheræ.*
basi in setas duas desinentes.

I. Helenium. Foliis amplexicaulibus ovatis rugo-
sis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis,

Hortensis. Perennis.

S

Off.

Off. Radix.

FORMA. Rec. *Radix alba*, majuscula, superne ramosa: ramis teretibus, breviusculis; undique obsessa fibris filiformibus, albis. **Parencyma carnosum**, tranversaliter sectum centro medullari albo, uniformi, circumdato annulo punctato, peripheria incarnata, striis radiata.

PROPRIETAS. Rec. Odor gravis calidiusculus; Sapor amarus, ingratus, in Acorum incidens, diu inhæretis; masticata comminuitur, linguam faucesque leniter calefaciens.

PRÆPARATA. Essentia.

Extractum.

COMPOSITA. Rad. Elixirium Salutis.

Pulvis Vitæ.

Extract. Emplastrum Diabotanon.

ARNICA MONTANA. L.

Arnica. Ph. Wolverley, Engelstræ. Angelsey
træ.

Arnica. Recept. nudum. *Pappus simplex.* Corollæ radii filamentis 5 absque antheris.

A. Montana. Foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis,

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba. Flores.

FORMA. *Radix rec.* calatum aut etiam minimum ferme digitum interdum crassa, inæqualis, horizontaliter aut oblique excurrens, fibris plu-

pluribus deorsum tendentibus terræ affixa, extus spadicea, intus albida. *Rec.* *Caulis* teretiusculus, subnudus, undique striatus, pubescenti — scaber, erectus, pedalis, simplex vel subdivisus : ramis binis, oppositis, simplicibus, erectis, nudiusculis, elongatis, unifloris. *Folia* radicalia plura, ovato — lanceolata, obtusiuscula, sessilia vel inferne attenuata in petiolos lineares, palmaria, integerrima, margine minutim ciliata, supra scabriuscula, subtus glabra, trinervia ; *caulina* pauca, minora, alterna, linearis — lanceolata, sessilia, ad ramificationem vero opposita. *Flores* terminales, solitarii, pedunculati, erecti. *CAL.* communis imbricans, simplici serie : foliolis linearis — lanceolatis, acutis, æqualibus, pubescens, erectis. *COR.* composita radiata, *propria* *radii* lingulata, lanceolata, calyce triplo longior, patens, picta nervis longitudinalibus, parallelis, apice truncata, tridentata ; *disci* infundibuliformis, tubo cylindrico, pubescente, limbo cylindrico, glabro, quinquefido, lacinias revolutis, acutis scabridis. *S.LAM.* *disci* : *Filam.* 5, capillaria, minute ; *Antb.* cylindrica, corolla longior, ore 5-fido ; *radii* *Filam.* 5, tubo corollæ inserta, sterilia, absque anthera. *PIST.* utrinque. *Germ.* subulatum, undique longitudinaliter striato — angulatum, scabrum, coronatum pappo. *Styl.* setaceus, staminibus longior. *Stigm.* 2, subulato, spiraliter revoluta,

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* debilior; *rec.* gra-
veolens, sternutationem movens; *Sapor* herba-
ceus, acris. *Folia* siccata fragiliuscula; inter ma-
nus confricata & olfacta sternutationem excitant.

PRÆPARATA. Extractum Florum & Herbarum.
Syrpus Florum.

DORONICUM PARDALIANCHES. L.

Doronicum. Ph. Gänswurzel. Doronykum, Kam-
zykowy Koten.

Doronicum. Recept. nudum. *Pappus* simplex. Cyl.
squamæ duplicis ordinis æquales, disco longio-
res. *Sem.* radii nuda pappoque destituta.

D. Pardalianches. Folii cordatis obtusis denticu-
latis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexi-
caulibus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec.* *Radix* tuberosa, ovata, vix
pollicaris, alba, glabra, rugis annularibus, cilia-
tis; *parenchymate* carnosæ, albo, post sectionem
transversalem notato disco æquali, annulo con-
centrico prope peripheriam, e punctis discretis
serie annulari dispositis. *Siccata* dura, fragilius-
cula. (a)

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* debilis, aromaticus
in semen Nigellæ incidens; *Sapor* dulcescens, gra-
tus.

BEL.

(a) Hæc olim dicebatur Doronici Romani radix, a qua radix
Doroniei Longi sic dicti in alpinis sub nomine Gemsenwur-
zel cogniti ut plurimum differt.

BELLIS PERENNIS. L. (a)

Bellis Minor. Ph. Gánsblümel, Blaslieben, Rú-
derl. Sedmíkraša, matečník mensíj.

Bellis. Recept. nudum, conicum. Fappus nullus.
Cal. hemisphericus; squamis æqualibus. Sem.
ovatum.

B. *Perennis. Scapo nudo.*

Hortensis. *Perennis.*

Off. Herba. Flores. (b)

FORMA. *Folia radicalia in circulum expansa,*
petiolo longo, folioso, ipso folio fere ovato, cir-
cum crenato, firmulo, subhirsuto. Scapus nudus
uniflorus, dodrantalis. Flores rec. solitarii, pedun-
culati, pleni. CAL. communis polyphyllus: folio-
lis ovali — linearibus, obtusis, ciliatis, apice bar-
batis, viridibus, glabris, simplici serie imbricatis,
erectis. COR. composita, rubra — incarnata, ple-
na: corollis lingulatis, cuneiformibus, retusis,
bi vel tripartitis, basi tubulosis, tubo pubescenti,
brevi. STAM. nulla. PIST. Germ. ovatum, com-
pressum, glabrum. Styl. cylindricus, longitudi-
ne tubi, albidus. Stigm. bifidum, acutum, lute-
cens. Recept. nudum.

PROPRIETAS. Rec. *Odor nullus; Sapor vix*
ullus.

MATRICARIA PARTHENIUM. L.

f3

Mat-

a) Bergio Bellis Arvensis.

b) Pro succis herbarum etiam recens adhibetur.

Matricaria. Ph. Mutterkraut. Matečný, Ržim.
babá.

Matricaria. Recept. nudum. Pappus nullus. Cal.
hemisphæricus, imbricatus : marginalibus soli-
dis, acutiusculis.

M. Parthenium. Foliis compositis planis : folio-
lis ovatis incisis, pedunculis ramosis.

Hortensis. Perennis.

Off. Herba. Flores.

FORMA. Rec. Caulis teres, erectus, undique
striato — angulatus, glaber, bipedalis, virgatim
ramosus. Rami alterni, striato — angulati, erexit
minutim pubescentes. Folia alterna, ad ramos,
petiolata, plana, utrinque glabra, undique adspersa
punctis parvis, excavatis, frequentibus ; pinna-
tisida : pinnis suboppositis, ovato — oblongis, pin-
natifidis, inciso — ferratis. Petioli subtriquetri.
Corymbus terminalis in ramis, erectus, inferne
foliosus, pedunculis elongatis, sulcato — angula-
tis, pubescentibus. Bracteæ lineares, angustæ, ad
basim pedunculorum, & in ipsis pedunculis, so-
litariæ. CAL. communis, hemisphæricus, sulca-
tus, cinereus, arête imbricatus : squamis parvis
linearibus, convexo — carinatis, margine mem-
branaceis, subciliatis, apice scariosis, adpressis.
COR. composita, radiata. Discus lateus, hemi-
sphæricus, hermaphroditus. Radius albus, defle-
xus, hermaphroditus, Propria disci tubulosa, an-

gu-

gulata, scabriuscula, incurvata, calyce paullo longior, ore 5 — fido; *radii*, ligulata, ovali orbiculata, apice retusa, tridentata, supra glabra, carinata, longitudine calycis, subtus rugosa, tubo breviusculo, utrinque marginato. STAM. Disc. Filam. 5, capillaria; *Antera* tubulata. PISTIL. utrisque. Germ. oblongum, striato — angulatum, glabrum, nudum. Stilus filiformis, staminibus paullo longior. Stigm. 2, acuta, revoluta. Semina oblonga, angulata, nuda. Receptac. nudum,

PROPRIETAS. Totius herbe Odor fragrans, validus, graviusculus, in Chamomillam & Tanacetum incidens; sed florum odor fortior; Sapor amaricans, aromaticus, odori congruens, calidiusculus, præcipue florum.

PRÆPARATA. Fol. Aqua.

COMPOSITA. Herb. Aqua hysterica fœtida;

MATRICARIA CHAMOMILLA. L.

Chamomilla vulgaris. Ph. Gemeine Chamille;

Xmen aneb heřmánek.

M. Chamomilla. Receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.

Indigena. Annua,

Off. Flores.

FORMA. Rec. Flores terminales, subpaniculati; pedunculati: pedunculis striatis, nudis, unifloris. CAL. communis hemisphæricus, arcte imbri-

ca-

catus : squamis linearis — oblongis, obtusis, apice acutis membrana scariosa. Cor. composita, radiata; Discus hermaphroditus, luteus, conico — hemisphaericus. Radius foemineus, reflexus, albus. Propria disci: tubulata, infundibuliformis, tubo crassiore membranaceo, rugoso, ore 5 — fido; radii ligulata, linearis subcuneiformis, obtusa, retusa, tridentata STAM. syngenesia. PIST. utrisque. Germ. oblongum, nudum. Styl. breviusculus. Stigm. 2, revoluta. Receptac. nudum.

PROPRIETAS. Rec. florum: Odor fragrans, gratus, fortior; Sapor aromaticus, calidiusculus; sicc; consimilis.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum Coctum. — Destillatum. — Infusum.

Syrupus.

COMPOSITA. Flor. Aqua Vulneraria cum aceto.

Emplastrum de Meliloto.

Species Emollientes.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Unguentum Carminativum. — Nervinum.

Ol. inf. Emplastrum Diachylon cum Gummatibus. — de Meliloto. — ad Rupturas,

AN-

ANTHEMIS NOBILIS. L.

Chamomilla Romana. Ph. Römische Chamille.
Rmen aneb hermánek Ríjmský.

Anthemis. Recept. paleaceum. *Pappus nullus.* Ca-
lyx hemisphæricus, subæqualis. *Flosculi radii*
plures quam 5.

A. Nobilis. Foliis pinnato — compositis lineati-
bus acutis subvillosis.

Hortensis. Perennis.

Off. Flores.

FORMA. Rec. Flores pedunculati, sæpe ple-
ni. CAL. communis hemisphæricus, minutim la-
nuginosus, undique sulcatus, imbricatus : squa-
mis linearibus, adpressis; inferioribus acutis, mar-
gine scariosis; superioribus paullo majoribus,
pariter apice scariosis, obtuso — rotundatis. COR:
composita, radiata. Radius fuscineus, albus, ca-
lyce duplo longior, corollis ligulatis, linearibus
obtusis, crena duplice emarginatis, patentibus.
Discus luteus, hermaphroditus, corollis infundi-
buliformibus, ore crenato. STAM: syngenesiæ,
corolla breviora. PIST. utrisque. Germ. lineare,
nudum. Styl. subbulatus. Stigm. 2, acuta reflexa.
Receptac. paleaceum, paleis scariosis, linearibus
concaviusculis, obtusis, floribus brevioribus.

PROPRIETAS. Rec. & sicc. Odor fragrans, for-
tis, balsamicus, gratus, cephalicus, in Chenopo-
dium Botrytidem incidens; Sapor odori congru-
ens, amaricans, calidiusculus.

Com-

COMPOSITA. *Aqua Carminativa Communis & Regia.*

Essentia Carminativa.

ANTHEMIS PIRETRUM. L.

Pyretrum, Ph, Bertram, Peltrám,

A. Piretrum, Caulibus simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato — multifidis, Exotico, Perenne.

Off. Radix. (a)

FORMA. *Rec. Radix descendens, digitalis vel ultra, crassirie pennæ anserinæ, sæpe cygneæ, cylindrica, recta, vix flexuosa, extus longitudine liter rugosa, fusco — cinerea, fibrillis capillaribus, sparsis, apice setis & petiolis resectis (in siccata) terminata. Parenyma album, subcarnosum, post sectionem transversalem notatum centro medullari orbiculato, stellato, radiis obsoletis; siccata durum, fragile.*

PROPRIETAS. *Sicc. Odor vix ullus. Sapor peculiaris, acidus, acris, inhærens; masticata dura, comminuitur, acida primum, dein acris, pungens, linguae labiisque inhærens, salivam copiosam alliciens, postea fauces irritans; recentis sapor mitior.*

ACHILLEA MILLEFOLIUM. L.

Millefolium. Ph. Schaafgarbe. Kjebříček.

Achi-

a) Apud nos fere semper substituitur radix Artemisiae Draconisculi,

Aebla. Recept. palleaceum. *Pappus nullus. Cal-*
ovatus, imbricatus. Floculi radii circiter 4.

A. Millefolium. Foliis bipinnatis nudis: lacinias
 linearibus dentatis, caulis superne fulcatis.
 Indigeno — Perennis.

Off. Herba. (α) Flores albi & rubri.

FORMA. Rec. Caulis erectus, pedalis, tere-
 tiusculus, striatus, subangulatus, lanuginosus, sim-
 plex, superne parce ramosus. *Folia* sessilia, am-
 plexicaulia, linearis — lanceolata, alterna, pinna-
 ta: pinnulis obovatis, oppositis, bipinnatifidis,
 acutis, obliquis, supra minutim pubescentibus,
 subtus lanuginosis; inferiora petiolata: petiolis
 membranaceis, subvaginatis. *Corymbus* florum
 terminalis, fastigiatus, lanuginosus. *Bracteæ* linea-
 res, pinnatifidæ vel integræ, pubescentes parvius-
 culæ, ad ramos corymbi & pedunculos. *CAL.*
 communis ovatus, pubescens, arcte imbricatus:
 squamis ovalibus, concavis, pubescentibus, obtu-
 siusculis, superne margine ciliatis. *COR.* com-
 posita, radiata: *Discus* 12 — florus, longitudine caly-
 cis hermaphroditus albus. *Radius* 5 — florus albus,
 fœmineus, laxe imbricatus. *Propria disci* tubulata,
 infundibuliformis, tubo sordide lutescente, limbo
 subdiaphano, campanulato, albido, 5 — fido: laci-
 niis ovato — acutis, revolutis; *Radii* ligulata, tu-
 bo cylindrico, viridescente, striato, subpubes-
 cente, longitudine calycis. *STAM.* syngenesia,

* *Herbz recentis usus etiam ad succos herbarum.*

corolla paullo longiora, filamentis albis, anthers lutea. PIST. utrisque. Germ. oblongum, compressum, subtetragonum, album, nudum, glabrum. Styl. capillaris, staminibus longior, Stigm. 2, linearia, truncata, patentia. Receptac. paleaceum : paleis teneris, membranaceis, oblongis, fibris brevioribus.

PROPRIETAS. Rec. Folior. Odor debilior, in odorem mucronis incidens; Sapor consimilis, americans. Florum: Odor foliorum, verum longe gravior; Sapor americanus, subcalidiusculus, leniter aromaticus; sicc. sapor consimilis, leniter acriusculus.

O R D O POLYGAMIA, ERUSTRANEA.

CENTAUREA CYANUS. L.
Cyanus. Ph. Blaue Kornblumen. Chrys., mōdrāk.
Centaurea. Recept. setosum, Pappus simplex. Cor. radii infundibuliformes, longiores, irregulares.
C. Cyanus. Calycibus ferratis : foliis linearibus integerrimis : infimis dentatis.
Indigena. Annua.

Off.

Off. Flores. (a)

FORMA. Rec. *flores* in ramis terminales, solitarii, pedunculati, erecti. **CAL.** communis ovatus, cinereus, tomentosus, undique imbricatus: squamis adpressis: inferioribus minoribus ovatis, acutis, margine undique serratis: ferraturis membranaceis, albido, acutis, apice fuscis; superioribus sensim longioribus, apice duntaxat serratis, obtusis; supramis linearibus, pariter obtusis, minutim serratis. **COR.** composita radiata, pulcerrime dilute cœrulea. *Discus hermaphroditus*, Calyce duplo longior. *Radius sterilis*. **Propria disci**: tubulata, tubo cylindrico, albo, longitudine calycis; limbo cernuo, cœruleo, 3 — angulari: angulis 3 gibbosis; 5 — fidus: laciniis linearibus, angustis, obtusiusculis, tubo longioribus, erectis; *Radius infundibuliformis*, tubo filiformi, calyce longiore, inferne albo, superne cœruleo, inæquali, circiter 8 — fido: laciniis 5 exterioribus altioribus lanceolatis, acutis, patentibus; 3 interioribus, longe minoribus, profundius divisis, superne ferratis. **STAM.** *Filam.* 5, alba, tando paullo longiora, apice barbata. *Anthera* tubulata, cylindrica, saturate cœrulea, corolla paullo longior. **PIST.** *hermaphro.* *Germen* obovatum, album, minutim pubescens, compressiusculum, coronatum *Pappo simplici*, sessili, albo, longitudo

dine

(a) *Radii steriles.*

dine fere staminum, superne cœrulescens. *Stigm.*
2, cœrulea, erecta. *Famineis*: *Germ.* obsoletum.
Recept. setosum: fetis paleaceis, angustissimis, albis.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* remissor, parum
gratus; *Sapor* vix amaricans; *masticati* salivam
violaceo colore tingunt. Flores recentes in pa-
pyro fricati, maculam relinguunt dilute cœru-
leam.

COMPOSITA. Pulvis fumalis ordinarius.—
Sternutatorius variegatus.

CENTAUREA BENEDICTA. L.

Cardus Benedictus. Ph. *Kardus Benedicti*. *Kard-*
benedykt, *Kardus* neb *bodlák požehnaný*,
přiměřný *Vlasty*, *krásowlásek*.

C. Benedicta. Calycibus duplicato — spinosis la-
natis involucratis, foliis semidecurrentibus
denticulato — spinosis.

Hortensis. Annua.

Off. Herba. Semen.

FORMA. *Rec.* *Caulis* subbipedalis, erectus,
teretiusculus, sulcato — angulatus, hispidus, su-
perne ramosus. *Rami* sparsi, sulcato — angulati
erecti, superne brevius ramosi. *Folia* spithamea,
obtusa rugosa, hispido — scabra, subtus reticula-
tim venosa, runcinata: lobis oppositis, oblon-
gis, obtusis cum mucrone, margine ciliatis, den-
ticulato — aculeatis, inferiora petiolata; supetio-
ra sessilia, erecta. *Sem.* oblongum, leviter incur-

vum,

vum, basi ad latus exsertum, striatum, supra mat-
gine ferrato coronatum, cortice griseo vestitum,
intra quem medulla alba.

PROPRIETAS. *Rec. Odor nullus; Sapor folio-*
rūm intenſe amarus, non nauseosus inhærens,

PRÆPARATA. *Conſerva.*

Extractum.

Sal medius.

COMPOSITA. *Herb. Effentia Absinthii com-*
poſita.

Extractum americans.

Oleum Viride.

Pulvis Vitæ.

Species Decocți Antifebriles.

Extract. Elixirum Stomachicum tem-
peratum.

Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

ORDO

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA OFFICINALIS. L.
Calendula. Ph. Ringelblume. Mēsycēl.
Calendula. Recept. nudum. Pappus nullus. Cal.
polyphyllus æqualis. Sem. disci membranacea.
C.

C. Officinalis. Seminibus cymbiformibus muri-
catis incurvatis, omnibus.

Hortensis. Annuæ.

Off. Flores.

FORMA. Rec. Flores solitarii, pedunculati,
nudi, erecti. CALYX communis polyphyllus, pu-
bescens, simplici serie imbricatus, squamis linea-
ribus, acutis, apice fuscis, erectis, extus conve-
xis, intus concavis, subæqualibus, laxiusculis.
COR. composita fulva, radiata. Discus herma-
phroditus, longitudine calycis; radius fœmineus,
patens, (inculta) 20—florus, imbricatus; Propria-
tæ: infundibuliformis, tubo brevi, pubescente,
limbo turbinato, glabro, 5—fido: laciniis
ovato — acutis, margine undique incrassato, ere-
ctis; radii: ligulata, obverse lanceolata, plana,
striata, calyce duplo longior, basi tubulata, pu-
bescens, apice obtuso. STAM. syngenesia, lutea,
corollæ circiter longitudine. PIST. disci: Germen
cylindricum. Stylus cylindricus, corolla paullo
longior. Stigma simplex capitatum, luteum. Ra-
dii: Germen subcylindricum, incurvum, villosum.
Stylus cylindricus, longitudine tubuli radii.
Stigm. 2, linearia, acuta revoluta. Receptac. nudum.

PROPRIETAS. Rec. Florum. Odor svaviter
subnarcoticus; Sapor leniter acidulus, saliva lute-
scens; sicc. odor vix ultius, nec sapor.

Com.

COMPOSITA. Fulvis Fumalis ordinarius. —
Sternutatorius variegatus.

Unguentum Balsamicum.

O R D O.

M O N O G A M I A.

V IO LA ODORATA. L.

Viola. Ph. Blaue Veilchen, Veigel, *Viola wons
ná neb modrá.*

Viola. Cal. 5 — *phyllus. Cor.* 5 — *petala, irreg-
ularis, postice cornuta. Caps. supera,* 3 — *valvis, unilocularis.*

*V. Odorata. Acaulis, foliis cordatis, stolonibus
reptantibus.*

Indigena. Perennis.

Off. Herba. Flores. Semen.

FORMA. *Rec.* *Folia omnia radicalia, petiolata,
patentia, cordata, obtusa, margine crenata,
minutim ciliata, supra glabra, nervis &c venis ar-
cuatis lineata, subtus nervis pubescentia, pollica-
ria vel ultra. Petioli erecti, pubescentes, subtus
convexi, supra plano — canaliculati, foliis longior-
res: Stipulae 2. radicales, membranaceæ, lat ceo-
latæ, acutæ, ferrato — ciliatæ. Caulis nullus. Sto-*

T lones

lones palmates, procumbentes, teretes, palide vi-
ridescentes, foliosi. Pedunculi radicales, filiformes,
pubescentes, purpurascientes, hihc convexi,
itide sulcati, foliis breviores, uniflori. Bracteæ 2,
lineares, oppositæ in medio pedunculi. Flores
nutantes. CAL. Perianth. 5 — phyllo, foliolis
adnatis, ovali — linearibus, obtusis, glabris, sed
atomis elevatis adspersis, viridi — fuscescensibus,
erectis, 2 utriusque lateralibus, imbricatis, uno
superiore. COR. violacea, 5 petala, calyce duplo
longior, irregularis, petalis obovatis, obtuso —
rotundatis, subæqualibus, basi unguiculatis, albi-
cantibus, subbarbatis; quarum 2 superiora re-
flexa sursum spectantia; lateralia 2 opposita, pa-
tentia; insimo deorsum spectante, versus basim
striis fuscis, subparallelis picto, & callis 2 linea-
ribus concavitatem includentibus, instructo, po-
ne cornuto; cornu conico, obtuso, incurvato,
intra foliæ calycina prominente. STAM. Filam.
vix ulla. Antheræ 5, pallidæ, conniventes, sub-
tetragonæ, in medio sulcatæ, latere utrinque hian-
tes, apice acutæ, squama ovato — oblonga, obtu-
sa, lutescente, erecta; harum antherarum duæ
basi excurrunt in appendices 2 subulatas, incur-
vas, compressas, cornu intrusas. PIST. Germ.
superum, conicum, subangulatum, pubescens. Sty-
lus obverse subulatus, glaber, apice hamatus.
Stigma laterale, subulatum, obtusum, terminatum

lata

sera pubescente, molli. *Capsula* ovata, obtusa, dilute pubescens, texangularis: angulis 3 alternis, incrassatis, rotundatis, 3 alternis parvis; unilocularis, trivalvis. *Semina* plura, obovata, obtusa, glabra, trifariam longitudinaliter disposita, pendunculata.

PROPRIETAS. *Rec. folior.* Odor vix ullus. Sapor herbaceus, masticata mucilaginosa. *Flor.* Odor sraweolens, Iridis florentinæ; Sapor debilis, violaceus; masticati teneri, saliva violacea. *Sicc.* inodori.

PREPARATA: *Flor.* Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* Unguentum Populeum, Syrup. Pilulæ de Cynoglosso.

VIOLA IPECACUANHA. L. (a)

Ipecacuanha. Ph. Hypoakarna, Brechwurzel, Hypokakoána, dawic.

V. Ipecacuanha. Foliis ovalibus margine subtus que pilosis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix* sicc. cylindrica, digitalis vel ultra, crassitrix pennæ anserinæ, cinerea, rursum prorsum flexa, annulis s. rugis torulosis transversalibus, approximatis; per encymate resinoso, brunneo, fragili, fibra lignea centrali, longitudinali.

t 2

PRO-

(a) Hæc species suppeditat Svecis Ipecacuanha alba radicem dum L'ONICERA cum le proœmbente repente foliis obverse ovatis, acutis scabris, dat radicem Ipecacuanha,

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor graviuscula^s, subnauseosus. *Sapor americans*, graviulus; *maſticeata* radix acriuscula, faucibus inhærens. Inter pulverandum orti cricum circa pulvifculi stimulant in naso, & sternutationem cident, pulmonibus etiam molesti.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

ORDO DIANDRIA.

O RCHIS MORIO. L.

Salep. *Satyrium.* *Ph.* *Salapwurzel.* *Wistawač*
Frálowský.

Orcbis. *Nectarium corniformae* pone florem.

O. Morio. *Bulbis indivisis,* *nectarii labio quadri-*
fido crenulato: *cornu obtuso adscendente,* pe-
talis obtusis coniventibus.

Indigenum & Exoticum. *Perenne.*

Off. *Radix variarum Orchidis specierum.*

FORMA. *Rec.* *Bulbus ovatus,* magnitudine
nuclei Persici, s^ape etiam Amygdalæ, undique
al-

albus; parenchymate albo, minutim spongioso; siccatus. extus cinereus, minutim rugosus; parenchymate faciei cornæ.

PROPRIETAS. Rec. Odor hircinus; Sapor vix nullus; bulbus masticatus tener, mucilaginosus, fere insipidus, inter dentes crepusculus, solvitur usquequoque, saliva mucilaginosa.

* EPIDENTRON VANILLA. L.

Vanilla. Ph. Vanille, Vanilie. Wanylie.

Epidentron. Nectarium turbinatum, obliquum reflexum.

E. Vanilla. Scandens, fol. ovato — oblongis nervosis sessilibus, caulinis, cirrhis spiralibus.

Exotica. Frutex Parasiticus.

Off. Siliqua. (a)

FORMA. Sicca. Siliqua dodrantalis, crassitiae pennæ cygneæ, recta, cylindrica, compressiuscula, fusco — brunea, longitudinaliter undique rugosa (hic a siccatione) lucidiuscula, flexilis, unilocularis, apice cernuo obtuso — truncata, basi sensim paullulum angustata, incurvata; parenchymate carnosæ — coriaceo, pinguisculo, centro longitudinaliter cavo, repleto pasta molli, pingui, nigra, e seminibus condensatis constante. Semina tantum non innumera, minutissima, subrotunda, nigra, splendentia.

PROPRIETAS. Odor per quam fragrans, inhæ-

t 3

reus.

a) An in aliud usum quam pro enocolada?

rens, exacte Balsami Peruviani. Sapor aromati-
cus, validus, subdulcescens, ab odore non ablu-
dens, calidiusculus, balsamicus, gratus; masticata
filiqua coriaceo mollis, tenaciuscula, emollitur,
tardius comminuitur.

O R D O

H E X A N D R I A.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. L.
Serpentaria Virginica. Ph. Virginische Schlan-
genwurzel. Hadskoten, hads ged hogicy ſo-
ten.

Aristolochia. Cal. o. Cor. 1 — petala, lingulata, in-
tegra. *Caps. 6* — locularis, infera.

A. Serpentaria. Folis cordato — oblongis planis,
caulibus infirmis, flexuofis teretibus, flor. fo-
litariis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix. (a)

FORMA. Sicc. Radix fibrosa, descendens,
biplicaris, vix palmaris, ferruginea: fibris plu-
rimis filiformibus, fragilibus, flexuofis, subæqua-
libus, descendantibus, fibrillosis: fibrillis crissis.
Parencyma album, solidiusculum, post sectionem
trans-

(a) Radix cum foliis prostat.

transversalem notatum disco æquali, puncto centrali ferrugineo.

PROPRIETAS. *Odor fragrans, fortis, balsamicus, fere ut tæda ligni Pini. Sapor aromatico — balsamicus, odori congruens, calidiusculus, inhærens.*

PRÆPARATA, Essentia.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. L.

Aristolochia Rotunda. Ph. Nund. Osterluzen.

Podražec ofrauhly.

A. Rotunda. Fol. cordatis sessilibus obtusis, caule infirme, flor. solitariis.

Hortensis. Perennis.

Off. Radix. (a)

FORMA. *Sicc. Radix subrotunda, nodulosa: nodis obtuso — rotundatis, pollicariis vel ultra, extus ferrugineo — cinerea, subrugosa; parenchymate duro, albido — citrino, post sectionem transversalem centro medullari ampio.*

PROPRIETAS. *Odor gravis; Sapor amarus sub-aromaticus.*

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi. — Diatessaron.

Pilulæ de Succinio Crocatæ.

* **ARISTOLOCHIA CLEMATITIS,** L.

Ari-

a) Sub nomine Aristolochiae rotundæ vulgaris prostant radices Fumarie bulbosæ in officinis nostris,

Aristolochia Vulgaris. Ph. Gemeine Österreicher.

Podrazil dlahý neb obecný.

A. Clematitis. Fol. cordatis obtusiusculis hirtis,
flor. solitariis pedunculis recurvatis subtrun-
catis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. Rec. Radix cylindrica, simplex, lon-
ga, subtetragona, descendens, parce fibrillosa,
craustis vix digitii minimi, extus glabra, olivacea,
parenchymate albido, post sectionem transversalem
distincto centro medullari amplissimo, orbiculato,
stellato : radiis cinereis, superne sensim latiori-
bus, apice obtuso truncatis, crenulatis, ferrugineis.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans, subgraveo-
lens ; Sapor aromatico — gravis herba magis
amarus, inhærens.

ORDO.

DODECANDRIA.

CYTINUS HYPOCISTIS. L.

Hypocistis. Ph. Hypocisten. Hypocistis.

Cyrinus. Cal. 4 — fidus, superus. Cor. o. Anthe-
re 16, sessiles. Bacc 8 — locularis, polysper-
ma.

Exoticus. Parasiticus in Cisto.

Off.

Off. Succus inspissatus.

FORMA. *Succus inspissatus* in massam nigricantem, plasticam, subfragilem, fragmentis opacis, atomis subsplendentibus.

PROPRIETAS. *Odor vix ullus; Sapor acerbus, in saporem atramenti leviter incidens, stypticus, acidulus; medicinalis dentibus subadglutinatus, solvit in ore: saliva fusco nigricante.*

COMPOSITA. *Electuarium seu Theriaca Andromachi.*

O R D O.

P O L Y A N D R I A.

ARUM MACULATUM. L.

Arum. Ph. Aron, Zehrurzel. Aron, aronowá bylina, Aronowé brady kořen, twarz S. Janá.

Arum. Spatha monophylla, cucullata. Spadix super nudus, inferne femineus, medio stamineus.

A. Maculatum. Acaule, fol. hastatis integerrimis, spadice clavato.

Hortense. Perenne.

Off. Radix.

FOR.

FORMA. *Rec.* *Radix* recens tuberosa, magnitudine vix ovi columbini, obducta tunica tenera; membranacea, ovata, extus alba, parce fibrillosa: fibris sparsis; tuberculis undique sparsis, distantibus, subrotundis, sc. totidem bulbulis parvis, ætate sensim excrescentibus; apice instruta. *Squamis* plurimis albis, membranaceis, imbricatis, adpressoſculis; quarum interiores minores, intra quas latet denticulus vivax, solitarius, subulatus, acutus, subincurvatus. *Parenyma* album, carnosum, post sectionem transversalem æquale, subsucculentum: succo maculas albidas, amylaceas, in cultro deponente. *Siccata* radix dura, subdiaphana; *vetusta* s. diu servata nivea, farinosa, sicca, fragilis, friabilis, subinquinans, facie creteæ albæ.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* nullus; *Sapor* primum insipidus, mox vero pungens, qui sensus pungitorius sensim increscit, haud aliter ac mille scus pungerent, atque inhæret etiam si os eluitur aqua pura, oleosis vero mitigatur. *Recens* radix reſecta lactescit, lacte amylaceo, quiete amyllum album deponente, supernatante liquido limpido. *Recenter* *siccata* radicis *Sapor* adhuc pungens, paullo tamen remissior quam recentis; *diu* vero *siccata* & arida farinaceus, vix pungens; hæc masticata, farinacea sentiunt & inter dentes friabilis, facile comminuitur, solvitur fere: *saliva* la-
ctes-

& escente; immo hæc, contusa, ex aqua frigida superflua resolvitur in amyllum album, recentis radieis amylo simillimum. Omnis radix ori, siccata & contusa, atque in aqua cocta, abit in Gelatinam mitem, dulcescentem, sapidam, alimentarem, glutinantem. Sic tota radix annosa amyllum constituit.

COMPOSITA. Pulvis Stomachicus Birkmanni.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

ORDO

TETRANDRIA.

BE T U L A ALBA. L.

Betula. Ph. Birke. Bëßza.

Betula. Mas. Cal. 1 — phyllus, fidus, 3 — florus. Cor. 4 — partita.

FEM. Cal: 1 — phyllus, sub 3 — fidus, 2 — florus, Sem. utrinque membrana alata.

B. Alba. Fol. ovatis acuminatis serratis.

Indigena. Arbor.

Off. Gemmæ recentes pro Unguento Medicorum.

BUXUS SEMPERVIRENS. L.

Buxus. Ph. Buchsbaum. Pusspan.

Buxus. Mas. Cal. 3 — phyllus. Petala 2. Germinis rudimentum.

FEM. Cal. 4 — phyllus. Petala 3. Styli 3.

Caps. 3 — rostris, 3 — locularis. Sem. 2. Hortensis. Arbuscula.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum solidum, duriusculum, ponderosum, pallido — citrinum, venis longitudinalibus; vestitum cortice cinereo, rugoso; post sectionem transversalem notatum venis transversalibus, parallelis, & striis decurrentibus, minutissimis.*

PROPRIETAS. *Odorem vix habet, nec Saporem.*

PRÆPARATA. *Oleum Epyreumaticum.*

URTICA DIOICA. L.

Urtica Major. Ph. Brennessel. Kopřivá pálivá neb wětſſj.

Urtica. Mas. Cal. 4 — phyllus. Cor. o. Nectarium centrale, cyathiforme.

FEM. Cal. 2 — valvis. Cor. o. Sem. 1. nitidum.

U. Dioica. Fol. oppositis cordatis, racemis geminis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FOR-

FORMA. *Rec.* *Caules* plures ex una radice
erecti, simplices, vix ramosi, tetragoni : angulis
subrotundis, 4 — fulcatis, pubescenti — hispidis :
pilis rigidiusculis, inferne crassis, cylindricis, in
medio articulatis, apice subulato, acuto, pungen-
te. *Folia* opposita, petiolata, cordata, acuta, gros-
se ferrata, bi—vel tripollicaria, supra lineata, ru-
gosa, saturate viridia, subtus pallidiora, utrinque
hispida : pilis breviusculis, rigidis, subulatis, ba-
si globosis ; superiora proximiora. *Petiolæ* tetra-
goni, hispidi. *Stipulae* oppositæ, bipartitæ : la-
ciniis linearibus, obtusiusculis, submembranaceis,
ciliatis, patent — reflexis.

PROPRIETAS. *Rec.* *Herbae* : *Odor* & *Sapor*
herbacei.

COMPOSITA. Unguentum Mendicorum.

⊕ **MORUS NIGRA.** L.

Morus. Ph. Maulbeerbaum. *Marusse.*

Morus. MAS. *Cal.* — partitus. *Cor.* o.

FEM. *Cal.* 4 — partitus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Cal.*

baccatus. *Sem.* I.

M. Nigra. Fol. cordatis scabris.

Hortensis. Arbor.

Off. *Fructus* recens.

FORMA. *Rec.* *Baccæ* axillares e foliis, bre-
vius pedunculatæ, ovales, obtusæ, fusco — nigræ,
glabré, lucidiusculæ, subpollicares, pondere
Scrup. 2 — 4, compositæ e Basculis, dispositis se-
rie

rie longitudinali, inæquali, obovatis, compressis,
truncato obtusis, terminatis pistillo, undique im-
bricatis in receptaculo carnosō, cylindrico; fin-
gulis constantibus e 4 lobis vesiculosis, teneris,
succosis, superne convexis, inferne attenuatis, im-
bricatis, arcte coniventibus; quorum 2 exteriōres
oppositi, concavi, margine rotundato — adpres-
to, minutim pubescente; 2 interiores conniven-
tes, paralleli, directione contraria ad exteriōres.
Semen unicum in medio, intra lobos, triangu-
lari — ovatum, acutum, glabriusculum, compres-
sum, dorso plano, antice acie acuta, inferne truncat-
um, cavum, auctum apophysi gelatinosa, invo-
lutum propria tunica subexsucca.

PROPRIETAS. *Baccar.* rec. *Odor* vix ullus;
Sapor acidulus, insimul in concumerinum inci-
dens. *Baccæ masticatae* valde succosæ, extrahitur
succus remanent pelliculæ, receptaculum & semi-
na exspuenta: *saliva nigro* — *violacea*.

PRÆPARATA. Roob.

Syrupus.

ORDO

POLYANDRIA,

POTERIUM SANGUISORBA. L.

Pimpinella Rubra. Ph. Noth Bibernel. Bedr-
nje, erwawé Kotenj.

Poterium. MAS. Cal. 4 — phyllus. Cor. 4 —
partita. Stam. 30 — 40.

FEM. Cal. 4 — phyllus. 4 — partita. Pift. 2.
Paccia e tubo corollæ indurato.

P. Sanguisorba. Interme, caulis subangulatis,
Hortensis, Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. Caules plures ex una radice,
erecti, pedales, angulati, virides, angulis linea
fuscâ notatis; glabri, ramosi. Rami alterni, ere-
cti, compresiunculi, angulati. Folia altena, petio-
lata, pinnata cum impari, septemjuga: foliolis pe-
tiolellatis, oppositis, ovatis, obtusis, inciso — fer-
ratis, utrinque glabris, venulosis, subtus glaucis,
carinatis, supra obscure vitidibus, concaviflu-
lis; inferioribus minoribus. Petoli communes
fuscescentes, parce pilosi, subtus convexi supra
canaliculati, basi concavi, ciliati. Stipulae utrin-
que 3, ex pari foliorum solitario, basi petoli.

PROPRIETAS. Rec. Odor fragrans, graviuf-
culus, gratus; Sapor congruens.

COMPOSITA. Species Decoceti Althææ Fer-
nelii.

QUERCUS ROBUR. L.

Quercus. Eiche. Dub.

Quercus. MAS. Cal. 5 — fidus fere, Cor. o. Stam.

5 — 10.

FEM.

FEM. *Cal.* 1 — *phyllus*, *integerrimus*, *scaber*. *Cor.* o. *Styli* 4 — 5. *Sem.* 1. *ovatum*.

Q. *Robur*. *Fol.* *deciduis oblongis superne latori-
bus*; *sinibus acutioribus, angulis obtusis*.
Indigena. Arbor.

Off. *Cortex. Gemmæ recentes (Oculi vul-
go) Folia. Glandes.*

FORMA. *Cortex* *trunci planiusculus, crassi-
tie semipollucari, subligneus, undique cinereus*,
*extus longitudinaliter subfissus, sæpe conspurca-
tus lichenibus. Folia alterna, breviter petiolata*,
fere digitalia, cuneiformia, runcinato — lobata:
*lobis oppositis, obtusis, inferioribus sensim mi-
noribus; utrinque glabra, minutissime venulo-
— reticulata, margine subrecurvato, integerrimo*.
*Pedunculi axillares, in summitate ramulo-
rum solitarii, foliis breviores, nudi, glabri. Pe-
rianth. fructus (cupulæ) cinerascens, crassiuscu-
lum, corticosum, communiter getminum, sæpe
solitarium, pateriforme, integerrimum, margine
truncato, æquali minutissime ciliato, extus rugo-
sum: squamulis imbricatis, ovato — acutis, sub-
carinatis, adpressis, apice obtusiusculis; intus læ-
ve, centro derafo in fundo pallidiore. Nux ova-
lis, calyce triplo longior, undique lævis, nitidius-
cula, colore stramineo, striis rubicundis longitudinalibus,
basi macula orbiculata — derafa, api-
ce obtusa, subvillosa, cum umbilico cylindrico*

pro-

prominente; *testa* pergamena, fragili; *nucleo* dupli tunica obvelato, extus rugoso: vestigiis venulosis; bipartibili, solido; plumula in apice: puncto subrotundo, subprominente. (*)

PROPRIETAS. *Corticis:* Odor vix ullus; *Sapor* acerbus, stypticus. *Glandis rec.* Odor nullus; *Sapor* acerbus, stypticus; *Siccata* dura. *Lazaretum*

COMPOSITA. *Gem.* Unguentum Mendicorum.

JUGLANS REGIA. L.

Juglans. Ph. Welscher Nussbaum. *Wlaſtý ořech.*

Juglans. MAS. *Ca'*. 1 — phyllus, squamiformis
Cor. 6 — partita. *Filamenta* 18.

FEM. *Cal.* 4 — fidus, superus. *Cor.* 4 — par-
tita: *Styli* 2. *Drupa* nucleo sulcato.

Z. Regia. Foliolis ovalibus glabris subserratis
subæqualibus.

Hortensis. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Rec.* *Nux* matura majuscula, polli-
caris, subrotunda, ossea, fulcis reticulata, bivalvis,
semiquadrilocularis; *nucleo* albo, quadrilobo: lo-
bis longitudinalibus, anfractuosis, auriformibus
undique gibbulis rugosis, binis utrinque latere
parallelis; membrana obvelato.

PROPRIETAS. *Nucleorum* matur. Odor nullus;
Sapor subdulcescens; *masticati* firmi, comi inu-

U

*) Huic parasiticus est Agaricus Chirurgorum.

vuntur, saliva emulsiva. Nucleus immaturus, dis-
sectus, inter anfractus plurimum mucilaginis foget.

PRÆPARATA. Oleum expressum.

COMPOSITA. O/. Balsamum Sulphuris Rulandi.

Unguentum de Styrace.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. L.

Styrax Liquida. Ph. Flüssiger Storax. Tekauç
Styrax.

Liquidambar. MAS. Cal. communis 4 — phyllus.
Cor. o. Filam. numerosa.

FEM. Cal. in globum, 4 — phylli. Cor. o. Sty-
li 2. Caps. multæ in globum, bivalves, po-
lyspermæ.

L. Styraciflua. Fol. palmato — angulatis; lobis
indivisis acutis.

Exotica. Arbor.

Off. Balsamum sive Resina liquida.

FORMA. Resina griseo — brunnea, fuscescens,
homogena, consistentia unguenti, plastica, tenaci-
uscula, rigidiuscula, opaca, lucida, pinguiuscula.
Purior Storax liquida in officinis subinde occur-
rit, facie Terebinthinæ, consistentia mollis, sub-
diaphana, tenax, lutea, odore validiore. (a)

PRO-

(a) Liquidambar & Styrax liquida austorum, quantum li-
quet, ejusdem arboris progenies sunt in eo modo discre-
pantes, quod in hac naturæ ars subvenierit. Hinc utru-
que jungant.

LIQUIDAMBAR. Est resina crassa incisione corticis pro-
viens, cui cortex comminutus odoris tanto diutius servan-

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, in Storacem Calamintham incidens; *Sapor* unctuosus, acriusculus, *odori* congruens. Accensa flagrat, odore grato, balsamico, remanente carbone tenui, atro, parum inquinante.

PRÆPARATA. Unguentum de Styrace.

COMPOSITA. Emplastrum Diabotanon.

O R D O.

M O N A D E L P H I A.

P INUS SYLVESTRIS. L.

Pinus Sylvestris. Githenbaum. *Lesnij borowice.*
Pinus. MAS. *Cal.* 4 — *phyllus.* *Cor.* o. *Stam.* plurima. *Antberæ nudæ.*

U 2

FEM.

di causa admisetur (*Monardes Simpl. Clas.* p. 324) Æta-
te indurescit in resinam solidam fragilem (*Lewis M.* in p.
361).

STYRAX LIQUIDA. Venalis quantum constat, ramorum comminutivorum coctione elicetur, sub qua superficiem ascendit (*Monard.* p. 325) Purior per colum transmissa fuit, sere transparens, mellis consistentia, & coloris rubri vel grisei, odoris fragrantis styracem calamintam referrentis, saporis acris. Quæ in officinis occurrit quibusdam fa-
cilitia videtur, solutione styracis calamintæ in vino ac oleo ad-
mixtaque resina laricea (*Kaii, Hist.*, c.). Ita Murray. Appa-
rat. Medicaminum.

FEM. *Cal. strobili* : squama 2 — flora. *Cor.*

○. *Pist. 1. Nux* ala membranacea excepta.

P. *Sylvestris*. Fol. geminis: primordialibus solitariis glabris.

Indigena. Arbor.

Off. Turiones. Resina liquida (*Terebinthina communis vulgo*) Resina solidia. Pix.

FORMA. *Turiones*, s. ramulorum rudimenta, terminales, plures aggregati, ferruginei, cylindrici, acuti, latitudine pollicis vel ultra, undique imbricati: squamis angustis, linearibus, acutis, albido — membranaceis, subdiaphanis, dorso viridulis, adpressis, margine ciliato — laceris; undique (excepto apice) contaminati Resina tenui, in frigore solidiuscula, in calore molli, digitis se adglutinante; parencymate viridi, molliusculo, sicciusculo. *Resina Liquida* (*Terebinthina communis*) massa est resinosa, opaca, butiracea, mollis, pallida, cinerascenti — subcitrina, quasi unguentum liquidius. *Resina communis solidia*, rubicunda, nitidiuscula, facie Quartz, fragilis fracturis planis; digitis se adglutinans, odore tædæ Pini. *Pix atra* fit ex pice liquida per inspissationem, & est resina solidia in massa grandi, atra, lucida, homogenea, facie vitri nigri, in frigore fragilis: fracturis planiusculis, nitidis; in calore leni molliuscula, flexilis, digitis tenaciter adhærens, extensilis, in filum ductilis.

PRO-

PROPRIETAS. *Turionum rec.* *Odor fragrans resinosus, gravisculus; Sapor non ingratus, debilius resinosus, amaricans; masticati subpulposi, medullaris pars mollior, comminuitur, subsolvitur; corticalis pars tenax, vix comminuitur.*

Resinæ liquid. *Odor validior ligni Pini resina abundantis, s. tæda;* *Sapor pinguisculus, resinosus, subamaricans, odori congruens.* *Picis Odor in tædam incidens;* *Sapor debilissimus vix ullus.*

PRÆPARATA. *Oleum destillatum.*

Spiritus.

Terebinthina cocta.

COMPOSITA. *Terebinth.* *Ceratum pro Cerraturis balsamicis.*

Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum Citrinum. — *de Cicuta simplex & compositum.* — *Diabotanon* — *ad Fonticulos rubrum.* — *Diachilon.* — *de Galbano Crocatum.* — *de Labdano.* — *Malacticum.* — *de Melilotto.* — *Mercuriale.* — *de Minio.* — *Oxicroceum.* — *ad Rupturas.* — *Vesicatorium.*

Oleum Hyperici. — *Viride.*

Pilulae Balsamicæ Stahlii.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Unguentum Althææ. — *seu Balsamum*

Arcæi. — *Basiliconis.* — *Digestivum.*
— *Nervinum.*

Tereb. coct. *Ceratum pro Cereolis di-*
gestivis. — *pro Cereis exsiccantibus.*

Resin. *Emplastrum Citrinum.* — *Di-*
achilon cum gummatibus — *Malacti-*
cum. — *de Meliloto.* — *ad Ruptu-*
ras.

Unguentum Althææ. — *Balsamicum.*

Pix nigr. *Emplastrum Diabotanon.* —
Diachilon cum gummatibus.

Pix naval. *Unguentum Balsamicum.*

Ol. Balsamum Sulphuris Terebinthina-
tum.

PINUS PINEA. L.

Pinus Sativa. Ph. *Pineole,* *Zirbesnüsselbaum.*
Domácy borowice.

P. Pinea. Fol. *geminis:* *primordialibus solitariis*
ciliatis.

Exotica. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nuclei albi sunt, oblongi, compressi*
altera parte paullo latiores, pollicem dimidium
longi, tenui epidermide vestiti, intra putamen
ligneum reconditi, quod vero ante venditio-
nem separatur.

PROPRIETAS. *Odor & Sapor subacidulus, dul-*
cis, amygdalarum æmulus; oleo pariter fœti, ut
ad tertiam sui ponderis partem fundant. Pr-

PINUS LARIX. L.

Larix. Ph. Lerchenbaum. Dr̄sn.

P. Larix. Fol. fasciculatis acutis.

Indigena rarius. Arbor.

Off. Balsamum sive Resina liquida (*Terebinthina veneta (a) vulgo.*

FORMA. *Resina liquida*, diaphana, consistenza mellis vel syrapi spissioris, colore aqueo vel pallide lutescente, pro diversa ætate, in fila dupilis, tenax. (b)

PROPRIETAS. *Odor debilius fragrans; Sapor amarus, fauibus inhærens, resinosis, subpinguisculus, acriusculus.*

PINUS ABIES. L.

Pinus Picea. vulgo Abies rubra. Ph. Rothe Zanæne. Smrk.

P. Abies. Fol. solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis.

Indigena. Arbor.

Off. Resina. (c) Colophoniam.

a) *Terebinthina veneta* male dicta, justius semper *Larigna*, dicenda, quum non per Venetas colos transferatur. Locus hic est generatim de *Terebinthina* dicendi; cuius triplex vulgo assumitur species. 1.) *Cypria* ex *Pistacia Terebinthino* L. 2.) *Communis*, plerumque ex *Pino Picea*, cui & originem suam tribuit *argenteo atensis*; & 3.) *Venera* ex præfixa arbore. Cœlebris etiam evasit recentius *Conadensis*. Murray. Appar. Med.

b) Huic parasiticus est *Agaricus Albus officinarum*.c) *Resina hæc* et si ex aliis quoque coniferis nominatim pino sylvestri proveniat, pinus tamen picis uberiorem copiam lar.

FORMA. *Resina abietis nativa*, qualis e trunko arboris hieme abraditur, albida est, mollis, pinguiscula, subdiaphana; & estate siccatur & durior fit; Alia ex trunko arboris inciso extrahitur; quæ si decoctione in aqua igne moderato, funditur, & deinde per sacculos ex linteo densiore cum expressione colatur, uta sordibus bene purgetur, *Pix burgundica* vocatur. Si vero resina hæc ad consumpcionem aquæ, h. e. ad siccitatem cogitur, addito sub fine coctionis, aceto vini, obtinetur massa sicca, quæ *Colophonium* appellatur: Estque resina solida in frustis majoribus, fusco-rubescens, subdiaphana, nitida, facie vitri obscuri, fragilis: fracturis planis nitidis, subfribilis: granulis quasi deauratis, micantibus, pulverata abit in pulverem lutescentem.

PROPRIETAS. *Resinæ*: *Odor* fragrans, ligni abietis; *Sapor* amaricans, balsamicus, satis gratus; digitis contractata pinguedine illos inficit. *Coloph.* *Odor* Pini, sed debilior, *Sapor* nullus.

PRÆPARATA. *Resinæ*. *Liquid.* *Oleum* destillatum.

COMPOSITA. *Resinæ*. *Ceratum* pro *Ceratiris* balsamicis.

Emplastrum Citrinum. — *Diachilon* cum gummatibus. — *Malacticum*. — *de Meliloto*. — *Oxicroceum*. — *ad Rupturas*.

Un-gitur, prout abies rufus resinæ subpeditandæ aptior. Murray T. I. p. 30.

Unguentum. Althææ. — Balsamicum.
Coloph. Emplastrum Oxicroceum.
 Unguentum de Styrace.

CROTON CASCARILLA. L.

Cascarilla. Ph. Schafarille. Bæscarilla.

Croton. MAS. *Cal.* cylindricus 5 dentatus. *Cor.* 5 —
 petala. *Stam.* 10 — 15.

FEM. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* 0; *Styli* 3, bifidi.

Caps. 3 — locularis. *Sem.* 1.

C. Cascarilla. Fol. lanceolatis acutis integerrimis
 petiolatis subtus tomentosis, caule arboreo.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA, Sicc. Cortex durus, cinerascenti —
 bruneus, lineaæ vix crassitudine, subrugosus, lineaæ
 transversalibus sparsis, saepe lichenibus conspur-
 catus, sectus in segmenta bipollicaria, semicon-
 voluta; fragilis; fractura plana, fusca.

PROPRIETAS. Odor aromaticus, non ingratus;
 Sapor aromaticus; masticatus satis facile commi-
 nitur, sub masticatione sensim amarior: amari-
 tie inhærente. Ignis flammæ adnotus accendit, —
 flagrat flamma vivida, mox tamen ab igne remoto
 extincta fumat: fumo grato, in ambram inciden-
 te, temulante.

COMPOSITA. Candelæ fumales.

BEN-

BENZOIFERA plânta incognita adhuc: nam
non est LAURUS BENZOIN neque CROTON.
BENZOIN. L. (α)

Benzoe. Aza odorata seu dulcis. Ph. Wohltrie-
chender Asand. Benzoe.

Ε. Benzoīn. Fol. linearibus subrepandis nudis:
venis rubris.

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. Gummi Resina in massa grandiori,
virideſcens, rubicunda, marmorea: maculis glan-
dulisque albicantibus, undique nitidiſcula, fra-
gilis, friabilis.

PROPRIETAS. Odor fragrans, non ingratus,
balsamicus; maſticata inter dentes friabilis, com-
minuitur in ore, non solubilis, ſapore subdulce-
ſcente, resinoso, balsamico. Manibus traçtata di-
gitis non adhæret.

PRÆPARATA. Flores.

Oleum deſtillatum.

Tinctura.

COMPOSTA. Resin. Candelæ Fumales.

• Pi.

J. Pharmacopæa. Aust. Prog. pag. 23.

Juxta Bergium, qui ita agit: Authoritate III. v. LINNE
nixus, arborem Benzoferam ad Crotonis genus reſero.
Dubium tamen Ar. SYLVII, deſcriptio fructus, qui trico-
cus non est, verum drupa ſicca, intra quam continentur
Nux cinerea, nucleo albido — virideſcente ſaporis amaris,
& nigrati.

Pilulæ de Styrace.

Pulvis Fumalis ordinarius. — Specie-
rum pro Cucupha.

Spiritus Balsamicus vulgo Schaueria-
nus.

Unguentum Nervinum.

Flor. Pilulæ Balsamicæ Mortoni.

Ol. Unguentum, ad Scabiem.

CROTON LACCIFERUM. L.

Lacca. Ph. Gummilack. Laka.

C. Lacciferum. Fol. ovatis tomentosis ferrulatis
petiolatis, caule arboreo.

Exotica, Arbor.

Off. Resina. Præfertur granulata in ramu-
lis.

FORMA. *Resina* rubicunda dura, fragiliuscu-
la, subdiaphana, lăviuscula, ramulis undique in-
crustata: crustis crassis, subcylindricis, rugosis,
nodulosis, sëpe lacrymis adnatis, diaphanis, ru-
bris, nitidiusculis, scabridis; pollicaribus vel ul-
tra, ramulo longitudinaliter perforatis; parenchy-
mate celluloso: cellulis simplicibus, transversa-
libus, approximatis, refertis exuviis insectorum
ut puppis exclusis, tela s. lana a larvis nata, & së-
pe stercore. Hinc. G. Lacca in bacculis est gal-
la resinosa, sive nidus insecti cuiusdam.

PROPRIETAS. Odor nullus; Sapor nullus. Ma-
sticata resina inter dentes dura, friabilis, minime
emollitur.

PRÆ-

PRÆPARATA. Tinctura Lacce.

COMPOSITA. Pulvis Dentifricius ruber,

RICINUS COMMUNIS. L. (a)

Ricinus vulgaris. Ph. Wunderbaum, Kreuzbaum,

Purgierferner. Skočec wětſj.

Ricinus. MAS. Cal. 5 — partitus. Cor. o. Stam.
numerosa.

FEM. Cal. 3 — partitus. Cor. o. Syli 3, bifidi.

Caps. 3 — locularis. Sem. 1.

R. Communis. Foliis peltatis subpalmatis serratis.

Exotico — Biennis.

Off. Semen.

FORMA. Nux ovata, utrinque obtusa, magnitudine seminis Phaseoli saccharati, utrinque compressa, nitida, & spadiceo & viridi variegato — marmorea, terminata hilo prominente, pallide lutescente, acutiusculo, latere utrinque excavato. Nucleus niveus, pinguisculus, centro cavo, obductus membrana alba, intra testam tenem, fragilem.

PROPRIETAS. Sem. Odor nullus; Sapor debilis, vix dulcescens, acriusculus; masticata semina tenera, facile comminuantur, & quasi solvuntur saliva emulsiva; sed acrimonia rodens postea in faucibus sentitur & aliquantum inhæret. Si rancescunt semina, sapor eorum in saporem seminum Canabis incidit.

PARATUR inde Oleum pressum.

O R-

a) Cum tantæ deprædicentur de Ricini oleo laudes, hinc veniam dabit Lector, quod etiam hinc oleum concederim.

O R D O
S Y N G E N E S I A.

MOMORDICA BALSAMINA. L.

Momordica. Ph. Balsamäpfel, Momordike.

Momordika.

Momordica. MAS. Cal. 5 — fidus. Cor. 6 — partita. Filamenta 3.

FEM. Cal. 5 — fidus. Cor. 5 partita. Stylus 3 — fidus. Pomum elastice dissiliens.

M. Balsamina. Pomis angulatis tuberculatis, fol. glabris patentibus — palmatis.

Hortensis. Annua.

Off. Fruktus recens pro oleo.

FORMA. Fruktus sublongus, qui maturus rubet vel; (ut ait Lobelius) superficie, carneque intentis purpureæ phœnicioæ, turbinatus, cucumeris forma, eodemque modo tuberculis horridis bullatus: Semine Citruli vulgo dicti, copioso, fuso, longiore quam latiore, modice acuminato, compresso & aspero.

PROPRIETAS. Odor vix ullus; Sapor pinguis, mucilaginosus semini Lini similis.

PRÆPARATA. Oleum coctum.

MMOMORDICA ELATERIUM. L.

Cucumis Asininus. Ph. Eselskufumern. Strikas wā aneb planá Tyfvice.

Hor-

Hortense. Annum.

Off. Radix. Fructus recentes.

FORMA. *Rad.* longa, crassa, alba, paucis adnatis donata. *Fructus* oblongus, pollicem circiter crassus, ex viridi flavidus, qui maturescens ad levem flexionem prope pedunculum diffilit, violenter semina cum succo in cavo latente explodens. Huic præprimis insignis amarities insidet. Duplex Elaterii species officinis Svecicis assumitur; *album* & *nigrum* (a) Prior succo lactescente pomi submaturi. Alterum ex succo pomi expresso. *Album* est massa terrea, in frustis planis crassitudine linearum circiter 2, *cinerea*, *leviuscula*, *sicca*, *fragilis*, *friabilis*. *Nigrum* massa *sicca*, *viridescentia nigra*, subsplendens, in frustulis inæqualibus, *fragilis*; *fracturis* planiusculis.

PROPRIETAS. *Albi*: Odor nullus; Sapor vix amaricans, acris; masticatum solvit in ore, & mordet in lingua. *Nigri*: Odor nullus; Sapor acris, debilior quam albi, subsalsus; masticatum tenaciusculum, ægre comminuitur, adglutinatur dentibus, solvit in saliva brunea; mordet postea in faucibus.

PRÆPARATA. *Fruct.* Extractum.

COMPOSITA. *Rad.* Unguentum de Arthani-
ta, sive contra Vermes.

Extract. Emplastrum Diabotanon.

Cu;

(a) Nobis solummodo nigrum.

CUCURBITA LAGENARIA. L.

Cucurbita. Ph. Kürbs, Flaschenkürbs, Tykew domácy.

Cucurbita. MAS. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — fida. Filamenta 3.

FEM. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — fida. Pif. 3 — fidum. Pomi semina margine tumida.

C. Lagenaria. Fol. subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, (a) pomis lignosis.

Exótica etiam Hortensis, Annua.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* cinerea, minutim rúgosa, linearia, vix pollicaria, utrinque plana, bisulcata: sulcis apice conniventibus; utrinque obtusa, apice profunde retusa. *Parencyma* album, cotiledoneum, bipartibile, intra testam fragilem.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* pinguisculus, amygdalinus; *masticata* comminuuntur, *saliva* emulsiva.

COMPOSITA. *Semina* IV. frigida majora.

Species Decocti Althææ Fernelii.

CUCURBITA PEPO. L.

Pepo. Ph. Türkenkopf, Pfieben, Plüger. Dynæ, melæum.

C. Pepo. Fol. lobatis, pomis levibus.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

FOR.

(a) Folia hæc Moschi odorem valide spargunt.

FORMA. Semina albida, obovalia, undique compressa margine incrassato.

PROPRIETAS. Odor nullus; Sapor subdulcis, pinguiusculus; masticata comminuuntur, saliva emulsiva.

CUCURBITA CITRULLUS. L.

Citrullus. Ph. Angurie, Wassermelaune. *Cytrule,* Angurye.

C. Citrullus. Fol. multipartitis.

Exoticus etiam Hortensis. Annuus.

Off. Semen.

FORMA. Semina plurima, pedicellata: pedicello carnosō, molli; fusco — brunea, lāvia nitida, ovata, ontusa, apice summo decorticata, utrinque compresso — plana, in singulo loculo membrana tenui interstinēta.

PROPRIETAS. Seminum: Odor nullus; Sapor amygdalinus.

COMPOSITA. Semina IV. frigida majora.

Species decocti Althææ Fernelii.

CUCUMIS COLOCYNTHIS. L.

Colocynthis. Ph. Koloquinte. Boloquintida, Rágsté gablko.

Cucumis. MAS. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — partita. Filamenta 3.

FEM. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — partita. Pist. 3 — fidum. Pomi semina arguta.

C. Colocynthis. Fol. multifidis, pomis globosis glabris.

Exotico — Annuus.

Off.

Off. Fructus decorticatus. Semen.

FORMA. *Sicc. Pomum* decorticatum, subro-
tundum, magnitudine ovi gallinacei, siccum, al-
bidum, lœviusculum, constans ex substantia papy-
raceo — spongiosa, molli; sexloculare: loculis
refertis *seminibus* numerosis, ovatis, obtusis utrin-
que compressis, lœvibus, olivaceis, longitudine cir-
citer 2 linearum; parenchymate albo, cotyledoneo.

PROPRIETAS. *Pulpæ:* Odor debilis, ingratus;
Sapor amarissimus, nauseosus, acrisculus. *Semi-*
num Odor nullus; *Sapor amygdalinus,* dulcescens,
pinguisculus.

PRÆPARATA. *Pulpa?* (α)

COMPOSITA. *Fruct. Extractum Catholicum.*
hoc pro Pilulis Mercurialibus. — *Panchymago-*
gum,

Unguentum de Arthanita sive contra
vermes.

Sem. Suppositoria composita.

CUCUMIS MELO. L.

Melo. Ph. *Melone,* *Melaune,* *Melaun.*

C. Melo. Foliorum angulis rotundatis, pomis to-
rulosis.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

X

FOR-

a) Pro compонendo Oleo Coccoynthidis composito vulgo
Habacucino. Unguento de Arthanita. Pulvere Trochisco-
rum Alchandar.

FORMA. *Semina* plurima, pedicellata, ovalia, acuta, utrinque compressa, glabra, albida, lœvia, in pulpa mollissima & succosa nidulantia.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* pinguiculus, amygdalinus; *masticata* comminuantur, *saliva* emulsiva.

COMPOSITA. Emulsio Laxativa.

Semina IV. Frigida majora.

Species Decocti Althææ Fernelii.

CUCUMIS SATIVUS. L.

Cucumis. Ph. Cucumeri, Gurken, Omurken.

Öskürky.

C. Sativus. Foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* (matura) ovato—oblonga, utrinque obtusa, compressa, circiter tres lineas longa, alba, lœvia; parenchymate cotyledoneo albo, bipartibili.

PROPRIETAS. *Seminum Odor.* nullus; *Sapor* amygdalinus, magis tamen pinguis; *masticantur* *saliva* emulsiva.

COMPOSITA. *Semina* IV. Frigida majora.

Species Decocti Althææ Fernelii.

BRYONIA ALBA. L.

Bryonia. Ph. Baunrübe. Posed.

Bryonia. Mas. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — partita. Filamenta 3. FEM.

FEM. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — partita.

Stylus 3 — fidus. *Bacca* subglobosa poly-sperma.

B. *Alba*. Fol. palmatis utrinque calloso — scabris.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec.* *Radix* fusiformis, subpedalis, sepe ramosa, apice obtuso — rotundata, albido-lutescens, transversaliter rugosa : rugis obsoletis, subapproximatis, ceterum glabriuscula. *Paren-*
cyma album, carnosum, succosum, post sectionem transversalem æquale, undique punctatum : punctis subrotundis, serie radiali a centro ad peripheriam undique dispositis; serie autem annulari, solitaria, centrum medullare includente.

PROPRIETAS. *Rec.* *Rad.* *Odor* nauseosus ; *Sapor* nauseosus odori congruens, acriusculus : *Substypticus*. *Radix* recens lactescit ; siccata vero recenti longe debilior.

COMPOSITA, *Aqua Bryonie composita?* (a)

(a) Olim, sicut adhuc hodie satis usualis;

CLASSIS XXII.

DIOECIA ORDO MONANDRIA.

SALIX ALBA. L.

Salix vulgaris. Ph. Weisse Weide, Felber, Weba.

Salix. MAS. Amenti squamæ, Cor. o. Glandula baseos nectarifera.

FEM. *Amenti squamæ, Cor. o. Stylus 2 — fidus, Caps. 1 — locularis, 2 — valvis, Sem. papposa.*

S. Alba. Fol. lanceolatis acuminatis, ferratis utrinque pubescentibus: serraturis insimis glandulosis.

Indigena. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex perasperus, rami fusci & subvirides.*

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor austerus, adstringens, masticatus salivam cinnamomeo imbutit colore.*

OR.

O R D O.

P E N T A N D R I A.

PISTACIA VERA. L.

Pistacia. Ph. Pistazie, Pimpernüsslein. Pistacy,
Elokočka.

Pistacia. MAS. Amenti. Cal. 5 — fidus. Cor. o.

FEM. distincta. Cal. 3 — fidus. Cor. o. Styli
2. Drupa monoisperma.

P. Vera. Fol. impari — pinnatis : foliolis subova-
tis recurvis.

Exotica. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nux ossea*, alba, glabra, basi ma-
cula, oblonga, rugoso — *spongiosa*, albidiore ;
nucleo amygdalino, albido — *viridescere*, obdu-
cto tunica albida, saxe subfuscata.

PROPRIETAS. Nuclei : *Odor nullus* ; *Sapor amygdalinus*, dulcescens, subpinguisculus, subbal-
famicus ; *masticati teneri*, comminuuntur, *saliva emulsiva*.

COMPOSITA. Morsuli Imperatoris.

PISTACIA LENTISCUS. L.

Lentiscus. Mastiche. Ph. Mastixbaum. Len-
tyskus, mastixowy strom.

P. Lentiscus. Fol. abrupte pinnatis : foliolis lan-
ceolatis.

x 3

Exo-

Exotica. Arbor.

Off. Lignum. Resina (Mastiche vulgo.)

FORMA. *Lignum* siccum difficile fractu, ponderosum, extus cinereum, intus album. *Resina* solida, pallide lutescens, homogenea, in lachrymis ovaris laevibus, diaphanis, magnitudine voria, a seminis canabini ad Fabæ magnitudinem, superficie plerumque undique subopaca, fragilis: fracturis planis, instar gemmæ pellucidis, nitentibus, vitriformibus.

PROPRIETAS. Ligni : Odor non ingratus; Sapor adstringens. *Resinæ* odor balsamicus; *masticata* Mastix subfriabilis, & inter mandendum colligitur, coit in massam siccam, subrigidiusculam albam, ceræ albæ similem, non solubilem.

COMPOSITA. Rec. Candelæ Fumales.

Emplastrum defensivum rubrum. —

Diabotanon.—de Labdano.—Oxy-
croceum.—ad Rupturas.—Vesica-
torium.

Oleum Viride.

Pilulæ de Succino Crotonis.

Pulvis Fumalis ordinarius. — Specie-
rum Hieræ Picræ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schaueria-
nus. — Matricalis.

Tinctura Masticæ composita.

Unguentum Digestivum.

CA-

CANNABIS SATIVA. L.

Cannabis. Ph. Hanf. Bonovē, semenec.

Cannabis. MAS. Cal. 5 — partitus. Cor. o.

FEM. Cal. 1 — phyllus, integer, latere hians.

Cor. o. Styli 2. Nux 2 — valvis, intra ca-
lycem clausum.

Colitur. Annua.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovata, utrinque compres-
siuscula, undique testacea, lævia, nitidiuscula,
utrinque obtusa, sed altera extremitate excavata
linearum 2 longitudine, margine utrinque pro-
minulo pallidiore; *parenchymate* cotyledoneo, al-
bo, pinguisculo, bipartibili, intra crustam corti-
calem sicciam, fragilem, obvelato pellicula fusce-
scente.

PROPRIETAS. *Odor* vix ullus; *Sapor* subfa-
tuus.

O R D O.**H E X A N D R I A.****S**MILAX SARSAPARILLA. L.

Sarsaparilla. Ph. *Sassaparille.* *Sarsaparille* Po-
ren neb Wlaſtē hřiswy kořen.

Smilax. MAS. Cal. 6 — phyllus. Cor. o.

FEM.

FEM. *Cal.* 6 — phyllus. *Cor.* ò. *Styli* 3. *Bac-*
ca 3 — locularis. *Sem.* 2.

S. Sarsaparilla. Caule aculeato angulato, fol. iner-
 mibus ovatis retuso — mucronatis trinerviis.
 Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Fibræ radicis longissimæ plu-
 rimum ulnarum, crassitie pennæ anserinæ, teretes,
 longitudinaliter undique sulcatæ, flexibiles, cor-
 tice tenui rubicundo — cinerascente, fibrillis spar-
 sis, filiformibus, breviusculis, subramosis; paren-
 cymate albo, farinaceo, sicco subinquinante, in-
 tra corticem; tum subligneo: medulla subfari-
 nacea, alba, compacta; post sectionem transver-
 salem notato centro medullari albo, majusculo,
 obducto annulo ferrugineo, undique punctato;
 circumdato margine albo.

PROPRIETAS. Odor vix ullus; Sapor debilis,
 subamaricans; masticata secca, sub masticatione
 solvit substantia farinosa, & submucilaginosa
 sentitur, remanet lignea pars tenax.

COMPOSITA. Species Decociti Lignorum.

SMILAX CHINA. L.

China nodosa. Ph. Chinawurzel. Boen chyny.
S. China. Caule aculeato teretiusculo fol. iner-
 mibus ovato — cordatis quinquenerviis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

For-

FORMA. *Sicc.* *Radix* ovato oblonga, compressiuscula, palmaris vel ultra, nodulosa, penderosa, obducta cortice tenui rubicundo —bruneo; parenchymate solidiusculo, pallide rubicundo post sectionem transversalem æquali.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* vix ullus; *masticata* sicca, duriuscula, comminuitur.

COMPOSITA. *Essentia Lignorum.*

Species Decocti Lignorum.

ORDO.

O C T A N D R I A:

* **P**OPULUS NIGRA. L. (*a*)

Populus. Ph. *Pappelbaum.* **Topol.**

Populus. MAS. Amenti. *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra.

FEM. Amenti. *Cal.* & *Cor.* maris. *Sem.* multa, papposa.

P. Nigra. Fol. deltoidibus acuminatis serratis.

Exotica. Arbor excelsa.

Off. Gemmæ recentes (Oculi vulgo.)

FORMA. *Rec.* *Gemmæ* majusculæ, ovato — oblongæ, acutæ spadiceæ, imbricatæ: squamis firmis, oblongis, concavis.

PRO-

a) Bergio loco hujus *Populus Balsamifera.* L.

PROPRIETAS. Gemmæ, tempore vernali tumidæ, simul ac inter digitos comprimuntur, bal-
samum limpidum, spissuscum, aurei coloris
largiter fundunt, Odore fragrante, vere gratiore
estate ingratiore, fere Rhei veri, Sapore subaro-
matico, amaricante, calidiusculo.

COMPOSITA. Unguentum Mendicorum.—
Populeum.

O R D O E N N E A N D R I A.

MERCURIALIS ANNUA. L.
Mercurialis. Ph. Bingelkraut. Merkuryalis, neb
planá bazalická.
Mercurialis. MAS. Cal. 3 — partitus. Cor. o. Stans.
9 — f. 12. Antheræ globosæ, didymæ.
FEM. Cal. 3 — partitus. Cor. o. Styli 2. Caps.
dicocca. 2 — locularis, 1 — sperma.
M. Annua. Caule brachiatō, fol. glabris, flor.
spicatis.
Indigena. Annua.
Off. Herba.
FORMA. *Caulis* erectus, pedalis, glaber, ge-
niculatus; internodiis compressis, alternis; late-
ri-

ribus & oppositis compressiusculis; & aliis oppositis planis, angulatis, carina longitudinali. Rami ad genicula, striato — sulcati, oppositi, superne foliosi. Folia opposita, petiolata ovata, obtusiuscula, margine obtuse serrata, minutim ciliata, utrinque glabra, lucidiuscula, nervosa, vix bipinnata, patentia. Petoli semiteretes, supra canaliculati, glabri. Stipulae 4 ad genicula, utrinque binæ, oppositæ, parvæ, lanceolatae, concaviusculæ, erectæ submembranaceæ.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor graveolens, fœtidus; Sapor ingratus, americanus, subsalsus.

PRÆPARATA. Succ. Mel Mercurialis herbae.

O R D O M O N A D E L P H I A.

JUNIPERUS SABINA. L.
Sabina. Ph. Seewenbaum, Sedel oder Sadelbaum. Sawina neb kläffterkáchwogka.
Juniperus. MAS. Amenti Calyx squamæ. Cor. o:
Stam. 3.

FEM. Cal. 3 — partitus. Petala 3. Styli 3.
Bacca 3 — sperma, tribus tuberculis caly-
cis inæqualibus.

J. Sa.

J. Sabina. Fol. oppositis erectis decurrentibus oppositionibus pyxidatis.

Hortensis. Arbuscula.

Off. Frondes. (a)

FORMA. *Rec.* Frutex ramosus, diffusus, 3—vel 4 pedalis, vel ultra. Rami fuscescentes, tere-tes, sparsi, valde ramulosi: ramulis testis squa-mis emarcidis, e foliis emortuis, subimbricatis; teneri ramuli, distiche parentes, virides, testifoliis acerosis, alternatim opositis, linearibus, acuti, 2 lineas longis, convexis, medio dorso ob-soleto sulcatis, glabris sessilibus, longitudinali-ter adpresso—adnatis, apicibus liberis verum latere utrinque adpressi culis; tenerimi vero ra-muli imbricati foliolis consimilibus, sed duplo minoribus.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor fœtidus, gravis, for-tis; *Sapor* amaricans, gravis.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. Pulvis fumalis Arthriticus.

JVNIPERUS COMUNIS. L.

Juniperus. Ph. Wacholder, Kranowet. Galowec.

J. Communis. Fol. ternis patentibus mucronatis, baccæ longioribus.

Indigenus. Arbuscula.

Off. Lignum. Baccæ virides & maturæ.

Resina (vulgo Gummi Sandarac.)

a) Herbae aut folii nomine etiam insigniuntur,

FORMA. *Caulis* fruticosus, diffusus. *Frutex* altitudine plurimum pedum, saepe arborescens, caule crassitie brachii vel ultra. *Rami* teretes, patuli, cortice tecti sublivaceo, laeviusculo, squamoso. *Rami* ad angulum rectum fere patent, sparsi, vix determinati, inaequales, squamosi; *Surculi* tenelli viridescentes, glabri, articulati; internodiis triquetris; angulis subluccosis, glabris, rotundatis, superne attenuatis. *Baccæ* laterales in ramulis, solitariae, subsessiles s. brevissime pedunculatae: pedicello crasso, undique imbricato squamis ovato—acutis, adpressiusculis; magnitudine semitis Pisi, nigro—violacea, globosæ, glabrae, lucidiusculæ, apice instructæ macula subrotunda, subrugosa, sulcis tribus, trifariam spectantibus; peroncymate constante e pulpa spongioso—subsucculenta, ferruginea, tenuiuscula, intra corticem papyraceum. *Semina* 3, majuscula, hinc plana, inde convexa, in hemisphærium convenientia, intra pulpam. *Resina* pallide lutescens, homogenea, facie vitri, fere Mastiches, solida, dia-phana, in lachrymis oblongis subpollicaribus, subcylindricis, compressiusculis, laevibus, saepe rugosis; fragilis, subfriabilis: fracturis planis, instar vitri pellucidis, nitentibus.

PROPRIETAS. *Summit.* rec. *Odor* gratus, balsamicus; *Sapor* balsamicus, vix amaricans. *Bacc.* *Odor* gratus balsamicus; *Sapor* dulcis, aromati-

cus,

cus, calidiusculus, odori consentaneus. Sem. Odor debilis; Sapor aromaticus, non dulcis; masticata fragiliuscula, sicciouscula. Baccæ non maturantur nisi bienni spatio, tota prima æstate virides sunt. Resinæ Odor balsamicus, gratus, fere Mastiches, sed paullo fortior; Sapor debilis; masticata inter dentes friabilis comminuitur in pulverem tenuissimum & masticatione non coit.

PRÆPARATA. *Bacc. virid. Aqua.*

Oleum destillatum.

Spiritus.

Bacc. matur. Roob.

COMPOSITA. *Lign. Species Decocti Lignorum.*

Bacc. virid. Oleum Viride.

Pulvis Fumalis Arthriticus. — Vitæ.

Unguentum Nervinum.

Bacc. mat. Electuarium seu Theriaca Diateffaron.

Ref. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

Pulvis Fumalis ordinarius.

Ol. Unguentum Nervinum.

Roob. Electuarium Purgans, seu Hydragogum.

JUNIPERUS LYCINA. L.

Olibanum. Thus. Ph. Weihrauch. Badidlo.

J. Lycina. Fol. ternis undique imbricatis ovatis obtusis.

Exotica. Arbor.

Off.

Off. Resina.

FORMA. *Gummi — Resina* pallide lutescens & rubicunda, in lachrymis majoribus ovato — oblongis, utrinque obtusis, magnitudine feminis Fabæ vel ovi columbini, solitariis vel geminis, sepe pluribus aggregatis, levibus, subopacis; fragilis: fracturis planiusculis. Vixior varietas occurrit in massa majuscula, marmorea.

PROPRIETAS. *Odor balsamicus resinosus; Sapori balsamicus, subamaricans; masticata comminuitur, emolilitur, dentibus adglutinatur, alba fit, solvit lente: solutione lactescente.*

COMPOSITA. Candelæ Fumales.

Elestuarium seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum defensivum rubrum. —

Diaboranon. — Diapompolygos, hoc

pro Unguento Diapompoligos. —

Oxycroceum. — ad Rupturas.

Oleum Viride.

Pilulae de Cynoglosto. — de Styrace.

Pulvis Fumalis Arthriticus & ordinarius. — Vitæ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus. — Matricaris.

Tinctura sive Balsamum Comentatoris.

— Mastiches composita.

Unguentum Digestivum.

OR.

O R D O
S Y N G E N E S I A.

RUSCUS ACULEATUS. L.

Ruscus. Ph. Maasdorn. *Lesnij myrtus*, gedliche Wlaſtā.

Ruscus. Mas. *Cal. 6* — phylus; *Cor. o. Nectarium centrale*, ovatum, apice perforatum.

FEM. *Calyx*, *Corolla* & *Nectarium maris. Stylus 1. Bacca 3* — locularis. *Sem. 2.*

R. Aculeatus. fol. supra floriferis nudis.
Exoticus. Suffrutex.

Off. Radix.

FORMA. Sic. *Radix* facie radicis asparagi, cylindrica, subrotunda, cineraſcens, fibris pluribus cylindricis, descendantibus, elongatis, frequentibus, cinerascentibus.

PROPRIETAS. Sicc. *Odor nullus*; *Sapor graviſculus*, subamaricans;

COMPOSITA. Radices V aperitivæ. Hæc pro Speciebus Decoëti aperitivi.—Syrupo 5 rad. aperientium,

* **RUSCUS HYPOGLOSSUM. L.**

Uvularia. Ph. Zäpfleinraut. *Czypkowá bylina*.
R. Hypoglossum. Fol. subtus floriferis subfoliosis.
Indigenus. Suffrutex.

Off. Folia raro.

FOR-

FORMA. Rec. *Folia* sparsa, s^epe gemina,
ovato — oblonga, acuta, in petiolos breves des-
inentia, viridescentia, venulo^so — reticulata, inte-
gerrima, bipinnicaria, patentia, utrinque glabra,
nitidiuscula.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* amaricans,
acriusculus.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

ORDO

MONOECIA.

V ERATRUM ALBUM. L.

Helleborus albus. Ph. Weisse Nieswurzel. Elles-
bor, neb Čemeřice, anebo keychawka bjlá.

Veratrum. HERMAPHROD. Cal. o. Cor. 6 — petala.

Stam. 6. *Pist.* 3. *Caps.* 3. polyspermæ.

MAS. Cal. o. Cor. 6 — petala. *Stam.* 6. *Pist.*
rudimentum.

V. Album. Racemo supradecomposito, corollis
erectis.

Indigenum & Hortense. Perenne.

Y

Off.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix carnosā, fusiformis, digitalis, albido — sublutescens, undique instructa fibris teneribus, longis; Sicc. occurrit fibris resecatis undique scabra, cinerea; parenchymate solidō pallide cinereo, post sectionem transversalem undique punctato.*

PROPRIETAS. *Odor rec. ingratus; Sapor recent. & sicc. nauseosus, acerrimus, diu inhærens; masticata fauces adurit.*

COMPOSITA. *Unguentum ad Phthiriasim seu contra pediculos.*

AN VERATRUM SABADILLA? *Phar. P. (α) Sabadilla. Ph. Sabadille, Capucineraamen. Sabadilla neb Capucinisté semeno. Exotica.*

Off. Semen.

FORMA. *Sicc. Capsulae tres æquales, teretiusculæ, acutæ, semiunguiculares, glabrae, bivalves, latere interiore longitudinaliter dehiscentes, uniloculares, subdilpermæ. Semina oblonga, subcylindrica, propria tunica obvelata.*

PROPRIETAS. *Odor vix ullus; Sapor capsulae ipsius nullus, sed seminum amarissimus, & acer-rimus: acrimonia diu inhærente, Inter mastican-dum*

α) Veratrum quod Mexicanum Sabadilli semen. VAN DERBECK Act phyl. med. A. N. C. vol. I. app. p. 120. vide Berg. pag. 822.

dum lingua & fauces subito afficiuntur acrimonia caustica, & valde pungente, sed sub masticationis fine aliquid etiam subdulcis inter amarum prominet. Acerimus stimulus durat postea satis diu, etiam si fauces aqua frigida probe eluviantur, cum sensu intermixto subdulci saporis. Bergio maculam excoriatam in lingua fecerunt semina quæ paullo diutius perstabant.

COMPOSITA. Unguentum ad Phtiriasim seu contra pediculos (a)

PARIETARIA OFFICINALIS. L.

Parietaria. Ph. Tag- und Nacht. Den a noc, flenná bylina.

Parietaria. HERMAPHROD. Cal. 4 — fidus. Cor. o.

Stamina 4. Styl. 1. Semen 1, superum, elongatum.

FEM. Cal. 4 — fidus. Cor. o. Stam. o. Stylus 1. Stamen 1. superum, elongatum.

P. Officinalis. Fol lanceolato — ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. Rec. *Caulis* teres, pedalis vel supra, undique striatus, pubescens, inferne ramosus. *Rami* alterni, erecti, simplices. *Folia* alterna, petiolata, ovata, acuta, utrinque attenuata, integrifolia,

a) Quod ex Religiosis quidam capsulas Delphinii clati in hunc scopum optato successu adhibeant, in ev. Eis est.

rima, supra saturate viridia, lucida, rugosa, sub-
tus venis pubescentia, luci exposita undique pun-
ctata, bipollucaria vel ultra, patentia. Petioli pal-
lidi, striati, supra canaliculati, minutim pubescen-
tes.

PROPRIETAS. *Rec. Odor nullus; Sapor her-
baceus in Urticam incidens;*

MIMOSA NILOTICA. L.

Acacia vera. Ph. Arabischer Schottendorn.

Egyptské trny.

*Mimosa. HERMAPHROD. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 —
fida. Stam. 5 f. plura. Pift. 1. Legumen.*

*MAS. Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — fida. Stam.
5, 10. plura.*

*M. Nilotica. Spinis stipularibus patentibus, fol.
bipinnatis: partialibus 8 — jugis, spicis globosis
fessilibus.*

Exotica. Arbor.

**Off. Succus inspissatus. Gummi arabicum
quod tamen raro ad nos adfertur, sed
ejus loco habetur Gummi Senegal ex
Mimosa Senegal L. de qua paullo infra.**

FORMA. *Gummi in frustulis subrotundis vel
hemisphaericis, magnitudine ovi columbini vel
nucis juglandis extus subrugosum rufescens dia-
phanum; parencymate pellucido, lutescente, fa-
cie*

**Ad Mimose Species etiam amandatur Terra Catechu juxta
recentiores: vide Murray. Appar. Med. T. II. pag. 425.**

cie vitri colorati, splendente, fragili : fracturis planis.

M. Senegal. Spinis ternis ; intermedia reflexa, fol. bipinnatis, flor. spicatis.

FORMA. *Gummi* in frustulis majoribus, sape magnitudine pomi minoris, subrotundatis vel hemisphaericis, præcedenti magis pallidum, colore albo, subcitrino, superficie rugosa ; parenchymate facie vitri, diaphano, fragili : fracturis pariter planis.

PROPRIETAS. *Odor nullus* ; *Sapor nullus* ; *masticatum* inter dentes primo duriusculum, fragile ; dein subemollitur, dentibus adhæret, tandem solvitur.

COMPOSITA. *Electuarium Diaſcordii.* — *Elect. seu Theriaca Andromachi.*

Pasta de Althæa.

Pulvis Haly.

Species Diatragacanthæ, hæc pro Pul-
vere Diaireos.

O R D O D I O E C I A.

FRAXINUS EXCELSIOR. L.
Fraxinus. Ph. Esche, Eschenbaum. Gesen.
y 3 *Fra*

Fraxinus s. HERMAPHROD. *Cal.* o. f. 4 — partitus:

Cor. o. f. 4 — petala. *Stam.* 2. *Pist.* 1. *Sem.* 1,
lanceolatum.

FEM. *Pist.* 1, lanceolatum.

E. Excelsior: Fol. serratis, flor. apetalis;
Indigenus. Arbor.

Off. Cortex. (Semen raro.)

FORMA. *Rec.* *Cortex* ramulorum extus oliveus f. brunneus, levigatus punctis elevatis pallidioribus, sparsis, intus pallide cinereus; *Semen* pendulum, lingua avis simile, ita ut fructum in ossicinis vocant.

PROPRIETAS. *Rec.* *Cort.* *Odor.* nullus; *Sapor* acerbus. *Sem.* *Odor* nullus; *Sapor* acris, aromaticus, savori corticis peruviani non quidem similis sed & multo acrior.

FRAXINUS ORNUS. L.

Manna. Ph. Manna, Mannadöschbaum. *Manna.*
F. Ormus. Foliolis serratis, flor. corollatis.

Exotica. Arbor.

Off. Succus nativus, seu Substantia gummifera — mellea.

FORMA. *Succus* melligenus, exsiccatus, facie mellis crystallisati, subfriabilis, albido — lutescens, occurrentes vel in frustulis solidis, oblongis, subtubulosis, molliusculis, fragilibus: fracturis granularis, albidiioribus; vel in frustulis laxe conglomeratis, mollibus, plasticis, fragiliusculis.

PRO.

PROPRIETAS, *Odor nullus; Sapor melligenus, dulcis, subaceſcens; masticata primum subfarinosa ſentitur: inter dentes molliter subarenuſum quid mentitur, mox solvitur, acuteque ſapidus evadit.*

ORDO TRILOECKIA.

CERATONIA SILIQUA. L.
Siliqua dulcis. Ph. St. Johannessbrod, Boden-
hörnel. Sw. Jana chléb.
Ceratonia. HERMAPHROD. Cal. s — partitus. Cor;
nulla. Stamina quinque. Stylus filiformis. Le-
gumen coriaceum, polyspermum.
Dioica. Maf. & Femina distincta.

Exotica. Arbor.

Off. Fructus.

FORMA. *Sicc.* Legumen palmare vel ultra,
undique fulvo — bruneum, glabrum, nitidiuscu-
lum, lineare, latitudine apicis digiti, obtusum
cum puncto convexo, multiloculare; parenchy-
mate leguminis pulpoſo: pulpa ſiccata rufa. Se-
mina ſolitaria in ſingulo loculamento, ovato, ob-
tusa, glabra,

PRO-

PROPRIETAS. *Odor nullus; Sapor dulcis mel-ligineus; masticata siliqua sicca, fragiliscula, comminuitur, extrahitur pulposum: saliva rubi-cunda. Siccata siliqua sapidiores quam recentes.*

COMPOSITA. Syrupus de Siliquis seu Diaco-dii Liquidus; hic pro Electuario Infantum seu Re-quie Nicolai, & Pilulis Balsamicis Mortoni.

Syrupus de Siliquis sive Diacodii Cro-catus.

FICUS CARICA. L.

Carica. Ficus. Ph. Feige. Σιφύ.

Ficus. Receptaculum commune turbinatum, car-nosum, conivens, occultans, flosculos vel in eodem vel distincto.

MAS. *Cal. 3 — partitus. Cor. o. Stam. 3.*

FEM. *Cal. 5 — partitus. Cor. o. Pisi. 1. Se-men 1.*

F. Carica. Fol. palmatis.

Hortensis. Arbor.

Off. Fructus.

FORMA. *Rec. Bacca magna, turbinata, e re-ceptaculo carnosoflora, magnitudine fructus Py-ri vel supra, colore viridi — lutescente vel vio-laceo, pro ingenio cujusque varietatis, nitidius-cula, apice obtuso — rotundata, undique striata, umbilicata: umbilico orbiculato, vix prominente, perforato, sed simul subclauso: squamis plur-imis, ovatis, acutis subcarnosis, glabriusculis sub-*

aqua-

æqualibus, imbricatis, adpressis; in bene vero
matura bacca umbilicus hiat. *Parencyma* rite ma-
turæ baccæ carnosæ — succulentum, molle, ru-
bicundum, centro cavo, intus undique vestito
seminibus; *siccatae* vero baccæ turgidum pulpa
melligena, rubicunda, subdiaphana, tenaci, digi-
tis se adglutinante, & referta *seminibus* numero-
sis, parviusculis, ovatis, obtusis, lutescentibus, dor-
so convexis, antice margine acutiusculo, com-
pressifusculis, glabris, hilo marginali, prope apí-
cem, punctato parvo.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor vix ullus; *Sapor*
dulcis in cucumerinum leniter incidens mastica-
ta bacca recens mucilaginosa, solvitur qua majo-
rem partem. *Sicc.* Odor subunguentarius; *Sapor*
dulcis melligenus, odori consentaneus, gratus;
Caricæ masticatæ glutinosæ; solvitur pulpa mel-
ligena, corticali parte molli, subpulposa, com-
minuenda.

COMPOSITA. Hydromel Infantum.

Species Decocti Pectoralis.

CLAS-

C L A S S I S XIV.

C R Y P T O G A M I A,

O R D O

F I L I C E S:

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. L.
*Scolopendrium. Ph. Hirschzunge. Gelenj gáz
 zyk, psaný trnák, Četerák.*
*Asplenium. Fructif. in lineolis disci frondis spar-
 sis.*
*A. Scolopendrium. Frond. simplicibus cordato-
 lingulatis integerrimis, stipit. hirsutis,
 Exoticum. Perenne.*
Off. Herba.

FORMA. *Filix stipite cylindrico, crassitie vix
 culmi secalini, palmari, glabro, hinc convexo,
 inde planiusculo, erecto apice scabro : squamis
 plurimis linearibus, acutis, ferrugineis. Frons
 integerrima, spithamea, lanceolata, acuta, utrin-
 que glabra, instructa nervis tenuibus, furcatis,
 subtransversalibus, parallelis, versus basim paul-
 lulum angustior, basi excavata. Fructificationes
 inversa pagina lineares, subtransversales, paral-
 lelæ, frequentes.*

PRO-

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor ingratus; Sapor acer-*
bus; siccatione odor prorsus perit.

COMPOSITA. *Pulvis Vitæ.*

Species Decocti Aperitivi.

POLYPODIUM VULGARE. L.

Polypodium. Ph. *Steinwurzel, Engelsüß. Oslá-*
dyč.

Polypodium. Fructific. in punctis subrotundis,
sparsis per discum frondis.

P. Vulgare. Frond. pinnatifidis: pinn. oblongis
subferratis obtusis, radie, squamata.

Iudigenum. Penenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec.* *Radix horizontalis, repens,*
cylindrica, crassitie pennæ anserinæ, undique tu-
berculata: tuberculis elevatis, truncatis, sparsis,
remotis; undique vestita tegmine e squamis fer-
rugineis, emarcidis, lanceolatis, acutis, imbrica-
tis; radicans fibris tomentosis, ferrugineis, de-
scendentibus, longitudinaliter dispositis. Paren-
cyma carnosum, albidum, subrubescens, post se-
ctionem transversalem æquale, punctis sparsis.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor ipsius radicis nul-*
lus; tegminis vero mucosus. Sapor prædulcis,
remissior quam Liquiritæ; masticata comminui-
tur, dulcis sentitur, sed insimul subamaricans.

COMPOSITA. *Species Decocti Aperitivi.*

POLIPODIUM FILIX MAS. L.

Filix Mas. Ph. *Gärenkraut, Baprads.*

P. Felix mas. Frond. bipinnatis : pinn. obtusis
crenulatis, stipit. paleaceo.

Indigeno — Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec.* Radix oblonga, crassa, subhorizontalis, undique extus conflata e bullis parallelis, approximatis, ovato — oblongis, acutis, nigricantibus, laeviusculis, sive obtectis squamis paleaceis emarcidis, ferrugineis, oblongis, nudis, sive in stipites frondium se exserrentibus, ex ipsa radice protrusis. Parenchyma subcarnosum, albido — lutescens, post sectionem transversalem notatum disco æquali, margine lobato.

PROPRIETAS. *Rec.* Odor debilis, subnauseosus; Sapor substypticus, non ingratus, masticata comminuitur, linguae imprimis saporem peculariem, debiliter subaromaticum, vix dulcescentem acriusculum.

ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS. L.

Capillus Veneris. Ph. Frauenhaar. Ženský vlas.
Adianthum. Fructific. in maculis terminalibus sub replicato margine frondis.

A. Capillus Veneris. Frond. decompositis : foliol. alternis : pinn. cuneiformibus lobatis pedicellatis.

Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Felix magnitudine varia, palmaris, spithamea, pedalis.* Stipes longitudine frontis,

niger, glaber lucidus, filiformis, subangulatus, erectus. *Frons decomposita.* *Rachis e stipite continuato, ramosa, stipiti concolor:* *Folia alterna.* erecta, petiolata, cuneiformia, ovato—rotundata, instructa nervis parallelis, tenuibus, glabra, inferne longius producta, sensim angustiora, integra, superne inciso—lobata: lobis parallelis, apice crenatis. *Petioli capillares, fusci, laves.* *Fru-*
etificationes lunulatae, marginales, in apice folio-
rum sitæ, reflexæ, adpressiusculæ.

PROPRIETAS. *Odor debilis; Sapor subdulcescens, subadstringens, leniter amaricans, non ingratus.*

PRÆPARATA. Syrupus.

O R D O.

M U S C I.

LYCOPODIUM CLAVATUM. L.
Lycopodium. Ph. Bärlapp, Erdschwefel. Me-
chowé semeno.

Lycopodium. Anthera. bivalvis, sessilis. Caliptra
nulla.

L. Clavatum. Fol. sparsis filamentosis, spic. te-
retibus pedunculatis geminis.

In-

Indigeno — Perenne, Muscus.

Off. Semen?

FORMA. *Pollen.* (farina) farinaceum, sublutescens, tenue, inter digitos molliusculum.

PROPRIETAS. *Farinæ:* Oder nullus; Sapor nullus.

O R D O.

ALGAE.

LICHEN ISLANDICUS. L.
Lichen Islandicus. Muscus Sanguin. Ph. Blutlungemoos, Lungenschwamm. (a) Gaternjé.
Lichen. MAS. Receptaculum subrotundum, planiusculum, nitidum.

FEM. *Farina* foliis adpressa.

L. Islandicus. Foliaceus adscendens lacinatus, marginibus elevatis ciliatis.

Indigeno — Perennis.

Off. Planta integra.

FORMA. *Lichen* foliaceus, subcoriaceus, eretus, pallidus, subolivaceus, glaber, lacunulosus, circiter palmaris, laevis, lacinatus: laciñis sublinearibus,

(a) Sub hoc Titulo, & contra hujus visceris morbos per secula fere dixerò jam celebris est hic lichen alpicolis montium Giganteorum Bohemia.

ribus, obtusis, marginibus omnibus ciliatis; apice fuscō — olivaceus. *Scutella* orbiculata, integerim, supra folium positā, plana, solitaria.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* leniter amaricans; *masticatus* emollitur, comminuitur, vix acris.

LICHEN PULMONARIUS. L.

Pulmonaria arborea. Ph. Baumlungennüss.

Pleńje stromowy.

L. Pulmonarius. Foliaceus laciñiatus obtusus glaber: supra lacunulosus; subtus tomentosus.

Indigeno — Pérennis.

Off. Planta integra.

FORMA. *Lichen* foliaceus, coriaceus, supra lacunulosus: lacuniis retiformibus; viridis, glaber, sepe exasperatus verucis parvis, in eminentiis inter lacunas sitis; subtus bullatus, leniter tomentosus, viridescens, sed bullis pallidioribus, albidis, glabriusculis; laciñatus: laciniis lanceolatis, obtusis, sublacinatis. *Scutella* orbiculata, plana, marginalia.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* debilis, mucidus, subnauseosus, acriusculus; *masticatus* emollitur in ore, difficilis comminuitur, acriusculus sentitur, remanente acri sensu & mordente in faucibus, diu inhærente.

O R.

O R D O.

FUNGI.

BOLETUS LARICIS. L. (a)
Agaricus Albus. Ph. Weisser Lerchenschwamm.
Vslá dějnová haubc.

Boletus. Fungus horizontalis, subtus porosus.
Exoticus supra Larices.

Off. *Fungus decoriatus.*

FORMA. *Boletus sessilis, subrotundus, convexo — planus, magnitudine pugni, s^epe capitatis infantis ex annulis albidis lutescentibus & fulcis variegatus, laevis, subtus poris innumeris pertusus. In officinis occurrit purgatus & undique circumsectus, unde albus laeviusculus. Parencrema sicc. album, siccum, aquale, spongiosum, subfarinaceum, friabile, inquinans.*

PROPRIETAS. *Odor vix ullus ; Sapor dulcescenti — amarus, nauseosus, inquinans.*

COMPOSITA. *Electuarium seu Theriaca Andromachi.*

Extractum Catholicum. — Parchimagogum.

Pi.

a) In pulcherrima Dissertatione D. Rubel Viennæ habita de Agarico officinali evincitur, fungum hunc saltem esse notabilem varietatem Boleti igniarii, si non diversam omnino species.

Pilulæ de Succino Cratonis.
Species Decocti aperitivi.

* BOLETUS IGNIARIUS. L.

Agaricus Chirurgorum. Ph. Feuerschwamm.
Dubowá hauba, koterce.

B. Igniarius. Acaulis pulvinatus levius, poris
tenuissimis.

Indigenus.

Off. Fungus parasiticus in Betulis & Quer-
cubus frequens.

FORMA. Sicc. & præparat. Fomes coriaceus,
mollissimus, lenissimus, viridecens, consistentia
coriaceo—tomentosa. Boletus, qui in Fragorum
truncis crescit, mollissimus fit dum præparatur.

PROPRIETAS. Odor nullus, neque Sapor.

PEZIZA AURICUЛА. L.

Auricula Judæ, Fungus sambuci. Ph. Holder-
schwamm. Bezowá hauba.

Peziza. Fungus campanulatus, sessilis.

P. Auricula. Concava rugosa auriformis. Ele-
vata sessilis membranacea rugosa & crispa, for-
ma concava.

Indigena supra arbores putridas. (a)

Off. Fungus integer.

Z

For.

(a) Quot annis in magna copia erescit in vaporariis horti
Botanici super corticibus lignorum, quibus finius equinus
tegitur, & quibus olla pro parte imerguntur.

FORMA. *Rec.* *Fungus* *sessilis*, *umbilicatus*, *concavus*, *campanulatus*, *sæpe explanatus*, *magnitudine circiter ovi gallinacei*, *basi plicatus*, *superne margine integro terminatus*, *extus minutissime tomentosus*, *intus lævis*, *consistentia gelatinoso — cartilaginea*, *undique Kermesinus* *& purpurascens*.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* *vix ullus*; *Sapor nullus*; *masticatus* *communitur*, *subcartilagineus* *sentitur*, *vix solvitur*. *Siccatus* *fit satis tenuis*, *cinerascens*, *fragilis*, *rugosus*, *qui masticatus gelatinescit*. *In aquam tepidam immissus brevi emollitur*, *expanditur*, & *eandem*, *quam recens habuerat*, *resumit formam*, *consistentiam & colorem*.

* **LYCOPERDON BOVISTA.** L.

Crepitus lupi. Ph. *Bovista*, *Bubenfist*.

Lycoperdon. *Fungus* *subrotundus*. *Seminibus* *farinaceis repletus*.

L. Bovista. *Subrotundum*: *lacerato — dehiscens*.

Indigenus *in campis* *sterilibus*.

Off. *Fungus* *cum polline*.

FORMA. *Rec.* *Fungus* *subrotundus*, *stipitatus*, *læviusculus*, *magnitudie varia*; *parenzymate* *spongioso — succulento*, *niveo*. *Sicc.* *lævis*, *siccus*, *lividus*; *parenzymate* *spongioso*, *pulverulento*: *pulvere brunneo*, *inquinante*, *siccissimo*, *in auras obvolitante*, *dum fungus comprimitur*. *Si fungus* *hic siccatus* *pedibus calcatur*, *crepitum edit*,

&c

& fumum emitit pulverulentum. In solo propingui, aere pluvioso, in enormem perbrevi tempore excrescere potest magnitudinem, ut observavit CL. BENEDIC. BERGIUS, qui hujusmodi fungum habuit, cuius ambitus 2 ulnis & 3 digitis respondit, cuiusque gravitas 18. librarum sive, modum excebat.

PROPRIETAS. *Sicc.* Odor nullus, neque Sapor.

APPENDIX. PALMACE.

PHENIX DACTYLIFERA. L.

Dactylus. Ph. Datteln. Datle.

Phenix. Mas. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* 3 — petala. *Stam.* 3.

FEM. *Cal.* 3 — partitus, *Cor.* 3 — petala. *Pist.*
I. *Drupa* ovata.

P. Dactylifera. Frond. pinnatis : foliolis complicatis ensiformibus.

Exotica. Arbor. Palma;

Off. Fructus.

FORMA. *Sicc.* *Drupa* cylindrica, saepe conica, pollicaris, pollicis crassitie, apice obtuso — rotundata, tuberculo terminata, rubicunda, sub-

diaphana, glabra basi truncata, saxe subalbida (sc. ubi calyce tecta fuit) unilocularis. *Nucleus cylindricus, osseus, extus cinereo — brunneus, intus plumbeo — subviolaceus, solidus utrinque obtusus, undique minutim rugosus, laeviusculus tamen, subtuberculatus, dorso convexo — teres, hilo progerminante orbiculato, depresso- sculo in medio dorsi, antice fusco longitudinali profunde exaratus. Parenyma drupæ pulposum, melligenum, crassitie lineæ vel ultra, pariete interiori, nucleus spectante vestitum tunica tenera, nivea, subsplendente, membranacea, sub qua latet substantia alba, minutissime spongiosa, subpulposa.*

PROPRIETAS. Sicc. drupæ : Odor nullus ; Sapor melligenus, dulcissimus ; masticata drupa solvit in ore, excepta tunica interiore, quæ emollitur quidem, sed tenax fit, & ægre comminuitur.

ARECA CATECHU. L.

Catechu. Terra Japonica. Ph. Catechu. Katechu.

Areca. MAS. Cal. Cor. 3 — petala. Stam. 3.

FEM. Cal. Cor. 3 petala, Drupa calyce imbricato.

A. Catechu. Frond. pinnatis: foliolis replicatis oppositis præmorsis.

Exotica. Arbor. Palma,

Off.

Off. Succus inspissatus. An potius e Mimosa specie? (a)

FORMA. *Gummi Resina* in frustulis majoribus, fusco — nigra, nitidiuscula, dura, fragiliuscula, homogenea, saepe lignamentulis conspurcata, fragilis: fracturis irregularibus; in pulvrem facile resolubilis: pulvere brunneo — rubro.

PROPRIETAS. Odor nullus; Sapor substipticus, dein amaricans, postea subdulcescens; mastigata inter dentes dura, fragilis, comminuitur, solvit: saliva rubra.

PRÆPARATA. Essentia.

F R U C T U S.

MYRISTICA. L.

Moschata Nux. Ph. Mußkatnuß, Mußkátowa kufka.

Exotica. Arbor ignota!

Off. Fructus.

FORMA. *Drupa* magnitudine fere ovi gallinacei, pedunculata, axillaris, subsolitaria, subrotunda vel turbinata, glabra, gilva, utrinque lon-

gi-

(a) Mimosa (Catechu) spinis stipularibus geminis distictis, foliis bipinnatis, utrinque multijugis, spicis geminis axillaribus cylindricis. Phar. Svec.

z 3

gitudinaliter sulcata, tandem bivalvis, sulcis dehiscentibus; parenzymate carnosō, albicante, repleto succo tenui, seroso, sapore austero, stiptico, minime eduli. *Nux* subrotunda, decidua, intra valvulas drupæ dehiscens, magnitudine ovi columbini vel ultra, fusca, scabriuscula, inscripta sulcis longitudinalibus, subreticularis; testa dura, crassitie lineæ dimidiæ, fragilis: fracturis fuscis, nitidiusculis, superne obvelata tunica (*Macis dicta*) membranaceo pulposa, pinguiscula, testæ ad pressæ adhærente, undique glabra; recente sanguinea, siccata lutescenti — coccinea, fragili, multifida: laciñiis linearibus, singulis apice multifidis, acutis, inflexis. *Nucleus* (*Nux Moschiata*) liber intra testam, bruneo — cinerascens, subrotundus, magnitudine Pruni minoris, utrinque obtusis, læviusculis, reticulatus sulcis, quorum longitudinales validiores; parenzymate recentis carnosō, pingui, oleum plorante ex acri intruso; siccati vero solido, duriusculo, subfragili, post sectionem transversalem cinereo, undique pecto venis fuscis, longitudinalibus, inæqualibus.

PROPRIETAS. *Nucis Myrist.* Odor fragrans gratus; Supor pinguisculus, aromaticus, odori congruens, calidus; masticata inter dentes friabilis, facile comminuitur, solvitur fere in ore, calat in faucibus. *Macis odor nucis Myristica*, ve-

rum

rum fortior; *Sapor* nuce fortior, magis aromaticus, magis calidus, vix subamaricans; *masticata* subito emollitur, comminuitur, inter dentes sub-pulposa sentitur, sed non solvitur; calet in fauibus.

PRÆPARATA. *Nux* Oleum destillatum & pressum.

MACIS. Essentia.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. Nux. Acetum antisepticum.

Aqua Embryonis.—Melissæ compo-
fita.

Elixirium Vitrioli.

Emplastrum de Labdano.

Pulvis dentifricius albus.—Specierum
Aromaticarum.—pro Morulis Im-
peratoris.

Spiritus Aromaticus.—Balsamicus vul-
go Schauerianus.

Ol. pres. Balsamum Appoplecticum.—
Caryophyllorum.—Saxonicum.

MACIS. Aqua Embryonis.—Hysterica
fœtida.

Essentia Absinthii composita.—Car-
minativa.

Pulvis Vitæ.

Ol. Balsamum Saxonicum.

Essentia sive Balsamum Vitæ Hoffmanni;
Liquor seu Sal volatilis oleofus,

G U M M A T A.

PERUIFERA. L.

Balsamum Peruvianum. Ph. Schwarzer Peru-
wianischer Balsam. Peruwský balsam.
Exoticum.

Off. Balsamum. An arte compositum? Ita
ex aliis.

FORMA. *Resina* liquida, lente fluida, obscu-
re rubra, consistentia syrapi spissi vel Terebin-
thinæ, in calore ignis fluidior, diaphana si vitro
illinita, alias opaca.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, exacte siliquæ
Vanillæ; *Sapor* balsamicus, pinguisculus, amari-
cans, acrisculus, odori congruens.

COMPOSITA. Balsamum Apoplepticum.

Ceratum pro Ceraturis balsamicis.

Emplastrum de Labdano.

Essentia sive Balsamum Vitæ Hoffmanni.

Pilulæ Balsamicæ Mortoni

Tinctura Balsamica. — Tinct. sive Bal-
samum Commentatoris.

A M M O N I A C U M . L.

Ammoniacum. Ph. Gummi Ammoniak. Amo-
nnak.

Exoticum.

Off. Gummi — Resina.

FOR-

FORMA. *Gummi — resina* solida, in frustis majoribus, lucidiuscula molliuscula in calore & plastica, in frigore fragilis; viridescens, variegata: maculis s. glandulis inæqualibus, albidis, homogeneis, lœvissimis, nitidiusculis.

PROPRIETAS. *Odor fragrans, gravis in Galbanum incidens; Sapor amaricans, graviusculus, acriusculus, inhærens; masticata emollitur, dentibus subadhæret, præcipue glandulosa pars, alba evadit, solvitur; saliva lactescente. Digitis tractata iis adhæret.*

COMPOSITA. Emplastrum de Cicuta.—Diatomaton.—Diachylon cum gummatis.—Malaeticum.—de Meliloto.—Oxycroceum.

Pilulæ Balsamicæ Mortoni.

MYRRHA. L.

Myrrha. Ph. Myrrhen. *Myrrha.*

Off. Gummi — Resina.

FORMA. *Gummi — resina* solida, in frustis minoribus, rubicunda, subdiaphana, extus lœviuscula, vel verucis elevatis scabrida, fragilis; fracturis subrugosis, lucidiusculis; subfriabilis.

PROPRIETAS. *Odor fragrans, vix ingratus; Sapor amarus, odori congruens; masticata primum inter dentes friabilis, dein dentibus adhæret, solvitur saliva lactescente, halitu oris fragrante.*

PRÆPARATA. *Essentia,*

Ex-

Extractum.

Liquor, seu Oleum Myrræ per de:
liquum.

COMPOSITA. *Mirr.* Aqua Hysterica fœtida.
Eleetuarium seu Theriaca Andromachi
& Diateffaron.

Emplastrum Oxycroceum.

Pilulae de Cynoglosso. — Ruffi. — de
Styrace.

Pulvis Fumalis Arthriticus. — Specie-
rum Confectionis hyacinthinæ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schaueria-
nus. — *Matricalis.* — Theriacalis.

Tinctura sive Balsamum Commentato-
ris. — Masticæ composita.

Unguentum de Arthanita sive contra
Vermes. — Digestivum.

Extract. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

BDELLIUM. L.

Bdellium. Ph. Bdellienharz. Bdellium.

Exoticum. Arbor. Palma.

Off. Gummi — Resina.

FORMA. *Gummi* — *resina* in frustulis mino-
ribus, magnitudine vix fructus Cerasi, angulatis,
extus rugosis; obscure rubicunda, subdiaphana,
fragilis: fracturis planis, homogeneis, laxibus,
nitidiusculis.

PROPRIETAS. *Odor* gravis, debilior; *Sapor*
graviusculus americanus, in Terebinthinam vene-

ram incidens; *masticata* tardissime emollitur, dentibus adhæret.

COMPOSITA. Emplastrum de Melloto.

SAGAPENUM. L.

Sagapenum. Ph. *Sagapen*, *Seraphinharz*. *Sagapenum*.

Exoticum.

Off. Gummi — Resinæ.

FORMA. Duplex in nostris officinis reperiatur Sagapenum. *Prius* Gummi — resina solida in frustulis minoribus, magnitudine circiter fructus Cerasi vel ultra, rubra, subdiaphana homogenea, lœviuscula, facie cornea, lucidiuscula, consistentia ceræ, in moderato calore molliuscula, in frigore duriuscula fragiliuscula; cultro secta resolvitur in scobem albidam quasi ex cornu. *Vulgare* sagapenum occurrit in frustis majoribus, magis opacum, rubicundum, non homogeneum, verum glandulis albidis impastatis, & ligni recrementi, aliisque heteropeneis sæpe onustum.

PROPRIETAS. *Odor* fortior, graveolens, fere G. Ammoniaci; sed vulgare magis fœtidum. *Sapor* gravis, inhærens, in Assam fœtidam incidens; *masticatum* sagapenum dentibus subadglutinatur, mox album evadit, solvitur sensim: solutione lactescente.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Em-

Emplastrum Diachylon cum gumma-tibus.

CÆSALPINA? L.

Santalum rubrum. Ph. Rothes Sandelholz.

Cžerwený Santal neb čerwené santalowé dřevo.

Exoticum. Arbor.

Off. Lignum arboris incertæ.

FORMA. *Lignum* solidum, pulchre rubrum, in frustis majoribus, extus fuscis, ponderosum, subsonorum; longitudinaliter fissum, fissura undulata; post sectionem transversalem, nitidiusculum, nebulosum, fasciis longitudinalibus.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* debilis, subadstringens; inter masticandum saliva rubra evadit.

COMPOSITA. *Essentia Lignorum.*

Pulvis Specierum Confectionis hyacinthinæ.

Species Decocti Avenæ. — — *Lignorum.*

IN-

I N D E X.

A.

<i>Abies rubra</i>	<i>pag.</i> 311.
<i>Abrotanum</i>	266.
<i>Absinthium ponticum</i>	267.
<i>Absinthium vulgare</i>	268.
<i>Acacia nostras</i>	156.
<i>Acacia vera</i>	340.
<i>Acetosa vulgaris</i>	111.
<i>Acetosella</i>	142.
<i>Acorus vulgaris</i>	107.
<i>Agaricus albus</i>	352.
<i>Agaricus chirurgorum</i>	353.
<i>Agrimonia</i>	148.
<i>Alchimilla</i>	39.
<i>Alliaria</i>	223.
<i>Allium</i>	100.
<i>Aloe</i>	105.
<i>Althæa</i>	228.
<i>Ammi verum</i>	80.
<i>Ammoniacum</i>	360.
<i>Amomum</i>	80.
<i>Amygdalæ amarae</i>	154.
<i>Amygdalæ dulces</i>	153.
<i>Anagallis</i>	44.
<i>Anchusa lutea</i>	42.
<i>Anethum</i>	87.
<i>Angelica sativa</i>	78.
<i>Anime</i>	127.
<i>Anisum stellatum</i>	186.
<i>Anisum vulgare</i>	93.
<i>Anthophylli</i>	179.
<i>Anthos</i>	12.
<i>Apium</i>	94.
<i>Arabicum gummi</i>	340.
<i>Aristolochia rotunda</i>	295.
<i>Aristolochia vulgaris</i>	296.

pag.

<i>Armoracia</i>	221.
<i>Arnica</i>	274.
<i>Artemisia</i>	269.
<i>Arthanita</i>	43.
<i>Arum</i>	297.
<i>Aſa dulcis</i>	314.
<i>Aſa fœtida</i>	77.
<i>Aſa odorata</i>	314.
<i>Aſarum</i>	143.
<i>Aſparagus</i>	103.
<i>Avena</i>	28.
<i>Aurantium</i>	250.
<i>Auricula judæ</i>	353.

B.

<i>Balaustrium</i>	151.
<i>Balsamita</i>	264.
<i>Balsamum copaivæ</i>	137.
<i>Balsamum de Mecha</i>	115.
<i>Balsamum Peruvianum</i>	360.
<i>Balsamum de Tolu</i>	133.
<i>Barba capræ</i>	159.
<i>Bardana</i>	260.
<i>Basilicum</i>	214.
<i>Bdelium</i>	362.
<i>Beccabunga</i>	10.
<i>Bella donna</i>	54.
<i>Bellis minor</i>	277.
<i>Benzoe</i>	314.
<i>Berberis</i>	109.
<i>Betonica</i>	206.
<i>Betula</i>	299.
<i>Borsdorffiana poma</i>	158.
<i>Botrys</i>	68.
<i>Branca ursi vera</i>	218.
<i>Brio-</i>	

	pag.		pag.
Bronia	322.	Cina	265.
Buxus	300.	Cinnamomum	118.
C.			
Cacao	247.	Citrullus	320.
Calamintha montana	213.	Citrus	248.
Calamus aromaticus	107.	Cochlearia	210.
Calcatripa	183.	Colchicum	112.
Calendula	287	Colocynthis	310.
Camphora	120.	Consolida major	41.
Canella alba	144.	Consolida regalis	183.
Canabis	327.	Consolida saracenica	272.
Capillus veneris	348.	Contra	265.
Capparis	169.	Contrajervia	38.
Cardamomum minus	2.	Copaiva	137.
Cardus Benedictus	286.	Coriandrum	83.
Cardus Mariæ	261.	Cortex Magellanicus seu Wint-	
Carica	344.	teranus	144.
Carthamus	262.	Cotoneum	158.
Carvi	91.	Craftula	140.
Caryophylata	168.	Crepitus lupi	354.
Caryophyllus	178.	Crocus	21.
Cascilla	313.	Cubeba	17.
Cassia fistula	128.	Cucumis	322.
Cassia lignea	120.	Cucumis asininus	317.
Catechu	356.	Cucurbita	319.
Celtica spica	19.	Cureuma	4.
Centaurium minus	71.	Cuscuta	39.
Cerasa nigra	154.	Cyanus	284.
Cerefolium	84.	Cyclamen	43.
Chamædrys	194.	Cydonia	158.
Chamæpitys	191.	Cymimum	82.
Chamomilla romana	281.	Cynoglossum	40.
Chamomilla vulgaris	279.	Cynobastos	162.
Chæiri	224.	Cyperus	24.
Chelidonium majus	170.	D.	
China Chinæ.	48.	Dactylus	335.
China nodosa	328.	Datura	50.
Cicer	240.	Daucus creticus	76.
Cichorium	259.	Daucus sylvestris	73.
Cicuta vulgaris	74.	Dictamnus albus	131.
		Dictamnus creticus	207.
		Doro-	

	pag.	H.		pag
Doronicum	276.	Hedera arborea		59.
Draconis sanguis	108.	Hedera terestris		203.
Dulcamara	55.	Helleborus albus		337.
	E.	Helleborus niger		190.
Ebulus	96.	Hepatica obilis		187.
Elaterium	317.	Hirundinaria		67.
Elemi	114.	Hordeum		29.
Enula	273.	Hyoscyamus		52.
Epithymum	39.	Hypericum		253.
Eruca	226.	Hypocistis		296.
Eryngium	72.	Hystopus		196.
Euphorbium	149.		I.	
	F.	Ialapa		45.
Faba	239.	Imperatoria		85.
Faba inversa	140.	Ipecacuanha		291.
Farfara	270.	Iris floretina		22.
Ficus	344.	Iris nostras		23.
Filix mas	347.	Iuglans		305.
Flamula jovis	189.	Iujubae		57.
Fœniculum dulce, majus	88.	luniperus		332.
Fœniculum vulgare, minus	89.		L.	
	G.	Lacca		315.
Galanga	3.	Lactuca		256.
Galbanum	81.	Lactuca silvestris		257.
Genista	237.	Ladanum		180.
Gentiana	70.	Lamium		204.
Gramen	31.	Lapatum acutum		111.
Grana Paradisi	3.	Larix		311.
Granatum	151.	Lavandula		197.
Gratiola	10.	Laurus		121.
Guajacum	130.	Lentiscus		325.
Gummi Gutta	175.	Levisticum		77.
	H.	Lichen Isladicus		350.
		Lilium album		101.
		Lilium coivalium		104.
		Limonia		248.
		Linnaria		217.
			Li.	

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
<i>Linum</i>	241.	<i>Nasturtium aquaticum</i>	222.
<i>Lupinus</i>	238.	<i>Nepeta</i>	197.
<i>Lycopodium</i>	349.	<i>Nicotiana</i>	53.
<i>Lysimachia purpurea</i>	146.	<i>Nigella</i>	186.
<i>M.</i>		<i>Nux moschata</i>	357.
<i>O.</i>			
<i>Macis</i>	358.	<i>Olea</i>	7.
<i>Magelanicus cortex</i>	144.	<i>Olibanum</i>	334.
<i>Majorana</i>	209.	<i>Opium</i>	172.
<i>Malicorium</i>	152.	<i>Opopbalsamum</i>	115.
<i>Malva arborea</i>	231.	<i>Opopanax</i>	86.
<i>Malva vulgaris</i>	232.	<i>Origanum</i>	208.
<i>Manna</i>	342.	<i>Orleana</i>	176.
<i>Marrubium album</i>	207.	<i>P.</i>	
<i>Marum verum</i>	192.	<i>Papaver album</i>	171.
<i>Mattiche</i>	327.	<i>Papaver erraticum</i>	174.
<i>Matricaria</i>	278.	<i>Paradisi grana</i>	3.
<i>Mechoacanna</i>	47.	<i>Parietaria</i>	339.
<i>Melilotus</i>	244.	<i>Passulae majores</i>	61.
<i>Melissa</i>	212.	<i>Passulae minores</i>	61.
<i>Melo</i>	321.	<i>Pastinaca</i>	86.
<i>Mentha crispa</i>	200.	<i>Pepo</i>	319.
<i>Mentha piperitis</i>	202.	<i>Persica</i>	152.
<i>Mentha rubra</i>	201.	<i>Petalites</i>	272.
<i>Mentha saracenica</i>	264.	<i>Petroselinum</i>	94.
<i>Mercurialis</i>	330.	<i>Petum</i>	53.
<i>Meum</i>	83.	<i>Phu</i>	19.
<i>Mezereum</i>	117.	<i>Pimpinella alba</i>	92.
<i>Millefolium</i>	282.	<i>Pimpinella rubra</i>	303.
<i>Momordica</i>	317.	<i>Pinus picea</i>	311.
<i>Morsus diaboli</i>	32.	<i>Pinus sativa</i>	310.
<i>Morus</i>	301.	<i>Pinus sylvestris</i>	307.
<i>Moschata nux</i>	357.	<i>Piper longum</i>	16.
<i>Muscus sanguineus</i>	350.	<i>Piper rotundum</i>	15.
<i>Myrrha</i>	361.	<i>Piperitis</i>	202.
<i>Myrtillus</i>	116.	<i>Pistacia</i>	325.
<i>N.</i>		<i>Plantago</i>	36.
<i>Napellus</i>	185.	<i>Paeonia</i>	181.
<i>Naphæ flores</i>	250.	<i>Polygala</i>	236.
<i>Napus</i>	225.	<i>Polypodium</i>	347.
			<i>Po.</i>

	<i>pag</i>		<i>pag</i>
Poma Borsdorffiana	158.	Sambuci fungus	353.
Populus	329.	Sanctum lignum	130.
Prunella	214.	Sandaraca	332.
Prunus	155.	Sanguis draconis	108.
Psyllium	37.	Santalum citrinum	115.
Pulegium	203.	Santalum rubrum	364.
Pulmonaria arborea	351.	Santonicum	265.
Pulsatilla nigricans	188.	Saponaria	138.
Pyretrum	282.	Sarcocolla	35.
Q.		Saraparilla	327.
Quercus	308.	Sassafras	123.
R.		Satureja	195.
Raphanus niger	221.	Satyrionum	292.
Raphanus rusticanus	221.	Scabiosa	33.
Rhabarbarum	124.	Scamonium	45.
Rapa alba	225.	Scolopendrium	346.
Raponticum	123.	Scordium	193.
Rhodium	237.	Scorzonera	255.
Rhoeas	174.	Scrophularia	217.
Ribesium nigrum	59.	Secale	29.
Ribesium rubrum	58.	Sedum majus	150.
Ricinus vulgaris	316.	Sedum minus	141.
Rosa palida	163.	Sedum vermiculare	142.
Rosa rubra	160.	Sempervivum	150.
Rosa sylvestris	162.	Senega nostras	236.
Rosmarinus hortensis	12.	Senegal gummi	341.
Rubia	33.	Senna	129.
Rubus	165.	Serpentaria virginica	294.
Ruscus	336.	Serpyllum	210.
Ruta	132.	Sefeli creticum	72.
S.		Siliqua dulcis	343.
Sabadilla	358.	Simaruba	69.
Sabina	331.	Solanum	55.
Sacharum	25.	Solanum furiosum	54.
Sagapenum	363.	Spica	197.
Salep	292.	Spica celtica	19.
Salicaria	146.	Spina cervina	56.
Salix vulgaris	324.	Squilla	102.
Salvia	14.	Staphisagria	184.
Sambucus	91.	Stramonium	50.
		Stirax calaminta	135.

	pag.		pag.
Styrax liquida	306.	Tunica	119.
Sumach	95.	Turpethum	46.
Symphytum	41.	Tussilago	270.
T.			V.
Tabacum	53.	Valeriana major	19.
Tacamahaca	37.	Valeriana vulgaris	18.
Tamarindus	20.	Vanilla	293.
Tamariscus	99.	Verbascum	49.
Tanaeetum	262.	Verbena	11.
Taraxacum	258.	Veronica	9.
Telephium	140.	Viola	289.
Terebinthina communis	308.	Virga aurea	272.
Terebinthina veneta	311.	Viscum Quercinum	110.
Terra Japonica	356.	Vitis	60.
Thee orientale	178.	Urtica major	300.
Thlaspi	220.	Urtica mortua	204.
Thus	334.	Uva ursi	134.
Thymus	221.	Vulvaria	68.
Tilia	176.	Uvularia	336.
Tolu	133.	Winteranus cortex	144.
Tragacantha	242.		Z.
Trifolium fibrinum	43.	Zedoaria	5.
Triticum	30.	Zingiber	1.

N e g i s t e r.

A.	Seite		Seite
Aepfel Borsdorfer	188.	Ammonklein	80.
Aepfel maschansker	158.	Ammoniak Gummi	360.
Atant	273.	Andorn weisser	207.
Atkantisches Aschensalz	69.	Aneis gemeiner	93.
Aloe	105.	Angelite	78.
Ammen	80.	Angurie	320.
		Animenharz	127.
		Apich	

	Seite		Seite
Apich	94.	Bittersüß	55.
Apostelmutter	33.	Bläue Kornblumen	285.
Arabischer Schottendorn	340.	Bläue Veilchen	289.
Aron	297.	Bläuschwertel	23.
Asand stinkender	7.	Blutlungenmoos	350.
Asand wohlriechender	314.	Boksdorn	243.
Aschensalz alicantiisches	69.	Bokshörnel	343.
Attig	96.	Betshorn	245.
B.		Bofit	354.
Bachbungen	10.	Bohne	239.
Bärenklau	218.	Borsdorff Aepfel	158.
Barentage	218.	Braunwurzel	217.
Bärklapp	349.	Brechwurzel	291.
Bärwurzel	83.	Brennessel	300.
Baldrian gemeiner	18.	Brennkraut	189.
Baldrian großer	19.	Brunelle	214.
Balsamäpfel	317.	Brunnenkreße	222.
Balsam Copal	137.	Brustbeerlein	57.
Balsam peruanischer	360.	Bubenfist	354.
Balsam schwarzer	360.	Buchampfer	142.
Balsam toluianischer	133.	Buchsbaum	300.
Bassie	214.	C.	
Bauchampfer	142.	Caceau	247.
Lauersenf	220.	Capucinersamen	338.
Baumlungemoos	351.	Catechu	356.
Badelienharz	362.	Celtischer Narbus	19.
Benediktinwurzel	168.	Chamille gemeine	279.
Bergmünze	23.	Chamille römische	281.
Bertram	282.	Chinarinde	48.
Bethonie	206.	Chinawurzel	328.
Beyfuss	269.	Eichhorle	259.
Bibernel roth	303.	Eicrone	248.
Bibernel weißer	92.	Copaibalsam	137.
Bilsenkraut	52.	Cretischer Diptam	207.
Bingelkraut	310.	Cretischer Gesel	72.
Birke	299.	Cretischer Vogelnest	76.
Bittere Mandeln	154.	Creuzbeere	56.
Bitterklee	43.	Creuzblümlein	236.
		Cubeben	17.
		Cii.	

	Seite		Seite
Cukumern	322.	Fenchel gemeiner	89.
Eyperwurzel	24.	Fenchel römischer	88.
D.		Fette Henne	140.
Datteln	355.	Feuerschwamm	353.
Dille	87.	Fichtenbaum	307.
Diptam cretischer	207.	Fieberklee	43.
Diptam weißer	131.	Fieberrinde	48.
Dolläpfel	50.	Flachsfeide	39.
Dollkraut	54.	Flaschenkürbß	319.
Drachenblut	108.	Fleischkleim	35.
E.		Flieder	97.
Edel - Leberkraut	187.	Flobammenkraut	37.
Ehrenpreis	9.	Flüssiger Storax	306.
Eiche	303.	Franzosenholz	130.
Eichenmistel	110.	Frauenblatt	264.
Eisenbüttel	185.	Frauendistel	261.
Eisenkraut	11.	Frauenhaar	348.
Elemiharz	114.	Frauenmantel	39.
Engelsfuss	347.	Frauenmünze	264.
Engeltrank	274.	G.	
Enzian	70.	Gänswurzel	276.
Ephen	59.	Gänseblümel	277.
Eppig	94.	Gärberbaum	95.
Erdbeere	166.	Galban Gummi	81.
Erdrauch	234.	Galgant	3.
Erdschwefel	34.	Gamanderle	194.
Esche. Eschenbaum	341.	Gartenpapeln	231.
Eselkukumern	317.	Garttheil	266.
Euphorbium	149.	Gauc heil	44.
Eybisch	228.	Geißbart	159.
F.		Gelbes Sandelholz	115.
Falstrian	104.	Gelbe VioLEN	224.
Färberthe	33.	Gemeine Chamille	279.
Färber Ochsenzunge	42.	Gemeine Käsepapeln	232.
Farrenkraut	347.	Gemeine Österlüzen	296.
Feige	344.	Gemeiner Aueß	93.
Feigbohne	238.	Gemeiner Baldrian	18.
Felber	324.	Gemeiner Fenchel	89.
Feldcypresse	191	Gemeiner Saueramp	111.
		Gemeiner Vogelnest	73.
		G.	

	Seite		Seite
Gemeiner Wermuth	268.	Himmelbrand	49.
Genester	237.	Hinbere	163.
Gerste	29.	Hirschkraut	35.
Gewürznägelu	178.	Hirschzunge	346.
Giftwurzel	38.	Holder, older, Holzunder	97.
Gilbwurz	4.	Holdenschwanum	353.
Granatbaum	151.	Hünerdarm	44.
Granathüthe	151.	Husflattig	270.
Granatäpfel	31.	Hundsjunge	40.
Graswurzel	31.	Hypoakanna	291.
Gredel in der Staude	186.	Hypocisten	216.
Grindwurzel	111.	Hysop	196.
Große Haustwurzel	150.		
Große Kardamomen	3.		
Große Wallwurzel	41.	J.	
Großer Baldrian	19.	Taloppe	46.
Großer Terpentbaum	134.	Taloppe weiße	47.
Groß Schillkraut	170.	Johannesbeeren rothe	58.
Gummi Imonia	360.	Johanneskraut	153.
Gummi Galban	81.	Jüber, Ingwer	1.
Gummi Gutt	175.		
Gummiladan	110.	K.	
Gummisack	317.	Käsepochen gemeine	232.
Gummipopanax	86.	Kalmes Kalmus	107.
Gürtel	266.	Kämpfer	120.
Gündelstrehen	203.	Kappern	169.
Gundermann	203.	Kardamomlein	2.
Gurken	312.	Kardamömen große	3.
		Kardusbenedykt	286.
H.		Kassie	120. 128.
Haber	28.	Kazenmünze	147.
Hagebutten	163.	Kerbelkraut	84.
Hanf	327.	Kichern	240.
Hanf wilder	191.	Kirschen schwarze	151.
Hafelwurz	143.	Klapperrose	174.
Haustwurzel große	150.	Kleine Haustwurzel	141.
Haustwurzel kleine	141.	Klette	260.
Heidelbeere	116.	Knoblauch	100.
Heiligen Geistwurzel	78.	Knoblauchkraut	223.
Hirschepisch	161.	Königskerze	49.
Heidnisch Wundkraut	272.	Koquinte	320.
		Koriander	83.

(3)

Korn

	Seite		Seite
Korn	29.	Mandeln bittere	154.
Kornblumen blaue	285	Mandeln süße	155.
Kornblumen rothe	174.	Manna Mannäschbaum	
Kranowet	332.		342.
Krausmünze	200.	Mannstreuwurzel	72.
Kreen	221.	Margran	209.
Kreuzbaum	315	Mashanster äpfel	158.
Kreuzbeere	56.	Maslieben	277.
Kreuzblümlein	236.	Mastixbaum	325.
Küchernschelle schwärzliche	188.	Mauerpfeffer	142.
Küm	91.	Maulbeerbaum	301.
Kümmel	91.	Mausdorff	336.
Kümel römischer	82.	Masenblümel	101.
Kümel schwarzer	186.	Mechoakannerwurzel	47.
Kürbs	319.	Meeretia	221.
Kütten	158.	Meerzwibel	102.
Küttelkraut	210.	Meisterwurzel	85.
Küttelkraut welsches	211.	Melisse	212.
L.			
Lachenknoblauch	193.	Melaune Melone	321.
Langer Pfeffer	16.	Melte stinkende	68.
Lattig	256.	Mohn weißer	171.
Lattig wilder	257.	Momordike	317.
Laussaamen	184.	Münze rothe	201.
Larwendel	197.	Mustatnuß	357.
Leberkraut - edek	187.	Mutterkraut	278.
Lein	99.	Mutternägelein	179.
Leinkraut	217.	Mutterzimmet	120.
Lerchenbaum	311.	Myrrhen	361.
Lerchenchwamm weißer	352.	N.	
Liebstöckel	77.	Nachtschatten	55.
Lilie weiße	101.	Nägelein	139.
Linde Lindenblume	176.	Nägelein Gewürz	178.
Lungenschwamm	350.	Nardus celtischer	19.
Löffelkraut	220.	Nelke	139.
Löwenzahn	258.	Nesel taube	204.
Lorberbaum	121.	Niegwurzel schwarze	190.
M.			
Majorana	209.	Niegwurzel weiße	337.
Mandelbaum	153. 154.	Nußbaum welscher	305.
O.			
		Odermenig	148.
		Dels	

			Seite
Delbaum	7.	Rapontise	123.
Dmurken	322.	Raute	132.
Opobalsam	115.	Reinfaren	263.
Opopanax Gummi	86.	Kettig	227.
Orientalischer Thee	178.	Ribesel rothe	58.
Orlean	176.	Ribesel schwarze	59.
Osterluzen gemeine	296.	Ringelblume	287.
Osterluzen runde	295.	Rittersporn	183.
P.		Rocken	29.
Pappelbaum	329.	Röhrelkraut	258.
Pappeln schwarz rothe	231.	Römische Chamille	281.
Paradeiskerner	3.	Römischer Fenchel	88.
Pasternak	86.	Römischer Kümmel	82.
Peonie	181.	Römischer Quendel	211.
Peruviauischer schwarzer		Römischer Vermuth	267.
Balsam	360.	Rohrkassie	128.
Pestilenzwurzel	272.	Rosenholz	237.
Petersilie	94.	Rose rothe	160.
Pfaffenröhrel	258.	Rose weisse	163.
Pfeben	319.	Rose wilde	162.
Pfeffer langer	16.	Rosmarin	12.
Pfeffermünze	202.	Rothe Bibernel	303.
Pfeffer schwarzer	15.	Rothe Joannesbeeren	58.
Pfingstrosse	181.	Rothe Münze	201.
Pfirsiche	152.	Rothe Rose	260.
Pflaumen	155.	Rothe Kornblumen	174.
Pfirmentraut	237.	Rothes Sandelholz	364.
Pimpermülein	325.	Rothe Tonne	311.
Pineole	310.	Ruben weisse	225.
Pistazie	325.	Rücksel	277.
Plutzer	319.	Runde Osterluzen	295.
Polen	203.	S.	
Pomoranze	250.	Sabadille	338.
Purgierkerner	316.	Sadelbaum	331.
Q.		Saflor	262.
Quecken	31.	Safran	21.
Quendel	210.	Safran wilder	262.
Quendel römischer	211.	Sagapenharz	363.
Quitten	158.	Salapwurzel	292.
R		Salwen Salwer	14.
Rabarbare	124.	St	

	Seite.		Seite
St. Johannesbrod	343.	Senf weißer	226.
St. Johanneskraut	253.	Sennesblätter	129.
Sandelbeere	134.	Serapinharz	363.
Sandelholz gelbes	115.	Sesel cretischer	172.
Sandelholz rothes	364.	Seruenbaum	331.
Sassafrasholz	123.	Simarube	134.
Sisaparille	327.	Stinau	39.
Saturen	195.	Skorzonera	255.
Saubrod	44.	Spargel	103.
Sauerampf gemeiner	111.	Stabwurzel	266.
Sauerklee	142.	Steckrubben	225.
Sauerauch	109.	Steffanskerner	184.
Seabiose	33.	Steinklee	244.
Seamoneie	45.	Steinwurzel	347.
Schaafcarbe	282.	Sternaneis	346.
Schkarisse	313.	Stinkender Asaib	77.
Schellkraut gross	170.	Stinkende Melte	68.
Scherübel	225.	Storax	134.
Schierling	74.	Starax flüssiger	306.
Schlagkräuslein	192.	Süsse Mandeln	153.
Schlängenmord.	253.	Süßholz	244.
Schlangenwurzel	Wiergini- sche	Sumach	95.
Schlehen	294		L.
Schottendorn arabischer	340.	Tabak	53.
Schwalbenwurzel	67.	Tacamahalharz	37.
Schwarze Kirschen	154.	Tag und Nacht	339.
Schwarze Nieswurzel	190.	Tamarinden	20.
Schwarze Ribesel	59.	Tamariksen	99.
Schwärzliche Küchenschelle	188.	Tanne rothe	311.
Schwarzer Balsam	360.	Taube Nessel	204.
Schwarzer Kummel	186.	Tausendquellenkraut	71.
Schwarzer Pfeffer	15.	Terpentinbaum großer	134.
Schwarzer Senf	227.	Teufels Ubis	32.
Schwarzrothe Papeln	231.	Teufelsdreck	77.
Schwarzwurzel	41.	Thee Orientalische	378.
Schmeinhrod	43.	Thymian	211.
Schwindelkerner	17.	Thymseide	39.
Sedel	331.	Tolutanischer Balsam	113.
Selkenkraut	138.	Tormentille	167.
Senf schwarzer	227.	Tragant	242.
		Traubenkraut	68.

	Seite.		Seite.
Turbit	46.	Weisser Diptam	131.
Türkenkopf	319.	Weisser Lerhenschwamm	352.
V.		Weisser Mohn	171.
Panisie	293.	Weisser Senf	226.
Weischen, Beigel blaue	289.	Weisser Zimmet	144.
Beigelwurz	22.	Weizen	30.
Violen gelbe	224.	Welscher Nussbaum	305.
Virginische Schlangentourzel	294.	Welsches Rüttelkraut	311.
Bogelnest Cretischer	76.	Wermuth gemeiner	268.
Bogelnest gemeiner	73.	Wermuth römischer	267.
Bürgerig	185.	Wildaurin	10.
W.		Wilder Hanf	191.
Wacholder	322.	Wilder Lattig	257.
Wallmurzel große	41.	Wilde Rosen	162.
Warisse	293.	Wilder Safran	262.
Wasserbünden	10.	Wohlgemuth	208.
Wasserlauch	193.	Wohlriechender Usand	314.
Wasser Melaine	320.	Wolverley	274.
Wegbreit	36.	Wullkraut	49.
Wegerig	36.	Wunderbaum	316.
Wegwart	259.	Wurmkraut	263.
Weiderich	146.	Wurmsamen	265.
Weide weiße	324.	Z.	
Weihrauch	334.	Zäpfleinkrut	336.
Wein, Weintrebe	60.	Zaucken	104.
Weinbeeren große	61.	Zaunrübe	322.
Weinbeeren kleine	61.	Zehrwurzel	391.
Weinrute	132.	Zeidelbast	117.
Weinschädlings	109.	Zeitlofe	112.
Weißübernel	92.	Zeller	94.
Weisse Falape	47.	Zibeben	61.
Weisse Lilie	101.	Zimmet	318.
Weisse Nieshwurzel	337.	Zimmet weisser	144.
Weisse Rose	163.	Zirbesküppelbaum	310.
Weisse Ruben	225.	Ziserlein	240.
Weisse Weide	324.	Zitwersamen	265.
Weisser Undorn	207.	Zitwerwurzel	5.
		Zucker	25.
		Zweschpen	155.

Nr.

N e g s t ě j k.

A.

	strana.	fir.
Afant	218.	47.
Aleluja	142.	337.
Alikantická lachawa sůl	69.	162.
Aloes	105.	225.
Amni	80.	144.
Ammoniac	360.	131.
Angelička	78.	239.
Angelský trnek	274.	101.
Angurye	320.	337.
Anýme	127.	207.
Anýz	127.	171.
Apich veliký	93.	54.
Archangelická	77.	37. 184.
Aron	78.	52.
Aronowá bylina	297.	Bob
Aronowé břady kořen	297.	121. 239.

B.

Badian	186.	Borowice domácí
Balsam Kopagaský	137.	Borowice lesní
Balsam peruwský	360.	Boží Matky bylina
Balsam Tolutský	133.	Brada Aronowá
Balsam zahradní	200.	Brada kořív
Bazalička planá	330.	Brotán
Bazylíka	214.	Brunátná vrbiná
Bdellium	362.	Břečtan
Bedeník	92.	Břeskew
Benedyk neb Benedyktowy		Bíjra
kořen	171.	Bułwice
Benzoe	314.	Bylina Aronowa
Beyli	237.	Bylina česnečková
Bex	97.	Bylina čipkowa
Bexowa hauba	353.	Bylina broznowa
Bilá čemeřice	337.	Bylina Matky boží
Bilá dřínová hauba	352.	Bylina stlenna
Bilá horčice	226.	C.

C.

Celidonya	170.	Dar nebeský	str.
Celycty Nardus	19.	Datle	355.
Ceterák	346.	Dawic	291.
Cukr	25.	Den a noc	339.
Czatkanka	259.	Dételek týselý zageej	142.
Czemeřice bílá	337.	Dewesyl	272.
Czemeřice černá	190.	Deyworec domácí	73.
Czerná čemeřice	197.	Deyworec kretský	76.
Czerná růže	160.	Divizna	49.
Czerná řekew	227.	Dlauhý pepř	16.
Czerné gahody	116.	Dobrá mysl	208.
Czerne tressně	154.	Domácí borowice	310.
Czernobýl	269.	Domácí Deyworec	73.
Czernohlávek	183. 214.	Domácí růže	160.
Czerný ellebor	190.	Domácí tyčew	319.
Czerný kmín	186.	Doronikum	276.
Czerný konjšelec	188.	Drac	109.
Czerný pepř	15.	Dračkova řekew	108.
Czertkus	32.	Dřevo francowské	130.
Czertovo howno	77.	Dřevo růžové	237.
Czerwená máta	201.	Dřevo santalové čerwene	
Czerwené santalové dřevo			364.
Czerwený santal	364.	Dřevo santalové žluté	115.
Czerwený wolowy gazyk	42	Dřevo sassafrasové	123.
Czerwený zwonecet	253.	Dřevo sladký	241.
Czesnek	100.	Dřín	311.
Czesnek planý	193.	Dřinowa hauba bila	352.
Czesnek wodny	193.	Dříštal	109.
Czesnekowa bylina	223.	Dub	393.
Czirkowá bylina	336.	Dubowa hauba	353.
Cybule morská	102.	Dubové melí	110.
Cycwar	5.	Ducha swateho kořenj	190.
Cycwarowe semeno	265.	Dýne	319.
Cyparis planý	191.	Dýptam	131.
Cytrule	320.	Dýptam kretský	207.
Cytryn	248.	L.	
Cytrynowé gablko	248.	Lgiptské trnky	340.
Cyzrus	240.	Elemi	114.
Daktyle indyanské	20.	Ellebor bili	337.
		Ellebor černý	190.
	(62)		Eua

D.

Daktyle indyanské 20.

Euforbiin

F.

- Fasoly bjlé
Fenyk
Fialový kořen
Fíky
Fiola modrá
Fiola woná
Fiola žlutá
Francouzské dřevo

G.

- Gablečník bjlý
Gablko bodlaveč
Gablko cytrynowé
Gablko granátové
Gablko missenské
Gablko Rágste
Gabodněk
Gabody
Gabody černé
Gabody psý
Galapa
Galapa bjlá
Galban
Galgant
Galgant planý
Galowec
Ganoffit
Gaterník
Gazyk gelenj
Gazyk ps
Gazyk wołowy čerwený
Gdaule
Gečmen
Ged hads hogic̄ kořen
Gedhog
Gedle
Gedlice Wlašská
Gelenj gazyk
Gesen
Géšl'owa palice

str.
149.

239.
88.
22.
344.
289.
289.
224.
130.

207.
50.
248.
151.
158.
32.
166.
166.
216.
56.
46.
47.
81.
4.
24.
332.
237.
187.
350.
346.
40.
42.
158.
29.
294.
38.
311.
336.
346.
341.
50.

294.
294.
255.
353.
353.
352.
279.
281.
204.
227.
226.
220.
72.
213.
70.
154.
43.
260.
260.
77.
238.
238.
103.
68.
178.
179.
39.
291.
296.

Getel horký
Getel vodoní
Gitrocel prošední nebo říro
Eg

36.
43.
43.
351.
57.
175.
86.
37.

H.

- Hadj kořen
Hadj ged hogic̄ kořen
Hadj morcovy kořen
Hauba bezová
Hauba dubová
Hauba dřínová
Heřmánek Ržimský
Blucha Kopřiva
Horejce
Horejce bjlá
Horejce sedlák
Horní máčka
Horní marulká
Hořec
Hořké mandle
Hořký getel
Hořký luppen
hořký repš
Howno certowod
Hrach Ržimský
Hrach Šlikawic̄nij
Hromový kořen
Hrozníček nebbrožnowa byz
lina
Hřebíček Krámský
Hřebíčkova mata
Hus nuzka
Hypokafiana
Hypocistis

Ch.

Chebdj

96.

	str.		str.
Chleb Sw. Jana	343.	Klokočka	325
Chleb swinsty	43.	Kmijn	82
Chmelík	37.	Kmijn černy	186.
Chrpá	284.	Kmijn laučny	91.
Chyná	48.	Kmijn zahradní	186.
Chyn Kořen	328.	Kočičí Kořen	192.
Chwogta klášterská	331.	Kekotice	39.
J.			
Jana Sw. bylinka	253.	Koloquintida	3:0.
Jana Sw. Chleb	343.	Komonice	244.
Jána Sw. Twár	297	Koniklec černy	188.
Janofit	237.	Konjtrud	10.
Indyjské dakyyle	20.	Konopé	327.
B.			
Bachau	247.	Konšte Kopyto	270.
Bade'awa mata	200. 264.	Konšte Kopyto wětss!	272.
Badiolo	314.	Konšty słowjsk	111.
Baffer	120.	Konvalium	104.
Balkan	3.	Kopagstky balsam	327.
Bamanderle	194.	Kopr	89.
Ba mzykowý Kořen	276	Kopr Ržimsky	88.
Bappary	169.	Kopr sladký	98.
Bapardi	347.	Kopr Vlas y	88.
Bapucinský semeno	338.	Kopr zahradní	87.
Barafilat	139.	Koprnik	83.
Bardamomum mensii	2.	Kopi iwa blucha	204.
Bardbenedykt	286.	Kopi iwa mrtvá	204.
Bardus Marye	261.	Kopi iwa paliwa	100.
Bardus pyžehnany	286.	Kopi iwa smradlawa	204.
Baskarilla	313.	Kopi iwa wětss	300.
Basye	120.	Kopito Konšté	270.
Basya fistula	128	Kopito Konšte wětss	272.
Batechu	356	Koryander neb koliander	85.
Bawias	33	Kořen Aronowé brady	297.
Bdile	158	Kořen Benediktowy	168.
Begchawka bjlá	317	Kořen Chynn	328.
Berblík	84	Kořen fialowy	22.
Ber wjnný	60	Kořen hadí ged bogicý	294.
Bmen wjnný	60	Kořen hadí mordowy	255.
Blašterská chwogta	331	Kořen kamzikowy	276.
		Kořen midly	138.

(C)

	str.		str.
Kořen prsní	107.	Lauhowa olitanska žul	69.
Kořen Sarsaparille	327.	Lawendule	197.
Kořen sladký	241.	Lebeda smradlawa	68.
Kořen swinstý	140.	Leko ice	241.
Kořen Vlastek živoč.	327.	Len	99.
Kořenj Ducha swatého	190.	Len Maty boží	217.
Kořenj bromowé	103.	Lenijskus	325.
Kořenj kočičí	192.	Lesní borowice	307.
Kořenj ktwawé	303.	Lesní Myrtus	336.
Kořenj latkowé	197.	Libeček	77.
Kořenj raupowé	213.	Lilek blažnowý	54.
Kořenj třzené	170.	Lilium bjlé	101.
Kořenj wonné	167.	Lipa	176.
Kořenj woszecko	120.	Litsi senowy	129.
Kosatec	80.	Locika	256.
Kostival	23.	Locika lesní	257.
Kotrlík	41.	Loerka plana	157.
Kozík obecný	353.	Lomíkamen i edý	72.
Kozík wětší	18.	Ljšenjek	220.
Koz bradka	19.	Lupen hočky	250.
Králowství swálňské	159.	Lupen wětší	260.
Kralowství wstewowac	83.		
Krámstí b obječek	292.		
Kroswlásek	178.		
Kretský deyworec	286.	Mácka horní	72.
Kretský Dyptam	76.	Mak bjlý	171.
Krew drakowá	207.	Mak plený	174.
Krokos	108.	Mak včeli	174.
Kren	262.	Male rozyňky	61.
Křtičnjkowý kořen	221.	Maliny	165.
Krvavé kořenj	217.	Mandle horčeké	154.
Kubeb	303.	Mandle sladké	153.
Kulka Mustátowa	17.	Manna	342.
Kučimor	357.	Marulka horní	197.
Kutna	44.	Marulka polní	213.
Kysely Detel zagedej	158.	Marosse	301.
	142.	Maryanka	209.
	L.	Marensa	33.
Ladanum	180.	Mastixowý strom	325.
Luka	315.	Mata čerwena	201.
Lassawiensk	67.	Mata kade awa	200.
Laučník římijn	91.	Mata pep. owa	264.
		Mata pep. owa	202.
			238.

	str.	V.		str.
Mata planá	213.			
Mata Ržedka	264.			
Matečně	278.			
Matečně menssí	277.			
Materi dausška	210.			
Materi dausška Ržimská	211.			
Materidausška Wlastka	211.			
Matka hřebíčkowa	179.			
Matky boží bylina	264.			
Matky boží len	217.			
Mechowý semeno	349.			
Medunka	212.			
Melanu	319. 321.			
Mels dubowé	110.			
Melissa	212.			
Menssí matečně	277.			
Menssí mužský tučný	141.			
Menssí ozánka	194.			
Menssí sovalník	214.			
Menssí vlcí pepř polstý	17.			
Menssí země žluč	71.			
Merkuryalis	330.			
Mesyček	187.			
Muž	94.			
Muženské gabsko	158.			
Modra fiala	282.			
Modrak	284.			
Momordyka	317.			
Mořská cybule	102.			
Mrtwa Kopřiva	204.			
Mudatka	236.			
Mužský tučný menssí	141.			
Mužský tučný ne menssí	141.			
Mužský tučný wetsší	150.			
Muskatowa kulta	357.			
Mužka výra	72.			
Mysl dobra	138.			
Mýrus	208.			
Mýrus lešníj	136.			
Mýra	336.			
	361.	(c2)		

V.

Nardus celtický	19.
Natkowé kořenij	197. 213.
Natržněk	167.
Nebesy dar	170.
Nedvědž pažnocht	218.
Nerěšek	141, 142, 150.
Neymenssí tučný mužský	142.
Noc a den	339.
O,	
Obecny kožlěk	18.
Obecny pelinek	268.
Obecny podražec	296.
Očn	112.
Oča vrani	116.
Očrauhly podražec	295.
Očurky	322.
Olesníkowé semeno	72.
Olesník	73.
Oliwa prawa	7.
Opobalsam	115.
Opopanax	86.
Orlean	176.
Origentalský thee	178.
O'ech wlaſtěy	305.
Osladí	347.
Ostropes	261.
Ostrenba rytijská	183.
Owes	28.
Ozanka menssí	194.
P.	
Pälice geskowa	50.
Panazowe gummi	86.
Pastirnák	86.
Pažnocht nedvědž	218.
Peltram	282.
Pelinek obecný	268.
Pelynek Ržimský	217.
Penzzeč	220.
Pep	220.

	ſtr.		ſtr.
Pepř černý	15.	Prutník	140. 217.
Pepř dlanohý	16.	Prškerník	189.
Pepř polštý včej menší	117.	Vimétské Wlastě	286.
Pepřová matka	202.	Psan. tránek	346.
Peruwský balsam	360.	Psi gabody	56.
Petržel	94.	Psi gavrk	40.
Peře	31.	Psi vjno	55.
Piwonka	181.	Pšenice	30.
Pistacy	325.	Pušpan	300.
Plamynek	189.		R.
Plana Bazalička	330.	Rabarbara	124.
Plana locyka	257.	Ragška zrna	3.
Plana mata	213.	Raaske gableko	320.
Plana ruče	162.	Rakosy	237.
Plana t kwece	317.	Raupové koření	170.
Plsné vjno	184.	Rauta	132.
Planý esneč	193.	Rauta plana	234.
Planý cypris	191.	Rauta polní	234.
Planý galán	24.	Rék lomíkamen	72.
Planý mak	174.	Reupontikum	123.
Plan safran	112.	Rmen	279.
Pleska	262.	Rmen Ržimský	281.
Plienskstromový	351.	Rozbodník	140. 217.
Podraec dlanohý	296.	Rozmarin	12.
Podražec obecný	296.	Rozynky malé	61.
Podražec okrauhly	295.	Rozynky velké	61.
Poleg.	197. 203. 213.	Rék ječ	282.
Polní marulká	197.	Rékka mata	264.
Polštý včej pepř menší	117.	Réké seno	245.
Pomagaran	151.	Répské	148.
Pomoranč	250.	Répsk hoř	260.
Poponec	203.	Répsk wětší	260.
Posed	322.	Réricha potok	222.
Potočník	10.	Ržéicha wodný	222.
Potočník je iha	222.	Ržetkewerna	227.
Počehnaný bodlák	286.	Ržimbaba	278.
Počehnaný kardus	286.	Ržimská matečka	211.
Prawa olsiva	7.	Ržimská ssalwág	264.
Prostřední gitrocel	36.	Ržimský heřmanek	281.
Prostřední swalně	272.		Ržim.
Prsní kořen	107.		
Prustworec	107.		

	ſtr.		ſtr.
R̄jmský brach	238.	Sklenna břlina	339.
R̄jmský kopr	88.	Skocce wěrſſi	316.
R̄jmský velinec	267.	Skoice	118.
R̄jmský rmen	281.	Skoice bſla	144.
R̄jmský ſlez	231.	Simaruba	134.
R̄jpa bſla	225.	Sladka hoſka	59.
R̄iw Wlaſte kořen	327.	Sladke mandle	153.
R̄je bſla	163.	Sladký d'ewo kořen	241.
R̄je čerwena	160.	Sladký kopr	88.
R̄je domac/	160.	Slez R̄jmský	231.
R̄je plana	162.	Slez wysoký	228.
R̄jzowe d'ewo	237.	Slez zagej	232.
R̄bes erny	59.	Sler zahradnij	231.
Rybes ěrveny	58.	Sliwa	162.
Rytířská oſtruba	183.	Smradlawa lebeda	68.
Ryw winne	60.	Smradlawa kęp iwa	204.
S.			
Sabadylla	338.	Saffran	214.
Sagapenum	363.	Saffran planý	112.
Salat	256.	Salomunek	185.
Salezowe ſemeno	72.	Siroký gitrocel	35.
Santal čerweny	364.	Ssalwéa	14.
Santal lut	115.	Ssaltvég R̄jmská	264.
Santalowe d'ewo čerwene	364.	Sſkrkawienský brach	238.
Santalome d'ewo žlute	115.	Šterbač	259.
Sarkofolla	35.	Stowik	111.
Sarsaparylle kořen	327.	Stowik konſeſ	111.
Sassafrasowe d'ewo	123.	Swestka	155.
Satureye	154.	Šspelk	162.
Sawina	331.	Staricek	148.
Sedlška horčice	220.	Strom mastix-wy	325.
Sedníkraſa	277.	Strom terpentinow wel	134.
Semenec	327.	Stromowy plienjek	351.
Semeno ewcharowewe	265.	Strewce žabi	44.
Semeno Kapucinský	338.	Štičkawa tykwięce	317.
Semeno mechowe	349.	Št' rax	135.
Sena	129.	Štreap tekavcy	306.
Seno R̄zecke	245.	Šul alikantskalaubowa	69.
Šlammonia	45.	Sumach	95.
		Šwalnijsk	48.
		Šwalnijsk krakowsky	185.
		Šwalnijsk menissi	214.
		Swal	

S waln̄sk prostřední	272.	
S w. Ducha kořen̄	190.	Wetiss konſke kořidlo
S w. Jana bylina	253.	Wetiss koſlik
S w. Jana Chleb	343.	Wetiss lupen
S w. Jana Tvar	297.	Wetiss i epik
S w. Jana vjno černe	59.	Wetiss rozynky
S w. Jana vjno červene	58	Wetiss skočec
S winsky Chleb	43.	Wet j tu ny mužík
S winsky kořen	140. 217.	Wetiss wlaſtawicniſt
S winsky wořech	43.	Wetiss zeměžluč
T.		
T abák	53.	Wijnny kmen, ſeř
T akamahala gummi	371.	Wjno plane
T amaryndy	20.	Wjno psy
T amarisk	99.	Wjno Sw. Jana černe
T ekaucy styrax	306.	Wjno Sw. Jana červene
T erpentinowy Strom	134.	Wira muſka
T hee orientalsky	178.	Wlaſta gedlice
T olutsky balsam	133.	Wlaſta mateři dauſta
T opol	329.	Wlaſta ritvy kořen
T ragant	243.	Wlaſty koře
T ránk angelsky	277.	Wlaſty y ořech
T ránk psaný	346	Wlaſty pŕimětník
T ránk vysoký	41	Wlaſtawicniſt wetiss
T rawa	31.	Wlaſtensky
T renk	156.	Wlej mak
T renk Egiptſke	340.	Wlej pepř polſky menſi
T rehule	84.	
T effné černe	154.	Wodnj česnek
T rewdowa bila	131.	Wodnj getek
T rene kořen	167.	Wodnj ſeřicha
T u'nr mužík menſi	141.	Molowy gazyč čerweny
T u'nj mužík neymenſi	142.	Woman
T u'ny mužík wetiss	150.	Wonna fiola'
T ulebit	46.	Wonne kořen̄
T var Sw. Jana	297.	Wořech swinsky
T ykew domacy	319.	Wranj oka'
T ykwee plana	317.	Wratič
T ykwee ſitkawa	317.	Wrbba
V.		
V eliky apich	77.	Wrbina brunatna
V eronika	9.	Wrbinka
		Wſwač
		Wſtač

	str.		str.
Wstar až kralowsky	292.	Žahradnj kope	87.
Wsecko kokenj	80.	Žahradnj kmjn	186.
Wsedobr	85.	Žahradnj slez	231.
Wstivec	184.	Žazvor	1.
Wysoky slez	228.	Žeměžluč mensí	71.
Wysoky trank	41. 272.	Žeměžluč wetsí	123.
R.		Ženský vlas	348.
Řwa	191.	Žezhulta	236.
Řzop	196.	Žito	29.
S.		Žluta fiola	224.
Žabštřewce	44.	Žlutý Santal neb dřevo	115.
Žagečí dřevel k; sely	142.	Žrna ragiska	3.
Žagičí slez	232.	Žvoneček červený	253.
Žahradnj balsam	200.		

E r r a t a.

Pag 29. lin. 3 lege Secale Ph. Korn, Rocken.

Zito.

- | | | | |
|------------|-------------------|------|---------------------|
| — 31. loco | Tēawa | lege | Trawa. |
| — 53. — | Petu | — | Petum. |
| — 102. — | Quilla | — | Squilla. |
| — 110. — | Fichenmistel | — | Eichenmüssel. |
| — 130. — | exfositis | — | expositis. |
| — 142. — | sezariam | — | sexariam. |
| — 151. — | Pomaprān | — | Pomagrān. |
| — 213. — | Clamintha montana | lege | Calamintha montana. |
| — 236. — | Vſtawac̄ | — | Wſtawac̄. |
| — 276. — | Gānswurzel | — | Gānsiwurzel. |
-

