

MORBI VASORUM MINIMORUM,
ET MAJORUM.

38. Vasorum minimorum, ex fibris simplicibus (21. 23.) applicatu, intertextu, vel intortu, adunatis, factorum morbi ex iisdem causis eandem indolem, effectum, & curationem habent; ergo ex dictis (ab 21. ad 38.) intelliguntur.

39.) Vasa majora, ex minimis (38.), applicatu, intertextu, vel intortu, unitis, conflata habent duo diversa morborum genera. Horum prius pendet ex morbis minimi canalibus (38.), majorem hunc componentis, adeoque origo, natura, efficacia, curatio ejus inde (38.) peti debet. *Posterius vero pendet* 1. a vi, qua fluidum, per majorem hunc canalem fluens, ejus latera extendendo premit: quae latera, ex aliis minoribus canalibus constantia, hac pressione orbantur suo liquido, uniuntur quoad latera, concresecunt in fibrae (21. 23.) solidae, sed crassioris speciem: potestque idem & vicinis communicari vasculis. 2. a liquido cum vasculo proprio concresecente.

40. Inde vasorum debilitas, laxitas, robur: rigiditas, elasticitas, de quibus

A 5

mul-

multa imperitis memorantur, clare intelligi possunt. Et meretur dignitas horum pertractationem.

MORBI VISCERUM DEBILIORUM
ET LAXORUM.

41. Vasorum, & viscerum debilitas vocatur illa partium (23. 38. 39.), haec constituentium, cohaesio, quae tam levi motu tolli potest, ut imparia sint iis efficiendis, quae Sanitatis & Vitae ratio ab his postulat.

42. Quae alia aetate, atque sexu, alia sunt.

43. Haec debilitas oritur. 1. ab debilitate fibrae (24.) ejusque causis. (25.) 2. a debilitate canalium minimorum (28.), atque causis hujus (38.) 3. ab inertia liquidum per vasa majora (39.) fluentis, quae pendet a minuta copia, fluiditate aquosa aucta, motu musculari torpescente. 4. a numero magno canalium minimorum, pro ratione aetatis, nimis diu remanentium.

44. Ab hac debilitate (41.), per suas causas (43) producta, oriuntur multi morbi, qui falso Temperiei, vel Congeniti, habentur; primarii sunt: facilis vasorum dilatatio, tumor; facilis horum compressio, inanitas; liquidum stagnatio;
Cordi