

O S S A F R A C T A.

339. Si unius Ossis partes vi a cohaesione solvuntur in magna fragmenta fractura dicitur.

340. Quae si sola, & una, simplex; ubi multiplex, composita; si stipata vulnere, contusione, inflammatione, ulcere, pluribus fracturis, complicata vocatur.

341. Quin etiam pro vario situ fracturae transversa, obliqua, longitudinalis audit; & ratione fragmentorum sibi innitentium, aut juxta latera sibi mutuo applicatorum, vel eminente spina emergentium, varia nomina, naturam, medelam accipit.

342. Effectus ejus varii, pro varia indeole ossis fracti, pro modo fracturae vario, pro varietate fragmentorum quoad situm, figuram, numerum, magnitudinem, pro varietate denique loci, in quo, vicinorum, circa quae, sit.

343. Primarii ergo sunt destruetio muneris fulciendi, sustinendi musculos & dirigendi eosdem; muscularum contractio, membra accurratio, muscularum ex debito loco deturbatio, membra intorsio, ejusdem deformatio; periosteis externi, valvularum cellulas occupantium, periosteis interni, membranae medullosoae, medullae ipsius

ipsius laceratio, contusio, corruptio; luxuries vasculorum osseorum, unde calli inaequalitas, tumor, membrique deformatio; membranarum, tendinum, nervorum distractio, laceratio, irritatio, compressio, convulsio; Vasorum vicinorum mutatio, destructio, obstructio, inflammatio, dolor, ecchymosis, marcior, suppuratio, gangraena, mors partis & saepe totius; contusio fere semper.

344. Quae expensa (342. 343.) praesens malum, ejusque statum docent, si tactus fragmenta; auris crepitationem; oculus laesam figuram, immobilitatem; intellectus causam, ejus impetum, modum impulsus, senii decrepiti, temperiei morbo-sae, hybernique frigoris efficaciam simul consideraverit, clarior est diagnosis.

345. Verum oblongae fracturae difficulter detectio, nisi sero: dolor, tumor, crassities partis, inaequalitas, pus foedum, causa fortis cognita, aliquid luminis dabunt.

346. Facilem, difficilem, tardam, celerem, integrum, vel deficientem fore curationem praedicit figura, simplicitas, compositio, duratio fracturae, numerus, figura, magnitudo fragmentorum; locus ossis laesi; vicina laesa; tempus anni; aetas aegri & temperies.

347.

347. Sanatio requirit:

1. Restitutionem in situ naturalem, extendendo, reponendo.
2. Retentionem in eo situ per fascias & machinas.

3. Unitorum, retentorumque consolidationem, enato callo.

348. Si fracta situm proprium retinent, prima indicatio cessat.

Si partim divergunt in latera, requiri-
tur extensio parva.

Si omnino juxta mutua latera pertracta
funt, requiritur ingens extensio, ut inter-
cepta removeantur, & ut debita longitudo
& adaptatio fiant.

349. Extensio fit. 1. apprehenso osse pro-
pe fracturam manu, vel laqueis. 2. firma-
to aegro. 3. disposita parte in situ natura-
li. 4. distractione lenta, recta, parium
fractarum ea vi, eousque, prout vis con-
tractorum musculorum requirit. 5. vi &
applicatu instrumentorum mechanicorum,
si robur manus deficit.

350. Quae (348 349.) quum sine vi &
dolore saepe vix fieri queant, ubi partes
jam inflammatae, saepe omitti debent, do-
nec sedata inflammatio. Aliter convulsi
moriuntur, vel gangraena correpti.

351. Si fragmenta libera, eximenda, si
facile fieri queat. Si acumina eminentia
exten-

extensionem plane prohibent, & patent, exscindenda; si latent, incisione detegenda prius. Si fractura composita valde & complicata, in primis cum ingenti simul contusione, ossium contritu, vasorum magnorum destructione, requiritur illico, si nihil vetat, extirratio.

352. Restitutio fit partem rite extensem, (349.) & paratam, (351.) caute, lente, leniter ita intorquendo, donec os ossi debito in loco occurrat, musculi vero revulsi suo in situ sint repositi, nihilque intercipiatur.

353. Id notescit ex anatomicis, comparatione partis sanae, dolore sublato, longitudine & figura naturali redditia.

354. Retentio in situ fit fasciis, spleniis, ferulis, canalibus quietem conciliando, tum impediendo & dirigendo actionem muscularum

355. Fasciae adstrictae tumorem, suffocationem, gangraenam producunt; unde infinita mala: ergo leviter attrahendae, ut firmare, & vascula leniter compescere queant.

356. Si vulnera adsint, curanda ex arte, (185. ad 239.) sed rara deligatione, idem de inflammatione, dolore, tumore, & reliquis symptomatibus intelligendum.

357. Tum fit concretio, callusque, cito Aphor. F tior,

tior, tardior pro aetate, ossis crassitie,
pondere, incubituro, vario tempore, intra
20. & 70. dies.

LUXATA.

358. Luxatio est recessus extremi ossis
mobilis ex cavo, in quo naturaliter
movetur, cum motus impedimento.

359. Qui integer, vel pro parte; unde
luxatio, & distorsio.

360. Pessima, quae epiphysi ab corpore
ossis soluta accidit.

361. Causa vis externa extendens, in-
torquens, expellens.

362. Aut interna, cavo innata, extru-
dens.

363. Hae causae (361. 362.) juvantur
extensis, laxatis, ruptis ligamentis, sive id
ab externa, sive ab interna causa.

364. Hinc figureae in parte mutatio, tu-
mor, cavitas, elongatio, accurtatio mem-
bri, immobilitas, distractio muscularum,
torpor subjacentium, paralysis, vasorum
vicinorum compressio, dolor, pervigilium,
inflammatio, oedemia, ankylosis, convul-
sio, marcio, mors partis, vel & totius.

365. Ex quibus notis signa evidentia
habentur luxationis.

366.