

missio: συνεχής vero, five continuas (727.),  
 quae Continuae remittentes.

## FEBRIS ARDENS.

738. **Q**uas inter Causas, five Ardens di-  
 cta febris, meretur singulatim di-  
 scuti, ob frequentiam, discrimen, sanandi  
 laborem.

739. Hujus symptomata primaria, Ca-  
 lor ad tactum fere urens, inaequalis diver-  
 sis locis, ad vitalia ardentissimus, (in ex-  
 tremis saepe remissior, imo aliquando fri-  
 gus), ipsum aerem exspiratum incendens;  
 siccitas in cute tota, naribus, ore, lin-  
 gua; Respiratio densa, anhelosa, cita;  
 Lingua sicca, flava, nigra, exusta, aspe-  
 ra; sitis inexplebilis, saepe subito sublata;  
 fastidia cibi, nausea, vomitus; anxietas,  
 inquietudo; lassitudo summa; Tussicula,  
 vox clangosa; delirium, phrenitis, per-  
 vigilium, coma, convulsio, diebus impa-  
 ribus exacerbationes.

740. Causa labor nimius, iter longum,  
 aestus solis, sitis diu tolerata, usus calefa-  
 cientium, fermentatorum, aromaticorum  
 acrium, Veneris nimiae, delassatio immo-  
 dica, maxime aestate &c.

741. Decursus talis, tertio & quarto  
 die saepe lethalis, septimum raro transit si

L 2

per-

perfecta; solvitur saepe haemorrhagia, (quae si tertio vel quarto die parca, lethalis); haec praenunciatur cervicis dolore, temporum gravitate, tenebrosa caligine, praecordiorum contentione sine doloris sensu, invitis lachrymis sine lethali signo alio, rubore faciei, pruritu narium, optima fit die decretorio; solvitur & die decretorio, vomitu, alvo, sudore, urina, sputo crasso; accessio die pari pessima, si id ante diem sextum; urina nigra, pauca, tenuis huic lethalis; lethale sanguinis sputum; lethalis sanguinis mictus; deglutitio laesa mala; extremorum refrigeratio pessima; facies rubra & sudans mala; parotis non suppurans exitialis; alvus nimis fluxa lethalis; cum tremore abit in delirium, inde in mortem, transit in peripneumoniam saepe cum delirio; post ingentia alvi tormina quae oritur pessima; solvitur critice cum rigore.

742. Quibus explanatis haud difficulter morbus praesens cognoscitur: neque de ejus causa propiori, & proxima ambigetur; est enim a cruore orbato parte blandiori, liquidiori, inflammatione per universum corpus, viribus validioribus: Quin praesagia haud infirma hinc deducuntur.

743. Curatio exigit aërem purum, frigidum, renovatum saepius; integumenta mini-

minime suffocantia, vel aggravantia corpus; situm corporis erectum saepe; potus copiosos, blandos, demulcentes, subacidos, aqueos, calidos; cibos leves, farinaceos, hordeatos, avenaceos, ex fructibus subacidis confectos; Venae sectionem, si morbi initium, plethorae indicia, inflammationis singularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, revulsio necessaria, symptomata urgentia, neque alio remedio facile superanda, hanc exigunt; Clysmatum blandorum, diluentium, laxantium, antiphlogisticorum, refrigerantium applicationem repetendam, prout vis ardoris, siccitas alvi, revulsio, requisita imperat: Humectationem totius corporis, hauriendo aerem fumo calidae blandum per nares, colluendo os, & guttur, lavando pedes, manusque tepida, fovendo spongiis calidis loca, ubi plurima vasa contactui magis exposita; Medicamenta aquosa, blanda nitrosa, grato, acore sapida, alvum lenissime laxantia, urinae materiem suppeditantia, suppletia, sudori vehiculum copia praebentia, non acrimonia, omnem contractionem fibrarum, crassitiem liquorum, acrimoniam eorundem solventia, diluentia, temperantia.

744. Quibus qui adjunxerit dicta in regulis universalibus de cura acutarum, ha-

L 3

rumque

rumque symptomatum, & secutura de acutis in perniciem viscerum singularium tendentibus, liquidò perspecta habebit Ardentis Febris cujuslibet remedia.

745. Quin & reliquae febres acutae singulares ex dictis intelliguntur, vel ad symptomata singularia pertinent, vel sunt alius morbi acuti effectus.

### FEBRIS INTERMITTENS.

746. Febris intermittens definitio jam data (727. 737.). hujus diagnosis sponte patet, distinctio in varias classes facilis, utpote soli temporis differentiae innixa, septenaria exquisita quandoque accidit, ut vidi.

747. Tamen seire est, hanc in genere esse Vernalem, quae à Februario in Augustum, & Autumnalem, quae ab Augusto in Februarium dominatur. Distinctione necessariâ ob varios mores, symptomata, exitus, durationem, curationemque febris; quin una aliam fugat.

748. Quin & saepe initio autumnis æmulantur exactè indolem continuarum, ob longiores & duplicatos paroxysmos, dum tamen indoles & curatio planè diversae sunt.

749. Incipiunt cum oscitatione; pandiculatione, lassitudine, debilitate, frigore,