

R e c e p t e

der besten Aerzte aller Zeiten , für die verschiedenen Krankheiten des menschlichen Organismus.

I. Acute Krankheiten.

Fieber überhaupt.

Fast in allen fieberhaften Krankheiten ist der Durst eine für die Kranken höchst lästige Erscheinung, und der Arzt muss mit Rücksicht auf die Behandlung des Fiebers besonders Getränke verordnen. Wirklich ist auch, wie *Berends* (Vorlesungen Bd. II, S. 262.) sehr richtig bemerkt, reichliches Trinken ein fieberwichtiges und fieberstillendes Mittel. Man lasse in der Fieberhitze oft und jedesmal in kleinen Quantitäten trinken, und Sorge überhaupt dafür, dass das Getränk lauwarm ist. Man nimmt nun wohl Chamillen-, Melissen-, Schlüsselblumen-, Malven-, Wollkraut- oder grünen Thee; allein die Kranken werden des Getränkes selbst schnell müde, wie viel sie auch der Durst zum Trinken zwingt, und es ist daher zweckmässig, einige Fiebertränke zu kennen.

N^o. 1.

- R^y. Rad. Scorzonerae
Passular. minor. ana \mathfrak{z} ijj.
Hord. decorticat.
Rad. Liquirit. ana \mathfrak{z} β.
Concis. contus. coq. c.
Aq. font. \mathfrak{z} IV.
Cola. Refrig. adde
Syr. succi Citri q. s. ad gratum saporem (\mathfrak{z} ijj.)
M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 2.

R_y. Hordei decorticat. (Hordei perlat. Avenae decorticat.) $\bar{\text{ij}}$.

Coque cum

Aq. font. \mathcal{L} V. per $\frac{1}{4}$ horae.

Colat. adde

Succi Citri recent. express. $\bar{\text{ij}}$ β.

Sacch. Hordei q. s. ad gr. sap. ($\bar{\text{ij}}$.)

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 3.

R_y. Succi Citri (Aceti) $\bar{\text{ijij}}$.

Syr. Rubi Idaei $\bar{\text{ij}}$.

Aq. font. \mathcal{L} IV.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 4.

R_y. Rad. Chinae concis. $\bar{\text{ij}}$ β.

Passular. minor. concis. $\bar{\text{ij}}$ β.

Coque cum

Aq. font. \mathcal{L} IV.

Colat. adde

Syr. Cerasor. nigr. $\bar{\text{ij}}$ β.

Aceti Vini opt. $\bar{\text{ij}}$.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 5.

R_y. Roob Ribium (Cerasorum, Berberum, Mororum) $\bar{\text{ij}}$.

Infunde cum

Aq. font. fervid. \mathcal{L} $\bar{\text{ij}}$ — $\bar{\text{ijij}}$.

stent ad solut. Adde

Succi Citri q. s. ad grat. sap.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. (Für Damen.)
Richter.

N^o. 6.

Ry. Sacch. Lactis $\overline{\text{ʒ}}\beta$.
 Infunde cum
 Aq. font. fervid. $\overline{\text{℥}}\text{II}$.
 stent ad solut. Adde
 Succi Citri q. s. ad gratum saporem.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 7.

Ry. Pastae Althaeae (Liquiritiae) $\overline{\text{ʒ}}\beta$.
 inf. Aq. ferv. $\overline{\text{℥}}\text{III}$.
 stent in loco calido ad solut. Adde
 Succi Citri q. s. ad gr. sap.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 8.

Ry. Cerasor. nigr. sicc. et contus.
 Rad. Scorzonerae ana $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
 infunde cum
 Aq. font. fervid. $\overline{\text{℥}}\text{IV}$.
 ebull. paulisper.
 Colat. adde
 Succi Citri q. s. ad. gr. sap.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 9.

Ry. Rasur. Pan. alb. duriusc. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
 infunde cum

I. Acute Krankheiten.

Aq. font. fervid. ℞ III — IV.
 ebull. paulisp. Cola. Adde
 Syrupi Rubi Idaeii ℥j.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 10.

Ry. Sem. Mili-decort.
 Oryzae sativae ana ℥j.
 Coq. c.
 Aq. font. ℞ V. per $\frac{1}{4}$ horae.
 Colat. adde
 Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 11.

Ry. Amygdal. dulc. excorticat. ℥vj.
 Sem. Pap. alb. ℥jj.
 tere cum
 Aq. font. ℞ j.
 adde
 Sacch. Althaeae (Lactis) ℥β.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*N^o. 12.

Ry. Rasurae Cornu Cervi ℥β.
 Gummi arab. ℥jj.
 Coque cum
 Aq. font. ℞ III. ad Col. ℞ II.
 adde
 Syr. Althaeae ℥jj.
 M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 13.

- R_x. Tart. dep. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 inf. cum
 Aq. font. ℥ II.
 stent ad solut. Sub finem adde
 Pulv. Rad. Liquiritiae $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$.
 Colat. adde
 Conserv. Rosar. $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 14.

- R_x. Tart. dep. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 Passular. major. contus. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 inf. cum
 Aq. font. fervid. ℥ IV.
 Ebulliant paulisp. Col.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 15.

- R_x. Pulp. Tamarindor. $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$.
 Past. Althaeae $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 infunde cum
 Aq. font. fervid. ℥ II.
 Stent ad solut. Cola.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

N^o. 16.

- R_x. Pulv. Cort. Cinnamomi
 — Caryophyll.
 — Macis ana $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$.
 Coque cum

Vini boni albi gall. ℥ II.

Col. adde

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap. (℥IV.)

M. D. S. Halbe Theetassenweise zu trinken.

Richter.

N^o. 17.

R̄. Rasurae panis nigr. duriusc. ℥β. — ℥jj.
inf. c.

Aq. font. fervid. ℥ III — IV.

ebull. paulisp. Col. adde

Vini albi gall. ℥vj.

Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. (℥vj.)

M. D. S. Tassenweise.

M. J. Schmidt.

N^o. 18.

R̄. Vitell. ovor. No. II — IV.

coq. c.

Aq. font. ℥xjj. — ℥ II.

subrefrig. adde

Vini albi ℥vj.

Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. (℥IV.)

M. D. S. Tassenweise.

Sproegel.

N^o. 19.

R̄. Infusi Hb. Althaeae ex ℥j.

parati ℥xjj.

admisce

Vitell. ovi unius

Sacch. alb. ℥vj.

M. D. S. Tassenweise.

Best.

N^o. 20.

R_x. Fol. Theae ℥j. — ℥℥β.
 Cort. Cinnamom. ℥β. — ℥j.
 infunde Aq. fervid. ℥vjjj.
 adde
 Amygdal. dulc. excort.
 in Lactis vaccin. rec. ℥ II.
 contus. ℥jjj.
 Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. (℥vj.)

M. D. S. Tassenweise.

*Wedel.*N^o. 21.

R_x. Emulsionis amygdalin. ℥ II.
 D. S. Tassenweise.

*Reil.*N^o. 22.

R_x. Acidi tartarici ℥j.
 Ol. Cort. Citri gtt. I.
 Sacch. alb. ℥iv.
 M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise unter Wasser
 zum gewöhnlichen Getränk.

Hecker.

Entzündliches Fieber.

Vorzüglich antiphlogistische Mittel, und solche Getränke.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 19. 21. 22.

N^o. 23.

- R_x. Aceti Vini destill. $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 Syr. Rhoeados (Papav. Moror.)
 Syr. Althaeae $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 M. D. S. Unter's Getränk zu mischen.

*Hecker.*N^o. 24. a).

- R_x. Decoct. Althaeae $\& \text{I}$.
 Aceti Vini $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 Syr. Althaeae $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse.

*Hecker.*N^o. 24. b).

- R_x. Gummi arab. $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 solve in
 Aq. font. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{I}\text{I}\text{I}$.
 adde
 Oxymell. simpl. $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse.

*Hecker.*N^o. 25.

- R_x. Kali nitrici dep. $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 solve in
 Aq. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{I}\text{I}\text{I}$.
 adde
 Syr. Althaeae $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.

*Berends.*N^o. 26.

- R_x. Kali nitrici $\bar{\text{I}}\text{I}\text{I}$.
 Mucilag. G. arab. $\bar{\text{I}}\text{I}$.
 solve in

Aq. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}$.
adde

Syr. Rubi Idaei $\bar{\text{V}}\text{j}$.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

Richter.

N^o. 27.

Ry. Pulpae Tamarindor. $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Coq. c. Aq. font. suff. qt.
per $\frac{1}{4}$ horae ad Col. $\bar{\text{I}}\text{X}$.
solve

Magnesiae sulph. $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Syr. Rubi Idaei $\bar{\text{I}}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse zu
nehmen.

Wendt.

N^o. 28.

Ry. Liq. Ammonii acet. $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Vini stib. $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Aq. flor. Sambuci $\bar{\text{I}}\text{V}$.

Syr. Rubi Idaei $\bar{\text{I}}\text{j}$.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

(Besonders beim Eintritt einer Haut-Crise passend.

Richter.

Complicationen mit gastrischen Zuständen, s. beim
gastrischen Fieber.

N e r v e n f i e b e r .

No. 10. 16. 17. 18. 19. 20.

N^o. 29.

Ry. Rad. Valer. min. $\bar{\text{I}}\beta$. — $\bar{\text{V}}\text{j}$.

inf. Aq. ferv. q. s. ad Col. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{j}$.
adde

Aceti concentr. $\mathfrak{J}\text{ij}$.Aeth. Aceti $\mathfrak{J}\beta$.Syr. Cort. Aurantior. $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Berends.*N^o. 30.℞. Asae foet. $\mathfrak{D}\text{ij}$.

Vitell. ov. q. s.

Aq. Ment. pip. $\mathfrak{J}\text{vj}$.Cort. Chin. reg. pulv. $\mathfrak{J}\beta$.Aeth. sulph. $\mathfrak{J}\text{j}$.

Solve terendo.

M. D. S. Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen
Esslöffel.*Berends.*N^o. 31.℞. Emuls. comm. $\mathfrak{J}\text{IV}$.

Camphorae cum

Gummi arab. s. q. subact. $\mathfrak{D}\text{j}$.Spir. Sal. ammon. aq. $\mathfrak{J}\text{ij}$.Syr. Papav. $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*N^o. 32.℞. Emuls. comm. $\mathfrak{J}\text{IV}$.

Moschi oriental.

c. Sacch. trit. $\mathfrak{J}\beta$.Spir. Cornu C. $\mathfrak{J}\text{ij}$.Syr. Cinnamom. $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 33.

- R. Aeth. sulph.
 Tr. Opii simpl. ana \mathfrak{J} j.
 Spir. C. C. succ. \mathfrak{J} jj.
 M. D. S. Alle Stunden 20 Tropfen auf Zucker.
Hecker.

N^o. 34.

- R. Rad. Valer. $\mathfrak{J}\beta$.
 Digere c. Aq. fervid. \mathfrak{V} vj.
 per $\frac{1}{4}$ horae in vase clauso.
 Colat. refrig. adde
 Liq. Ammon. acet. \mathfrak{J} j.
 Spir. Sulph. aeth. \mathfrak{J} j.
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
Hufeland.

N^o. 35.

- R. Camphorae \mathfrak{J} jj.
 solve in
 Spir. sulph. aeth. \mathfrak{V} iv.
 M. D. S. Alle Stunden 15 — 20 Tropfen.
Richter.

N^o. 36.

- R. Extr. Hyoscyami
 Croci orient. ana gr. \mathfrak{J} jj.
 Sacch. albi \mathfrak{J} j.
 M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. vj.
 D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.
 (Besonders bei Nervosa versatilis.)
Richter.

N^o. 37.

- R. Rad. Valer. (Angelicae)
 Flor. Chamomill. ana $\mathfrak{J}\beta$.
 inf. vas. claus. cum
 Aq. font. fervid. \mathfrak{V} vj.

I. Acute Krankheiten.

Col. adde

Ol. Chamomill. coct. $\bar{3}\beta$.— dest. Foeniculi $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Zum Clystir.

*Hecker.*N^o. 38.

Bei gesunkenen Kräften:

R_x. Emuls. comm. $\bar{3}iv$.Gumm. arab. $\bar{5}j$.Tr. Cantharid. $\bar{5}j$.Syr. Papav. alb. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*N^o. 39.R_x. Aether. sulph. $\bar{3}\beta$.Camphor. $\bar{3}\beta$.Tr. Cantharid. $\bar{5}j$.

M. D. S. Alle Stunden 15 — 20 Tropfen.

(Wie No. 38.)

*Hecker.*N^o. 40.R_x. Gummi Asae foet. $\bar{5}j$.Camphor. $\bar{5}j$.

Vitell. ovor. q. s.

solve in

Decoct. Cort. Chin. reg. $\bar{3}vj$.

adde

Laud. liq. Sydenh. $\bar{3}\beta$

M. D. S. Zum Clystir.

(Wie No. 38.)

*Hecker.*N^o. 41.R_x. Rad. Serpentar. virg. $\bar{3}vj$.— Valer. $\bar{3}iv$.inf. Aq. f. $\bar{3}vjij$.

Col. refrig. adde

Aeth. sulph. $\bar{5}$ jj.Syr. Cort. Aurant. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Besonders bei Nervosa cum torpore.)

*Richter.*N^o. 42.R_x. Sacch. alb. $\bar{5}$ jj.

Ol. Menth. pip. gtt. X.

tere in mortar. vitr.

adde

Aq. Menth. pip. $\bar{5}$ v.Spir. sulph. aeth. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie No. 41.)

*Richter.*N^o. 43.R_x. Hb. Menthae pip.Elaeosacch. Menth. pip. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in partes VIII. aeq.

D. S. Viermal täglich ein Pulver.

(Wie No. 41.)

*Wendt.*N^o. 44.R_x. Phosphor. gr. jiiij.

solve digerendo in

Aeth. sulph. $\bar{5}$ j.Ol. Lini $\bar{5}$ j.Gumm. arab. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.

(Beim höchsten Grade torpider Schwäche.)

Richter.

N^o. 45.

Ry. Cort. Chinae reg. $\mathfrak{z}\beta$.
 coq. ex Aq. font. suff. qt.
 in finem Coct. immisce

Rad. Valerianae

— Angelicae

— Calami aromat. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

in Col $\mathfrak{z}\text{vj}$. solve

Natri sulph. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

adde

Naphthae Vitrioli $\mathfrak{z}\beta$.

Syr. Cort. Aurantior. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

(Bei hohen Graden torpider Schwäche mit
gleichzeitigem gastrischen Zustand.)

M. J. Schmidt.

N^o. 46.

Ry. Ferment. panis atrii $\mathfrak{z}\text{ijij}$.

Sem. Sinap. contus. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Rasur. Raphani rust. $\mathfrak{z}\beta$.

Cepar. sub cinere tostar. et contus. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}\beta$.

Capsici indici concis. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. c. Acet. Vin. acerr. q. s.

Cataplasma mediae consist.

D. S. Auf Leder gestrichen auf die Waden zu legen.

Richter.

N^o. 47.

Ry. Moschi genuini gr. vj — xj .

Castor. sib. gr. xj — XXIV .

Asae foet. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. c. Tr. Valer. simpl q. s.

Pil. No. XXIV .

D. S. Abends, Nachts und Morgens jedesmal vier
Pillen.

(Gegen die Schlaflosigkeit im schleichenden
Nervenfieber.) *Berends.*

N^o. 48.

R_y. Pulv. Cort. Chin. reg. ʒij.

— — Aurant.

Ferri pulverat. ana ʒj.
inf. c.

Vini rhenani opt. ℥ IV.

Digere loco calido, saepius agitando.
Cola.

D. S. Alle zwei Stunden ein Spitzglas voll.

(In der Reconvalescenz.)

Richter.

F a u l f i e b e r.

No. 10. 16. 17. 18. 19. 20. 30. 32. 33. 40. 44.
45. 47. 48.

N^o. 49.

R_y. Pulv. Cort. Chin. reg. ʒβ — jj.

Coque cum

Aq. font. ℥ II. ad rem ℥ I.

Col. adde

Pulv. Cort. Chinae reg. ʒjj. — ʒβ.

Extr. Cort. Chinae frig. parat. ʒjjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Vogel.

N^o. 50.

R_y. Aq. Cinnamom. s. v. ʒvjjj.

Extr. Cort. reg. ʒβ.

Aluminis ʒjj — IV.

Syr. simpl. ʒj.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.
Schröder. (Vogel. Richter.)

N^o. 51.

Rx. Liq. C. C.

Tr. Castor. ana gtt. XX.

Aq. fl. Naphae ʒiβ.

Syr. Cort. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.
Quarin.

N^o. 52.

Rx. Castor.

Pulv. Rad. Valer.

Sacch. alb. ana ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dös. No. XII.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

Hecker.

N^o. 53.

Rx. Castor. opt.

Sacch. alb. ana ʒβ.

Ol. Cajeput. gtt. j̄j.

M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. XII.

S. Alle Stunden ein Pulver.

Hecker.

N^o. 54.

Rx. Aq. Cinnamomi ʒiv.

Camphor. in Spir. Vini solut. ʒβ.

Aether. sulph. ʒj.

Syr. Cinnamomi ʒjj.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 55.

R_x. Rad. Val. $\bar{3}\beta$.

inf. Aq. fervid.

vase bene clauso q. s.

Col. $\bar{3}vjjj$. adde

Aq. Cinnamomi $\bar{3}j$.

Aeth. sulph. $\bar{3}j$.

Syr. Cort. Aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden eine halbe Tasse voll.

Hecker.

N^o. 56.

R_x. Phosphori gr. IV.

solve digerendo in

Ol. Amygdal. dulc. $\bar{3}\beta$.

adde

Mucilag. Gummi arab. q. s.

Aq. Cerasor. nigr. $\bar{3}jj$.

et fiat l. à. Emulsio,

adde

Syr. Cinnamomi $\bar{3}j$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Theelöffel.

Hecker.

N^o. 57.

R_x. Acidi phosphorici p. deliq. $\bar{3}\beta$. — $\bar{3}j$.

Aq. Ment. pip. $\bar{3}v$.

Syr. Cort. Aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 58.

Ry. Rad. Valer. (Serpentar. virg.) $\bar{3}\beta$.
 inf. in vase bene clauso cum
 Decoct. Cort. Chin. reg. fervid. $\bar{3}\nu j$.
 Col. adde

Aether. sulphur. $\bar{3}j j$.

Aq. Cinnam. s. v. $\bar{3}j j$.

Syr. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.
 (Febris putrida cum torpore.)

Hecker.

N^o. 59.

Ry. Aq. Menth. pip. s. v. $\bar{3}\nu j j j$.
 Vin. rhen. $\bar{3}I V$.
 Gummi Tragacanth.
 Succi Catech. ana $\bar{3}j$.
 Alum. crud. $\bar{3}j j$.

M. D. S. Alle Stunden einen bis zwei Esslöffel.
 (Bei gleichzeitigen colliquativen Erscheinungen,
 besonders colliquativem Durchfall.)

Vogel.

N^o. 60.

Ry. Cort. Cascarill. $\bar{3}\beta$.
 Digere cum Aq. font. et
 Aq. Menth. pip. ana $\bar{3}\nu j$.
 in Col. solve
 Extr. Cort. Angusturae $\bar{3}\beta$.
 adde

Tr. Valerianae simpl.

Liq. anodyn. Hoffm. ana $\bar{3}j j$.

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse.
 (Wie bei No. 59.)

Hecker.

N^o. 61.

- R_y. Decoct. Cort. Chin. reg. $\bar{\text{V}}$.
 Alum. crud. $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 Camphor. in Aeth. sulph.
 q. s. subact. $\bar{\text{V}}\beta$.
 adde
 Syr. Cort. Aurant. $\bar{\text{V}}\beta$.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 59.)

*Hecker.*N^o. 62.

- R_y. Alum. crud.
 Gummi arab. ana $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 Aq. Menth. pip. $\bar{\text{V}}\text{iv}$.
 Tr. Opii simpl. $\bar{\text{V}}\text{j}$.
 Tr. Cinnamomi $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 59.)

*Hecker.*N^o. 63.

- R_y. Aeth. sulph. $\bar{\text{V}}\text{ijj}$.
 Ol. Cajeput. $\bar{\text{V}}\text{j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Bei grosser Schwäche.)

*Hecker.*N^o. 64.

- R_y. Spir. Vini camphorat.
 — Lavandulae ana $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 Liq. Ammon. caust.
 Ol. destill. Menth. pip. ana $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 63.)

Hecker.

N^o. 65.

- R_x. Kali subcarbonici $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 Acet. bezoard. q. s.
 ad saturat.
 Aq. Cinnamomi $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Vini albi Gall. generos. $\bar{\text{ʒ}}\text{iv}$.
 M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.
 (Bei eintretender Haut - Crise.)

*Hecker.*N^o. 66.

- Gegen den Decubitus:
 a.) R_x. Album. ovor. No. II.
 Conquass. et dein
 leni igne calef. perpet.
 agitand. admisce sensim
 Spir. Vini rectificat. $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.
 M. D. S. Zum Betupfen der kranken Stellen.

De Haen.

- b.) R_x. Decoct. Cort. Quercus
 Aq. saturnin. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.
 Album. Ovor. No. II.
 Liq. Myrrhae $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 M. D. S. Die Stellen kalt zu waschen.

Hecker.

- c.) R_x. Alum. crud. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 Album. Ovor. No. IV.
 Spir. Vini camphorat. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 M. f. Liniment. D. S.
 Auf Leder gestrichen, auf die kranken Stellen
 zu legen.

Hecker.

- d.) *Ry.* Cort. Quercus $\bar{5}j$.
 Coq. c. Aq. font. $\bar{5}xj$.
 Col. $\bar{5}vj$. instill. Aq. saturn.
 q. s. ad deposit. cui adde
 Spir. Vini $\bar{5}jjj$.
 M. D. S. Auf die kranken Stellen.

Autenrieth.

N^o. 67.

Gegen die Aphthen:

- Ry.* Mell. rosat. $\bar{5}j$.
 Boracis venet. $\bar{5}j$ — $\bar{5}jj$.
 M. D. S. Zum Bepinseln.

Vogel.

Zur Verhütung der Ansteckung s. die salzsauren und salpetersauren Dämpfe, deren Bereitung am Schluss des Formulare's angegeben worden ist.

Gastrisches Fieber.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 22.

Zuvörderst sind es Brech- und Abführmittel, deren Anwendung zur Entfernung der schadhafte Stoffe beim gastrischen Fieber nothwendig wird. Formeln dazu finden sich im Anfang. — Bei scharfer caustischer Galle ist das Emeticum mit einer vegetabilischen Säure zu verbinden;

N^o. 68.

- Ry.* Kali carb. dep. $\bar{5}\beta$.
 Succ. Citri q. s. ad sat.
 Aq. font. $\bar{5}j$.
 Tart. stib. gr. IV.
 M. D. S. Sogleich die Hälfte zu nehmen.

Richter.

N^o. 69.

Bei schleimigtem Zustand:

- R_x. Ammonii muriat. dep. ʒj.
 Aq. flor. Chamomill. ʒxj.
 Tart. stib. gr. jj.
 Oxymell. simpl. ʒj.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden drei Esslöffel.

*Berends.*N^o. 70.

- R_x. Tart. stib. gr. j.
 Ammon. muriat. dep. ʒj.
 Natri sulph. cryst. ʒvj.
 solve in
 Aq. destill. ʒv.
 adde
 Syr. Amygdal. ʒvj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei starke Esslöffel.
(Wie No. 69.)*Richter.*N^o. 71.

- R_x. Pulv. Rad. Rhei gr. xvj.
 Calomel. gr. jj — jjj.
 M. f. c. Syr. Cort. Aurant.
 Bolus. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 69.)

*Richter.*N^o. 72.

- R_x. Sulph. stib. rubr. gr. j.
 Kali tart.
 Pulv. Rad. Pimpinell. ana ʒj.
 M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. vj.
 D. S. Täglich zwei Pulver.
 (Febris pituitosa.)

Richter.

N^o. 73.

- R_y. Res. Jalapp.
 Camphor. rasae
 Calomel. ana gr. V.
 M. f. c. Mucilag. Gummi arab.
 q. s. Pil. No. XX. D. S.
 Morgens und Abends drei Pillen.
 (Wie bei No. 72.)

*Richter.*N^o. 74.

- R_y. Gummi ammoniaci
 Sap. med.
 Pulv. Rad. Rhei
 Fell. Tauri inspiss.
 Extr. Aloës aq. ana ʒj.
 Tart. stib. in aq. solut. gr. IV.
 M. f. Pil. pd. gr. jj. D. S.
 Dreimal täglich zehn Pillen.
 (Wie bei No. 72.)

*Richter.*N^o. 75.

- R_y. Pulv. Rad. Jalapp.
 — Sem. Santonici ana Gr. XXIV.
 Calomel gr. IV.
 M. f. Pulv. D. S. Auf einmal zu nehmen.
 (Bei Febris verminosa.)

*Richter.*N^o. 76.

- R_y. Camphorae gr. xjj.
 Gummi arab. q. s.
 adde
 Aq. Ment. crisp. ʒvj.
 Aceti Vini opt. ʒβ.
 Sacch. alb. ʒj.

- M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 75. mit gleichzeitiger grosser Schwäche.) *Berends.*
-

N^o. 77.

- R_x. Pulv. Cort. Chin. reg. ʒvj.
Coq. c.
Aq. font. ʒxvj. ad Col. ʒvjjj.
sub finem Coct. adde
Pulv. Rad. Serpentar. virg. ʒjjj.
— Rhei ʒiβ.
Col. adde
Liq. Ammon. acet.
Syr. Cort. Aurant. ana ʒj.

- M. D. S. Alle zwei Stunden zwei starke Esslöffel.
(Bei eintretender Haut-Crise.)

*Richter.*N^o. 78.

- R_x. Aq. Ment. pip.
Tr. Rhei vinos.
— Aurant. comp. ana ʒj.

- M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
(Zur Nach-Cur; besonders bei Schlaflosigkeit aus Schwäche.) *Richter.*
-

K i n d b e t t f i e b e r .

Je nach dem Fieberzustande, die beim entzündlichen, nervösen, fauligten und gastrischen Fieber angegebenen Getränke.)

N^o. 79.

- R_x. Rad. Ipecacuanhae gr. XV.
f. Pulv. Divide in partes jj. aeq.

D. S. Ein Pulver zu nehmen, und nach anderthalb Stunden das andere Pulver.

Hierauf:

Ry. Ol. Amygdal. dulc. $\overline{3j}$.

Syr. Althaeae $\overline{3j}$.

Kerm. mineral. gr. \overline{jj} .

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Zugleich:

Ry. Sem. Lini (vel Scorzoner.) M. \overline{j} ,

Coq. in Aq. font. Cong. \overline{j} .

adde

Syr. Althaeae q. s. ad gr. sap.

D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. —

Den 7ten — 8ten Tag eine Abführung aus zwei Unzen Manna und zwei Drachmen Arcanum duplicatum; welche drei bis viermal wiederholt wird.

Doulcet.

N^o. 80.

Ry. Sem. Papav. alb. $\overline{3\beta}$.

Aq. comm. $\overline{3vj}$.

f. l. a Emulsio,

adde

Ol. Amygdal. dulc. $\overline{3j}$.

Pulv. Gummi arab. $\overline{3jj}$.

Extr. Hyoscyami gr. \overline{vj} — \overline{vjij} .

Tart. stib. gr. \overline{j} .

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Busch.

N^o. 81.

Ry. Calomel.

Extr. Hyoscyami ana gr. \overline{xjj} .

Opii thebaici gr. \overline{vjij} — \overline{xjj} .

F 1

M. f. l. a. massa Pil. e. q. f.

Pil. No. xjj. Consp. Pulv. Lycopod.

D. S. Alle vier Stunden eine Pille zu nehmen.

Schweighäuser.

N^o. 82.

R_x. Aq. oxymuriat. rec. parat. ℥iβ.

Aq. destill. simpl. ℥iv.

Syr. Alth. ℥iiβ.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Zugleich:

R_x. Acid. nitrici diluti

— muriat. ana ℥β.

Aq. font. tep. ℥vjjj.

M. D. S. Mit einem hiemit befeuchteten flannelnen Lappen Brust, Arme und Schenkel zu waschen.

Sundelin.

W e c h s e l f i e b e r.

No. 10. 11. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 48. 49.

N^o. 83.

R_x. Extr. Trifol. aq.

— Absynthii ana ℥jj.

solve in

Aq. Ment. pip. ℥iv.

Elix. Aurant. comp. ℥β.

M. D. S. Viermal täglich einen kleinen Esslöffel voll.
(Bei Atonie und gleichzeitigem, doch unbedeutendem Diätfehler.)

Richter.

N^o. 84.

Bei gastrischer Complication: (No. 84. 85. 86. 87.)

R_x. Cort. Chin. reg. ℥j.

coq. ex Aq. font. suff. qt.

in Col. $\bar{3}$ vj. solve
 Natri sulph. $\bar{3}$ jj.
 adde

Succi Liq. dep. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

M. J. Schmidt.

N^o. 85.

Ry. Ammon. mur. dep. $\bar{3}$ jj.

Tartari stib. granum

Succi Liq. dep. $\bar{3}$ ß.

solve in

Aq. flor. Chamomill. $\bar{3}$ vj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 84. Besonders vorbereitend zu den eigentlichen Febrifugis.)

Richter.

N^o. 86. a.)

Ry. Aq. Chamomill. $\bar{3}$ vjjj.

Sal. Ammon. dep.

Extr. Gentianae ana $\bar{3}$ jj.

Syr. Cort. Aurant. $\bar{3}$ ß.

M. D. S. In der fieberfreien Zeit alle zwei bis drei Stunden einen bis drei Esslöffel.

(Wie bei No. 84 und 85.)

Vogel.

b.) Wohlschmeckender:

Ry. Amygd. dulc. $\bar{3}$ j.

Mucilag. Gummi arab. q. s.

f. c.

Aq. Rubi Idaei $\bar{3}$ X.

Mucilago,

solve

Sal. Ammon. dep. $\bar{3}j$.

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse.

*Vogel.*N^o. 87.

Ry. Pulv. Rad. Rhei

Sap. med. ana $\bar{3}j$.Extr. Aloës aq. $\bar{3}\beta$.M. f. Pil. pd. gr. $\bar{j}j$.

D. S. Dreimal täglich sechs Pillen.

(Wie bei No. 84.)

Richter.

Als eigentliche Febrifuga werden gerühmt (No. 88 bis 102):

N^o. 88.Ry. Rad. Gentianae rubr. \bar{ij} .— Ari $\bar{3}\beta$.Sulph. Antim. aurat. gr. \bar{j} — $\bar{j}j$.

Sal. Absynth.

Sacch. alb. ana gr. V.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Täglich 3 — 4 Pulver mit vielem Getränk.

*Vogel.*N^o. 89.Ry. Fulv. Cort. Chin. reg. $\bar{3}vj$. — $\bar{3}j$.

Pulv. Rad. Serpentar. virg.

— Summitat. Arnicae

— Flor. Chamomill. ana $\bar{3}j$.Elect. theriac. $\bar{3}\beta$.Syr. Croci $\bar{3}v$.

M. f. Elect.

D. S. In 5 — 6 Portionen zu verbrauchen.

Richter.

N^o. 90.

- Ry. Cort. Chin. reg.
 Rad. Arnicae ana $\bar{3}\beta$.
 Cort. Hippocastani $\bar{5}\text{j}$.
 M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Besonders in der Armenpraxis anwendbar.)
M. J. Schmidt.
-

N^o. 91.

- Ry. Cort. Chin. reg. contus. $\bar{3}\text{I}\beta$.
 coq. ex Aq. ft. $\bar{3}\text{xv}\text{ij}\text{j}$.
 Col. $\bar{3}\text{x}\text{ij}$. adde
 Pulv. Cort. reg. $\bar{3}\beta$.
 Tr. Cort. peruv. $\bar{5}\text{I}\beta$. — $\bar{5}\text{ij}$.
 Syr. Cort. Aurantior. $\bar{3}\text{I}\beta$.
 M. D. S. In der Apyrexie wohl umgeschüttelt alle
 Stunden $\frac{1}{2}$ bis 1 Esslöffel.
 (Bei grosser Gefahr, als concentrirteste Form
 der China - Anwendung.)

*Berends.*N^o. 92.

- Ry. Cort. Chin. reg. $\bar{5}\text{j}$.
 Extr. Gent. rubr. $\bar{3}\beta$.
 Opii puri gr. j.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut f. Pil. pd. gr. ij.
 D. S. Viermal täglich 15 Pillen.

*Hecker.*N^o. 93.

- Ry. Chinin. sulph. gr. xvijj.
 Cort. Chin. reg. $\bar{5}\text{ij}$.
 M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.
 D. S. Alle Stunden ein Pulver mit schwarzem Caffé.

(Diese Form ist die sicherste zur Anwendung des Chinins, und vielfacher Erfahrung zu Folge sind bei ihr die sonst so gefürchteten Recidive nur höchst selten. Das Chinin nimmt sich überhaupt nicht leichter als in schwarzem Caffé.)

M. J. Schmidt.

N^o. 94.

℞. Coffeae tostae ℥vj.
 coq. ex Aq. ft. suff. qt.
 Col. ℥iijβ. adde
 Succ. Citri rec. express. ℥iβ.

M. D. S. Am fieberfreien Tage Morgens nüchtern auf einmal warm zu trinken; dann etwas Suppe zu nehmen, und den Tag über im Bett zu bleiben.

Audon.

N^o. 95.

℞. Sem. Coff. tost. pulv. ℥iv.
 coq. c.
 Vini rubri ℥xij. ad Col. ℥vjjj.

D. S. Eine Stunde vor dem Anfall die Hälfte, und die andere Hälfte $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Anfall.

Neumann.

N^o. 96.

℞. Opii puri
 Sulph. stib. aurant. ana gr. jj.
 Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pulv. Divide in partes II aeq.

D. S. Ein Pulver eine Stunde, das andere $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Anfall.

Hecker.

N^o. 97.

- R_y. Cort. Chin. reg. $\overline{5}$ j.
 Tr. Opii simpl. $\overline{5}$ j.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut f. Elect. D.
- S. In der Apyrexie alle 2 Stunden den sechsten
 Theil zu nehmen.

*Hecker.*N^o. 98.

- R_y. Pulv. Flor. Chamomill. $\overline{5}$ j.
 — Cort. Chin. reg. $\overline{5}$ β.
 Elaeosacch. Chamomillae $\overline{5}$ j.
- M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.

*Hecker.*N^o. 99.

- R_y. Extr. Nucis vomicae $\overline{5}$ β. — gr. XV.
 Gummi arab. $\overline{5}$ j.
 Aq. Foeniculi $\overline{5}$ iv.
 Syr. Cort. Aurant. $\overline{5}$ β.
- M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*N^o. 100.

- R_y. Pulv. Fol. Belladonnae gr. j — \overline{ijj} .
 Moschi oriental.
 Camphorae ana gr. V.
 Sacch. alb. $\overline{5}$ β.
- M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VIII.
 D. S. Täglich drei Pulver.

*Hecker.*N^o. 101.

- R_y. Cort. Chin. reg. $\overline{5}$ j.
 Ol. Cajeput. gtt. XXXII.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.
 D. S. In der Apyrexie stündlich ein Pulver mit
 Thee oder Wein.

Hecker.

N^o. 102.

Ry. Extr. Cort. Chin. frig. parat. $\mathfrak{z}\beta$.
 solve in
 Aq. Melissae $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 adde
 Syr. Cort. Aurantior. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. D. S. Theelöffelweise.
 (Für Kinder.)

Berends.

N^o. 103.

Bei gleichzeitiger Obstipation bei schwachen Subjecten :

Ry. Kali tart. $\mathfrak{z}\beta$.
 Magnes. carb. $\mathfrak{z}\text{I}\beta$.
 Rad. Rhei opt. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Elaeosacch. Foeniculi $\mathfrak{z}\text{vj}$.
 M. f. Pulv. D. in vitro.
 S. Dreimal täglich einen Theelöffel.

Oder:

Ry. Extr. Aloës aq. gr. vj .
 Ferri pulverati gr. xj .
 Ammoniacy dep. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. c. Extr. Gentianae q s.
 Pil. pd. gr. jj . D. S.
 Dreimal täglich 3 — 5 Pillen.

Berends.

N^o. 104.

In den hartnäckigsten Fällen (No. 104. 105. 106. 107. 103.):

Ry. Arsenicy alb. pulv.
 Kali carb. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

Aq. font. destill. ℞ β.

M. coque in balneo arenae ad
perf. Arsenici solut. — Frigef. adde

Spir. Angelicae comp. ℥j.

Aq. font. destill. q. s. ut tota
solutio constituat ℞ I.

M. D. S. In der fieberfreien Zeit alle 2 Stunden
5 — 10 Tropfen unter Wasser (steigend zu 16
Tropfen).

Für Kinder:

Rx. Solut. arsenical. Heimii ℥j.

Aq. font. destill. ℥β.

Syr. balsam. ℥β.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

Heim.

N^o. 105.

Rx. Arsenici albi

Natri carb. ana ℥β.

Coq. c. Aq. destill. ℥vj.

Solut. filtratae adde

Aq. Cinnamomi s. v. q. s. ut
pondus totius solutionis sit ℥vjjj.

M. D. S. Alle 3 Stunden 6 — 12 Tropfen unter
Wasser.

(Auch gegen Chorea, Hydrophobie, Wasser-
sucht, chronische Hautkrankheiten, und Haut-
krebs.)

Harless.

N^o. 106.

Rx. Arsenici albi gr. j.

Aq. Cort. Aurant. ℥ix.

Syr. Cort. Aurant. ℥j.

M. D. S. In der Apyrexie stündlich 1 — 2 Esslöffel.

Hecker.

N^o. 107.

Ry. Arsenici sulphurati gr. β. — gr. j.
Sacch. alb. ℥β.
Ol. Anisi gt. i.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.

D. S. In der Apyrexie stündlich ein Pulver,
(Man soll selten mehr als diese 12 Pulver nöthig haben.)

Hecker.

N^o. 108.

Ry. Cupri sulphurici
Opii puriss. ana gr. β. — gr. j.
Canellae alb. gr. j.
Gummi arab. ℥j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

Richter.

Bei Uebergang in Chlorosis.

N^o. 109.

Ry. Extr. Cort. Angustur.
— Chamomill. ana ℥jj.
Ferri pulverati ℥j. — ℥iβ.

Pulv. Rad. Columb. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. jj. Consp. Magnes. carb.

D. S. Dreimal täglich 8 — 10 Pillen.

Hecker.

N^o. 110.

In der Hitze des Fiebers, als ungemein angenehm und erquickend:

Ry. Aq. Cerasor. nigr. ℥iv.
Tr. flor. Papav. ℥β. — ℥vj.
Syr. flor. Papav. ℥vj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Vogel.

Zur Abkürzung des Frostes, und Beförderung der eintretenden Haut - Crise:

N^o. 111.

R_x. Lapid. Cancror. pulv. ʒj.

Aceti Vini ʒij.

M. D. S. Im Aufbrausen (während des Frostes) zu nehmen.

(Soll sich in vielen hundert Fällen wirksam bewiesen haben.)

Lind.

Als Ptsanen werden empfohlen No 112. 113. 114.

N^o. 112.

R_x. Hb. Cent. min.

— Card. bened.

— Absynth. vulg.

— Trifol. fibr. ana M. j.

Flor. Chamomill. vulg. P. ij.

Fol. Sennae

Rad. Hellebori nigri ana ʒβ.

Cort. peruv. ʒj.

Tart. tart. ʒvj.

Conc. inf. in Vini albi ℥ II — III.

Aq. comm. ℥ I.

St. per aliquot dies.

Col. D. S. An den fieberfreien Tagen drei Tassen täglich zu trinken.

Vogel.

N^o. 113.

R_x. Rad. Sarsaparill. ʒij.

Stipit. Dulcamar. ʒjjj.

Coq. vas. claus. c. Aq. f. q. s.
per hor. j̄j̄. Col. ℞ I. admisce
Syr. Fumariae ʒ̄j̄.

M. D. S. Drei bis viermal täglich eine Tasse.

Vogel.

N^o. 114.

R̄. Rad. Taraxaci
— Cichor.
— Juniperi
— Graminis
— Saponar. ana ʒ̄β.
Sem. Foeniculi
— Anisi ana ʒ̄j.

Concis. Contus. M. D. S. Einen Esslöffel in 3 Schoppen Wasser $\frac{1}{4}$ Stunde lang zu kochen, und colirt täglich zu trinken.

Vogel.

Zur Nach - Cur, und in der Reconvalescenz:

N^o. 115.

R̄. Pulv. Rad. Gentianae rubr. ʒ̄β.
— Cort. Aurant. ʒ̄j̄j̄.
— — Chinae ʒ̄j.
Ferri pulverati ʒ̄l̄β.
inf. c.

Vini rhen. opt. ℞ IV.

Stent per XXIV. hor. in vase bene clauso, saepius agitando. Col.

D. S. Täglich 3 — 4 mal ein Weinglas voll.

Richter.

Hektisches Fieber.

No. 1. 2. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 17. 18. 19. 21.

N^o. 116.R_y. Rad. Graminis.

— Althaeae ana ʒij.

— Taraxaci ʒj.

— Salep. ʒij.

Rasurae Cornu Cervi ʒβ.

Sem. Foeniculi ʒij.

C. C. D. S. Drei Esslöffel voll in 3 Nöseln Wasser
zu kochen, und täglich zu trinken.*Stark.*N^o. 117.R_y. Pulv. Cort. Chin. reg.

Hb. Lichen. island. ana ʒβ.

Stipit. Dulcimar. ʒij.

Coq. c.

Aq. font. ʒXX. ad Col. ʒX.
adde

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.

*Richter.*N^o. 118.R_y. Tr. Opii simpl. ʒj.

Acid. sulph. dil. ʒjjj.

Syr. Violar. ʒjjj.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

*Fournier.*N^o. 119.R_y. Gummi Myrrhae ʒj.

solve terendo in mortario vitreo in

F 2

Aq. alexiph. simpl. $\bar{\text{z}}\text{vi}\beta$.— — spirit. $\bar{\text{v}}\text{j}$.

adde

Kali. carb. $\bar{\text{z}}\beta$.Ferri sulphur. gr. xj .Syr. simpl. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. In 4 Portionen den Tag über zu verbrauchen.

*Griffith.*N^o. 120.R_x. Plumbi acet.Opii puriss. ana gr. β — j .Sacch. alb. gr. xj .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich ein bis zwei Pulver.

*Richter.*N^o. 121.R_x. Vitell. ovor. No. XI.

tere c. Aq. Plantag. q. s.

admisce

Corall. praep. $\bar{\text{z}}\text{j}$.Gummi arab. $\bar{\text{z}}\text{j}$.Syr. Farfar. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel, und ein Gläschen Hühner- oder Kalbsbrühe mit arabischem Gummi nachzutrinken.

(Besonders bei febris hectica a causa metallica, z. B. Blei, Arsenik, Sublimat.)

Fournier.

Gegen die colliquativen Nachtschweisse:

N^o. 122.R_x. Tereb. puriss. c. Vitell. ovi intim. subact. $\bar{\text{z}}\text{j}$.Elect. theriac. $\bar{\text{z}}\beta$.

Lact. vacc. rec. $\bar{\text{3}}\text{IV}$.

M. D. S. Zum Clystir, welches der Kranke, auf der linken Seite liegend, so lange als möglich bei sich behalten soll. — Zugleich einen kalt gewordenen Thee von Hb. Salviae; $\bar{\text{5}}\text{j}$. auf 3 Tassen Thee.

van Swieten.

Zur Nach - Cur.

N^o. 123.

R_x. Ferri pulv. $\bar{\text{5}}\text{j}$.

Pulv. Cort. Chin. reg. $\bar{\text{5}}\text{jj}$.

— — Aurant. $\bar{\text{5}}\beta$.

inf. c.

Vini rhen. gen. $\bar{\text{8}}\text{IV}$.

Stent in digest. frig. saep. agit. decant.

M. D. S. Viermal täglich ein kleines Weinglas voll.

Richter.

Entzündungen.

Im Allgemeinen passen für die verschiedenen Arten der Entzündung sämmtliche beim entzündlichen Fieber angegebene Mittel. Also No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. und die für gastrische Complication beim gastrischen Fieber angegebenen Formeln. Die wahren Entzündungen werden gleichmässig behandelt, und es giebt daher wohl keine besonders passenden Vorschriften; doch mögen einige gerühmte Formeln hier zur Auswahl folgen.

N^o. 124.

Bei Encephalitis:

R_x. Vin. Antimon. $\bar{\text{5}}\text{jjj}$.

Tr. thebaic. $\bar{\text{5}}\text{j}$.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden 25 Tropfen.

Bell.

N^o. 125.

Gegen Entzündung im Halse und Schlunde.

Rx. Pulv. Fol. Sabinæ ʒvj . — ʒj .

Ebull. Aq. font. q. s.

Col. ʒvj . adde

Merc. sublim. corros. gr. j.

M. D. S. Gurgelwasser zu einem Löffel voll.

Kopp.

Oder:

N^o. 126.

Rx. Cupri ammon. gr. vjjj.

solve in

Aq. Sabinæ ʒvj .

M. D. S. Gurgelwasser.

(Besonders in chronisch gewordenen Fällen.)

*Kopp.*N^o. 127.

Bei Angina:

Rx. Infus. Flor. Sambuci ʒix .

Oxymell. squill.

— simpl. ana ʒiβ .

M. D. S. Zum Gurgeln.

*Hecker.*N^o. 128.

Rx. Hb. Salviae

Sem. Sinapios ana ʒβ .inf. c. Aq. fervid. ʒix .

Col. adde

Spir. Cochleariae ʒijj .

M. D. S. Zum Gurgeln.

Hecker.

N^o. 129.

Bei Angina suppuratoria:

℞. Panis tritici sicc. contrit. $\overline{3}$ v.Sem. Lini contus. $\overline{3}$ j.Sal. ammon. pulv. $\overline{3}$ j.

Opii puri gr. XX.

Aq. fervid. q. s.

ut f. Cataplasma.

D. S. Oftmals erwärmt um den Hals zu legen.

*Vogler.*N^o. 130.

Bei Angina aphthosa maligna cum scarlatina: (s. No. 254.)

℞. Calomel. gr. V — X.

Rad. Rhei $\overline{3}$ j.

M. f. Pulv. D. S. Zwei bis drei Tage lang alle Morgen und Abende ein solches Pulver.

*Wedekind.*N^o. 131.

Bei Bronchitis chronica:

℞. Extr. Hyoscyami gr. xxxjj.

Syr. simpl. $\overline{6}$ II.

M. S. Bilsenkraut - Syrup; theelöffelweise zu gebrauchen.

*Gilbert.*N^o. 132.

Gegen Group:

℞. Kali sulphurati

Guajaci ana $\overline{3}$ j.

Extr. Card. bened. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Dreimal täglich 5 Pillen.

Senff.

N^o. 133.

Oder:

- Ry. Kali sulphurat. \mathfrak{z} j.
 Butyr. Cacao \mathfrak{z} jj.
 Sacch. alb. \mathfrak{z} jjj.
 Ol. Amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Alle 2 — 4 Stunden 2 — 3 Theelöffel.
Senff.

N^o. 134.

- Ry. Ungt. Hydrarg. ciner. \mathfrak{z} j.
 — Ceruss. camphor. \mathfrak{z} jjj.

M. D. S. In die Gegend des Kehlkopfs soviel einzureiben, dass die Hälfte in 24 Stunden verbraucht ist.

Richter.

Bei Pleuritis, Pneumonie und Peripneumonie:

N^o. 135.

- Ry. Mell. opt. \mathfrak{z} vj.
 Gummi arab. \mathfrak{z} j.
 Aq. Rosar. \mathfrak{z} jj.
 terendo adde
 Ol. Amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\beta$.
 Aq. font. \mathfrak{z} vj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll.
 (Besänftigt vorzüglich den Husten, und ist mit einem rein entzündlichen Zustande verträglich.)
Pringle.

N^o. 136.

- Ry. Flor. Papav. Rhoeados
 — Malvae ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Sem. Lini contus. \mathfrak{z} vj.

Coq. c.

Aq. font. \mathcal{R} IV. per $\frac{1}{4}$ horae.

Col. adde

Syr. Althaeae $\mathfrak{3}\text{j}$.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.
(Wie bei No. 135.)

*Richter.*N^o. 137.

R_x. Sem. Cannab. contus.
Capit. Papav. alb. c. sem. contus.
Flor. Malvae ana $\mathfrak{3}\text{j}$.

Coq. c.

Aq. font. \mathcal{R} III. per $\frac{1}{4}$ horae.

Col. adde

Syr. Capill. Ven. $\mathfrak{3}\text{j}\text{j}$.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.
(Wie bei No. 135.)

*Richter.*N^o. 138.

R_x. Rasur. Pan. alb. duriusc. $\mathfrak{3}\text{j}\text{j}\text{j}$.
Hb. Conii maculat. concis. $\mathfrak{3}\text{j}\text{j}$.
Hb. Hyoscyami $\mathfrak{3}\text{j}$.

Coq. c.

Aq. ft. q. s. ad consist. Catapl.
tenuioris, cui addeOl. Hyoscyami $\mathfrak{3}\text{j}\text{j}$.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.

*Huxham.*N^o. 139.

R_x. Rad. Althaeae
Hb. Meliss.
— Menth. pip.
Flor. Sambuci
— Arnicae ana $\mathfrak{3}\text{j}$.
Sem. Anisi $\mathfrak{3}\beta$.

C. M. D. S. Zum Thee.

(Auch bei Angina catarrhalis von grossem Nutzen. In pleuritischen Affectionen, besonders bei eingetretener nervöser Complication.)

Hecker.

N^o. 140.

R_x. Ammoniaci dep. ʒij.
 Aq. Foeniculi ʒvj.
 Vini stibiatı ʒij.
 Oxymell. simpl. ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
 (In Peripneumonia notha.)

Brunner.

N^o. 141.

R_x. Rad. Polygalae Seneg. concis ʒj.
 Coq. c.
 Aq. font. ʒxvj. ad Col. ʒvjjj.
 solve
 Ammon. muriat. dep. ʒij.
 Pulpae Tamarindor. ʒj.
 Tart. stib. gr. j.
 Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.
 (Die Expectoration befördernd, und vorzüglich anwendbar, wo nur geringes Fieber ist.)

Richter.

N^o. 142.

R_x. Rad. Polyg. Seneg.
 Sacch. alb. gr. XV.
 Camphor. rasae gr. j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.
(Wie bei No. 141.)

Richter.

N^o. 143.

Rx. Ammon. muriat. dep. ʒj.
Camphorae
Extr. Opii ana gr. ʒj.
Flor. Arnicae ʒβ.
Sacch. alb. ʒvj.

M. f. Pulv. D. ad vitr.

S. Drei bis viermal täglich einen Theelöffel.
(Die Expectoration befördernd.)

Berends.

N^o. 144.

Rx. Kerm. mineral. gr. ʒj — IV.
Flor. Sulph. ʒj.
Gummi arab.

— Tragacanth. ana ʒlβ.

Extr. Liquirit.

Sacch. alb. ana ʒjj.

M. f. Pulv. D. S. Zwei bis dreimal täglich ein Kaffeelöffelchen in Wasser gerührt zu nehmen.
(Wie bei No. 143.)

Quarin.

N^o. 145.

Rx. Tart. stib. gr. j.
Kali tart. ʒvj.
 solve in
Aq. destill. simpl. ʒlβ.
 adde
Mellis opt. ʒlβ.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.
(Bei schon vorhandener Expectoration zur Unterhaltung derselben.)

Richter.

N^o. 146.

R_x. Gummi Ammoniaci ʒj.
Sulph. aurat. Antim. gr. vj.
Syr. Althaeae ʒijj.

M. f. l. a. Linctus. D. S. Umgeschüttelt alle 2
Stunden ein Paar Kaffeelöffel.

(Wo kein Fieber mehr ist. Wie bei No. 145.)

A. Schmidt.

N^o. 147.

R_x. Gummi Ammoniaci ʒj.
solve in
Oxymell. squill. ʒj.

Aq. flor. Sambuci ʒiv.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 146.)

Richter.

N^o. 148.

R_x. Flor. Benzoës gr. vj.
Camphor. gr. jj.
Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. IV.

M. D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

(Wenn der Auswurf bei sich verschlimmerndem
Zustande stockt, um denselben wieder hervorzu-
rufen.)

Hoffmann.

N^o. 149.

R_x. Sulph. stib. aurant.
Rad. Ipecacuanhae ana gr. j.
Camphor. rasae gr. jijj.
Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 148.)

Mursinna.

N^o. 150.

- R_x. Sal. volat. C. C. gr. V.
 Calomel. gr. jj.
 Opii puri
 Kerm. mineral. ana gr. β.
 Rad. Liquirit. gr. X.

M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. q. l.

S. Alle 3 — 4 Stunden ein Pulver.

(In den letzten Stadien pleuritischer und pneumonischer Affection, bei schon eingetretener seröser Ausschwitzung zur Resorption derselben. Auch bei Pericarditis und eingetretener Exsudation.)

Kraft.

N^o. 151.

Bei Hepatitis:

- R_x. Calomel.
 Sulph. stib. aurant. ana gr. j.
 Hb. Cicutae gr. vj.
 Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VIII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Zugleich, wenn nicht schon offener Leib eintritt, den 5ten oder 6ten Tag ein Purgans aus Res. Jalapp., Calomel. ana gr. IV. und nachher wieder die Pulver.

Richter.

Bei Enteritis No. 136, 137.
 und bei gleichzeitiger Verstopfung:

N^o. 152.

- R_x. Magnes. sulph. ℥j.
 solve in
 Aq. font. ℥vjj.
 Ol. Lini ℥jjj.

Tr. Opii simpl. gtt. XVIII.

Syr. Papav. $\bar{5}j$.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle halbe Stunden einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 153.

Ry. Ol. Ricini $\bar{5}j$.

Gummi arab. $\bar{5}j$.

Aq. Sambuci $\bar{5}iv$.

Syr. Alth. $\bar{3}\beta$. — $\bar{5}j$.

Spir. nitrico - aeth. $\bar{5}j$. — $\bar{5}j$.

Tr. Opii croc. $\bar{5}\beta$. — $\bar{5}j$.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 152.)

Jahn.

Gegen Verhärtungen nach Entzündungen:

N^o. 154.

Ry. Extr. Conii maculat. $\bar{3}\beta$.

Ungt. saturnin. $\bar{5}j$.

M. f. Ungt. S. Theils einzureiben, theils als Pflaster auf die Stelle des verhärteten Eingeweides zu legen.

Berends.

An die Entzündungen reihen sich der Rheumatismus, die Prosopalgie, Ischias, Lumbago, — der Katarrh und die Dysenterie. —

R h e u m a t i s m u s .

N^o. 155.

Ry. Amygdal. dulc. dec. $\bar{3}\beta$.

Sem. Papav. alb.

— Cannab. ana $\bar{5}jj$.

Camphorae \mathfrak{J} . — $\mathfrak{3}\beta$.
 cum Amygdal. trit. adde
 Aq. Rubi Idaei $\mathfrak{3}\times$.
 Emulsioni adde

Nitri dep. $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$.
 Syr. mannati $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel bis
 $\frac{1}{2}$ Tasse.
 (Bei gleichzeitigem Fieber.)

Vogel.

N^o. 156.

R \mathfrak{y} . Aq. Menth. pip. $\mathfrak{3}\mathfrak{iv}$.
 Spir. Minderer. $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$.
 Syr. Ribium $\mathfrak{3}\mathfrak{v}$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 155.)

Vogel.

N^o. 157.

R \mathfrak{y} . Nitri puri $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$. — $\mathfrak{3}\beta$.
 Tart. stib. gr. $\mathfrak{1}\beta$. — gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 solve in
 Aq. flor. Sambuci $\mathfrak{3}\mathfrak{v}$.
 adde
 Syr. comm. $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 155.)

Thilenius.

N^o. 158.

R \mathfrak{y} . Calomel.
 Opii puriss. ana gr. \mathfrak{j} .
 Camphor. rasae
 Rad. Ipecacuanhae ana gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Sacch. alb. \mathfrak{J} .

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal Abends kurz vor dem

G 1

Schlafengehen mit ein Paar Tassen warmem Fliederblüthentheee.

(Wie bei No. 155.)

Richter.

N^o. 159.

R_y. Elect. theriac. gr. xjj.
Sulph. stib. rub. gr. j.
Extr. Card. bened. ℥j.

M. f. Bolus. D. S. Abends vor dem Schlafengehn zu nehmen, und ein Paar Tassen Thee von Card. bened. zu trinken.

(Wie bei No. 155.)

Tissot.

N^o. 160.

R_y. Calomel.
Extr. Aconit. ana gr. j.
Camphorae gr. jj — jjj.
Extr. Card. bened. ℥j.

M. f. Bolus. D. S. Abends vor Schlafengehen zu nehmen.

(Wie bei No. 155.)

Tissot.

N^o. 161.

R_y. Liq. Ammon. acet. ℥jj — jjj.
Laud. liq. Sydenh. gtt. vjjj.
Aq. flor. Sambuci ℥j.

M. D. S. Abends vor Schlafengehen zu nehmen.

(Wie bei No. 155.)

Richter.

N^o. 162.

R_y. Ammon. carb. pyro - oleosi gr. IV.
Extr. Aconiti gr. j.
Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

- D. S. Alle 4 Stunden ein Pulver.
(In hartnäckigeren Fällen.)

Richter.

Bei mehr chronischem Zustand :

N^o. 163.

- Ry. Res. Guajac. nat. ʒjj.
Gummi arab. ʒjjj.
Aq. destill. simpl. ʒvjj.
Extr. Dulcamar. liq. ʒjjj.
Syr. Althaeae ʒj.

- M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

Berends.

N^o. 164.

- Ry. Res. Guajac. nat. ʒjj.
Sap. med. ʒβ.
Mellis puri q. s.
ut f. Pil. pd. gr. jj.
Consp. pulv. Cinnam. D.
S. Dreimal täglich 10 — 15 Stück.

Berends.

N^o. 165.

- Ry. Sulph. stib. aurant. ʒj.
Calomel. ʒβ.
Sap. med.
Res. Guajac. nat. ana ʒIV.
Extr. Aconit. gr. vj.

- M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj.

- D. S. Zwei bis dreimal täglich 8 — 12 Pillen.

Selle.

N^o. 166.

- Ry. Gummi Guajac. nat. ʒβ.
Sap. med. ʒjj.

Calomel.

Sulph. stib. aurant.

Rad. Senegae

Camphorae ana $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. c. Acet. squill. q. s.

Pil. pd. gr. \mathfrak{jj} . consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zwei bis dreimal täglich 8 Pillen.

*Hecker.*N^o. 167.R \mathfrak{y} . Gummi Guajaci nat.

— Ammoniacy

— arab. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{jj}$.Aq. Foeniculi $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.Vini stib. $\mathfrak{z}\beta$.Syr. Althaeae $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.

*Hecker.*N^o. 168.R \mathfrak{y} . Pulv. Gummi Guajac. nat. $\mathfrak{z}\beta$. — gr. XV.

— Cort. Cinnamom. gr. xj.

Sulph. stib. aurant.

Camphorae ana gr. \mathfrak{jj} .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Täglich dreimal ein Pulver.

*Hecker.*N^o. 169.R \mathfrak{y} . Gummi Guajac. nat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Mucilag. Gummi arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{jj}$.

terant. aff. sensim

Aq. Hyssopi $\mathfrak{z}\mathfrak{x}$.

M. D. S. Drei bis viermal täglich einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 170.

- R. Sap. med. $\bar{3}\beta$.
 G. Guajaci $\bar{3}\text{IV}$.
 M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj.
 Consperg. Pulv. Cinnam.
 D. S. Dreimal täglich 10 — 15 Pillen.

*Richter.*N^o. 171.

- R. Tr. Guajaci ammoniat. $\bar{3}\beta$.
 Mucilag. G. arab.
 Syr. Althaeae ana $\bar{3}\text{j}$.
 M. D. S. Abends vor dem Schlafengehn einen starken Esslöffel voll zu nehmen.

*Richter.*N^o. 172.

- R. G. Guajaci nat. $\bar{3}\beta$.
 solve in
 Vitell. ov. No. j.
 adde
 Aq. Cinnamomi $\bar{3}\text{jj}$.
 Syr. Foeniculi $\bar{3}\text{jj}$.
 M. D. S. Abends vor Schlafengehn einen Esslöffel.
 (Nacher Cort. Chinae.)

*Pringle. (Vogler.)*N^o. 173.

- R. Gummi Asae foet. $\bar{3}\beta$.
 Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}\text{IV}$.
 Syr. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.
 M. D. S. Alle zwei Stunden, einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 174.

- Ry. Tart. stib. gr. vjij.
 Sap. med. ʒjjj.
 Pulv. Rad. Rhei ʒj.
 Extr. Aloës aq. ʒβ.
 M. f. Pil. pd. gr. jj.
 D. S. Dreimal täglich 8 — 10 Pillen.

*Richter.*N^o. 175.

- Ry. Sap. hisp.
 Extr. Cicutae ana ʒβ.
 M. f. Pil. pd. gr. jjj.
 D. S. Dreimal täglich 3 Pillen.

*Stoerk.*N^o. 176.

- Ry. Sap. hisp. ʒvj.
 Extr. Tarax. ʒβ.
 G. ammon. ʒβ.
 Syr. Cap. Ven. q. s.
 ut. f. Pil. pd. gr. jjj.
 D. S. Morgens und Abends zehn Pillen.

*Tissot.*N^o. 177.

- Ry. Extr. Aconiti ʒβ — ʒj.
 Liq. C. C. succ. ʒβ.
 M. D. S. Einigemal täglich 15 — 20 Tropfen.
 (Besonders schmerzstillend.)

*Thilenius.*N^o. 178.

- Ry. Liq. anodyn. min. Hoffm.
 Spir. C. C. succ. ana ʒjj.

M. D. S. Alle zwei Stunden 30 — 80 Tropfen.
(Wie bei No. 177) *Hecker.*

N^o. 179.

R̄. Hydrarg. mur. corros. gr. jj.
 solve in
 Aq. destill. $\bar{3}$ vj.
M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
Lentin.

N^o. 180.

R̄. Calomel.
 Sulph. stib. aurant.
 Extr. Aconit. ana gr. j.
 Sacch. alb. $\bar{3}$ j.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos No. xjj.
D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
Richter.

N^o. 181.

R̄. Sulph. stib. rub. gr. j.
 Castor.
 Tart. ammon.
 Sacch. alb. ana $\bar{3}$ j.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Drei bis viermal täglich ein Pulver.
Richter.

N^o. 182.

R̄. Pulv. Opii gr. xvj.
 Antimonii gr. xjj — XXIV.
Conserv. Rosar. q. s. ut f. massa Pil.
ex qua form. Pil. No. XXIV.
D. S. Bei heftigem Schmerz eine bis zwei Pillen.
Scudamore.

N^o. 183.

- R_x. Sulph. stib. aurant. $\bar{3}j$.
 solve digerendo in s. q.
 Liq. Kali caust.
 admisce
 Sap. med. $\bar{3}jjj$.
 Spir. Vini rectificatiss.
 Aq. destill. ana $\bar{3}vj$.
 Diger.

M. D. S. Täglich einigemal 20 — 50 Tropfen.
 (In hartnäckigen Fällen, auch gegen Flechten
 und andere Hautkrankheiten.)

Hufeland.

N^o. 184.

- R_x. Pulv. Stipit. Dulcamar.
 Stibii sulph. nigr. ana $\bar{3}j$.
 Extr. Card. bened. $\bar{3}jj$.
 M. f. Pil. pd. gr. jj .
 D. S. Dreimal täglich 10 — 20 Pillen.

Richter.

N^o. 185.

- R_x. Spir. sulph. aeth.
 Liq. Ammon. succ. ana $\bar{3}\beta$.
 Extr. Hyoscyami $\bar{3}\beta$.
 M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich 30 Tropfen.

Richter.

N^o. 186.

- R_x. Stipit. et fol. Rhododendri $\bar{3}jj$.
 inf. c.
 Aq. font. $\bar{3}vjjj$.
 Stent in digest. vase bene clauso per hor. XXIV.
 Dein coque ad rem. $\bar{3}jjj$. Cola

D. S. Jeden Morgen $\frac{1}{2}$ Theetasse voll.

Richter.

N^o. 187.

R_x. Pulv. Rad. Valerianae $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 inf. c. Aq. fervid. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 stent in loc. cal. vas. bene claus.
 per $\frac{1}{2}$ hor. Col. adde

Liq. Ammon. acet. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Extr. Aconiti gr. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Viermal täglich einen starken Esslöffel voll.
 (Besonders gegen zurückbleibende stumpfe
 Schmerzen.)

v. Stoerk.

N^o. 188.

R_x. Ol. Tereb. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Mell. despumat. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Morgens und Abends einen Theelöffel.
Cheyne. (Herz.)

N^o. 189.

R_x. Hydrarg. muriat. corrosiv. gr. \mathfrak{j} .
 Extr. Hyosecyami gr. IV.
 Aq. Cinnamom. s. v. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

Brand.

N^o. 190.

R_x. Succ. rec. express. Nasturt. aq.
 — — — Cochlear.
 — — — Acetosell.
 — — — Taraxaci ana $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Syr. Acetos. Citri $\mathfrak{v}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. In zwei Portionen während einigen Stunden mit Molken zu verbrauchen.

(Bei Complication von Rheumatismus und Scorbut.)
v. Stoerk.

N^o. 191.

- R_x. Sal. polychrest. S. ʒijj.
Pulv. Rad. Jalapp. ʒiβ.
Conserv. Fumar.
Conserv. Nasturt. ana ʒiβ.
Syr. quinq. rad. ap. q. s. ut f. Conserv.
D. S. Alle drei Stunden zwei Theelöffel.

Zugleich:

N^o. 192.

- R_x. Summitat. Cent. min.
Fol. Card. bened.
Flor. Chamomill. ana M. j.
Rad. Liquirit. ʒj.
C. D. S. Zum Thee.
(Wie bei No. 190.)

v. Stoerk.

Aeusserliche Mittel beim Rheumatismus:

N^o. 193.

- R_x. Liq. Ammon. caust. ʒj.
Ol. Olivar. ʒijj.
Camphorae rasae ʒβ.
Tr. Opii simpl. ʒj.

M. D. S. Einzureiben, und mit Flanell warm aufzulegen.

(Bei noch vorhandenem entzündlichen Zustande.)

Richter.

N^o. 194.

- R_x. Fol. Daturae Stramm. ʒijj.
Axung. porci ʒiv.
Cerae ʒj.
M. f. c. Aq. f. Ungt. D. S.

Zum Einreiben.

(Wie bei No. 193.)

Read. (Zollikofer.)

N^o. 195.

- R_x. Fol. Salv. rec. concis.
 Bacc. Lauri pulv. ana $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 inf. c. Ol. Napi $\&$ II.
 Col. adde
 Camphorae ras. $\bar{\text{V}}\text{v}$.
 Ol. Tereb. $\bar{\text{I}}\text{I}\text{I}\text{I}$.
 — Petrae $\bar{\text{I}}\text{I}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Bei mehr torpidem Zustande, Auch gegen
 Frostbeulen empfohlen.)

Piepenbring.

N^o. 196.

- R_x. Alcohol. $\bar{\text{V}}\text{I}\text{I}\text{I}\text{I}$.
 Mixt. camphorat. $\bar{\text{I}}\text{XV}\text{I}$.
 Aq. calid. 75^o. q. s. ut f. Lin.

S. Mit einer Leinwand - Compresse auf den leiden-
 den Theil.

(Wie bei No. 195.)

Scudamore.

N^o. 197.

- R_x. Tr. Cantharid.
 Liq. Ammon. caust. ana $\bar{\text{V}}\text{v}$.
 Spir. Serpyll. $\bar{\text{I}}\text{I}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 195.)

Richter.

N^o. 198.

- R_x. Extr. Hyoscyami $\bar{\text{I}}\text{I}\text{I}\text{I}$.
 — Conii maculat. $\bar{\text{V}}\text{v}$.

Liq. Ammon. acet. q. s. ad

Consist. Ungt. D. S.

Lauwarm auf Leder gestrichen, auf den leidenden Theil.

(Besonders schmerzstillend.)

*Richter.*N^o. 199.

R̄. Pic. alb. ʒβ.

Camphor. ʒj.

Opii pur. ʒβ.

Ol. Petrae q. s.

M. f. Empl. D. S.

Auf den leidenden Theil zu legen.

*Richter.*N^o. 200.

R̄. Camphorae ʒj.

solve in

Spir. sulph. aeth. ʒj.

(Ol. Cajeput. ʒβ. — ʒj.)

M. D. S. Zwei bis dreimal täglich in den leidenden Theil einzureiben.

(Besonders bei hartnäckigem rheumatischem Kopfschmerz empfohlen.)

v. Tourtuel.

P r o s o p a l g i e .

N^o. 201.

R̄. Asae foet.

Extr. Conii maculat. ana ʒjj.

Ammon. carb. pyro - ol.

Pulv. Rad. Valer. ana ʒj.

- M. f. c. Tr. Succini q. s.
 Pil. pd. gr. j̄j.
 D. S. Morgens und Abends zehn Pillen.

Jahn.

N^o. 202.

- R̄. Gummi Guajaci
 Asae foet.
 Extr. Cicutae ana ʒj.
 Extr. Aconiti ʒβ.
 Calomel. gr. XV.
 M. f. Pil. pd. gr. j̄j.
 Consp. pulv. Cinnam.
 D. S. Morgens und Abends 5 — 10 Pillen.

Jahn.

N^o. 203.

- R̄. Moschi gen. gr. vj.
 Calomel.
 Sulph. stib. aurant. ana gr. j̄j̄j̄.
 Sacch. alb. ʒj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

P. Frank.

N^o. 204.

- R̄. Sem. Datur: Stramonii ʒj̄j̄.
 Vini hispanici ʒv̄j̄j̄j̄.
 Spir. Vini ʒj̄.
 Digere per aliquot dies leni calore
 et filtra.
 D. S. Sechs Tropfen auf einmal zu nehmen.
 (Zugleich Schwefelbäder.)

Lentin.

N^o. 205.

- R_x. Coccionell, septempunct. No. LX — LXXX.
 contus. in mortar. lapid. sensim adde
 Spir. Vini rectificatiss. ʒj.
 Digere per aliquot dies.
 Col. serva vas. vitr. ben. claus.
- D. S. Morgens und Abends 20 — 30 Tropfen.
 (Soll meistens gründliche Heilung, wenigstens
 Erleichterung verschaffen.)

*Sauter.*N^o. 206.

- R_x. Cort. peruv. ʒβ — j.
 Coq. c. Aq. f. q. s.
 Col. refrig. ʒvjjj. adde
 Tr. Guajaci ammon. ʒj. — ʒβ.
 Tr. Opii simpl. ʒj. — ʒlβ.
- M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
 (Besonders bei periodischer Prosopalgie.)

*Samel.*N^o. 207.

- R_x. Ol. Amygdal. amar. gtt. XX.
 Alcohol. Vini ʒjjj.
- M. D. S. Täglich viermal 10 — 20 Tropfen.
 (Gegen die Paroxysmen zuweilen hilfreich.)

*Horn.*N^o. 208.

- R_x. Calomel. ʒj.
 Cretae ʒjj.
 Ungt. Althaeae ʒj.
 Ol. Lini ʒj.
- M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle einzureiben.

Löbenstein - Löbel.

N^o. 209.

- R̄. Calomel. ℥j.
 Adipis suill. ℥β.
 Ol. Galbani
 — Succini ana ℥β.
- M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle einzureiben.
Stark.

I s c h i a s.

- s. Rheumatismus, Prosopalgie, Lumbago und Arthritis.

L u m b a g o.

- s. Rheumatismus, Prosopalgie und Arthritis.

N^o. 210.

- R̄. Camphorae ℥j.
 solve in
 Ol. Tereb. ℥jj.
 adde
 Sal. C. G. gr. XV.
 Pulv. Cumini ℥jj.
 Ungt nervin. Disp. Eding. ℥β.
 Sap. nigr. ℥j.
- M. f. Ungt. D. S.
 Auf Leder gestrichen, in die Lendengegend zu legen.
Home.

C a t a r r h u s.

- No. 125. 128. 129. 130. 132. 135. 136. 137. 138.
 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146.

N^o. 211.

- R_x. Calomel. gr. j.
 Extr. Hyoscyami gr. j̄j.
 Gummi arab.
 Sacch. alb. ana gr. XV.
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. IV.
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.

*Richter.*N^o. 212.

- R_x. Liq. Ammon. succ. ʒj.
 Tr. Opii simpl. gtt. v̄j̄j̄.
 Syr. opiat. ʒj.
 M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel.

*Richter.*N^o. 213.

- R_x. Liq. Ammon. acet. ʒvj.
 Extr. Card. bened. ʒj.
 Tr. Opii simpl. gtt. v̄j̄j̄.
 Aq. flor. Sambuci ʒl̄v.
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
 (Bei trockenem Husten, zur Lösung.)

*Richter.*N^o. 214.

- R_x. Ol. Amygdal. dulc.
 Syr. Papav. ana ʒj̄j̄.
 Tr. Opii simpl. gtt. x̄j̄j̄.
 M. D. S. theelöffelweise.
 (Besonders bei heftigem Husten.)

*Richter.*N^o. 215.

- R_x. Spir. nitrico - aeth. ʒj.
 Syr. Papav. Rhoead. ʒj̄j̄.

M. D. S. theelöffelweise.
(Wie bei No. 214.)

Werlhoff.

N^o. 216.

Ry. Rad. Rub. tinct. ʒj.
— Eryngii camp. ʒvj.
Concis. coq. c. Aq. f. s. q.
per $\frac{1}{2}$ hor. sub fin. coct. adde
Rad. Salep. ʒj.
Col. express. ʒxjj.
adde
Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.
(In chronischen Fällen sehr wirksam.)

Richter.

N^o. 217.

Ry. Rasur lign. Guajaci ʒj.
Stipit. Dulcamar.
Flor. Arnicae
Rad. Calami aromat.
— Liquirit. ana ʒβ.
Sem. Foeniculi ʒjj.

G. C. D. S. Als Abkochung zum Thee.
(Wie bei No. 216.)

Hecker.

N^o. 218.

Ry. Gummi Ammon. dep.
Extr. Marrubii alb.
Pulv. Rad. Senegae ana ʒβ.
Sulph. aurat. antim.
Calomel. ana ʒj.

M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.
Consp. pulv. Lycopod. D.
S. Zwei bis dreimal täglich 6 Pillen.

(Bei Catarrhus habitualis.)

v. Wedekind.

D y s e n t e r i e.

Die Getränke richten sich nach dem Fieberzustande, und sind daher die bei den einzelnen Fieberarten angegebenen nachzusehen.

N^o. 219.

Ry. Natri nitrici $\bar{\text{ʒ}}\beta$. — $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
solve in
Aq. font. $\bar{\text{ʒ}}\text{vjij}$.
adde

Gummi Tragacanth. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

(Besonders bei vorherrschend entzündlichem Zustande.)

Mayer. (v. Versen. Rademacher.)

N^o. 220.

Ry. Cerae flavae $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.
Vitell. ov. No. III.
Aq. Menth. crisp. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.
Syr. Croci $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Vitell. ov. c. cer. in mort. cal.

tunc adde Aq. et Syr. D.

S. Esslöffelweise.

Vogel.

N^o. 221.

Ry. Pulv. Gummi arab. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.
solve in
Aq. fervid. suff. qt.

adde

Cerae flav. calef. ʒj.

admisce

Bals. peruv. gtt. XV.

Sacch. alb. ʒβ.

Syr. Papav. alb. ʒβ.

M. D. S. In drei Theilen mit Decoctum Althaeae
(Chamomillae, Millefolii) zu nehmen.

Kämpf. (Vogel.)

N^o. 222.R_x. Gummi arab. pulv. ʒij.

solve in mort. lap. in

Aq. ebull. q. s. admisce

Cerae flavae ʒij.

tere usque ad perf. mixt.

deinde adde

Syr. Papav. Rhoad. ʒj.

Elix. acid. Dippelii q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Hoffmann. (Wedekind.)

N^o. 223.R_x. Gummi arab. ʒβ.

Tr. Rhei aq.

Spir. Minderer. ana ʒij.

Syr. Papav. ʒij.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Bei Dysenteria catarrhalis.)

Hecker.

N^o. 224.R_x. Tr. Rhei aq.

— aurant. comp. ana ʒij.

— Valer. simpl. ʒij.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 225.

Ry. Aq. Chamomill. $\bar{\text{V}}$.
 Extr. Chamomill.
 Gummi arab. ana $\bar{\text{J}}\text{ij}$.
 Syr. opiat $\bar{\text{J}}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 226.

Ry. Aq. flor. Acaciae (font.) $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 Pulv. rad. Rhei elect. $\bar{\text{J}}\beta$.
 — — Ipecacuanhae gr. jj .
 Spec. Diatragacanth. $\bar{\text{J}}\text{ij}$.
 Spir. Vitrioli acid. gtt. XX .
 Syr. Alth. (Papav.) $\bar{\text{J}}\text{ij}$.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Vogler.

N^o. 227.

Ry. Ol. Amygdal. dulc. $\bar{\text{J}}\text{ij}$.
 Mucilag. Gummi arab. $\bar{\text{V}}\text{ij}$.
 Decoct. rad. Salep. $\bar{\text{J}}\text{X}$.
 Opii puri gr. jj .

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

Hecker.

N^o. 228.

Ry. Rad. Ipecacuanhae
 Opii thebaic. ana gr. β .
 Calomel.
 Sulph. stib. aurant. ana gr. j .
 Conch. praep. $\bar{\text{J}}\beta$.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

*Hecker.*N^o. 229.R_x. Opii puri

Calomel.

Rad. Ipecacuanh. ana gr. j.

Sacch. alb. gr. xjj.

M. D. S. Auf einmal mit einer Tasse warmem Fliederblüthentheee Abends vor dem Schlafengehn zu nehmen.

(Bei Neigung zum Nervösen mit Gr. j. Camphor.)

*Richter.*N^o. 230.R_x. Liq. Ammon. succ. ʒjjj.

Opii puriss. gr. IV.

Extr. Hyoscyami gr. vjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich 30 Tropfen unter Wasser zu nehmen.

(Bei Neigung zum Nervösen.)

*Richter.*N^o. 231.R_x. Vini stib. ʒjjj.

Tr. Opii simpl. ʒj.

M. D. S. Viermal täglich 20 Tropfen.

(Wie bei No. 230.)

*Richter.*N^o. 232.R_x. Extr. Hyoscyami gr. X.

Liq. Ammon. succ. ʒiβ.

Aq. flor. Sambuci ʒij.

Syr. flor. Chamomill. ʒβ.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(In gelinden Fällen, bei gallichter Complication.)
Richter.

N^o. 233.

℞. Aq. flor. Sambuci ʒvj.
Mucilag. Gummi arab. ʒj.
Extr. Nucis vomicae ʒβ.
Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
Hufeland. (Berends.)

N^o. 234.

℞. Emuls. communis ʒiv.
Gummi arab. ʒjj.
Extr. Nucis vomicae ʒβ.
Syr. Papav. alb. ʒjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
Hecker.

N^o. 235.

℞. Extr. Nucis vomicae ʒj.
Aq. Menth. pip. ʒiv.

M. D. S. Alle 2 Stunden 1 — 2 Esslöffel.
Horn.

N^o. 236.

℞. Ol. Olivar. opt. ʒvj.
Liq. Ammon. caust. ʒj.
Tr. Opii simpl. ʒβ.
Camphor. ʒj.

M. D. S. Mit der flachen Hand auf den Unterleib
einzureiben, oder mit einem Stück Flanell aufzulegen.
Richter.

N^o. 237.

- R. Sevi cervin. (vel bovin.) rec. $\bar{\text{z}}\beta$.
 Butyr. rec. non salit. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 Amyli contriti $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Opii puri pulv. $\bar{\text{z}}\beta$.
 Leni calore liq. misc.

D. S. Eine Haselnuss gross in den After zu bringen.
 (Gegen den Tenesmus.)

Vogler.

N^o. 238.

- R. Lin. sap. camph. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 Tr. thebaic. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 M. D. S. Auf den Unterleib einzureiben.

Vogel.

N^o. 239.

- R. Merc. subl. corros. gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{3}$.
 Aq. destill. $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Mucilag. Gummi arab. $\bar{\text{z}}\beta$.
 Opii puri pulv. gr. j.

M. D. ad vitrum. S. Ein Glas voll erwärmt als
 Clystir zu gebrauchen.

(Bei heftigen, den gewöhnlichen Mitteln trozenden Dysenterien und chronischen Diarrhoën.
 — Die Mischung muss wegen Zersetzung des Sublimats und Veränderung desselben zu Calomel jedesmal frisch bereitet werden.)

Kopp.

Acute Hautausschläge.

N^o. 240.

- R. Stipit. Dulcamar.
 Ligni Juniperi

Ligni Sassafras ana $\bar{3}j$.Rad. Liquirit. $\bar{3}\beta$.Fol. Sennae $\bar{3}jj$.

C. C. D. S. Zwei Esslöffel in 3 Nöseln Wasser zu einer Ptisane zu kochen.

(In der Desquamations - Periode.)

*Stark.*N^o. 241.Rx. Camphorae $\bar{3}j$ — $\bar{3}j$.

Vitell. ov. No. II.

M. f. Lin. D. S. Zum Bestreichen der kranken Stellen, oder auch mit Aq. Rosarum oder Decoctum Chinae verdünnt, in Tüchern überzuschlagen.

(Gegen hösertige Blattern.)

*Hecker.*N^o. 242.

Rx. Liq. Ammon. succ. gtt. XXX.

Moschi opt. gr. $\bar{3}jj$.

Tr. Opii croc. gtt. XXI.

Syr. opiat. $\bar{3}\beta$.M. D. S. Ungeschüttelt zu einem kleinen Theelöffel.
(Bei einsinkenden Blattern zur Zeit der Eiterung.)*Richter.*N^o. 243.Rx. Hydrarg. mur. corros. gr. $\bar{3}j$.Aq. Rosar. $\bar{3}iv$.

M. D. S. Mit einem Pinsel zu bestreichen.

(Bei Blattern auf der Sclerotica oder Cornea ad locum affectum.)

Hecker.

N^o. 244.

- R_x. Aq. flor. Sambuci ℥ iβ.
 Mel. rosat.
 Syr. Moror. ana ʒ iβ.
 Succ. Sempervivi maj. rec. express. ʒ iV.
 M. D. S. Mundwasser.
 (Bei Blattern im Munde.)

v. Stoerk.

N^o. 245.

- R_x. Moschi opt. gr. vj.
 tere c.
 Sacch. alb. ʒ j.
 Liq. Ammon. succ. gtt. XXX.
 Tr. Opii crocat. gtt. XX.
 Aq. flor. Sambuci ʒ V.
 Syr. Amygdal. ʒ j.
 M. D. S. Alle halbe bis ganze Stunden einen Esslöffel.
Hufeland.

N^o. 246.

- R_x. Amygdal. dulc. ʒ β.
 f. c. Aq. fl. Sambuci
 suff. qt. Emulsio.
 adde
 Extr. Hyoseyami gr. IV.
 — Opii aq. gr. j.
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen den Husten bei Masern.)

*Henke.*N^o. 247.

- R_x. Extr. Conii maculat.
 Sulph. dep. ana gr. vjjj.

H 1

Extr. Hyoscyami gr. jj .

Sacch. alb. gr. xj .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver.

(Wie bei No. 226.)

Richter.

N^o. 248.

R_x. Stibii sulphurati nigri

Lapid. Cancror. praep. ana ʒj .

Pulv. Rad. Jalappae ʒʒ .

Sacch. alb. ʒiʒ .

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver.

(Wie bei No. 226.)

Wendt.

N^o. 249.

R_x. Flor. Benzoës gr. IV.

Camphorae gr. jj .

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. VI.

D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

(Bei stockendem Auswurf, und Gefahr der Erstickung bei Masern.)

Hoffmann.

N^o. 250.

R_x. Theriac. ʒj .

Ol. Rorismarini express. ʒʒ .

— Cumini destill. gtt.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.

(Bei eintretenden Kolikschmerzen mit Durchfall, bei Masern. Zugleich Umschläge mit Chamillenblumen.)

v. Rosenstein.

N^o. 251.

- R_x. Aq. destill. $\bar{3}$ jj.
 Merc. subl. corros. gr. β .
 Mucilag. G. arab. $\bar{3}$ j.
 M. D. S. Augengewasser.
 (Gegen Ophthalmie und Photophobie bei Masern.)
Henke.

N^o. 252.

- R_x. Extr. Belladonnae
 e succo rec. et leni igne parat. gr. jjj.
 Aq. Cinnamomi $\bar{3}$ j.
 M. D. S. Kinder von 1 Jahr dreimal täglich 3
 Tropfen, mit jedem Jahr des Alters um einen Tropfen
 steigend. In höchster Dosis zu 12 Tropfen.
 (Als Praeservativ gegen Scharlach.)
Hufeland.

N^o. 253.

- R_x. Rad. Ipecacuanhae contus. $\bar{3}\beta$.
 inf. Aq. ferv. q. s.
 Col. $\bar{3}$ i β . adde
 Syr. Rubi Idaei $\bar{3}$ j.
 M. D. S. Zarten Kindern stündlich einen Theelöffel,
 grössern zu 2 Theelöffel.
 (Im Anfange des Scharlachs. Soll der Krank-
 heit einen gutartigen Charakter verleihen.)
Schlesinger.

N^o. 254.

- R_x. Acid. mur. oxygenat. $\bar{3}$ jj.
 Aq. Rubi Idaei $\bar{3}$ i β .
 Muc. Sem. Cydon.
 Syr. Althaeae ana $\bar{3}$ vj.
 M. D. S. Alle halbe bis ganze Stunden 1 — 1 $\frac{1}{2}$ Thee-

löffel für Kinder von 3 — 5 Jahren. Bei ältern
Kindern in stärkerer Dosis.
(Gegen Scharlachfieber.)

Kopp.

N^o. 255.

R_x. Pulv. Fol. Sabinæ ʒvj. — ʒj.
Ebull. c. Aq. ft. q. s.
Col. refrig. ʒvj. adde
Merc. subl. corros. gr. j.

M. D. S. Alle Stunden damit zu gurgeln und nach-
her auszuspülen.

(Gegen Angina gangraenosa beim Scharlach.)

(s. auch No. 232.)

Kopp.

N^o. 256.

R_x. Pulv. Cort. Chinae ʒβ.
Coq. c.
Aq. font. ʒxxxj. ad rem. ʒvj.
in fin. coct. adde
Rad. Polygal. Seneg. ʒjj.
Hb. Digital. purp. ʒj.
Col. adde

Spir. Nitr. aeth. ʒjj.

Roob Juniperi

Syr. Cort. Aurant. ana ʒβ.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel bis
Esslöffel voll.

(Gegen hydropische Affectionen nach Scarlatina.)

Richter.

N^o. 257.

R_x. Hb. Digital. ʒjj — IV.
inf. Aq. ferv. suff. qt.
Col. ʒvj. adde

Spir. Minderer. $\bar{\text{z}}\beta$.Syr. Cort. Aurant. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 255. und besonders empfehlenswerth.) *Bluff.*N^o. 258.R $\bar{\text{y}}$. Sulph. praecip. gr. vj.

Rad. Squill. gr. jj.

Cort. Winter. gr. vjj.

Sacch. alb. zj .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Drei Pulver täglich.

(Wie bei No. 256)

*Richter.*N^o. 259.R $\bar{\text{y}}$. Ol. Tereb. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Tr. Opii simpl. gtt. XV.

M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich nach dem Alter 1 — 3 Tropfen auf Brod.

(Wie bei No. 256.)

*Richter.*N^o. 260.R $\bar{\text{y}}$. Vini stib. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.Tr. Cantharid. $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Viermal täglich 15 — 20 Tropfen.

(Wie bei No. 256.)

*Hufeland. (Bucholz.)*N^o. 261.R $\bar{\text{y}}$. Cantharid. zj .Amygdal. dulc. excort. $\bar{\text{z}}\beta$.

contund. exactiss. adde sensim

Aq. Calcis $\bar{\text{z}}\text{x}$.Sacch. alb. $\bar{\text{z}}\beta$.

Col. sine express. D.

S. Alle 2 — 3 Stunden einen halben bis einen Esslöffel.
(Wie bei No. 256.)

Berends.

N^o. 262.

Ry. Syr. de Cichor. c. Rheo ʒvjjβ.

Tr. Rhei aquos. ʒβ.

Aq. Foeniculi ʒj.

Lap. Cancr. praep. ʒjj.

Groci oriental. gr. IV.

M. D. S. Umgeschüttelt alle halbe bis ganze Stunden einen Theelöffel voll, bis das Kind ruhig wird.
(Gegen Aphthen von Magensäure.)

Richter.

N^o. 263.

Ry Extr. Chinae frig. parat. ʒjj.

solve in

Aq. flor. Tiliae ʒjjj.

adde

Spir. muriat. aeth. ʒβ.

Syr. Cort. Citri ʒj.

M. D. S. Alle Stunden zwei Theelöffel.

(Gegen böartige brandige Aphthen.)

Lentin. (Wendt.)

N^o. 264.

Ry. Zinci sulph. crystall. ʒβ.

Aq. Rosar. ʒv.

Syr. Moror. ʒlβ.

M. D. S. Zum Pinseln.

(Gegen Aphthen.)

Berends.

N^o. 265.

- R_x. Boracis venet. ℥j. — ʒj.
 solve in
 Aq. Rosarum ʒj.
 adde
 Mellis rosati ʒiβ.
 M. D. S. Zum Pinseln.
 (Wie bei No. 264.)

*Vogel.*N^o. 266.

- R_x. Hb. Salviae ʒj.
 inf. c.
 Aq. font. q. s. ad
 Col. ʒj. adde
 Syr. nigri domest. ʒj.
 M. D. S. Zum Bepinseln, und um ein Leinwand-
 Lappchen damit zu befeuchten und aufzulegen.
 (Wie bei No. 264. Auch gegen wunde Brustwar-
 zen.)

*Kluge.*N^o. 267.

- R_x. Cort. Ulmi inter. ʒlv.
 Coq. ex Aq. ft. q. s.
 Col. ʒiβ. adde
 Syr. Rubi Idaei
 — Moror. ana ʒiβ.
 M. D. S. Gurgelwasser.
 (Wie bei No. 264. und 266.)

*Fuller.*N^o. 268.

- R_x. Vitrioli albi ʒβ.
 solve in
 Aq. font. ʒvj.
 adde
 Mellis Rosar. ʒj.

M. D. S. Gurgelwasser.
(Wie bei No. 264.)

Sproegel.

N^o. 269.

R_x. Merc. subl. corros. gr. IV.
Aq. destill. ℥ j.

M. D. S. Zum Ausspülen und Gurgeln.
(Wie bei No. 264.)

v. Wedekind.

N^o. 270.

R_x. Aq. Calcis vivae ℥iβ.
Syr. bals.
Gummi arab. ana ℥jj.

M. D. S. Zum Bepinseln.
(Wie bei No. 264.)

Weikard.

N^o. 271.

R_x. Terrae Gatechu ℥jjj.
Coq. in Aq. Calcis vivae ℥ j.
Col. ℥x. adde
Sacch. Saturn. ℥j.
Mell. rosat. ℥jj.

M. D. S. Gurgelwasser.
(Wie bei No. 264. Doch nur bei Erwachsenen,
wo keine Gefahr ist, dass beim Gurgeln etwas
heruntergeschlungen wird, anwendbar.)

Weikard.

N^o. 272.

R_x. Pulv. Cort. Chin. ℥j.
Coq. cum
Aq. font. ℥ j. ad Col. ℥vj.
adde

Acid. sulph. (muriat.) dilut. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Mell. Rosar.

Liq. Myrrhae ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Wie bei No. 264. Besonders bei Gefahr von
Uebergang in Brand.)

Richter.

N^o. 273.

R̄. Extr. Digital. purp. gr. jj — vj .

Calomel. gr. j .

Opii puriss. gr. β .

Sacch. alb. gr. XV .

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle drei Tage ein Pulver zu nehmen.

(Gegen Pemphigus.)

Richter.

N^o. 274.

R̄. Stib. sulph. nigr.

Pulv. Stipit. Dulcamar. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

Extr. Trifol. aquat. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj .

D. S. Dreimal täglich zehn Pillen.

(Wie bei No. 273.)

Richter.

N^o. 275.

R̄. Calomel.

Sulph. stib. aurant. ana gr. jj .

Stipit. Dulcamar.

Sacch. alb. ana gr. XV .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 273.)

Richter.

II. Chronische Krankheiten.

W a s s e r s u c h t.

No. 105. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

N^o. 276.

Ry. Crem. Tart. solub. ʒj.

Borac. venet. ʒj.

Extr. Trifol. fibr. ʒj.

Aq. flor. Naphae ʒvj.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden 1 — 2 Esslöffel.

Lentin.

N^o. 277.

Ry. Hb. Fumariae ʒj.

Coq. in s. q. Aq. per ½ hor.

Col. refrig. ʒiv.

adde

Liq. Kali acet. ʒβ.

Spir. mur. aeth. ʒjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Wendt.

N^o. 278.

Ry. Extr. Lactucæ virosæ ʒjj.

Tr. Digital. purp. ʒβ.

Aq. Cinnam. c. v. $\bar{3}$ l β .M. D. S. Alle 2 Stunden 30 — 50 Tropfen.
*Schneider.*N^o. 279.Ry. Arcani dupl. $\bar{3}$ vj.Rad. Jalapp. $\bar{3}$ jj.

— Squillae gr. vj.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
*Conradi.*N^o. 280.Ry. Crem. Tart. $\bar{3}$ l β .Magnes. alb. $\bar{3}$ j.

Rad. Squillae

Sacch. alb. ana $\bar{3}$ l β .M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden eine gute Messerspitze voll in Wasser gerührt zu nehmen.
*Jahn.*N^o. 281.Ry. Crem. Tart. $\bar{3}$ l β .Limaturae Ferri $\bar{3}$ jj.Rad. Squillae $\bar{3}$ j.

Ol. Sassafras gtt. vjjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 3 — 4 mal eine gute Messerspitze voll.
*Kausch.*N^o. 282.Ry. Sal. Herb. $\bar{3}$ j.

Acet. squill. q. s. ad saturat.

Aq. Petrosel. $\bar{3}$ jjj.Extr. Tarax. $\bar{3}$ jjj.

Roob Juniperi ʒvj.
M. D. S. Esslöffelweise.

Fritze.

N^o. 283.

R_x. Extr. Squillae gr. X — xvj.
Liq. Kali acet. ʒjj.
Aq. Petrosel. ʒiv.
Syr. Rhei ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Quarin.

N^o. 284.

R_x. Sal. Tart. ʒj.
Acet. squill. q. s. ad sat.
Aq. Chamomill. ʒiv.
Extr. Card. bened.
— Fumariae
— Trifol. fibr.
— Millefol. ana ʒj — jj.
Tr. Antimonii
— Martis aperitiv. ana ʒj.

M. D. S. Esslöffelweise.

(Besonders bei Hydrops von Unterleibs - Ver-
stopfungen.)

Selle.

N^o. 285.

R_x. Rad. Helen. ʒj.
inf. c. Aq. suff. q.
per $\frac{1}{2}$ hor.
Col. refrig. ʒiv.
adde
Kali carb. Acet. squill.
perf. sat. ʒβ.
Syr. flor. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Wendt.

N^o. 286.

℞. Rad. Squillae rec. ʒjj.
Kali acet. ʒβ.
Spir. Vini rectificati
Aq. destill. simpl. ana ʒjjj.

Digere per tres dies. D.

S. 10 — 80 Tropfen in Wein (steigend).

Berends.

N^o. 287.

℞. Rad. Squillae concis. ʒjj.
Kali caust. ʒjj.
Digere c. Spir. V. rectificati ʒj.
per triduum. Exprime. Filtra.
D. S. 10 — 30 Tropfen (steigend).

Hufeland.

N^o. 288.

℞. Camphorae
G. Guajaci ana ʒj.
Tart. emet.
Opii puri ana gr. jj.
Syr. simpl. q. s. ut f.
Pil. No. XX. D.

S. Zweimal täglich 3 Pillen. (Zugleich ein starkes
China - Decoct.)

Sproegel.

N^o. 289.

℞. Sulph. stib. aurant.
Rad. Squill.

H 2

II. Chronische Krankheiten.

Gummi Guttae

Extr. Pimpinellae ana ʒjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zwei bis dreistündlich eine Pille.
(Gegen Hydrops frigidus.)*Heim.*N^o. 290.R_x. Ipecacuanhae

Rad. Squillae

Sulph. stib. aurant. ana ʒβ.

Galbani ʒjj.

Extr. Pimpinellae ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Cinnamomi.

D. S. Dreimal täglich 5 Pillen.

*Heim.*N^o. 291.R_x. Extr. Pimpinell. alb.

Pulv. Squillae

Sulph. aurat. antim.

Gummi Guttae ana ʒjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Alle 2 — 3 Stunden eine Pille.

*Heim.*N^o. 292.R_x. Gummi Guttae ʒj.

— arab. ʒj.

Aq. font. ʒiv.

Liq. Kali subcarb. ʒj.

Syr. Althaeae ʒjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 293.

R_x. Crem. Tart. ʒj — ʒβ.
Pulv. Rad. Jalapp. ʒj.
Roob Sambuci
Oxymell. squill. ana ʒvj.

M. f. Elect. D. S. Bis zum Purgiren alle 2 Stunden 3 — 4 Theelöffel.

Weikard.

N^o. 294.

R_x. Extr. Helleb. vinos. ʒjj.
— Myrrhae ʒj.
Pulv. Card. bened. q. s.
ut f. Pil. No. XC.
D. S. Dreimal täglich 8 Pillen.

Bacher.

N^o. 295.

R_x. Aq. Petrosel. ʒiv.
Elaeosacch. Juniperi ʒjj.
Syr. Althaeae ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen vollen Theelöffel.
(Für Kinder.)

Wendt.

N^o. 296.

R_x. Rad. Levistici ʒj — ʒjj.
inf. aq. f. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.
Col. refrig. ʒvj. adde
Spir. muriat. aeth. ʒj. — ʒj.
Syr. flor. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen vollen Esslöffel.
(Für Kinder.)

Wendt.

N^o. 297.

- R_x. Bals. Copaivae ʒj.
 Ungt. Rorismarini comp. ʒj.
 M. D. ad vasculum. S. Zum Einreiben in den Damm
 und die Schaamgegend.
 (Für Kinder.) *Wendt.*
-

N^o. 298.

- R_x. Vitrioli Cupri
 Cort. Winter. ana ʒj.
 Gummi arab. q. s. ut. f.
 Pil. No. XXIV.
 D. S. Abends beim Schlafengehn eine Pille.
Wright.
-

N^o. 299. a)

- R_x. Fol. siccat. Hb. Nicotianae, virg. ʒj.
 Aq. ft. ebull. ℥j.
 Macera per horam in vase clauso
 in balneo Mariae posito; deinde
 exprime hujus infusi ʒXIV. Colat.
 adde
 Spir. Vini rectificati ʒjij.
 M. D. S. Morgens 50, Abends 100 Tropfen; stei-
 gend bis zu 200 Tropfen;
 zugleich *b*)
 R_x. Fol. sicc. Hb. Nicot. virg. ʒj.
 Spir. Vini tenuioris ℥j.
 Digere per 4 dies et cola.
 D. S. Von 50 — 100 Tropfen Abends zu nehmen.
Fowler.
-

N^o. 300.

- R_x. Hb. Pyrolae umbellatae ʒj.
 inf. c. aq. ft. ℥jij.

ad Col. ℥j.

D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.

*Sommerville.*N^o. 301.

Ry. Rad. Armoraciae ras. ℥v.
 digere frig. in vase clauso cum
 Cerevisiae ℥jj. per hor. XXIV.
 Col. adde

Syr. communis ℥j.

M. D. S. Tassenweise zu 1 — 2 ℥ täglich.
 (Auch bei Dysurie, Enuresis, Asthma pituitosum,
 und Verschleimung der Harnwege.)

*Hufeland.*N^o. 302.

Ry. Sem. Genistae ℥jj.
 Baccar. Juniperi M. jj.
 Rad. Petroselini M. jjj.
 Rad. Tritici rep. M. j.
 C. C. coq. c. Aq. ft. q. s.
 ad Col. Cong. dimid. D.
 S. Zum gewöhnlichem Getränk.

*Sproegel.*N^o. 303.

Ry. Rad. Squillae pulv. ℥j.
 Digere per hor. XXXXVIII.
 cum
 Vini albi mosellani Cong. β.
 Col. D. S. Alle zwei Stunden eine Tasse voll.
Sproegel.

N^o. 304.

R_x. Fol. Prassii
 Ligni Cervin.
 Fol. Hepat.
 Hb. Absynth. vulg.
 — Acetosell. ana M. j.
 C. C. adde
 Sal. Absynthii ʒjj.
 suspende in sacculo
 in
 Cerevisiae rec. Cong. IV.
 Digere per horas XXIV.

D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. Zu einem
 Pfund täglich. *Bate.*

N^o. 305.

R_x. Rad. Iridis
 — Enulae
 — Squillae ana ʒβ.
 Hb. Marrubii
 Flor. Sambuc. ebuli ana ʒj.
 Fol. Sennae ʒiβ.
 Agarici ʒjj.
 inf. cum
 Vini albi ℥IV. Col.

D. S. In einigen Tagen Morgens nüchtern aufzu-
 trinken. *Bate.*

Mittel gegen einzelne Arten
 der Wassersucht.

N^o. 306.

R_x. Summitat. Absynth. ʒj.
 Rad. Calami aromat.

Rad. Gentianae

— Imperator. ana $\bar{\text{ʒ}}\beta$.Bacc. Laur. $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.— Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{I}\beta$.Sem. Sinap. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.C. C. inf. c. Vini $\text{\textcircled{R}}\text{IV}$.Digere vase clauso per XXIV. horas
saepius agitando. Cola.

D. S. Dreimal täglich 2 Unzen (4 Löffel.)

(Gegen Anasarca.)

*v. Swieten. (Weikard).*N^o. 307.R $\bar{\text{y}}$. Hb. Digital. purp. rec. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.Coq. ex Aq. ft. $\text{\textcircled{R}}\text{I}\beta$.Col. $\bar{\text{ʒ}}\text{IX}$ adde

Aq. Juniperi

Syr. Cort. Aurant. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{I}\beta$.

M. D. S. Alle vier Stunden zwei Esslöffel, bis Erbrechen, Purgiren oder häufiger Urinabgang erfolgt.

(Gegen Anasarca)

*Warren.*N^o. 308.R $\bar{\text{y}}$. Calomel. gr. $\text{II}\beta$.Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.

D. S. Zweimal täglich ein Pulver.

(Gegen Hydrocephalus.)

*Göhlis.*N^o. 309.R $\bar{\text{y}}$. Ungt. Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.— Hydrarg. ciner. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$. — $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Kopf.

(Gegen Hydrocephalus.)

Göhlis.

N^o. 310.

- Ry. Hb. Digital. purp. gr. IX.
 Opii puriss. gr. jvj.
 Elaeosacch. Menth. pip. ʒjij.
 M. f. Pulv. Divide in partes IX. aeq.
 D. S. Täglich drei Pulver.
 (Gegen Hydrothorax.)

*Richter.*N^o. 311.

- Ry. Calomel.
 Sulph. stib. aurant.
 Opii
 Rad. Squill. ana gr. j.
 Sacch. alb. gr. XII.
 M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. XII.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Gegen Hydrothorax.)

*Richter.*N^o. 312.

- Ry. Roob Sambuci
 — Ebuli
 — Juniperi ana ʒvi.
 Pulv. Squill. comp. pharm. Lond.
 — Rad. Bryoniae
 Extr. Elater. ana ʒj. — ʒβ.
 Elect. theriac. ʒj.
 M. f. c. Syr. Rosar. Elect.
 D. S. Dreimal täglich eine Kastanie gross zu
 nehmen.
 (Zugleich ein diuretischer Thee.)
 (Gegen Hydrothorax.)

*P. Frank.*N^o. 313.

- Ry. Liq. Kali acet. ʒβ.
 Spir. nitric. aeth. ʒjij.

Oxymell. Colchici $\overline{\text{V}}$.

- M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel; zugleich ein
Decoctum Rad. Senegae und Rubiae tinctorum.
(Gegen Hydrothorax.) *Kämpf.*

N^o. 314.

- Ry. Hydrarg. oxydat. subsulph. gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$.
Sacch. alb. $\text{D}\beta$.
M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. VI.
S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Gegen Hydrothorax.) *Heim.*

N^o. 315.

- Ry. Hb. Digital. purp. gr. j.
Extr. Lactucae virosae gr. jj — IV.
Sacch. alb. $\text{D}\beta$.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Alle 2 — 3 Stunden ein Pulver.
(Gegen Hydrothorax; besonders das heftige
Herzklopfen beruhigend; auch gegen Ascites
empfohlen.) *Toel.*

N^o. 316.

- Ry. Pulv. Rad. Jalapp. $\text{D}\beta$.
Calomel. gr. jj .
Hb. Digital. purp. gr. j.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. s.
D. S. Alle drei Stunden ein Pulver, bis wässrige
Stühle erfolgen.
(Gegen Hydrothorax.) *Wolf.*

N^o. 317.

- Ry. Sap. venet. $\overline{\text{V}}\beta$.
Gummi Ammoniac.

- Rad. Squillae
 Milleped. ana $\bar{5}j$.
 Ol. Anisi gtt. VIII.
 M. f. Pil. pd. gr. $\bar{j}j$.
 Consp. pulv. Lycopod.
 D. S. Morgens und Abends 12—15 Pillen.
 (Gegen Hydrothorax. Auch gegen Ascites.)
Baldinger.
-

N^o. 318.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{5}j$.
 — stib. gr. IV.
 M. f. Pulv. Divide in partes XVI. aeq.
 D. S. Täglich 3—6 Pulver in Wasser zu nehmen.
 (Gegen Ascites.) *Richter.*
-

N^o. 319.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{5}j$.
 Boracis venet. $\bar{5}j$.
 solve in
 Decoct. fervid. Petrosel. $\bar{3}v$.
 adde
 Oxymell. squill. $\bar{5}j$.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Ascites.) *Sachtleben.*
-

N^o. 320.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{5}j$.
 Rad. Zingiberis
 Conserv. Rosar. ana $\bar{5}j$.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut. f. Elect. D.
 S. Theelöffelweise.
 (Gegen Ascites.) *Monro.*
-

N^o. 321.

- R. Tart. dep. $\bar{5}$ vj.
 Pulv. Rad. Rhei
 Spec. aromat. pharm. Lond. ana $\bar{3}$ j.
 Oxymell. squill. q. s.
 ut. f. Elect. D.

S. In 24 Stunden 3—4 Theelöffel, bis 3—4
 Stühle erfolgen.

(Gegen Ascites.)

Fordyce.

N^o. 322.

- R. Cort. Chin. reg. $\bar{3}$ j.
 Coq. c. Aq. font. q. s.
 in Col. ferv. $\bar{3}$ vjjj.
 solve
 Tart. dep. $\bar{3}$ jjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

P. Frank.

N^o. 323.

- R. Tart. boraxat. $\bar{3}$ j.
 Spir. nitr. aeth. $\bar{3}$ jj.
 Oxymell. squill. $\bar{3}$ j.
 Aq. Menth. crisp. $\bar{3}$ vjjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

Selig.

N^o. 324.

- R. Gummi Guttae gr. vjjj.
 ter. c. Vit. ov. No. I.
 Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}$ jj.
 M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

Werlhoff.

N^o. 325.R_x. Gummi Guttae ʒβ.

solve in

Liq. Kali carb. ʒβ.

M. D. S. Drei bis viermal täglich 30 Tropfen.

(Gegen Ascites.)

*Richter.*N^o. 326.R_x. Tart. dep.

Rad. Rhei ana ʒj.

Gummi Guttae gr. IV—XII.

Tart. stib. gr. β.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. VI.

D. S. Jeden Morgen nüchtern ein Pulver zu nehmen.

(Gegen Ascites.)

*Sachtleben.*N^o. 327.R_x. Gummi Ammoniaci ʒjj.

Nitri dep. ʒiβ.

Sal. Ammon. dep. ʒβ.

Pulv. Rad. Squillae ʒβ—ʒjj.

Magnes. Nitri ʒj.

Sulph. Antim. aurat. gr. V.

Aq. font. ʒvjj.

Syr. Althaeae ʒvj.

M. D. S. Umgeschüttelt alle Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

*Vogler.*N^o. 328.R_x. Rad. Squillae rec. ʒj.

Cort. Aurant.

Rad. Calami aromat. ana ʒjj.

inf. c.

Vini boni alb. ℞jjj.

Digere per tres dies.

Col. adde

Oxymell. squill. ℥jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 329.

℞. Kali sulph. ℥β.

Rad. Squill. rec. ℥j.

Sem. Foeniculi ℥jjj.

Cort. Cinnam. ℥β.

Elaeosacch. Cinnam. ℥jjj.

M. f. Pulv. D. S. Alle 3 Stunden zwei Theelöffel.

(Gegen Ascites.)

Regnaudat.

N^o. 330.

℞. Rad. Squillae gr. IX.

Kali nitrici

Baccar. Juniperi

Rad. Ari ana ℥j.

M. f. Pulv. Divide in partes IX aeq.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver mit einer Tasse

Wachholderbeerenthee.

(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 331.

℞. Pulv. Rad. Squill. ℥β.

Sulph. stib. aurant.

Ammon. carb. pyro-oleos. ana ℥j.

Extr. Elater. ℥jj.

Ol. Anisi gtt. vj.

Succi Liq. q. s. ut f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. 5 bis 10 Pillen auf einmal.
(Gegen Ascites.)

*Vogler.*N^o. 332.

R_y. Pulv. Rad. Squillae gr. X.
— Piper. nigr.
Kali nitrici ana gr. XV.
Pulv. Rad. Ipecacuanhae gr. V.
Opii puriss. gr. ꝑꝑ.
M. f. c. Syr. q. s. Bolus.
D. S. Auf einmal zu nehmen.
(Gegen Ascites.)

*Fordyce.*N^o. 333.

R_y. Extr. Squillae gr. β—j.
Ammon. muriat. mart. gr. vj.
Elaeosacch. Ment. pip. ꝑj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Ascites.)

*Richter.*N^o. 334.

R_y. Extr. Squillae gr. xꝑꝑ.
solve in
Aq. Ment. pip. ꝑvj.
adde
Liq. Kali acet.
Syr. Fumar. ana ꝑj.
M. D. S. Vier bis sechsmal täglich einen Ess-
löffel.
(Gegen Ascites.)

*Richter.*N^o. 335.

R_y. Kali carb. puriss. ꝑj.
Acet. squill. q. s. ad. sat.

Tr. Opii simpl. gtt. XXX.

Aq. Cinnam. s. v. $\bar{3}j$.

M. D. S. Morgens, Nachmittags und Abends je-
desmal den dritten Theil der Mischung.

(Gegen Ascites. Besonders nach Intermittens.)

Leake.

N^o. 336.

Ry. Acet. squill. $\bar{3}\beta$.

Kali carb. puriss. $\bar{5}j$.

Aq. Menth. pip. $\bar{3}vj$.

Tr. Antim. $\bar{5}jj$.

— Opii simpl. $\bar{5}j$.

Syr. Cort. Aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 335.)

Leake.

N^o. 337.

Ry. Oxymell. squill.

Aq. flor. Sambuci ana $\bar{3}iv$.

Liq. Kali acet. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Täglich dreimal 1 — 2 Esslöffel.

(Gegen Ascites; wird besonders gut vertragen,
und ist auch nicht so widerlich zu nehmen,
als die andern Zusammensetzungen mit Squilla.)

Richter.

N^o. 338.

Ry. Rad. Senegae

Sap. med.

Tereb. loric. ana $\bar{5}jj$.

Pulv. Cort. Chinae reg. $\bar{3}\beta$.

Syr. simpl. q. s. ut f. Elect.

D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
(Gegen Ascites.) *Berends.*

N^o. 339.

R_x. Pomor. Colocynth. ʒij.
ebull. per VI. Min. c.

Aq. font. q. s.

Col. ℥jj. adde

Spir. sulph. aeth. ʒjj.

Syr. Cort. Aurant. ʒjj.

M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
(Gegen Ascites. Besonders bei torpidem Zu-
stand.) *Sydenham.*

N^o. 340.

R_x. Res. Jalapp.

Calomel.

Sap. med. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnam.

D. S. Täglich 9 Pillen auf einmal zu nehmen.
(Wie bei No. 339.) *Brocklesby.*

N^o. 341.

R_x. Extr. panchymag. Crollii ʒj.

Elater. gr. XV.

Ol. Cinnamom. gtt. jj.

M. f. Pil. pd. gr. j.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 339.) *Sydenham.*

N^o. 342.

R_x. Scammonii ʒj.

Antimon. crud.

Crocī mart. aperit. ana ʒβ.
M. f. Pulv. D. S. Täglich 20 Gran mit einem Sy-
rup zu einem Bolus gemacht.
(Wie bei No. 339.) *Dover.*

N^o. 343.

Ry. Fol. Digital. purp. rec. ʒIV.
Concis. coq. c.
Aq. font. ℞ II. ad rem. ℞β.
Col. adde
Spir. Vini gall. ʒβ.
M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel, bis zur
Uebelkeit.
(Gegen Ascites, besonders mit krampfhafter Af-
fection und Verstopfung in den Unterleibs-Ein-
geweiden.) *Richter.*

N^o. 344.

Ry. Hb. Digital. purp. gr. j—jjj.
Calomel. gr. j.
Opii puriss. gr. β.
Elaeosacch. Menth.
Sacchar. alb. ana gr. vj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
(Wie bei No. 343.) *Richter.*

N^o. 345.

Ry. Extr. Digital. purp.
solve in
Vini stib. ʒj.
Tr. Opii simpl. ʒj.
M. D. S. Dreimal täglich 16—30 Tropfen.
(Wie bei No. 343.) *Quarin.*

N^o. 346.R_x. Extr. Digital. purp. ℥j.

Aether. sulph. ℥β.

Aq. Menth. pip. ℥x.

M. D. S. Alle 3 — 4 Stunden 1 — 4 Esslöffel.

(Wie bei No. 343.)

*Quarin.*N^o. 347.R_x. Extr. Digital. purp. ℥β.

Liq. Kali acet. ℥jj.

Tr. Opii simpl. gtt. XXXII.

M. D. S. Umgeschüttelt 3 mal täglich 1 — 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 343.)

*Richter.*N^o. 348.R_x. Tr. Digital. ℥jjj.

— Squillae kalin. ℥j.

M. D. S. Alle 2 Stunden 30 Tropfen.

(Wie bei No. 343.)

*Horn.*N^o. 349.R_x. Raphan. rust.

Baccar. Juniperi ana ℥j.

Contus. intime in mortar. vitreo

adde

Sal. Tart. puriss. ℥j.

Vini boni rhen. ℥ IV.

M. D. S. Drei bis viermal täglich 3 — 6 Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

*Monro.*N^o. 350.R_x. Ciner. Genist. ℥ jj.

inf. c.

Vin. rhen. opt. ℥ IV.

Baccar. Juniperi contus. M. j.

Stent in digest. per XXIV hor.

Col. D.

S. Drei bis viermal täglich ein Spitzglas voll.

(Gegen Ascites.) *van Swieten.*

N^o. 351.

R_y. Kali carb.

Hb. Absynth. ana $\bar{\text{ʒ}}$ j.

inf. cum

Vin. rhen. \mathcal{R} jj.

Digere per XXIV hor. Col.

D. S. Vier bis sechs Unzen in 24 Stunden zu ver-
brauchen.

(Gegen Ascites.)

P. Frank.

N^o. 352.

R_y. Kali carb. $\bar{\text{ʒ}}$ j.

Ferri pulv. $\bar{\text{ʒ}}$ IV.

Sem. Sinap. contus. $\bar{\text{ʒ}}$ jj.

inf. c.

Cerevis. amar. rec. \mathcal{R} xjj.

Stent in digest. per II dies. Col.

D. S. Drei bis viermal täglich eine halbe Theetasse voll.

(Gegen Ascites.)

P. Frank.

N^o. 353.

R_y. Pulv. Cantharid. gr. j.

Camphor. gr. jjj.

M. f. c. Mucilag. G. arab.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends eine Pille.

(Gegen Ascites; bei reizlosem torpidem Zustande.)

Richter.

N^o. 354.

R_x. Pulv. Cantharid. ʒβ—ʒj.
 Amygdal. dulc. ʒj.
 Sacch. alb. ʒβ.

Cont. in mort. lap. et fiat
 lent. aff. Aq. Cal. ʒx. Emuls.

D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 353.) *Herwig. (Hufeland.)*

N^o. 355.

R_x. Succ. Milleped. rec. express.

Liq. Kali acet. ana ʒβ.

Aq. Petrosel. ʒIV.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden 1—2 Esslöffel.

(Gegen frischen Ascites mit gereiztem Zustande.)

Richter.

N^o. 356.

R_x. Extr. Lactucae viros. gr. jj.

Hb. Digital. purp. gr. β.

Sacch. alb. gr. xjj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.

(Gegen Ascites. Fast als specifisch empfohlen.)

(Hufeland's Journal.)

N^o. 357.

R_x. Pulv. Cort. Chin. reg.

— — Aurant.

— Rad. Gentianae ana ʒβ.

— Cort. Cinnamom. ʒjj

Ferri pulverati ʒjj.

inf. c.

Vini boni rhen. ℥jj.

Stent in digest. loco calido saepius agit.
per XXIV hor. Col. D.

S. Dreimal täglich ein Weinglas voll.

(Gegen Ascites aus Atonie.)

Richter.

N^o. 358.

R_x. Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

Tr. Ferri acet. aeth. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Extr. Cort. peruv. frig. parat. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Dreimal täglich einen halben Esslöffel.

(Wie bei No. 357.)

Richter.

N^o. 359.

R_x. Pulv. Cort. Chin. reg.

— Rad. Gentianae

Ammon. muriat. mart. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Oxymell. squill.

Syr. Cort. Aurant. ana q. s. ut f. Elect.

D. S. Alle 3 Stunden ein Paar Drachmen zu nehmen.

(Besonders gegen Hydrops nach intermittirenden
Fiebern.)

Quarin.

N^o. 360.

R_x. Cupri sulph.

Opii puriss. ana gr. β .

Pulv. Cort. Cinnamom. gr. j.

M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s. pil. No. XII.

D. S. Morgens und Abends eine Pille.

(Wie bei No. 357.)

Chalmers.

N^o. 361.

R_x. Acet. squill. $\bar{\text{ʒ}}\text{iv}$.

Liq. Kali carb. q. s. ad saturat.

Gummi Ammoniaci $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

Extr. Chelidonii $\bar{5}j$.

Tart. stib. gr. vjj .

Aq. Menth. pip. $\bar{5}jjj$.

M. D. S. Alle drei Stunden 3 Esslöffel.

(Besonders gegen Ascites, von Verstopfung in
den Eingeweiden.) *Richter.*

N^o. 362.

Ry. Pulv. Rad. Arnicae $\bar{5}j$.

Sap. med.

G. Ammoniac. ana $\bar{5}jj$.

Extr. Chelidon. $\bar{5}\beta$.

Tart. stib. gr. jjj .

M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj .

Consp. D. S. Dreimal täglich 10—30 Pillen.

(Wie bei No. 361.)

Richter.

N^o. 363.

Ry. Tart. stib. gr. xjj .

Gummi Ammoniac.

Gummi Asae foet.

Sap. med.

Extr. Conii maculat. ana $\bar{5}jj$.

— Aloës aq. $\bar{5}j$.

M. f. Pil. pd. gr. j . Consperg.

D. S. Dreimal täglich 10—15 Pillen.

(Wie bei No. 361.)

Richter.

N^o. 364.

Ry. Hb. Digital. purp. $\bar{5}jj$.

inf. c.

Aq. ferv. q. s. ad Col. $\bar{5}j$.

Refrig. adde

Ol. Tereb. $\bar{5}j$.

Vitell. ovor. No. II.

F. l. a. Emuls. adde

Extr. Squillae ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib.

(Gegen Ascites.)

*Schubarth.*N^o. 365.

Ry. Baccar. Juniperi contus. ℞j.

inf. c. Aq. ferv. q. s. Exprime

D. S. Die heissen Wachholderbeeren zwischen Tüchern um das angeschwollene Gelenk gelegt, und oft erneuert.

(Bei Hydrops extremitatum aut articularum; besonders nach intermittirenden Fiebern.)

*Bluff.*N^o. 366.

Ry. Sal. ammon. puri ʒβ.

Aq. font. ʒxxx.

Spir. Vini rectificatiss. ʒij.

M. Solutio calefacta D.

S. Mit Tüchern zu Umschlägen.

(Gegen Hydrops articularum.)

*Vogler.*N^o. 367.

Ry. Lithargyri ʒvj.

Boli armeni ʒj.

Mastich.

Myrrhae ana ʒβ.

Aceti Vini ℞j.

Coque per $\frac{1}{4}$ horae. S. Dicke Tücher in diese Mischung zu tauchen, und lauwarm überzuschlagen.

(Gegen Hygroma cysticum patellae.)

Heister.

N^o. 368.

- R_x. Antim. tart.
 Hb. Digital. ana gr. j.
 Calomel. gr. V.
 M. f. Pulv. D. tal. Dos. q. l.
 S. Alle 2 Stunden ein Pulver, bis Purgiren erfolgt. Zugleich 3 — 4 mal täglich einen Esslöffel von einem Infusum Hb. Digitalis.
 (Gegen Hydrocele.) *Schaw.*
-

N^o. 369.

- R_x. Sal. ammon. dep. $\overline{3}\beta$ — $\overline{3}j$.
 solve in
 Aq. destill. $\overline{3}x$.
 M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Gegen Hydrocele infantum; schon seit den ältesten Zeiten empfohlen.)
v. Graefe.
-

N^o. 370.

- R_x. Sal. ammon. dep. $\overline{3}j$.
 Aceti
 Spir. Vini. rectific. ana $\overline{3}iv$.
 M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Gegen Hydrocele.) *Keate.*
-

B l u t f l ü s s e.

N^o. 371.

- R_x. Tr. Digital. purp. $\overline{3}jj$.
 — Opii crocat. $\overline{3}\beta$.
 Syr. Cinnamom. $\overline{3}j$.
 M. D. S. Alle 3 Stunden 30 Tropfen.
 (Gegen Blutflüsse mit Erethismus) *Hecker.*

N^o. 372.

- R_x. Tereb. venet. ʒjij.
 Acid. sulph. concentr. ʒv.
 M. in vitro aperto et successive
 adde
 Spir. Vini rectificati ʒijj.
 M. D. S. Alle Stunden 15—30 Tropfen.
 (Gegen Blutflüsse mit dem Charakter der Paralyse.)
Hecker.
-

N^o. 373.

- R_x. Opii gr. j.
 Cinnamomi ʒj.
 Ferri sulphurici gr. IV.
 Sacch. alb. ʒijj.
 M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.
 D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden ein Pulver, bis zum
 Nachlassen des Blutflusses.
 (Wie bei No. 372.)
Hecker.
-

N^o. 374.

- R_x. Kino ʒβ.
 Aluminis ʒj.
 Cort. Cinnamom. gr. xxxxvjjj.
 Sacch. alb. ʒijj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VI aeq.
 D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 372.)
Berends.
-

N^o. 375.

- R_x. Aluminis crudi
 G. Kino ana gr. v.—ʒβ.
 M. f. Pulv. D. tal. Dos. No. XII.
 D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 372.)
Conradi.
-

N^o. 376.

R_x. G. arab. ʒj.
 Cupri sulphurici ʒjj.
 Gummi Kino ʒj.
 Lap. haematit. ʒβ.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Zum Einstreuen.

(Bei äusserlichen Blutungen aus Wunden u. s. w.)
v. Gräfe.

N^o. 377.

R_x. G. Kino ʒβ.
 — arab. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Ein in Essig getauchtes Charpie-Bäuschchen mit diesem Pulver zu bestreuen, und auf die Stichwunde zu legen, dann grössere Charpie-Bäuschchen aufzulegen, und das Ganze mit einem Heftpflaster zu befestigen.

(Gegen zu lange andauernde Blutungen aus Blutigelstichen.)
Lentin.

N^o. 378.

R_x. Boli armen.
 Alum. rupei ana ʒβ.
 Sang. Dracon. ʒjj.
 Colcothar. vitriol. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Mit Eiweiss vermischt und auf Wieken gestrichen in die Nase zu bringen.

(Gegen Epistaxis.)

Griffith.

N^o. 379.

R_x. Ol. Hyoscyami coct. ʒβ.
 G. arab. ʒvj.

- Syr. Althaeae $\bar{5}j$.
 M. int. et aff. sensim
 Aq. Cerasor. nigr. $\bar{5}vj$.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Haemoptysis spastica.) *Harless.*
-

N^o. 380.

- Ry. Hb. Digital.
 Opii puri
 Calomel. ana gr. j.
 M. f. Pulv. Disp. tal. D. q. l.
 D. S. Alle ein bis zwei Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 379.) *Richter.*
-

N^o. 381.

- Ry. Plumbi acet. gr. v.
 Opii puri $\bar{9}\beta$.
 Extr. Millefol.
 Rad. Liquirit. ana $\bar{5}j$.
 M. f. l. a. pil. No. LX.
 D. S. Alle 4—6 Stunden 3 Pillen.
 (Gegen Haemoptysis und Metrorrhagia atonica.)
Jahn.
-

N^o. 382.

- Ry. Syr. Violar. $\bar{5}\beta$.
 Acid. sulph. dilut. $\bar{5}\beta$.
 Tr. Opii simpl. gtt. XXIV—XL.
 M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden 1—2 Theelöffel.
 (Gegen Haemoptysis atonica.) *Richter.*
-

N^o. 383.

- Ry. Extr. Lign. campech. $\bar{5}jj$.
 Sal. essent. Tart. $\bar{5}j$.

Aq. Cerasor. nigr. $\bar{3}v$ j.

Syr. Rubi Idaei $\bar{3}v$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 382.)

Kohlhäs.

N^o. 384.

R_x. Cupri sulphurici oxydati gr. IV.

solve in

Aq. Cinnamomi $\bar{6}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel, so dass keine Uebelkeit erfolgt.

(Wie bei No. 382.)

Hecker.

N^o. 385.

R_x. Acid. phosphor. $\bar{3}$ j.

Aq. font. destill. $\bar{3}\beta$.

Syr. Cerasor. nigr. $\bar{3}jj$.

M. D. S. Alle Viertelstunden 10 — 30 Tropfen.

(Wie bei No. 382.)

(Hufeland's Journal.)

N^o. 386.

R_x. Ol. Amygdal. dulc.

Syr. Papav. alb. ana. $\bar{3}$ j.

G. arab. $\bar{3}j$ — jj .

M. D. S. Alle halbe Stunden $\frac{1}{2}$ — 2 Theelöffel.

(Gegen Melaena und Mictus cruentus.)

Weikard

N^o. 387.

R_x. Lactis Mens. j .

Aluminis $\bar{3}$ j.

Sacch. alb. q. s. ad. gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Melaena. Das Mittel half in einem Falle, wo bereits alles Andere fruchtlos angewandt worden war.)

Bang.

N^o. 388.

- Ry. Tr. Opii simpl. ℥β.
 Aether. acet. ℥j — j̄j.
 Aq. Cinnam. simpl. ℥j — j̄j.
 — flor. Aurant. ℥iv — v.
 Syr. Cort. Aurant. ℥j.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ — 2 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Melaena, cum indicatione vitali.)

Berends.

N^o. 389.

- Ry. Tart. dep.
 Magnes. carb.
 Sulph. praecip.
 Sem. Foeniculi ana ℥j̄j.
 Camphorae gr. v̄j̄j.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.

D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver mit Thee von Hb. Millefolii.

(Gegen Molimina haemorrhoidalia.)

Richter.

N^o. 390.

- Ry. Kali tart.
 Extr. Marrubii albi ana ℥j̄j.
 Aq. Meliss. ℥j̄j̄j.

M. D. S. Morgens und Abends jedesmal die Hälfte zu nehmen.

(Gegen Haemorrhoiden.)

Hecker.

No. 391.

R_x. Kali tart. ʒjij.
 Rad. Rhei ʒj.
 (Sulph. praecip. ʒjj.)
 Magnes. carb. ʒiβ.
 Elaeosacch. Foeniculi ʒvj.

M. D. ad vitr. S. Drei bis viermal täglich einen
 Theelöffel.

(Wie bei No. 390.)

Klein.

N^o. 392.

R_x. Lact. Sulph.
 Sap. med. ana ʒβ. — ʒj.
 Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 390.)

Berends.

N^o. 393.

R_x. Kali tart. ʒβ.
 Extr. Myrrhae aq.
 Aloës ana ʒj.
 Aq. Menth. pip. ʒvj.

M. D. S. Zweimal täglich einen Esslöffel.

(Wie bei No. 390.)

Hecker.

N^o. 394.

R_x. Gummi ammoniaci in gr. ʒjj.

Aloës lucid.

Limat. Ferri ana ʒj.

Syr. balsam. q. s. ut. f. Pil. pd. gr. jjj.

D. S. Täglich 4 — 6 Pillen, bis leichter Stuhl erfolgt.

Zugleich ein Thee aus

R_x. Hb. Millefolii M. j.
 Flor. Tiliae.

Flor. Cardam. prat. ana M. β.

Rad. Zingiberis ʒj.

M. f. Spec. D. S. Zuzn Thee. (Tassenweise.)

(Gegen Haemorrhoiden mit Verstopfung.)

Gaubius. (Weikard.)

N^o. 395.

Ry. Calomel.

Aloës ana gr. j.

M. f. Pil. q. 1.

D. S. Abends beim Schlafengehn eine Pille.

(Gegen die Verstopfung bei Hämorrhoidal-Kran-
ken.)

Weikard.

N^o. 396.

Ry. Sal. Seidlizens. ʒj.

Aq. Meliss. ʒj.

Tr. Rhei aq. ʒj.

Elaeosacch. Citri ʒβ.

M. D. S. Löffelweise, bis Stuhlgang erfolgt.

(Wie bei No. 395.)

Hecker.

N^o. 397.

Ry. Extr. Millefol.

— Lign. campech.

Elix. acid. Halleri ʒj.

Aq. Menth. pip. ʒj.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden 50—60 Tropfen. Zu-

gleich äusserlich ein Cataplasma aus Semmelkrumen
mit Acet. saturn., oder mit Alaunmolken.

(Gegen zu heftigen Hämorrhoidal-Fluss.)

Sprögel.

N^o. 398.

Ry. Extr. Hellebori nigri ʒj.

Boracis

II. Chronische Krankheiten.

Extr. Myrrhae aq.

Elaeosacch. Cinnamom. ana ℥j.
solve in

Aq. Cinnamom. s. v. ℥ijj.
adde

Syr. Cort. Aurant. ℥β.

M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
(Gegen unterdrückte Hämorrhoiden.)

Richter.

N^o. 399.

Rx. Aloës ℥jj.

Pulv. fol. Sennae ℥j.

G. Asae foet.

— Galbani

— Myrrhae ana ℥β.

Ferri sulph. ℥ijj.

Croci oriental.

Macis ana ℥β.

M. f. c. Syr. flor. Chamomill. q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consperg.

D. S. Jeden Abend 10 Pillen.

(Wie bei No. 398.)

Richter.

N^o. 400.

Rx. Aloës

G. Asae foet.

Extr. Hellebori nigr.

Ferri sulphurici

Croci oriental. ana ℥j.

Elix. propr. q. s. ut f. Pil.

pond. gr. jj. Consperg.

D. S. Alle Abende 8 Pillen.

(Wie bei No. 398.)

Richter.

N^o. 401.

- R_y. Butyr. Cacao ʒβ.
 Ol. coct. Hyoscyami
 Spermaceti ana ʒjj.
 Camphorae ʒjj.
 Croci ʒj.
- M. f. Ungt. D. S. Auf leinene Läppchen gestrichen,
 und diese alle 3 Stunden frisch aufgelegt.
 (Gegen heftige Hämorrhoidal-Schmerzen.)
Meyer.
-

N^o. 402.

- R_y. Ungt. Zinci
 — alb. camphorat.
 — de Linar. ana ʒjj.
- M. D. S. Wie bei No. 401.
Sprögel.
-

N^o. 403.

- R_y. Flor. Linariae Pug. jj.
 Axung. porc. purif. q. s.
 Coque ut f. Ungt.
 Expresso et refrig. admisce
 Vitell. ov. No. I.
- M. D. S. Zum Aufstreichen auf die Haemor-
 rhoiden.
 (Wie bei No. 401.)
Wolf.
-

N^o. 404.

- R_y. Butyr. rec. non salit. ʒvjj.
 Amyli contrit. ʒj.
 Opii crud. pulv. ʒβ.
- M. D. S. Wie bei No. 402.
Vogler.
-

N^o. 405.

- R_y. Liniment. saponat. therieb. ʒβ.
 Aq. fl. Chamomill. (vel Aq. saturn.) ʒvj.

M. D. S. Zu Umschlägen.

(Gegen Haemorrhoides coecae urentes.)

Berends.

N^o. 406.

Ry. Calomel. gr. j — vj.

Pulv. G. arab. ʒβ.

Aq. Valerianae ʒiβ.

M. exactiss. D. S. Zum Clystir.

(Gegen krampfhaftige Hämorrhoidal-Beschwerden
im Mastdarm. Auch gegen Ascariden benutzt.)

Kopp.

N^o. 407.

Ry. Liniment. volatil.

Ol. Hyoscyami

— Chamomill. ana ʒjj.

Camphor. ʒjj.

Tr. thebaicae ʒjjj.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib.

(Gegen Hämorrhoidal-Kolik.)

Meyer.

N^o. 408.

Ry. Cremor. Lactis ʒjjj.

Ol. Myrrhae p. del. ʒjjj.

Pompholig. praep. ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Gegen Ausschlag und heftiges Jucken am After
und an den Schaanthteilen, von Hämorrhoiden
herrührend.)

Meyer.

N^o. 409.

Ry. Merc. praecip. alb. ʒj.

Camphor. ʒβ.

Opii pulv. ʒjj.

Ungt. pomat. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 408. Besonders gegen das Jucken
am Hodensack von Hämorrhoiden.) *Meyer.*

N^o. 410.

R_x. Opii $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Nitri dep. $\bar{\text{ʒ}}\nu\beta$.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 15 Gran.

(Gegen Metrorrhagia inflammatoria.)

Weikard.

N^o. 411.

R_x. Elix. Vitriol. Mynsicht. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Tr. Castor. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

— Opii crocat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. Zu 20 — 30 Tropfen.

(Gegen Metrorrhagia spastica.)

Richter.

N^o. 412.

R_x. Aq. Menth. pip.

— Meliss. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

Tr. Cinnamom. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Lap. haematit. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

Syr. Melissae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ Stunden 3 Esslöffel.

(Gegen passive Metrorrhagie.)

van Swieten (Plenk. Mursinna. Osiander. Ackermann.)

N^o. 413.

R_x. Lap. haematit. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Cort. Cinnamom. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel mit
Chamillenthee.

(Wie bei No. 412.)

Stark.

N^o. 414.

R_x. Limatur. Ferri puriss. $\bar{3}\beta$.

Rad. Columb. $\bar{\text{J}}\text{IV}$.

— Rhei opt.

Cort. Cinnam. acut. ana $\bar{\text{J}}\text{jj}$.

Extr. Absynth. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. $\bar{\text{J}}\text{j}$. Consp. pulv. Cinnam.

(Wie bei No. 412. Auch gegen Pollutio berühmt.)

Weikard.

N^o. 415.

R_x. Limat. Ferri puriss.

Sacch. ana $\bar{3}\beta$.

Cort. Cinnamom. $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. S. Zweimal täglich 40—60 Gran.

(Wie bei Nr. 414.)

Weikard.

N^o. 416.

R_x. Rad. Tormentill.

Cort. Chinae ana gr. j.

Sacch. alb. $\bar{\text{J}}\beta$.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 412.)

Bergius.

N^o. 417.

R_x. Aq. Menth. pip. $\bar{3}\text{j}$.

Tr. Cinnamom. $\bar{3}\text{j}$.

Alum. crud. $\bar{\text{J}}\text{j}$.

Syr. Diacod. $\bar{3}\text{j}$.

M. D. S. Alle Stunden 1 — $1\frac{1}{2}$ Esslöffel.
(Wie bei No. 412.)

Plenk.

N^o. 418.

R_x. Alum. rom. \mathfrak{z} j.
Sacch. Lact. $\mathfrak{z}\beta$.
Cinnamom. acut. \mathfrak{z} jj.

M. f. Pulv. Divide in partes VIII aeq.

D. S. Täglich ein Pulver mit $1\frac{1}{2}$ ℥ Milch bis zum Gerinnen zu sieden. Die mit hinreichendem Zucker versüßte Colatur wird kalt zur Hälfte Vormittags, zur andern Hälfte Nachmittags getrunken.

(Wie bei No. 412.)

Osiander.

N^o. 419.

R_x. Alum. kinosat. gr. j — jj.
Cort. Cinnamom.
— Cascarill. ana gr. v. — $\mathfrak{z}\beta$.
Sacch. Lact. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 412.)

Mursinna.

N^o. 420.

R_x. Rad. Rhei
Magnes. carb.
Boli armen. ana p. aeq.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.

(Wie bei No. 412.)

v. Hildenbrandt.

N^o. 421.

R_x. Extr. Chinae frig. parat.
Aluminis crudi
Flor. Sal. ammon. mart.
Pulv. aromat. ana $\mathfrak{z}\beta$.

K 1

Ol. Cinnamomi gtt. XII.

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Wie bei No. 412.)

Formey.

N^o. 422.

R_x. Sacch. Saturn. gr. vj.

Rad. Althaeae pulv.

Extr. Polygal. amar. ana ʒj.

M. f. Pil. No. LX. Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Zu 2—5 Pillen pro Dosi. Für einen Tag

10—20 Pillen.

(Wie bei No. 412. Siehe auch No. 381.)

Kopp.

N^o. 423.

R_x. Extr. Cort. Salicis ʒβ.

Alum. rom. ʒβ.—ʒj.

Aq. Cinnamom. simpl. ʒv.

Syr. Rubi Idaeii ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 412.)

Osiander.

N^o. 424.

R_x. Aluminis crudi gr. xv.

solve in

Aq. Menth. crisp. ʒiv.

adde

Tr. Cinnamomi ʒjjj.

Syr. Papav. ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 412.)

Rust.

N^o. 425.

R_x. Ol. Caryophyllor. gtt. x.

Naphthae Vitrioli ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 10 — 15 Tropfen.
(Wie bei No. 412.) *Thilenius.*

N^o. 426.

R̄. Vitrioli Cupri usti $\overline{\text{v}}\text{ijj}$.
Sang. Dracon. $\overline{\text{v}}\text{ij}$.
Spir. Vini rectificati $\overline{\text{v}}\text{XXXII}$.

Digere in vase vitreo clauso in balneo arenae per 4
dies, agitando aliquoties in die. Liq. decantetur.
S. 40 — 60 Tropfen täglich mit einer Unze Wasser
und einer Unze rothem Wein.
(Wie bei No. 412.) *Bishoprick.*

N^o. 427.

R̄. Secal. cornut. $\overline{\text{v}}\text{j}$.
Coq. c. Aq. ft. q. s. ad
Col. $\overline{\text{v}}\text{IV}$.
adde
Syr. Cinnamomi $\overline{\text{v}}\text{j}$.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden ein Drittheil davon zu
nehmen.
(Wie bei No. 412.)

Prescot. (Schneider. Carus.)

N^o. 428.

R̄. Magnes. alb.
Boli armen.
Elaeosacch. Macis ana $\overline{\text{v}}\text{jj}$.
Rad. Rhei. elect. $\overline{\text{v}}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. ad scatul. S. Dreimal täglich einen
Theelöffel.
(Gegen habituelle Metrorrhagien.) *Rust.*

N^o. 429.

R̄. Elix. aperitiv. $\overline{\text{v}}\text{jjj}$.
Aq. Laurocerasi $\overline{\text{v}}\text{j}$.

M. D. S. Alle 3 Stunden 30—50 Tropfen.
(Gegen schmerzhaftes Menses.) *Jahn.*

N^o. 430.

℞. Aq. Menth. pip. $\bar{\text{z}}\text{IV}$.
— Cinnamomi $\bar{\text{z}}\beta$.
Tr. Castor—
— Valer aeth. ana $\bar{\text{z}}\text{j}$.
Syr. Papav. alb. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Esslöffel.
Zugleich;

℞. Lin. volatil. camphorat. $\bar{\text{z}}\text{j}$.
Tr. Opii crocat. $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.
(Gegen schmerzhaftes Menses von Krämpfen. —
Besonders zu empfehlen.)

M. J. Schmidt.

N^o. 431.

℞. Fol. Sabinæ rec. $\bar{\text{z}}\text{j}$.
inf. Aq. ferv. suff. qt.
Col. $\bar{\text{z}}\text{vjjj}$. adde
Boracis $\bar{\text{z}}\text{j}$.
Sacch. alb. $\bar{\text{z}}\text{ij}$.
(Gummi arab. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.)

M. D. S. Bei nicht vorhandener Menstruation
dreimal täglich einen Esslöffel; während der
Menstruation alle 1—3 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen schmerzhaftes Menses aus Schwäche.)

Kopp. (Sundelin.)

N^o. 432.

℞. Flor. Sulph.
Rad. Rub. tinct.
Nitri dep.

Sacch. Lact. ana ʒj.

M. f. Pulv. D.

S. Zwei — viermal täglich eine Messerspitze voll
in einem Glase Wasser.

(Gegen Amenorrhöe mit Congestionen nach
anderen Theilen.) *Vogler.*

N^o. 433.

Ry. Extr. Opii aq. gr. j.

Camphorae gr. j — IV.

Ammon. muriat. dep. ʒj.

Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. D. in vitr. S. Viermal täglich einen
Theelöffel.

(Gegen Amenorrhöe aus Schwäche.)

Berends.

N^o. 434.

Ry. Extr. Rad. Hellebori

Aloës succ.

Ammon. muriat. mart. ana j.

Croci oriental. ʒj.

Opii puriss. ʒβ.

M. f. c. Tr. Rhei vinos. q. s.

Pil. pd. gr. j — D.

S. Morgens und Abends 8 — 12 Pillen.

(Gegen Amenorrhöe aus Atonie.)

Hecker. (Richter.)

N^o. 435.

Ry. Gummi ammoniaci

Aloës lucid.

Ferri oxydat. nigr. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. j — D.

S. Morgens und Abends 3—4 Pillen.
(Wie bei No. 434.)

*Carus.*N^o. 436.

R_x. Rad. Graminis $\bar{3}\beta$.
Summitat. Millefol.
Flor. Chamomill.
Fibrar. Hellebori ana $\bar{3}\beta$.
Sem. Anisi stellati $\bar{5}jj$.
C. M. S. Zum Thee.
(Wie bei No. 434.)

*Jahn.*N^o. 437.

R_x. Aloës succ.
Myrrhae elect.
Crocī oriental.
Flor. Sulph. ana $\bar{3}\beta$.
Fell. Tauri inspissat. q. s.
ut f. Pil. pd. gr \bar{j} . Consp.
D. S. Täglich 10—30 Pillen.
(Wie bei No. 434.)

*Richter.*N^o. 438.

R_x. Aloës dep. $\bar{3}\beta$.
Myrrhae elect. $\bar{5}jj$.
Elix. proprietat. q. s.
ut f. Pil. pd. gr. II. D.
S. Dreimal täglich 8—12 Pillen.

(Wie bei No. 434. Das Elix. proprietat. besteht aus gleichen Theilen Tr. Croci, Tr. Myrrhae und Tr. Aloës; und wird auch für sich zu 10—30 Tropfen ebenfalls zur Beförderung der Menstruation benutzt.)

Hecker.

N^o. 439.

- R_x. Aloës succ. $\bar{3}\beta$.
 Fol. Sennae $\bar{3}jj$.
 Asae foet.
 Galbani
 Myrrhae ana $\bar{3}j$.
 Sal. Martis $\bar{3}vj$.
 Croci
 Macis ana $\bar{3}\beta$.
 Olei Succini gtt. XL.
 Syr. Artemisiae q. s.
 ut f. l. a. pil. pd. gr. jj . Consp. pulv. Lycopod.
 D. S. Drei bis vier Wochen lang jeden Abend
 5 bis 10 Pillen.
 (Wie bei No. 434. Bei grosser Atonie.)

*Fuller.*N^o. 440.

- R_x Spir. Sal. ammon. caust.
 Tr. Croci
 Laud. liq. Sydenh. ana $\bar{3}j$.
 M. D. S. Zweimal täglich 20—30 Tropfen in ei-
 nem Glase kalten Wassers.
 (Wie bei No. 434.)

*Freind.*N^o. 441.

- R_x. Elix. propr. dulc. $\bar{3}jj$.
 Essent. Castor.
 Laud. liq. Sydenh. ana $\bar{3}j$.
 M. D. S. Zwei bis viermal täglich 50 Tropfen in
 einer Tasse Melissen-, Rauten-, Majoran- oder
 Schaafergarben-Thee.
 (Wie bei No. 434.)

*Stark.*N^o. 442.

- R_x. Aloës lucid.
 Myrrhae

Res. Juniperi

— Hederae

— Guajaci ana $\bar{3}\beta$.

Extr. Absynth.

— Millefol.

— Fumar.

— Card. bened.

Hellebori nigr. ana $\bar{3}j$.Rad. Rhei pulv. $\bar{3}vj$.Tereb. venet. $\bar{3}jj$.

M. f. Pil. pd. gr. j.

D. S. Zu 5—10 Stück pro Dosi.

(Wie bei No. 434. Auch gegen Stockungen in der Leber und den andern Abdominal - Eingeweiden, und gegen Schleimflüsse des Uterus und Rectum's empfohlen.) *Hufeland.*

N^o. 443.Rx. Borac. venet. $\bar{3}jj$.

Flaved. Cort. Aurant.

Elaeosacch. Foeniculi ana $\bar{3}l\beta$.Sacch. alb. $\bar{3}jjj$.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 434.)

*Stark.*N^o. 444.

Rx. Elix. aperit. Claud.

Tr. Sabinæ ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle 2—4 Stunden 30—60 Tropfen.

(Gegen Amenorrhoea paralytica. Die Tr. Sabinæ wird aus 2—3 Unzen Fol. Sabinæ und 12 Unzen Spir. Vini rectific. bereitet.)

Schreger.

N^o. 445.

- R_x. Pulv. Hb. Sabinae $\mathfrak{I}\text{V}$.
 Extr. Sabinae $\mathfrak{I}\text{ij}$.
 Ol. aeth. Sabinae gtt. XXX.

M. f. Pil. No. LX. D.

S. Dreimal täglich 5 Pillen.

(Wie bei No. 444.)

v. *Wedekind.* (verbessert von *Sundelin.*)

N^o. 446.

- R_x. Extr. Fol. Taxi gr. j — xjj.
 Calomel. gr. j — jjj.
 Sacch. alb. gr. XV.
 Ol. destill. Sabinae gtt. jj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 444.)

Hartmann.

N^o. 447.

- R_x. Boracis
 Nitri dep. ana $\mathfrak{I}\text{j}$.
 Magnes. alb. $\mathfrak{I}\text{j}\beta$.
 Sacch. alb. $\mathfrak{I}\text{ij}$.

M. f. Pulv. D. S. Stündlich einen Theelöffel.

(Gegen unterdrückte Menses und Lochien. —
 Bei gleichzeitigem Krampf kann man einen
 Gran Opium hinzusetzen.) *Sprögel.*

Fehler der Verdauung.

(Insofern eine vorhergegangene Krankheit die Ursache zu Leiden der Verdauung giebt, sind schon bei jenen mannichfache Mittel angegeben worden.)

N^o. 448.

R^x. Pulv. Lign. Quassiae $\bar{3}\beta$.
inf. c.

Aq. Calcis vivae $\bar{3}vj$.
stent in digestionem per horas XXIV.

Ebull. paulisp. Col. adde

Aq. Menth. pip. $\bar{3}jj$.

Syr. Cort Aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Magenschwäche.)

Richter.

N^o. 449.

R^x. Pulv. Lign. Quass. $\bar{3}jj$.

— Cort. Cinnamom. $\bar{3}j$.

Extr. Lign. Quass. q. s.

ut f. pil. pd. gr. II.

Consp. pulv. Cinnam.

D. S. Vor und nach dem Essen jedesmal 10 Pillen.

(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 450.

R^x. Lign. Quass.

Cort. Chin. reg. ana $\bar{3}j$.

gross. pulv. stent in infus.

frig. per XXIV hor. cum

Aq. font. (vel. Aq. Cort. Aurant.) $\bar{8}jj$.

Aq. Cinnamom. $\bar{3}IV$.

Col.

D. S. Zweimal täglich 1—2 Esslöffel.
(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 451.

Ry. Lign. Quassiae ʒj.
Cort. Cinnamon. ʒj.
Sacch. alb. ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes X aeq.
D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 452.

Ry. Extr. Taraxaci
— Graminis ana ʒj.
— Gentianae ʒj.
solve in
Aq. Cort. Aurant. ʒvj.
adde
Liq. anodyn. Hoffm.
Syr. Cinnamomi ana ʒβ.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 453.

Ry. Extr. Centaurii minoris
— Gentianae ana ʒj.
Ferri oxydulati nigri ʒβ.
Syr. Cort. Aurant. q. s.
ut f. pil. pd. gr. II.
D. S. Zu 12 Pillen pro Dosi.
(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 454.

Ry. Extr. Absynth.
Hb. Gentianae

Hb. Centaur. min.

Kali subcarbonici ana $\bar{3}\beta$.

Cort. Aurant. rec. $\bar{3}\text{j}$.

C. C. digere cum Spir. Vini Cong. $\frac{1}{4}$ et Col.

D. S. Zu 90 — 100 Tropfen pro Dosi.

(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 455.

Ry. Pulv. Cort. Chinae $\bar{3}\text{j}$.

— Caryophyllor. $\bar{3}\beta$.

Vini rhenani \mathcal{R} II.

Digere per XXXXVIII horas in vas. claus. Col.

D. S. Dreimal täglich ein kleines Glas voll.

(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 456.

Ry. Cort. Chinae $\bar{3}\text{j}$.

Rad. Gentianae rubr. $\bar{3}\text{j}$.

Cort. Aurant. $\bar{3}\text{j}$.

Vini alb. \mathcal{R} IV.

Digere per II dies. Cola et adde

Syr. Caryophyllor. $\bar{3}\text{j}$.

M. D. S. (Wie bei No. 455.)

Tissot

N^o. 457.

Ry. Rad. Calami aromat. $\bar{3}\text{j}$.

— Gentianae

Fruct. Aurant. immat. ana $\bar{3}\text{j}$.

D. S. Mit 2 Flaschen Burgunder an der Sonne digerirt, und täglich zweimal 1 — 2 Esslöffel zu nehmen.

(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 458.

Ry. Cort. Aurant. $\bar{3}\text{vj}$.

Contus. in mort. marm. in

mass. pulviformis. Adde

Extr. Gentianae rubr. $\bar{3}\beta$.

M. digere cum Vini hispanici $\bar{8}$ j.

Col. D. S. Zu einem Löffel voll (mit Wein oder Wasser) zu nehmen.

(Wie bei No. 447. — Elixirium stomachicum
Rosensteinii.) *Rosenstein.*

N^o. 459.

R_x. Elix. visceral. Kleinii

Tr. Rhei aq. ana $\bar{3}j$.

Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}j$.

M. D. S. Drei bis viermal täglich einen Esslöffel.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitiger Verstopfung.) *Klein.*

N^o. 460.

R_x. Rad. Columb. $\bar{3}j$ jj.

Sal. ammon. dep.

Rad. Zingiberis ana $\bar{3}j$.

Elaeosacch. Menth. pip. $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

(Gegen Magenschwäche mit Schleim.) *Hecker.*

N^o. 461.

R_x. Extr. Cort. Angustur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}lv$.

adde

Tr. Valer. $\bar{3}j$ jj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Gegen torpide Magenschwäche.) *Hecker.*

N^o. 462.R_x. Extr. Absynth.

— Trifol. fibr. ana ʒj.

solve in

Aq. Ment. pip. ʒiv.

Tr. Cort. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel voll mit rothem Wein zu nehmen.

(Wie bei No. 461.)

Richter.

N^o. 463.R_x. Pulv. Rad. Gentianae rubr.

— — Zedoariae ana ʒjjj.

— — Columb.

— Lign. Quass. ana ʒβ.

— Cort. Aurant. ʒj.

— — peruv. ʒj.

inf. c.

Vini alb. generos. ℞ III.

Stent loco tepid. saep. agitando. Decant.

S. Viermal täglich ein Weinglas voll.

(Wie bei No. 461.)

Richter.

N^o. 464.R_x. Chocolat. c. Sacch. et Vanill. parat. ʒj.

terendo in mortar. adde

Pulv. Rad. Ipecacuanhae ʒj.

M. f. l. a. pasta, ex qua f. tab. No. LX.

D. S. Zweimal täglich ein Zeltchen.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitigen Blähungen.)

Richter.

N^o. 465.R_x. Pulv. Rad. Ipecacuanhae ʒj.

Catechu ʒjj.

Ambrae griseae gr. jiiij.

Sacch. alb. \mathfrak{J} j.

M. f. l. a. c. suff. qt. G. arab.

Trochisci No. LX.

D. S. Täglich ein Zeltchen; steigend.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitigem Durchfall.) *Richter.*

N^o. 466.

R. Magnes. alb. \mathfrak{J} j.

Sacch. alb.

Rad. Liquiritiae ana. \mathfrak{J} jj.

Sem. Foeniculi

Cort. Aurantior. ana $\mathfrak{J}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Vier bis fünfmal täglich einen Theelöffel.
(Gegen Säure. S. No. 262.) *Rosenstein.*

N^o. 467.

R. Rad. Valer. min. \mathfrak{J} j.

— Irid. florent. $\mathfrak{J}\beta$.

— Liquirit. \mathfrak{J} jj.

Sem. Anisi $\mathfrak{J}\beta$.

Croci oriental. gr. vjjj.

Magnes. carb. \mathfrak{J} j.

M. f. Pulv. D. ad scatul.

S. Zwei bis dreimal täglich (und öfter) eine Messerspitze voll.

(Wie bei No. 466.)

Hufeland.

N^o. 468.

R. Magnes. carb. $\mathfrak{J}\beta$.

Rad. Rhei \mathfrak{J} j.

Rad. Valer. sylv. \mathfrak{J} j.

Elaeosacch. Foeniculi \mathfrak{J} jj.

M. f. Pulv. D. S. Zu einer Messerspitze.

(Wie bei No. 466. Auch gegen Blähungen, Kolik, Unruhe, Schlaflosigkeit, Verschleimung,

Durchfall, Verstopfung u. s. w. bei kleinen Kindern empfohlen, und insofern diese Erscheinungen von Säure herrühren, sehr passend.)

Hufeland.

N^o. 469.

- R_x. Aq. Foeniculi ʒj.
 Syr. de Cichor. c. Rheo ʒVIIβ.
 Tr. Rhei aq.
 Pulv. Lapid. Cancror. ana ʒβ.
 Croci oriental. gr. IV.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 468.) *Hufeland.*

N^o. 470.

- R_x. Sal. alcal. mineral. puriss. sicc.
 pulv. et aq. sua crystall. orbatu ʒjj.
 Crystall. Tart. ʒVI.
 Sacch. alb. opt. sicc. (Sacch. Lact.) ʒβ.

M. D. S. Alle vier Stunden einen Kaffeelöffel voll, in einem Glase Brunnenwasser, umgerührt schnell zu trinken.

(Wie bei No. 466.) *Vogler.*

N^o. 471.

- R_x. Magnes. Sal. amar. ʒj.
 Rad. Ipecacuanhae gr. jiiij.
 Sacch. alb. ʒvjj.
 Ol. de Cedro (vel Anisi) gtt. VII — XII.

M. f. Pulv. Det. ad vitr.

S. Täglich zwei bis viermal eine Messerspitze voll.
 (Wie bei No. 466. Auch gegen Fluor albus, Keuchhusten, Nachtripper, Harnblasen-Hämorrhoiden, und Fehler der Harnwege empfohlen.)

Vogler.

N^o. 472.

- R_y. Elix. acid. Halleri ʒβ.
 Decoct. Salep. ʒv.
 Syr. Rubi Idaei ʒj — Ib.

M. D. S. Während des Anfalls alle halbe Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Pyrosis.)

Seiler.

N^o. 473.

- R_y. Sap. med. ʒjj.
 Extr. Lign. Quass.
 Fell. Tauri inspissat. ana ʒj.
 Extr. Cort. Aurant.
 — Aloës aq. ana ʒj.

M. f. pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Im Anfall 8 Pillen.

(Wie bei No. 472.)

Richter.

N^o. 474.

- R_y. Kali carb. ʒjjj.
 Extr. Absynth. ʒjj.
 Aq. Ment. pip. ʒjjj.

M. D. S. Im Anfall Esslöffelweise.

(Wie bei No. 472.)

Richter.

N^o. 475.

- R_y. Magnes. Sal. commun.
 Sal. essent. Tart. ana ʒj.

M. D. ad scat. S. Alle zwei Stunden einen halben Theelöffel in einer halben Tasse Wasser während des Aufbrausens zu nehmen.

(Wie bei No. 466.)

Hufeland.

N^o. 476.

- R_y. Sap. venet. ʒj.
 Magnes. alb. ʒiβ.
 Rad. Rhei opt. ʒβ.
 Crem. Tart. ʒj.
 Sacch. alb. ʒjjj.
 M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.
 (Wie bei No. 466.)

*Stark.*N^o. 477.

- R_y. Conchar. ppt.
 Tart. vitriolat.
 Kali nitrici ana ʒj.
 M. f. Pulv. subtiliss. D.
 S. Täglich zwei bis dreimal einen Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 466.)

*Unzer.*N^o. 478.

- R_y. Chocolat. ʒjj.
 Magnes. calcinat. ʒj.
 Sacch. alb. ʒv.
 M. f. Trochisci pd. gr. XXIV.
 D. S. Im Anfall zu 1—2 Stück.
 (Wie bei No. 466.)

*Chevalier. (Hufeland.)*N^o. 479.

- R_y. Magnes. carb. ʒj.
 Lap. Cancr. ppt. ʒβ.
 Cort. Cinnamom. ʒj.
 Sacch. alb. ʒvj.
 pulv. f. c. Mucilag. G. arab. q. s.
 Trochisci gr. X. D.
 S. Drei bis viermal täglich ein Zeltchen.
 (Wie bei No. 466.)

J. A. Schmidt.

N^o. 480.R_x. Ol. Tart. per deliq. ʒβ.

Aq. Foeniculi ʒijj.

M. D. S. Morgens und Abends 80—90 Tropfen
oder einen Esslöffel,

(Wie bei No. 466.)

*Stark.*N^o. 481.R_x. G. Ammon.

Extr. Tarax.

Sap. venet. ana ʒj.

Asae foet.

Aloës ana ʒβ.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Gegen Schleim im Magen und Darmkanal.

Auch gegen Gicht empfohlen, S. auch No. 460.

468. 469.)

*Jahn.*N^o. 482.R_x. Sap. venet.

Pulv. Rad. Rhei

G. Ammoniaci ana ʒjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Zweimal täglich 5 Pillen.

(Gegen Schleim im Magen und Darmkanal.)

*Richter.*N^o. 483.R_x. G. Guajaci ʒj.

Res. Jalapp. gr. X.

Calomel. gr. VI.

M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s.

Pil. pd. gr. II. D.

- S. Dreimal täglich 3 Pillen.
(Wie bei No. 482.)

Richter.

N^o. 484.

- R_x. Lign. Quassiae
Rad. Gentianae ana ʒj.
Elaeosacch. Menth. pip.
— Foeniculi ana ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.
D. S. Viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Blähungen. S. auch No. 464. 468. 469.)
M. J. Schmidt.
-

N^o. 485.

- R_x. Magister. Bismuth. gr. jj — jiiij.
Magnes. alb. gr. IV.
Elaeosacch. Anisi (Sacch. alb.) gr. vjiiij.
(Rad. Ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$.)
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Täglich viermal ein Pulver.
(Gegen Ekel und Erbrechen. Wo Säure die
Ursache ist, s. No. 466 — 480.)

Kopp.

N^o. 486.

- R_x. Mixt. River. ʒiβ.
Tr. thebaicae ʒβ.
M. D. S. Alle drei Stunden 25 — 30 Tropfen in
Melissenthee.
(Wie bei No. 485.)

Stark.

N^o. 487.

- R_x. Essent. Ambrae ʒj.
Elix. Vitriol. Mynsicht. ʒjii.

- M. D. S. Drei bis viermal täglich 20 — 30 Tropfen.
(Gegen Vomitus Gravidarum, wo keine entzündliche Plethora ist.) *Waiz.*
-

N^o. 488.

- R_x. Rad. Columb. ʒj.
Opium puri gr. ʒj.
Elaeosacch. Menth. crisp. ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver in Wasser zu nehmen.
(Gegen Erbrechen. Aeusserlich Lin. volatil. und Tr. Opium zum Einreiben in die Magengegend.) *Vogel.*
-

N^o. 489.

- R_x. Tr. Cort. Aurant. ʒβ.
— Aloës
— Castor. ana ʒj.
M. D. S. Drei bis viermal täglich 50 Tropfen in Wasser.
(Wie bei No. 488.) *Vogel.*
-

N^o. 490.

- R_x. Nucis moschat. gr. ʒjʒ — IV.
Sacch. alb. ʒj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver in Wasser.
(Wie bei No. 488.) *Vogel.*
-

N^o. 491.

- R_x. Spir. Rorismarini ʒj.
Ol. Anisi gtt. vj.
M. D. S. Auf Löschpapier getropft, und auf die Magengegend zu legen.
(Besonders gegen das Erbrechen durch Fahren.) *Vogel.*

N^o. 492.

- R_x. Ol. Hyoscyami
 — Papav. alb. ana $\bar{3}\beta$.
 Liq. C. C. succ.
 Laud. liq. Syd. ana $\bar{5}\text{jjj}$.
 M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben in die Magen-
 gegend.
 (Gegen das Erbrechen von der Seekrankheit.)
Krampf.
-

N^o. 493.

- R_x. Empl. de Galbano crocat. $\bar{3}\text{j}$.
 Camphorae $\bar{3}\text{j}$.
 Sal. vol. C. C.
 Opii puriss. ana $\bar{3}\beta$.
 Ol. Cajeput. gtt. XL.
 M. D. S. Auf Leder gestrichen, auf die ganze Ma-
 gengegend zu legen.
 (Wie bei No. 492.) (*Hufeland's Journal.*)
-

N^o. 494.

- R_x. Extr. Belladonnae gr. jj .
 solve in
 Aq. Laurocerasi $\bar{5}\text{jj}$.
 M. D. S. Dreimal täglich 40—50 Tropfen.
 (Gegen Erbrechen von Magenerweichung.)
Hufeland.
-

N^o. 495. a)

- R_x. Sal. Tart. acet. $\bar{3}\text{l}\beta$.
 Extr. Cicut. $\bar{3}\beta$.
 — Nuc. vom. gr. xvj.
 — Tarax. $\bar{5}\text{jjj}$.
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}\text{vj}$.
 Syr. Tarax. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Zugleich b)

R̄. Hb. Belladonnae gr. ʒʒj.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Alle Abende (oder einen Tag um den andern)
ein Pulver.

(Wie bei No. 494.)

Schmidtmüller.

N^o. 496.

R̄. Acid. pyro-lignos. ʒj.

Aq. flor. Naphae ʒʒj.

Syr. emulsiv. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen halben Esslöffel.

Zugleich Gerstenschleim, Zuckerwasser, Fenchel- und
Anisthee.

(Gegen Gastromalacie. Besonders bei Kindern.)

Pittschafst.

N^o. 497.

R̄. Acidi nitrici dil. gr. IV — V.

Mucilag. G. arab. Vascul. Theae.

D. S. Vier bis fünfmal täglich pro Dosi.

(Wie bei No. 496.) *Nasse. (Wiesmann.)*

N^o. 498.

R̄. Decoct. Rad. Althaeae ʒʒj.

G. arab. ʒʒj.

Ferri muriat. ʒβ.

Syr. Althaeae ʒvj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel. Zu-

gleich auf den Kopf kalte Umschläge; auf die

Magengegend warme Umschläge mit Cort. Chin.

rubr., Cort. Salicis, Cort. Hippocast., Spec. aro-

mat. und rothem Wein.

(Wie bei No. 496.)

Pommer.

N^o. 499.

Ry. Empl. Theriaci $\bar{5}$ jj.
Morphii acet. gr. vj.

M. D. S. Auf Leder gestrichen, auf die Magen-
gegend zu legen.

(Wie bei No. 496.)

Margot.

N^o. 500.

Ry. Sap. venet. $\bar{3}\beta$.
Extr. Cicut. $\bar{5}$ jj.
Aeth. antim. $\bar{5}$ j.
Fell. Tauri inspiss. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Täglich drei bis viermal 8—10 Pillen.

(Gegen Induratio Pylori.)

Pezold.

N^o. 501.

Ry. G. Ammoniaci
Kali acet. s. Acet. squill.
q. s. ad. solut. et. inspiss. ana $\bar{5}$ jjj.
Sap. venet.

Pulv. Rad. Rhei

Extr. Chelidon. maj.

— Trifol. fibr.

Fell. Tauri inspissat. ana $\bar{5}$ j.

Extr. Lactuca^e viro^ae $\bar{3}\beta$.

Calomel.

Sulph. aurat. Antim. ana gr. XV.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Irid. florent.

D. S. Täglich zweimal 6—8 Pillen.

(Gegen Gekrösstockungen. Zugleich ein eisen-
haltiges Mineralwasser.)

Schen.

B l e n n o r r h ö e n .

N^o. 502. a)R_x. Pulv. Rad. Columb.

Lign. Quassiae ana ʒβ.

Rad. Ipecacuanhae ʒβ.

Tr. thebaicae q. s.

ut. f. Pil. No. XV.

D. S. Abends 3 Pillen.

Zugleich b)

R_x. Infus. Lign. Quassiae ʒiβ.

Tut. praep. ʒβ.

Tr. thebaic. gtt. jiiij.

M. f. Haustus. D. S. Dreimal täglich pro Dosi.

(Gegen Diarrhoea. — S. No. 250. 442. 465. 468.

469. und die zur Dysenterie angegebenen Mittel.)

Lettsom.

503.

R_x. Cort. Querc.

— Granator.

— Tormentill. ana ʒjj.

Coq. c. Aq. font.

Lact. vaccin. ana ʒj.

per $\frac{1}{4}$ hor. In fin. coct. adm.

Cort. Cinnamon. contus. ʒjj.

Col. D. S. Zwei bis viermal täglich $\frac{1}{2}$ Tasse.

(Wie bei No. 502.)

*Swediaur.*N^o. 504.R_x. Extr. Gentianae ʒiβ.

Spec. diatragacanth. ʒβ.

Pulv. Terrae japon. ʒjj.

Opii gr. jiiij—IV.

Spir. Vitrioli acid. gtt. xjj.

L 1

Aq. Menth. ̄IV .M. D. S. Ungeschüttelt alle 2—4 Stunden einen
Esslöffel.

(Wie bei No. 502.)

*Vogler.*N^o. 505.R_x. Rad. Rhei. opt. gr. ̄jjj —v.

— Columb. gr. x.

Nucis moschat. gr. v.

Elaeosacch. Foeniculi gr. x.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 502.)

*Berends.*N^o. 506.R_x. Infus. Lign. Quassiae $\text{̄VII}\beta$.Aq. Laurocerasi $\text{̄}\beta$.

M. D. S. Dreimal täglich 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 502.)

*Schlegel.*N^o. 507.R_x. Rad. Ipecacuanhae gr. ̄jj .— Rhei opt. gr. ̄xjj .

Lap. Cancror. pp.

Elaeosacch. Macidis ana $\text{̄}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in partes VI aeq.

D. S. Täglich dreimal einen Theelöffel mit Schleim.

(Wie bei No. 502.)

*Sundelin.*N^o. 508.R_x. Pulv. Rad. Columb. ̄j .

Elaeosacch. Macidis gr. x.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Alle 4 Stunden ein Pulver in Kaffee oder
Wasser.

(Wie bei No. 502.)

J. A. Schmidt.

No. 509.

- R. Rad. Salep. ʒβ.
 Coq. c. Aq. ft. ʒvjij.
 Col. adde
 Sal. Ammoniaci ʒj.
 Tr. Rhei aq. ʒj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒj.
 Syr. Diacodii ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 502.) *Stark.*

No. 510.

- R. Spir. Juniperi ʒij.
 Ol. destill. Caryophyll.
 Bals. Nucis moschat. ana ʒβ.

M. D. S. Täglich dreimal in den Rücken einzu-
 reiben.
 (Wie bei No. 502.) *Rosenstein.*

No. 511.

- R. Aq. Anhaltin. spir. ʒij.
 Tr. Bals. peruv.
 — — Nucist. ana ʒβ.
 Ol. Menth. pip.
 — Caryophyll. ana gtt. xjj.

M. D. S. Morgens und Abends den Unterleib da-
 mit einzureiben, und nachher eine warme Ser-
 viette aufzulegen.

(Wie bei No. 502.) *Fr. Hoffmann.*

No. 512.

- R. Ol. Nucis mosch. express. ʒiβ.
 — destill. Mastiches
 — — Menth. pip.

- Ol. destill. Carvi
 Bals. peruv. ana gtt. vj.
 M. D. S. Morgens und Abends etwas in die Ma-
 gengegend einzureiben.
 (Wie bei No. 502.) *Heister.*
-

N^o. 513.

- R_x. Empl. de Tacamahac. ℥j.
 Bals. peruv. q. s.
 Malax. S. Wie bei No. 512. *Vogel.*
-

N^o. 514.

- R_x. Extr. Columb. ℥j.
 Bals. Nuc. mosch. expr. ℥β.
 Laud. liq. Sydeuh. gtt. XX—XXX.
 Camphorae ℥β.
 M. D. S. Als Pflaster auf den Unterleib.
 (Wie bei No. 502. — Besonders für Kinder.)
Vogel.
-

N^o. 515.

- R_x. Vitell. ovi unius
 G. arab. ℥j.
 Aq. flor. Chamomill. ℥iv.
 M. D. S. Zum Clystir.
 (Gegen epidemischen Durchfall.)
v. Hildenbrandt.
-

N^o. 516.

- R_x. Sal. ammon. dep. ℥j.
 solve in
 Aq. flor. Chamomill. ℥j.
 Mucilag. G. arab. ℥j.
 adde

Tr. Rhei aq. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Esslöffel.

(Wie bei No. 515.)

*Richter.*N^o. 517.Ry. Tr. Rhei. aq. $\bar{3}j$.Aq. flor. Chamomill. $\bar{3}jj$.

Ol. Oliv. c. s. g. vitell, ov. subact.

Syr. opiat. ana $\bar{3}vj$.M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 515. Besonders gegen heftige Schmerzen.)

*Richter.*N^o. 518.

Ry. Amygdal. dulc. excort.

Sem. Papav. alb. ana $\bar{3}\beta$.Mucilag. G. arab. $\bar{3}jj$.

ter. aff. sensim

Aq. fl. Sambuci $\bar{3}xjj$.

f. l. a. Emulsio.

Adde

Syr. opiat. $\bar{3}j$.

M. D. S. Halbe Theetassenweise.

(Besonders gegen wässrigen Durchfall.)

*Richter.*N^o. 519.

Ry. Gummi arab.

Flor. Chamomill, ana gr. xv.

Rad. Rhei gr. IV.

— Ipecacuanhae gr. β .Croci oriental. gr. jj .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.

(Gegen wässrigen Durchfall mit gleichzeitigen
Leibschmerzen.) *Richter.*

N^o. 520.

R_x. Decoct. Rad. Althaeae
ex $\mathfrak{D}\text{IV}$ parat. $\mathfrak{Z}\text{ijj}$.
Extr. Dulcamar. gr. vjjj .
Laud. liq. Sydenh. gtt. jj .
Syr. Diacodii $\mathfrak{Z}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
(Gegen katarrhalischen Durchfall. Besonders
bei Kindern.) *Gölis.*

N^o. 521.

R_x. Spir. Minderer.
Aq. flor. Sambuci ana $\mathfrak{Z}\text{ii}\beta$.
Tr. Aurant. $\mathfrak{Z}\beta$.
Syr. Diacod. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.
(Gegen katarrhalischen und rheumatischen
Durchfall.) *Vogel.*

N^o. 522.

R_x. Camphorae $\mathfrak{Z}\beta$ — $\mathfrak{Z}\text{j}$.
Pulv. G. arab.
Elaeosacch. Cinnamom. ana $\mathfrak{Z}\text{jj}$.
solve trit. in
Aq. Ment. pip. $\mathfrak{Z}\text{vj}$ — vjjj .

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 521.) *Vogel.*

N^o. 523.

R_x. G. arab. $\mathfrak{Z}\beta$ — j .
Sacch. alb. $\mathfrak{Z}\text{jj}$.

Aq. Foeniculi $\bar{3}v$.Spir. Minderer. $\bar{3}j$.Tr. thebaic. $\bar{3}\beta - j$.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 521.)

*Vogel.*N^o. 524.Ry. Aq. flor. Sambuci $\bar{3}IV$.

Liq. Ammon. acet.

Syr. Amygdal. ana $\bar{3}j$.Roob Sambuci $\bar{3}jj$.Vini stib. $\bar{3}j$.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 521. Besonders bei gleichzeitigem
Fieberzustand.)*Richter.*N^o. 525. a)

Ry. Sacch. Saturn.

Opii puri ana gr. jj.

Elaeosacch. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in partes XII aeq.

D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.

(Gegen colliquative Diarrhoea.)

*Vogel.*N^o. 525. b)

Ry. Tereb. puriss. vitell.

ov. int. subact. $\bar{3}\beta$.Elect. theriac. $\bar{3}\beta$.Lact. vaccin. rec. $\bar{3}IV$.M. D. S. Zum Clystir. (Der Kranke soll auf der
linken Seite liegen, und so lange als möglich das
Clystir bei sich zu behalten suchen.)

(Wie bei No. 525. a.)

van Swieten.

N^o. 526.

R_x. Decoct. Althaeae (vel Rad. Salep.) $\bar{3}$ jj.
Laud. liq. Syd. gtt. jj.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel.
(Gegen Diarrhoea infantum. S. No. 520.)

Gölis.

N^o. 527.

R_x. Elect. de Scord. $\bar{3}$ jj.
Tr. Cort. Aurant. (vel Tr. aromat.) $\bar{3}$ jjj.
Aq. Cinnamomi $\bar{3}$ iv.

M. D. S. Zu 1 — 2 Theelöffel mit Syrup.
(Wie bei No. 526.)

Weikard.

N^o. 528.

R_x. Calomel. gr. j.
Sacch. alb. $\bar{3}$ j.

M. f. Pulv. Divide in partes X (aut VIII) aeq.
D. S. Zwei bis dreimal täglich ein Pulver.

(Wie bei No. 526. Wenn grüne Stühle ab
gehen, ist die Prognosis günstig zu stellen.)

Kopp.

N^o. 529.

R_x. Ol. Amygdal. dulc.
Pulv. G. arab.
Syr. Amygdal. ana $\bar{3}$ jj.
Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}$ β.
— Foeniculi $\bar{3}$ j.

M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Theelöffel.
(Gegen Diarrhoea infantum vom Zahndurch-
bruch.)

Richter.

N^o. 530.

- R_x. Extr. Gentianae rubr. ʒiiβ.
 Pulv. Squillae comp. Stahlii
 — G. ammoniaci ana ʒjj.
 Magnes. Nitri ʒβ.
 Sulph. aurat. Antimon. gr. xv.
 M. f. c. Spir. Vin. suff. qt. Pil. No. C.
 D. S. Täglich 5—7 Pillen.

(Gegen chronische Diarrhöe und Lienterie;
 besonders mit Infarctus der Eingeweide.)

Vogler.

N^o. 531.

- R_x. Conserv. Rosar. ʒvj.
 Theriaci ʒjjj.
 Pulp. Cydonior. q. s.
 ut. f. Elect. D.

S. Einigemal täglich ein Loth, ohne etwas nachzu-
 trinken.

(Gegen Lienterie.)

(P. Frank.)

N^o. 532.

- R_x. Cort. peruv. pulv. ʒjj.
 — Aurant. pulv.
 Rad. Serpentar. virg. pulv. ana ʒi.
 inf. c. Vin. lisbon. ℥jj. per IV dies.
 Col. admisce
 Aq. Cinnamom. vinos. ℥β.
 Spir. Lavandulae comp. ʒjj.
 M. D. S. Alle 4—5 Stunden zwei bis drei Ess-
 löffel.

(Wie bei No. 531.)

Tompson.

N^o. 533.

- R_x. Limaturae Martis alcohol.
 Cort. Cinnamom. ana gr. xjj.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. Divide in partes XII aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 531.)

Bucholz.

N^o. 534.

Ry. Spir. Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.

Bals. moschat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Ol. Nuc. moschat. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Wiederholt in das Rückgrat einzureiben.

(Wie bei No. 531.)

Abhandl. f. pr. Aerzte. Bd. XXII.

N^o. 535.

Ry. Aq. flor. Sambuci $\bar{\text{ʒ}}\text{iv}$.

Pulv. Rad. Ipecacuanhae gr. j.

Nitri dep. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Spec. diatragacanth. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Spir. Vitriol. acid. gtt. XV.

Ol. Olivar. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.

(Gegen Cholera.)

Vogler.

N^o. 536.

Ry. Camphorae $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.

solve in

Liq. an. min. Hoffm. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden 20 Tropfen. (Zugleich

kalt Wasser zu trinken, bis das Erbrechen aufhört.)

(Wie bei No. 535.)

Bang.

N^o. 537.

Ry. Empl. Bacc. Laur. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Camphor.

Sal. vol. C. C. ana ʒβ.

Laud. pur. ʒj.

Ol. Nuc. mosch. express. ʒjj.

Ol. Menth. pip. ʒβ.

Ol. Caryophyll. ʒj.

Malax. D. S. Auf die Magengegend.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 538.

Rx. Liniment. saponat. ʒvj.

Tr. thebaicae ʒjj.

M. D. S. In die Magengegend einzureiben.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 539.

Rx. Camphor. (in Ol. Oliv. ʒjj. sol.) ʒj.

Tr. thebaicae ʒβ.

M. D. S. In die Magengegend einzureiben.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 540.

Rx. G. arab. ʒj.

Vitell. ovor. ʒiβ.

Aq. Foeniculi ʒiβ.

Ol. Amygdal. dulc. ʒβ.

Tr. thebaic. gtt. xv.

Syr. emuls. ʒvj.

M. D. S. Alle halbe Stunden 1 — 2 Theelöffel.

(Gegen Cholera vom Zahnen, bei Kindern.)

Vogel.

N^o. 541.

Rx. Tr. Asae foet. ʒvj.

Sulph. aurat. Antim. ʒiiβ.

- Ol. Tereb. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 30 Tropfen.
 (Gegen Icterus.)

*Herz.*N^o. 542.

- Ry. Acidi phosphorici ʒj.
 Infus. Hb. Theae ℥j.
 M. D. S. Tassenweise.
 (Wie bei No. 541.)

*Caleb Miller.*N^o. 543.

- Ry. Summitat. Absynth. ʒvj.
 inf. Aq. f. q. s.
 Col. ʒvjjj. adde
 Sal. Tart. gr. xxx.
 Tr. Mart. tart.
 — Succini ana ʒjj.
 Spir. Juniperi ʒjjj.
 M. D. S. In vier Portionen auf einen Tag zu ver-
 brauchen.
 (Wie bei No. 541.)

*Pringle.*N^o. 544.

- Ry. G. Ammoniaci
 Fell. Tauri inspiss.
 Extr. Arnicae ana ʒjjj.
 — Anagallidis ʒβ.
 M f. Pil. pd. gr. jj.
 D. S. Täglich dreimal 15—20 Pillen.
 (Wie bei No. 541.)

*Stoll.*N^o. 545.

- Ry. G. Ammoniaci ʒiv.
 Pulv. Rad. Rhei ʒjj.

Pulv. alt. Plummer. ℥j.

Sap. med. ℥jj.

Extr. Cicutae ℥j.

— Chelidonii maj. ℥jj.

M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. rad. Liquirit.

D. S. Morgens und Abends 10 — 12 Pillen.

(Wie bei No. 541. Besonders bei Leberver-
härtung.) *Flemming.*

N^o. 546.

R_x. Sap. venet.

Extr. Chamomill. ana ℥jj.

Limatur. Ferri ℥β — 1β.

M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Wie bei No. 541.) *Theden.*

N^o. 547.

R_x. Pulv. Rad. Ipecacuanhae ℥1β.

— Cort. Aurant. ℥jj.

Crem. Tart. ℥β.

ebull. paulisp. c.

Aq. font. ℥1V.

Col. adde

Syr. flor. Chamomill. ℥j.

M. D. S. Alle 3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 541.) *Baldinger.*

N^o. 548.

R_x. Kali nitrici ℥jj.

Crem. Tart. ℥j.

Extr. Opii gr. jj.

- solve in
 Aq. font. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 adde
 Syr. Papav. $\bar{\text{z}}\beta$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 541.) *Vogler.*
-

- N^o. 549.
 R $\bar{\text{y}}$. Tart. solub. $\bar{\text{z}}\beta$.
 Extr. Graminis
 (vel Taraxaci vel Sap.) $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 solve in
 Aq. font. $\bar{\text{z}}\text{vj}$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 1—2 Esslöffel.
 (Gegen Icterus mit Unterleibs-Stockungen.)
Richter.
-

- N^o. 550.
 R $\bar{\text{y}}$. Sap. venet. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 Extr. Tarax. $\bar{\text{z}}\beta$.
 Tr. Rhei aq. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 Aq. Ment. pip. $\bar{\text{z}}\text{vj}\bar{\text{z}}\text{jj}$.
 Syr. Cert. Aurant. $\bar{\text{z}}\beta$.
 M. D. S. Alle halbe Stunden eine halbe Thee-
 tasse voll.
 (Wie bei No. 549.) *Richter.*
-

- N^o. 551.
 R $\bar{\text{y}}$. Rad. Rub. tinctor.
 — Curcum. ana $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Hb. Chelidon. maj.
 Summit. Centaur. min. ana M. I.
 Coq. in Vini rhen. et Aq. ft. ana $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Col. adde
 Syr. rad. quinque aperient. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. D. S. Morgens und Abends ein halbes Pfund
zu trinken.

(Wie bei No. 549.)

Sydenham.

N^o. 552.

R_x. Tart. stib. gr. x.

G. Ammoniaci

Sap. venet. ana ʒj.

Extr. Cicutae

— Chelidon. maj.

— Aloës aq. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.

D. S. Täglich dreimal 8 Pillen.

(Wie bei No. 549; bei gleichzeitigem Torpor.)

Richter.

N^o. 553.

R_x. Liq. Terrae Fol. Tart. ʒj.

Extr. Aloës aq. ʒj.

M. D. S. Viermal täglich 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 552.)

Richter.

N^o. 554.

R_x. Aloës succotr.

Pulv. Rad. Rhei ana ʒiβ.

Asae foet. ʒj.

Sap. venet. ʒvj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consperg.

D. S. Täglich dreimal 4 Pillen.

(Wie bei No. 552.)

Richter.

N^o. 555.

R_x. Sal. Herb. dep. ʒj.

Aceti Vini. q. s. ad sat.

- Aq. Cerasor. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Mellag. Graminis
 Oxymell. squill. ana $\mathfrak{J}\beta$.
 Vini Antimon. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 M. D. S. Esslöffelweise.
 (Gegen Icterus von Verschleimung der ersten
 Wege.) *Jahn.*
-

N^o. 556.

- Ry. Rad. Ipecacuanhae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Inf. per $\frac{1}{4}$ hor. c.
 Aq. fervid. $\mathfrak{J}\mathfrak{IV}$.
 Col. admisce
 Syr. Althaeae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Sacch. alb. $\mathfrak{J}\beta$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Icterus ex spasm.) *Richter.*
-

N^o. 557.

- Ry. Ferri carb.
 Flor. Sulph.
 Crem. Tart. ana $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Sacch. alb. $\mathfrak{J}\beta$.
 M. f. Pulv. D.
 S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
 (Gegen Icterus von zurückgetretenen Exanthe-
 men, mit gleichzeitigem Leiden des Uterus.)
Bluff.
-

N^o. 558.

- Ry. Sal. mirab. Glaub. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Extr. Tarax. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Aq. font. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Icterus Neonatorum mit Stuhlverhal-
 tung.) *Gölis.*
-

N^o. 559.

- R. Extr. Cicutae $\bar{3}j$.
 — Hyoscyami $\bar{3}\beta$.
 Pulv. Hb. Belladonnae $\bar{3}j$.
 Liq. ammon. acet. q. s. ad consist.
 Empl. ten.

D. S. Die Hälfte auf Leder gestrichen, in die Lebergegend zu legen.

(Gegen Icterus.)

Richter.

N^o. 560.

- R. Sal. Friderici contr. $\bar{3}j$.
 Sap. venet. ras, $\bar{3}\beta$.
 Sem. Lini contus. $\bar{3}i\beta$.
 Ras. Pan. $\bar{3}xj$.
 Coq. c. aq. font. q. s. ad
 Consist. Cataplasma.

D. S. In die Lebergegend.

(Wie bei No. 559. Auch gegen Kolik.)

Vogler.

N^o. 561.

- R. Acidi nitrici
 — muriat. ana $\bar{3}j$ — $i\beta$.

M. D. S. Zu einem Bad. (Für Kinder $\bar{3}\beta$ — j .)
 (Gegen Icterus. Auch gegen Gallensteine empfohlen. — Dasselbe Bad bleibt drei bis viermal brauchbar; die Menge der Säuren aber muss nach den einzelnen Fällen zuweilen vermindert werden.)

Scott. (Hall. Bernhardt.)

N^o. 562.

- R. G. Kino $\bar{3}jj$.
 Camphorae $\bar{3}\beta$.

Pulv. aromat. ℥j.

Flor. Zinci ℥β.

M. f. Pil. No. XX.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. (Zugleich ein Infusum Valerianae, und täglich eine halbe Unze Tr. G. Kino.)

(Gegen Diabetes.)

Shee.

N^o. 563.

Ry. Rad. Sarsaparill. ℥vj.

Uvar. Corinth. concis. ℥vjij.

Coq. ex Aq. ft. ℥ XII. ad ℥ VI.

In Col. extingue

Calcis vivae ℥β.

M. D. S. Dreimal täglich 3 Unzen.

(Wie bei No. 562.)

Fuller.

N^o. 564.

Ry. Myrrhae elect. ℥β.

G. Galbani

Extr. Trifol. fibr.

Terrae jap. ana ℥jj.

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens, Mittags und Abends 7 Pillen.

(Gegen Pollutionen und Saamenfluss. No. 414. 415.)

Tissot.

N^o. 565.

Ry. Acid. phosphor. vitr.

Pulv. Cort. Chin. opt.

Extr. Cort. Cascarill. ana ℥jj.

Limat. Martis ℥β.

Camphor, rasae ℥β.

M. f. Pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Cort. Cinnamom.

D. S. Dreimal täglich 10 Pillen. (Schwache Lungen
sind eine Gegenanzeige des Gebrauchs dieser Pillen.)

(Wie bei No. 564.)

Wurzer.

N^o. 566.

R_x. Pulv. Cort. peruv. ʒj.

— — Cascarill.

— Lign. Quass. ana ʒβ.

Sal. mart. ʒjj.

Elaeosacch. Cajeput. ʒvj.

M. D. S. Morgens und Abends einen grossen Thee-
löffel voll.

(Wie bei No. 564.)

Jördens.

N^o. 567.

R_x. Aq. Ment. pip. vin.

Spir. Formicar.

— Serpylli ana ʒjj.

Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen des Hodensacks.

(Wie bei No. 564. Wenn Atonie die Ursache ist.)

Jördens.

N^o. 568.

R_x. Extr. Bistortae ʒβ.

Pulv. Myrrhae

Vitriol. Mart. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Alle drei Stunden 6 Pillen.

(Gegen Pollutionen und Fluor albus.)

(Horn.)

N^o. 569.

R_y. Ferri sulphurici q. v.
 excandescat in crucibulo donec
 massa ex fusco rubra appareat;
 hujus massae in pulv. redact. ʒj.
 solve in

Vini de Madeira ʒj.

M. D. S. Zweistündlich 15 — 20 Tropfen. (Arca-
 num Weigeli.)

(Wie bei No. 568.) *Weigel. (Turte.)*

N^o. 570.

R_y. Ferr. sulph. ex alb. calc. ʒj.
 Extr. Gentianae q. s.
 ut f. Pil. No. CXX.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Alle zwei Stunden eine Pille, und in 6 Tagen
 zu 8 Pillen pro Dosi steigend.

(Gegen Fluor-a'bus.) *(Horn.)*

N^o. 571.

R_y. Boli armen.
 Magnes. muriat,
 Elaeosacch. Macid. ana ʒvi.
 (Pulv. Rad. Rhei ʒj.)

M. f. Pulv. D. S. Täglich dreimal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 570.) *Rust. (Sundelin.)*

N^o. 572.

R_y. Aluminis
 Ammon. muriat. mart.
 Pulv. aromat.
 Extr. Cort. Chin. frig. par. ana ʒβ.
 Ol. Cinnam. aeth. gtt. xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj .
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. in vitro. S. Morgens und Abends 15—20 Pillen.
 (Wie bei No. 570.) *Formey.*

N^o. 573.

R_x. Ol. Vitriol. ʒv .
 — Tereb. ʒjj .
 Spir. V. rectific. ʒijj .
 M. D. S. Täglich dreimal 30—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 570.) *Richter.*

N^o. 574.

R_x. Ol. Succin. rectific.
 Tereb. venet.
 Bals. Copaiv. ana ʒβ .
 M. D. S. Dreimal täglich 30 Tropfen in Syr. simpl.
 und ein halbes Glas Portwein. Die Dosis kann
 auf 60 Tropfen steigen.
 (Wie bei No. 570.) *Horn.*

N^o. 575.

R_x. Extr. Aloës aq.
 — Myrrhae aq. ana ʒβ .
 solve in
 Liq. Terrae fol. Tart. ʒij .
 M. D. S. Täglich dreimal 2 Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 570.) *Brendel.*

N^o. 576.

R_x. G. Kino
 — Myrrhae
 Extr. Marrub. alb. ana ʒjj .
 Vitrioli Martis ʒj .

M. f. Pil. pd. gr. jj .
 D. S. Täglich dreimal 8 Pillen.
 (Wei bei No. 570.)

*Weitz.*N^o. 577.

Ry. Myrrhae
 Ammoniaci
 Ferri oxydulati nigri ana 3jj .
 Rad. Valer. 3j .
 — Rhei $\text{3}\beta$.

M. f. c. s. q. Extr. Fumar.
 Pil. pd. gr. jjj . D.
 S. Täglich dreimal 4 Pillen.
 (Wie bei No. 570.)

*Bluff.*N^o. 578.

Ry. Hb. Millefol. 3j .
 — Lamii alb.
 — Cynogloss. ana 3j .
 Rad. Sant. rubri $\text{3}\beta$.
 Coq. in Aq. ft. 8 j .
 Adde

Terrae japon. 3jj .
 Macidis contusae 3j .
 Sacch. alb. 3jjj .

M. D. S. Morgens und Abends jedesmal 3 Unzen mit
 einem zu Schaum geschlagenen Eiweiss.
 (Wie bei No. 570.)

*Fuller.*N^o. 579.

Ry. Lign. Sassafras
 Rad. Sarsaparill.
 — Rub. tinct.
 — Bardanae
 — Liquirit. ana $\text{3}\beta$.

Coq. in Cong. II. Vin. ad dimid.

D. S. In einem Tage zu verbrauchen.

(Wie bei No. 570.)

*Sproegel.*N^o. 580.

Ry. Flor. Lamii alb. ʒx.

— Consolid. maj. ʒvjjj.

Hormin. ʒiv.

C. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 570.)

*Bate.*N^o. 581.

Ry. Extr. Opii aq. ʒj.

solve in

Aq. Rosar. ʒvjjj.

Acet. Saturn. ʒj.

Mucilag. Sem. Cydon. ʒj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Gegen Fluor albus.)

*Richter*N^o. 582.

Ry. Acet. Saturn. ʒj.

Aq. destill. ʒj.

Spir. camphorat. ʒj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 581.)

*Richter.*N^o. 583.

Ry. Calomel. ʒj.

Aq. Calcis vivae ʒxjj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 581.)

Sproegel.

N^o. 584.

- Ry. Terrae jap.
Myrrhae ana ʒβ — j.
Aq. Calcis vivae ʒijj.
M. D. S. Zum Einspritzen.
(Wie bei No. 581. Besonders empfehlenswerth.)
Vogler. (M. J. Schmidt.)
-

N^o. 585.

- Ry. Sal. ammon. gr. X — ʒj.
Pulv. Liquirit. ʒj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.
D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.
(Gegen Fluor albus Vesica. S. No. 301.)
Büttner.
-

5N^o. 86.

- Ry. Ferri sulphurici cryst. ʒjj.
Myrrhae ʒjjj.
Pulv. Cort. Lign. Quass. ʒiv.
M. f. c. Extr. Cort. Chin. pil. gr. jjj.
Consp. pulv. Cinnamom.
D. S. Täglich dreimal 4 — 8 Pillen.
(Gegen Galactirrhöe, besonders aus Verdauungs-
schwäche.)
Berends.
-

N^o. 587.

- Ry. Sap. med.
G. Asae foet.
— Ammoniaci ana ʒiβ.
Extr. Trifol. fibr. ʒjjj.
— Aloës aq. ʒj.
Sulph. aurat. Antim. ʒj.
Aq. Foeniculi q. s.
ut f. Pil. pd. gr. II, Consp.

D. S. Täglich deimal 10 — 15 Pillen.
(Gegen Chlorosis.)

Richter.

N^o. 588.

Ry. Lign. Quass.
Sacch. alb. ana ʒj.
Flor. Sal. amm. mart. gr. X.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XXIV.
D. S. Täglich viermal ein Pulver.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 589.

Ry. Ferri pulv. ʒjj.
Sulph. dep.
G. Myrrhae
Aloës lucid. ana ʒj.
Fell. Taur. inspiss. q. s.
ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
D. S. Morgens und Abends 12 Pillen.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 590.

Ry. Ferri pulv. ʒjj.
Sacch. alb. ʒβ.
Cort. Cascarill.
— Cinnamom. ana ʒj.
M. f. Pulv. D. ad scatul.
S. Täglich viermal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 591.

Ry. Extr. Cort. peruv. ʒjj.
G. Myrrhae
Sal. mart. ana ʒj.

M 1

Ol. Cinnam. gtt. IV.

M. f. pil. No. XL. Consp.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen.

(Wie bei No. 587.)

Leake.

No. 592.

R. Aloës succ. ʒj.

Ferri pulv. ʒjj.

Sulph. stib. aur. ʒβ.

Calomel. ʒj.

Ol. Sabin. gtt. XX.

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Abends vor dem Schlafengehn 2 Pillen.

(Wie bei No. 587.)

Weikard. (Kopp.)

No. 593.

R. Pulv. Cort. Chinae

— — Aurant.

— Rad. Gentianae ana ʒβ.

— Cort. Cinnam. ʒjj.

inf. c.

Vini boni alb. rhen. ℥ jj.

Stent in digest. per XXIV hor.

Col.

D. S. Täglich zwei bis dreimal ein kleines Weinglas

voll.

(Wie bei No. 587. S. No. 551. 569. 578. 579.)

Richter.

Krankheiten der Harnabsonderung.

N^o. 594.

- R_y. Rad. Apii
 — Petrosel. ana M. j.
 Hb. Rubiae tinct. $\mathfrak{z}\beta$.
 Spic. Adianth. cap. ven.
 — Cuscut.
 — Agrimon.
 — Cicer. rubr. ana M. β .
 Rad. Asari \mathfrak{z} j.
 — Calami $\mathfrak{z}\beta$.
 Sem. Anisi
 — Apii
 — Petrosel.
 — Foenu graeci
 — Dauci
 — Carvi ana \mathfrak{z} jj.
 Mlon.
 Cucum. ana \mathfrak{z} jjj.
 Coq. in Aq. ft. \mathfrak{z} VI. ad \mathfrak{z} IV.
 Colat. adde
 Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.
 D. S. Täglich zu 6 Unzen. (Wirkt diuretisch.)
 (Gegen Harnleiden. S. No. 301. 471.)
Augen. (Baten.)

N^o. 595.

- R_y. Asae foet. $\mathfrak{z}\beta$.
 Rad. Ipecacuanhae
 Opii
 Olei Menth. pip. ana gr. jj.
 M. f. l. a; pil. pd. gr. jj.
 Consp. Sem. Lycopod.

D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.

(Gegen Ischuria und Stranguria spastica.)

Conradi. (Richter.)

N^o. 596.

Rj. G. arab. \mathfrak{z} jj.

Aq. Petrosel. \mathfrak{z} vj.

— Laurocerasi \mathfrak{z} j.

Syr. Papav. alb. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel. (Zugleich warme Umschläge mit Hb. Hyoscyami und Cutae in die Blasenegend.)

(Wie bei No. 595.)

Bluff.

N^o. 597.

Rj. Ol. Amygdal. dulc. \mathfrak{z} j.

Bals. peruv. gtt. XXX.

Syr. Althaeae \mathfrak{z} j.

Mucilag. G. arab. $\mathfrak{z}\beta$.

Aq. Foeniculi \mathfrak{z} IV.

— Petrosel. \mathfrak{z} vjjj.

M. f. l. a. Emuls. D.

S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Strangurie. Auch gegen die Schmerzen von Nieren- und Blasensteinen. S. No. 871.)

Kaempf.

N^o. 598.

Rj. Aluminis gr. X.

G. arab. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich viermal ein Pulver.

(Gegen Enuresis paralytica.)

Selle.

N^o. 599.

Rj. Pulv. Cantharid. gr. jiiij.

Camphorae gr. X.

- Sap. venet. $\mathfrak{3j}$.
 M. f. l. a. pil. No. XL.
 Consp. pulv. Cinnanom.
 D. S. Täglich drei Pillen,
 (Gegen Enuresis paralytica der Wöchnerinnen.)
v. Siebold.
-

N^o. 600.

- R_x. Hb. Sabinæ $\mathfrak{3j}$.
 inf. Aq. fervid. $\mathfrak{3v}$.
 stent in digest. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Col. adde
 Camphoræ gr \mathfrak{jj} — \mathfrak{vj} .
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Blasenlähmung nach schwerer Nieder-
 kunft.) *Horn.*
-

N^o. 601.

- R_x. Ol. Lavandul.
 — Macidis destill. ana $\mathfrak{3j}$.
 Butyr. Cacao $\mathfrak{3j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben in die Blasengegend.
 (Gegen Lähmung der Harnblase.) *Bluff.*
-

N^o. 602.

- R_x. Liq. nervin. Peerbom. $\mathfrak{3j}$.
 Tr. Cantharid. $\mathfrak{3j}$.
 M. D. S. Auf das Kreuz und Mittelfleisch einzu-
 reiben.
 (Gegen Lähmung des Blasenhal ses.)
Lentin.
-

Steinkrankheit.

N^o. 603.R_y. Tereb. venet. ʒvj.

Aq. font. ℥ j.

Vitell. ovor. q. s. ut f. Emuls.

D. S. Abends vor Schlafengehn in zwei Portionen zu trinken.

(Gegen Gallensteine. No. 561.) *Hecker.*N^o. 604.R_y. Natri sulph. ʒjj.

Aq. Calcis ℥ 1β.

M. D. S. Vierzehn Tage lang jeden Morgen nüchtern eine solche Portion zu trinken.

(Wie bei No. 603.)

*Delius.*N^o. 605.R_y. Ol. Tereb.

Naphthae Vitrioli ana ʒβ.

M. D. S. Einigemal täglich 10—30 Tropfen zu nehmen, und Molken nachzutrinken. Das Mittel muss beharrlich gebraucht werden.

(Gegen Gallen- und Harnsteine.)

*Durande.*N^o. 606.R_y. Sodae ʒj.

Piper. hisp. gr. IV.

Sap. med. q. s. ut f. pil. No. XX.

D. S. Zu 3—6 Pillen pro Dosi.

(Gegen Harnsteine. S. No. 597.)

Egan.

N^o. 607.

- R. Tereb. venet. $\bar{3}\beta$.
 Sap. venet.
 Succi Liquirit. ana $\bar{3}jjj$.
 M. f. Pil. pd. gr. jj .
 D. S. Zu 10—15 Pillen.
 (Wie bei No. 606.)

*Richter.*N^o. 608.

- R. Sap. med.
 Natri carb. sicc. ana $\bar{3}jj$.
 M. f. c. Extr. Trifol. fibr. q. s.
 Pil. pd. gr. jj . Consp. pulv. rad. Liquirit.
 D. S. Dreimal täglich 3—10 Pillen.
 (Wie bei No. 606.)

*Berends.*N^o. 609.

- R. Rad. Caricis arenar. $\bar{3}\beta$.
 — Liquirit. $\bar{3}jj$.
 Cort. Ulmi $\bar{3}jj$.
 Coq. c.
 Aq. font. q. s.
 Col. $\bar{8}jj$. adde
 Natri sulphurici $\bar{3}j$.
 Natri carbonici $\bar{3}\beta$.
 M. D. S. Täglich zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 606.)

*Heim.*N^o. 610.

- R. Kali carb. $\bar{3}\beta$.
 solve in
 Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}lv$.
 adde
 Syr. Diacodii $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Viermal täglich einen Esslöffel. Zugleich viel Thee von Hb. Jaceae.

(Gegen Nierensteine, Nasensteine, und Thränensteine.) *v. Walther.*

N^o. 611.

R_x. Rad. Ononid. spinos.

Summitat. Virgaur. ana $\bar{\text{z}}\beta$.

M. f. Spec. D. S. Mit einer Kanne heissen Wassers zu übergiessen, und täglich eine solche Portion zu trinken.

(Gegen Nierensteine.) *Muhrbeck. (Heim.)*

N^o. 612.

R_x. Hb. Uvae Ursi $\bar{\text{z}}\beta$.

G. arab. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Rad. Jalapp. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Ol. Cort. Aurant. $\bar{\text{z}}\beta$.

Sacch. alb. $\bar{\text{z}}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Zu $\bar{\text{z}}\beta$. Morgens und Abends.

(Gegen Steinbeschwerden.) *Quarin.*

S c h w i n d s u c h t e n .

N^o. 613.

R_x. Extr. Myrrhae aq. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Sacch. Lact. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. S. Einigemal täglich einen Theelöffel.

(Gegen Phthisis. S. No. 119. 631. 632.)

Hecker.

N^o. 614.

R_x. Fol. Pruni Padi No. XX.

C. D. S. Zu drei Tassen Thee; täglich zu trinken.

(Gegen Phthisis von organischen Herzfehlern.)
Lejeune.

N^o. 615.

- Ry. Aq. Laurocerasi ʒj.
Syr. Rubi Idaei ʒiβ — j̄j.
M. D. S. Täglich vier bis sechsmal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 614. Besonders beruhigend.)

Horn.

N^o. 616.

- Ry. Sem. Phellandrii aquat. gr. v.
Sacch. Lact.
G. arab. ana ʒβ.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Drei bis viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Phthisis pulmonalis tuberculosa.)
(Hecker.)

N^o. 617.

- Ry. Extr. Card. bened. ʒvj.
— Senegae ʒj.
M. f. Pil. pd. gr. j̄j. Consp.
D. S. Täglich viermal 10 — 20 Pillen.
(Wie bei No. 616.)
Hecker.

N^o. 618.

- Ry. Bals. peruv. ʒβ.
Vitell. ovor. No. II.
solve in
Aq. font. ʒiV.
adde
Spir. Vini rectificati ʒj̄j.
Syr. Cinnamomi ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 616.)

*Hecker.*N^o. 619.

Ry. Hb. Cicutae ʒβ.
Sulph. stib. aurant.
Calomel. ana gr. j.
Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Wie bei No. 616.)

*Richter.*N^o. 620.

Ry. Tart. stib. gr. X.
G. Ammoniaci
— Galbani
Extr. Cicut.
Sap. venet. ana ʒj.
Pulv. Hb. Belladonn. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ij. Consp.

D. S. Täglich dreimal 9 Pillen.
(Wie bei No. 616.)

*Richter.*N^o. 621.

Ry. Ol. Ricini ʒjjj.
Tr. Opii croc. ʒβ — j.

M. D. S. Auf einmal.

(Gegen den heftigen Husten Schwindsüchtiger.)

*Hecker.*N^o. 622.

Ry. Pulv. Rad. Salep. ʒβ.
solve in

Aq. calidae ʒjj.
adde

Extr. Hyoscyami $\mathfrak{D}\beta$.

Aq. flor. Naphae $\mathfrak{S}ijj$.

Syr. Althaeae $\mathfrak{S}j$.

M. D. S. Oefters einen Theelöffel voll.

(Wie bei No. 621.)

Hufeland.

N^o. 623.

Rx. Sem. Phellandrii aq. $\mathfrak{S}\beta$.

Hb. Digital. purp. $\mathfrak{S}\beta$ — $\mathfrak{S}j$.

inf. Aq. fervid. $\mathfrak{S}iv$.

Col. adde

Spir. Nitri dulc. $\mathfrak{S}j$.

Syr. Althaeae $\mathfrak{S}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Phthisis pulmonalis pituitosa.)

Jahn.

N^o. 624.

Rx. Lich. island.

Rad. Polygal. amar. ana $\mathfrak{S}ijj$.

— Liquirit. $\mathfrak{S}vj$.

Stipit. Dulcamar. $\mathfrak{S}jjj$.

C. f. Spec. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 623.)

Sachtleben.

N^o. 625.

Rx. G. Asae foet.

Pulv. Stipit. Dulcamarae ana $\mathfrak{S}j$.

— Lign. Campech. $\mathfrak{S}jjj$.

Extr. Myrrhae aq. $\mathfrak{S}jj$.

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Täglich dreimal 9 Pillen.

(Wie bei No. 623.)

Richter.

N^o. 626.

Rx. Bals. peruv. vit ov. sol. $\mathfrak{S}jj$.

Extr. Chin. aq. $\mathfrak{S}vj$.

- Mell. Rosar. \mathfrak{Jij} .
 M. exact. f. l. a. Elect.
 D. S. Alle 3 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 623.)

*Werthof.*N^o. 627.

- Ry. Kali sulphurat.
 Extr. Gentian. ana \mathfrak{Jij} .
 Pulv. Hb. Aconit.
 — Cort. Cinnamom. ana $\mathfrak{3}\beta$.
 M. f. l. a. Pil. pd. gr. j. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 623.)

*Busch.*N^o. 628.

- Ry. Rad. Cichor.
 — Tarax. ana $\mathfrak{3j}$.
 — Liquirit.
 — Graminis
 Hb. Veron.
 — Tussilag.
 Sem. Carvi ana $\mathfrak{3}\beta$.
 Cort. Aurant.
 — Cinnamom. ana $\mathfrak{3ij}$.
 M. C. C. D. S. Zum Thee.
 (Wie bei No. 623.)

*Richter.*N^o. 629.

- Ry. Succ. alb.
 Oliban.
 G. Benzoës ana $\mathfrak{3ij}$.
 — Guajaci
 Bals. tolut. ana $\mathfrak{3}\beta$.
 P. Rosar. $\mathfrak{3j}$.
 M. f. Pulv. D. S. Räucherpulver.
 (Wie bei No. 623. Zum Einathmen der Dämpfe.)

Richter.

N^o. 630.

- R_x. Rad. Polygal. amar. ʒj.
 Coq. C. Aq. ft. ʒXII.
 Col. ʒVIII. adde
 Spir. muriat. aeth. ʒj.
 Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Vomica pulmonum nach dem Auswurfe
 des Eiters, und bei gleichzeitiger grosser Schwä-
 che.) *Berends.*

N^o. 631.

- R_x. Pulv. Sem. Phellandrii aq.
 Sacch. Lact. ana ʒβ.
 G. Myrrhae ʒjj.
 Hep. Sulph. ʒjj.

M. f. Pulv. subtiliss.
 D. S. Täglich vier bis sechsmal einen Theelöffel.
 (Gegen Phthisis pulmonalis exulcerata.) *Jahn.*

N^o. 632.

- R_x. Myrrhae elect. ʒjjj.
 Bals. peruv. v. canad. ʒiβ.
 Extr. Opii ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Alle zwei Stunden 2—3 Pillen.
 (Wie bei No. 631.) *Marcus*

N^o. 633.

- R_x. Sacch. Saturn. gr. jj—IV.
 solve in
 Aq. Foeniculi ʒvj.
 adde
 Tr. Opii simpl. ʒβ.

M 2

M. D. S. Alle 2 Stunden einen starken Esslöffel voll.

(Wie bei No. 631. — S. auch No. 381. 422.)
Richter.

N^o. 631.

R_x. Plumbi acet. ʒj.
solve in
Aceti boni non destill. ʒj.
adde
Ferri sulphurici ʒiβ.
Spir. Vini rectificati ʒj.
Aq. Rosar. ʒjij.

M. D. S. Zu 20—30 Tropfen pro Dosi.
(Wie bei No. 631. Tr. antiphthisica Gram-
manni.) *Grammann. (Wedel.)*

N^o. 635.

R_x. Plumbi acet.
Ferri sulph. ana ʒj.
solve in
Spir. Vini rectificat. ʒjij.

Reponat. in frig. donec. Spir. rubescat.
D. S. Zu 15—30 Tropfen pro Dosi.
(Wie bei No. 631. Tr. antiphthisica Fulleri.)
Fuller.

N^o. 636.

R_x. Auri oxymuriatici gr. IV.
solve in
Aq. Amygdal. amar. ʒβ.
adde

Aq. flor. Tiliae ʒiβ.
M. D. S. Täglich viermal 24 Tropfen in einem
Esslöffel Aq. destill.

(Gegen Phthisis tuberculosa und Tabes mesaraica; in den ersten Stadien.) *Wendt.*

N^o. 637.

- R_y. Hb. Uvae Ursi ℥j.
Elaeosacch. Foeniculi gr. v.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver.
(Gegen Phthisis renalis und Phthisis vesicae. S. No. 618.) *Hecker.*
-

N^o. 638.

- R_y. Hb. Digital. ℥j.
inf. c. Aq. fervid. ℥iix.
Col. adde
Aq. Cinnamom. spirit.
Syr. Cort. Aurant. ana ℥j.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
(Gegen Phthisis uterina.) *Hecker.*
-

N^o. 639.

- R_y. Succu inspiss. Hb. Digital.
Opii thebaic. ana ℥β.
Pulv. Hb. Digital. q. s.
ut f. l. a. pil. pd. gr. j.
Consp. pulv. Cinnamom.
D. S. Morgens und Abends zwei Pillen.
(Wie bei No. 638.) *Hecker.*
-

W ü r m e r.

N^o. 640.

- R_y. Stanni limati ℥jj.
Sem. Santon. ℥j.

Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Gegen Würmer.)

Fordyce.

N^o. 641.

R̄. Stanni limati ʒj.

Rad. Jalapp. ℥j.

Mell. despumati ʒj.

M. f. Elect. D.

S. Alle vier Stunden drei Theelöffel.

(Wie bei No. 640.)

Bloch.

N^o. 642.

R̄. Rad. Valer.

Sem. Cynae ana ʒj.

inf. et. digere c.

Aq. ferv. suff. qt.

Col. ʒIV. adde

Extr. Nuc. jugland.

Liq. anodyn. Hoffm.

Essent. Cort. Aurant. ana ʒβ.

Syr. Cort. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 640. Bei zarten schwächlichen Kindern.)

Henke.

N^o. 643.

R̄. Sem. Santon.

Rad. Jalapp. pulv.

— Valer. pulv.

Sal. polychrest. Seign. ana ʒj.

Oxymell. squill. q. s. ut f. Elect.

D. S. Alle 2—3 Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 640.) *Störk.*

No. 644.

Ry. Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Fol. Sennae $\mathfrak{z}\beta$.

Tart. vitriolat. \mathfrak{z} j.

M. f. Pulv. Divide in partes III aeq.

D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden ein Pulver, bis Abfüh-
ren erfolgt.

(Wie bei No. 640.) *Bremser.*

No. 645.

Ry. Sem. Cynae (vel Tanaceti) $\mathfrak{z}\beta$.

Pulv. Rad. Valer. \mathfrak{z} jj.

— — Jalapp. $\mathfrak{z}\beta$ — \mathfrak{z} jj.

Tart. vitriolat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$ — \mathfrak{z} jj.

Oxymell. squill. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 640.) *Bremser.*

No. 646.

Ry. Rad. Valer. \mathfrak{z} jj.

Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Sem. Santon. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. pulv. cui addas

Oxymell. squill. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 640.) *Hecker.*

No. 647.

Ry. Pulv. Sem. Cynae \mathfrak{z} jj.

— Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Calomel. gr. \mathfrak{v} j— $\mathfrak{z}\beta$.

Aq. flor. Cassiae ʒβ.

Syr. flor. Persicae q. s.

ut f. Elect. D.

S. Alle 2 Stunden einen Kaffeelöffel, bis Abführen erfolgt.

(Wie bei No. 640.) *Vogler.*

Nº. 648.

Ry. Calomel. gr. ʒj.

Rad. Jalapp. gr. XV.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal.

(Wie bei No. 640. Für Kinder von 6 Jahren.)

Henke.

Nº. 649.

Ry. Sem. Santon. ʒjj.

Rad. Jalapp.

— Valer.

Aethiop. min. ana ʒj.

Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. D.

S. Morgens, Mittags und Abends, jedesmal 2 Theelöffel in Wasser gerührt zu nehmen.

(Wie bei No. 640.) *Stark.*

Nº. 650.

Ry. Asæ foet. ʒj.

G. arab.

Calomel.

Sem. Sabadill. ana gr. X.

Mell. despumat. q. s.

ut f. l. a. Pil. gr. ʒj.

D. S. Die Hälfte Abends, die andere Hälfte Morgens zu nehmen.

(Wie bei No. 640. Besonders bei von Würmern herrührenden Nervenleiden.) *Kämpf.*

N^o. 651.

Ry. Aethiop. antim. ʒj.

Sem. Santon.

Rad. Jalapp. ana ʒβ.

Oxymell. squill. q. s.

ut f. Elect.

D. S. Mehrere Male täglich einen Theelöffel.

(Wie bei No. 640. Besonders bei gleichzeitigem Schleim.) *Jahn. (Osiander.)*

N^o. 652.

Ry. Pulv. Sem. Santon. ʒjj.

Chocolatae ʒβ.

Mucilag. G. Tragacanth. q. s.

ut. f. l. a. Trochisci No. XXX.

D. S. Alle drei Stunden 4—6 Stück.

(Wie bei No. 640.)

Fries.

N^o. 653.

Ry. Sem. Santon.

Hb. Tanacet. ana ʒjj.

Aethiop. min.

Rad. Jalapp. ana ʒiβ.

Cinnamom. ʒj.

pulv. adde

Sacch. alb. in Aq. Rosar. solut.

et ad consist. tabuland. coct. ʒiiβ.

Fiant Morsuli ʒj — jj.

D. S. Ein bis zweimal täglich eine Morselle.

(Wie bei No. 640.) *J. A. Schmidt.*

N^o. 654.

Ry. Sacch. alb. ad consist. tab. cocti ʒij.
 Calomel. ʒj.
 Pulv. Rad. Jalapp. ʒjjj.
 — Macidis ʒjj.

M. f. l. a. Rotul. gr. IV.

D. S. Morgens und Abends 1—6 Stück.

(Wie bei No. 640.) *Zwelfer. (Wendt.)*

N^o. 655.

Ry. Res. Jalapp. gr. VIII—IX.
 Sap. med. gr. jjj.
 trit. in mort. lap.
 solve cum

Ol. Olivar. (vel Amygdal.) ʒiβ.

D. S. Umgeschüttelt alle 2—3 Stunden einen Ess-
 löffel (Kindern einen halben Esslöffel), bis Ab-
 führen erfolgt.

(Wie bei No. 640.) *Vogler.*

N^o. 656.

Ry. Extr. Nuc. jugland. ʒjj.
 Aq. Cinnamom. s. v. ʒβ.
 Mellis desp. ʒj.

M. D. S. Zwei bis dreijährigen Kindern dreimal
 täglich 30—60 Tropfen.

(Wie bei No. 640.) *Fischer.*

N^o. 657.

Ry. Camphorae ʒjjj.
 Petrol.
 Ol. Tereb. ana ʒi.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 20—30 Tropfen.

(Wie bei No. 640.) *Mellin.*

N^o. 658.

Ry. Tr. Asae foet. ʒvj.
Petrol. ʒβ.

M. D. S. Täglich viermal 40 Tropfen.
(Wie bei No. 640.) *Schwarz. (Hufeland.)*

N^o. 659.

Ry. Rad. Valer.
Sem. Cynae ana ʒβ.
inf. et diger. c. Aq. ft. suff. qt.
Col. ʒvjjj. adde
Asae foet. in vitell. ov. subact. ʒj.

M. D. S. Zu zwei Clystiren.
(Wie bei No. 640.)

*Henke.*N^o. 660.

Ry. Fell. Tauri inspiss.
Extr. Nuc. jugland. ana ʒjj.
Axung. porci ʒj.
M. leni igne et adde
Ol. Tanaceti ʒjjj.

D. S. Zum Eiureiben auf den Unterleib.
(Wie bei No. 640.)

*Hecker.*N^o. 661.

Ry. Fell. Tauri inspissat. ʒj.
Ol. Tanaceti ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.

(Wie bei No. 640.)

*Sprögel.*N^o. 662.

Ry. Pulv. Aloës ʒj.
— Colocynth.
— Myrrhae ana ʒjjj.

Fol. Sabinae
 — Absynth.
 — Rutae
 — Tanacet.
 — Jugland.

Rad. Bryon. ana ʒj.

Cerae

Resinae ana ʒiv.

Ol. Rutae ʒj.

M. f. Emplastrum.

D. S. Auf den Nabel zu legen.

(Wie bei No. 640.)

Bate.

N^o. 663.

Ry. Extr. Tanacet.
 Sem. Santon. ana gr. vj.
 Ferri sulph. gr. IV.
 Ol. Valer. aeth. gtt. j.

M. f. Pulv. D. tal. Dos. q. l.

S. Täglich ein Pulver.

(Gegen Würmer; zur Radical-Cur.)

Rosenstein.

N^o. 664.

Ry. Ferri sulphurici
 Extr. Cort. peruv. ana ʒj.
 Pulv. Sem. Santon. ʒj.
 Syr. Cinnamom. q. s. ut f. Elect.

D. S. Täglich 3 — 4 Theelöffel.

(Wie bei No. 663.)

Selle.

N^o. 665.

Ry. Tr. Aloës ʒj.
 — Martis pomat. ʒj.
 Elix. Vitrioli ʒβ.

- M. D. S. Täglich 10 — 30 Tropfen in einem Glas Wasser oder rothem Wein.
(Gegen Würmer; zur Nach-Cur.) *Bremser.*
-

N^o. 666.

- R_x. Rad. Jalapp. $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\jmath$.
Calomel. gr. $\jmath\jmath$ — IV .
Sacch. alb. gr. $\text{X}\jmath\jmath$.
M. f. Pulv. D. tal. Dos. No. III.
D. S. Drei Morgen nacheinander ein Pulver.
(Gegen Ascariden.) *Richter.*
-

N^o. 667.

- R_x Pulv. Sem. Santon. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.
inf. Aq. f. q. s.
Col. refrig. $\mathfrak{z}\text{I}\beta$.
adde
Merc. subl. corrosiv. gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$.
Mucilag. G. arab. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.
M. D. ad vitrum. S. Das Glas so lange in warmes Wasser gestellt, bis die Mischung warm ist; und dann im Clystir applicirt.
(Gegen Ascariden. S. No. 406.) *Kopp.*
-

N^o. 668.

- R_x. Sem. Santonici gr. XV.
Rad. Rhei gr. $\text{X}\jmath\jmath$.
Aloës gr. vj.
Calomel. gr. $\jmath\jmath\jmath$.
Rad. Ipecacuanhae gr. j.
M. f. Pulv. D. S. Drei Tage nach einander jedesmal früh nach dem Aufstehen den dritten Theil.
(Gegen Spulwürmer. Für ein Kind von 3 — 4 Jahren.) *Andry.*
-

N^o. 669.

- R_x. Pulv. Sem. Cynae ʒj.
 — Rad. Jalapp. ʒj.
 Calomel. gr. vj—X.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Theelöffel, bis 3—4
 Stuhlgänge erfolgen.

(Gegen Spulwürmer.)

Richter.

N^o. 670.

- R_x. Tereb. venet. ʒvj.
 Aq. ft. ʒj.
 Vitell. ov. q. s.

M. f. l. a. Emuls.

D. S. Abends in zwei Stunden zu trinken.

(Zur Ueberzeugung, ob ein Bandwurm vorhanden ist. — Nach dem Gebrauch gehen bei vorhandenem Bandwurme in der Nacht oder des folgenden Tages Stücke ab.)

Thilenius. (Kämpf.)

N^o. 671.

- R_x. Aeth. sulph. ʒjj.
 Ol. Ricini ʒj.

M. D. S. Alle 1—4 Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Bandwurm.)

Alibert.

N^o. 672.

- R_x. Rad. Filicis ʒj—jjj.
 Aq. Filicis (v. Tiliae) ʒiv—vj.

M. D. S. Nach einem Abführmittel am darauf
 folgenden Morgen im Bett liegend zu nehmen.
 Nach zwei Stunden:

- R_x. Scammon.
 Calomel. ana gr. X.

G. Guttae gr. vj.
Confect. Hyacynth. q. s.

ut. f. Bolus.

D. S. Auf einmal mit einer Tasse Thee.

(Wie bei No. 671.)

Nuffert.

N^o. 673.

Ry. G. Guttae gr. xjj.

Sal. Absynth. ℥iβ.

Sap. Stark. gr. jj.

M. D. S. Morgens nüchtern mit einigen Tassen
Thee zu nehmen.

(Wie bei No. 671.)

Herrenschwand.

N^o. 674.

Ry. Calomel. ℥j.

Cinnab. antim.

Cornu Cerv. ust. ana ℥β.

M. D. S. In einem Löffel Wasser mit etwas Schleim
Abends zu nehmen. — Am andern Morgen
nüchtern:

Ry. Rad. Filicis pulv. ℥j.

— Jalapp. pulv.

Hb. Card. bened.

Ebur. ust. ana gr. x.

Syr. Cort. Aurant. ℥β.

M. D. S. Auf einmal mit etwas Thee zu nehmen.

(Wird zwei bis dreimal wiederholt, wenn der
Bandwurm nicht gleich abgeht.)

(Wie bei No. 671.)

v. Beck.

N^o. 675.

Ry. Extr. Tanaceti

Asae foet.

Pulv. Sem. Santon. ana gr. xxxvj.

N 1

Ferri sulph.

Mell. despumat. ana gr. xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Bei abnehmendem Monde alle 2—3 Stunden 10 Pillen.

(Wie bei No. 671.)

*Rosenstein.*N^o. 676.R_x. Ol. Tereb. $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.Ol. animal. foet. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.

Destill. e retorta vitrea tertia pars.

S. Morgens und Abends einen kleinen Theelöffel.

(Wie bei No. 671. — Oleum Chaberti.)

*Chabert.*N^o. 677.R_x. Rad. Jalapp. $\overline{\text{ʒ}}\text{iv}$.Sem. Carthami $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.Scammon. $\overline{\text{ʒ}}\beta$.G. Guttae $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.

Digere cum Cong. II Spir. Vini.

D. S. Zu 30 bis 100 Tropfen.

(Wie bei No. 671.)

*Werlhoff.*N^o. 678.R_x. G. Guttae gr. x.

Sem. Colocynth. No. III.

Amygdal. dulc. No. I—III.

M. f. Pulv. et cum

Syr. Absynth. q. s. Bolus.

D. S. Alle acht Tage einen solchen Bolus. —
An den Zwischentagen:R_x. Aloës succotr.Asae foet. ana $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.

Sal. Absynth. $\mathfrak{z}\beta$.Ol. Rorismarini $\mathfrak{z}\text{jj}$.

Elix. proprietat. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. X.

D. S. Morgens und Abends zwei Pillen.

(Wie bei No. 671.)

*Hautesierk.*N^o. 679.R_x. Sal. Absynth. $\mathfrak{z}\text{j}$.Sal. Tartari $\mathfrak{z}\text{jj}$.

G. Guttae gr. VIII — XII.

Mannae elect. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. D. S. Nach einer Abends genommenen Abführung

(mit Ol. Ricini) am andern Morgen zu nehmen.

(Wie bei No. 671.)

*Viussen.*N^o. 680.R_x. Limat. Stanni $\mathfrak{z}\text{j}$.Pulv. Rad. Filicis $\mathfrak{z}\text{vj}$.Sem. Cynae $\mathfrak{z}\beta$.

Pulv. Rad. Jalapp.

Natri tart. ana $\mathfrak{z}\text{j}$. \mathfrak{z} M. D. S. Drei Tage lang alle Tage einen Theelöffel.
Sobald der Kranke Bewegungen verspürt:R_x. Rad. Jalapp.Natri tart. ana $\mathfrak{z}\text{jj}$.Scammon. $\mathfrak{z}\text{j}$.

G. Guttae gr. X.

M. f. c. Melle despumato Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel, bis der
Wurm abgeht.

(Wie bei No. 671.)

*Mathieu.*N^o. 681.R_x. Aloës dep. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Asae foet.

Myrrhae ana gr. XV.

Camphorae ʒβ.

Ferri sulph. ʒiβ.

Liq. C. C. succ. gtt. X.

Syr. Absynth. q. s. ut

f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich 10—12 Pillen.

(Wie bei No. 671.)

Hecker.

No. 682.

R̄. Asae foet.

Fell. Taur. ana ʒjj.

Pulv. Rad. Jalapp. ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

D. S. Zehn Pillen pro Dosi; steigend.

(Wie bei No. 671. — Auch gegen Infarctus.)

Mellin.

No. 683.

R̄. Calomel.

Rad. Rhei ana ʒj.

Scammon.

Syr. Absynth. ana gr. Xjj.

M. f. Bolus. D. S. Nach einer vorhergegangenen
Abführung zu nehmen; nachher:

R̄. Calomel.

Rad. Polypod.

Cort. Mori

Syr. Agarici alb. comp. ana ʒj.

Scammon. ʒβ.

M. f. Bolus.

(Wie bei No. 671.)

Rougere.

No. 684.

R̄. Calomel. gr. X.

Sem. Rutae gr. XV.

Hb. Sabinae ℥j.

Ol. Tanacetii gtt. xjj.

Syr. flor. Persicae q. s.

ut. f. Bolus, Disp. tal. Dos. No. II.

D. S. Zwei Tage nach einander einen solchen Bolus.

(Wie bei No. 671.)

*Rathier.*N^o. 685.

℞. Trochisc. Alhandal. gr. jiiij.

Aloës gr. vjjij.

Calomel.

Trochisc. Myrrhae ana gr. x.

Syr. Persicae q. s.

ut. f. Bol. Disp. tal. q. l.

D. S. Nach dem Neumonde drei Tage nach einander einen solchen Bolus.

(Wie bei No. 671. Zugleich Decoctum Portulacae und Rad. Filicis.)

*Laborde.*N^o. 686.

℞. Calomel. gr. x.

Panac. merc. gr. IV.

Diagryd. sulphurat. gr. Xjj.

Test. ovor. calcin. ℥j.

Syr. Persic. q. s.

ut. f. Bolus. D. S. Auf einmal. (Drei Tage lang.)

(Wie bei No. 671.)

*Lagene.*N^o. 687.

℞. Calomel.

Lapid. Cancr. ppt. ana gr. Xjj.

M. f. Pulv. D. S. Abends zu nehmen, und nach 2 Stunden $\frac{1}{2}$ bis 1 Unze Ol. Amygdal. — Am folgenden Morgen ein Drittheil von folgendem Pulver;

- R̄. G. Guttæ gr. XXXvj.
 Hb. Card. bened.
 Rad. Angelicæ
 Pulv. antiepilept. March. ana gr. vjjj.
 M. f. Pulv. S. Mit etwas Thee oder Fleischbrühe.
 Einige Stunden nachher das zweite und selbst
 das dritte Drittheil. —
 (Wie bei No. 671.) *Clossius.*

 N^o. 688. a)

- R̄. Calomel.
 Extr. Aloës succ. ana gr. jjj.
 M. f. i. a. pil. No. III.
 D. S. Bei magerer Diät 8 Tage lang alle Abende
 diese Dosis.
 (Wie bei No. 671.) *Bongard.*

 N^o. 688. b)

- R̄. Pulv. Rad. Valer. min. ʒvj.
 Fol. Sennæ ʒjj.
 inf. Aq. ft. suff. qt.
 Col. ʒvj. adde
 Natri sulph. crystall. ʒjjj.
 Syr. mannat. ʒjj.
 Elaeosacch. Tanaceti ʒjj.
 M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Eßlöffel, und schwarzen
 Kaffee mit vielem Zucker oder Syrup nach-
 zutrinken. — Mittags eine dünne Mehlsuppe, und
 Hering mit Heringsmilch. Abends 8 Uhr Herings-
 salat mit gehacktem rohen Schinken, Bolle, vie-
 lem Oel und Zucker. — Am darauf folgenden
 Tage von 6 Uhr Morgens an;
 R̄. Asae foetidæ
 Extr. Graminis ana ʒjjj.
 Pulv. Guttæ
 Pulv. Rad. Rhei
 — — Jalappæ ana ʒjj.

Pulv. Rad. Ipecacuanhae
 Hb. Digital. purp.
 Salph. stib. aurant. ana $\mathfrak{D}\beta$.
 Calomel. $\mathfrak{D}\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.
 Ol. Tanaceti aeth.

— Anisi aeth, ana gtt. XV.

M. f. l. a. pil. pd. gr. $\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.

Consp. pulv. Lycopod. dent. ad vitr.

- S. Stündlich 6 Pillen mit einem Theelöffel Syrup;
 und eine halbe Stunde, nachdem die Pillen ge-
 nommen worden, einen Esslöffel Ol. Ricini. Da-
 zwischen schwarzen Kaffee mit vielem Syrup und
 Zucker. Mittags Fleischbrühe, Abends Mehlsuppe
 mit frischer Butter und Zucker. —

Wo es zweifelhaft ist, ob ein Bandwurm vor-
 handen sei, gebe man vorher folgendes Pulver
 Morgens nüchtern, nachdem der Kranke Abends
 einen Herings-Salat gegessen, und viel Zucker-
 wasser getrunken hat.

$\mathfrak{R}\mathfrak{y}$. Pulv. Rad. Jalappae gr. XV.

— Sem. Cynae $\mathfrak{D}\beta$.

Guttae

* Calomel. ana gr. vj.

Elaeosacch. Tanaceti $\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.

- M. D. S. Morgens nüchtern mit Syrup zu neh-
 men, und Kaffee oder Fleischbrühe nachzutrin-
 ken. — Es erfolgen darauf starke Stühle, mit
 welchen Stücke des Bandwurms abgehn.

(Wie bei No. 671. — Dieses Mittel wurde von
 dem preussischen Ministerium der Medicinal-
 Angelegenheiten einer wiederholten Prüfung
 unterworfen, und fand sich als höchst wirksam
 in allen Fällen, weshalb es dem Entdecker für
 eine namhafte Summe abgekauft ward.)

C. A. Schmidt.

S c r o p h e l n.

N^o. 689.

R_x. Calomel. \mathfrak{v} j.
 Res. Jalapp. \mathfrak{v} jj.
 Sacch. alb. \mathfrak{v} jjj.
 Mucilag. G. arab.

q. s. ut f. l. a. Trochisc. gr. VI.

Consp. Amyl.

D. S. Von Zeit zu Zeit 2—3 Zeltchen.

(S. No. 1177.)

*Fleisch.*N^o. 690.

R_x. Calomel.
 Sulph. aurat. antim. ana gr. β .
 Hb. Cicutae gr. V—X.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver.

(Pulvis Plummeri.)

*Plummer. (Henke.)*N^o. 691.

R_x. Pulv. Antim. crud. $\mathfrak{v}\beta$.
 Elaeosacch. Citri \mathfrak{v} j.
 Pulv. Flor. Cassiae $\mathfrak{v}\beta$.

M. f. c. s. q. Mucilag. G. Tragacanth.

Trochisc. No. XXXXVIII.

D. S. Zuweilen im Tage ein Zeltchen.

*Fleisch.*N^o. 692.

R_x. Pulv. Antim. crud. \mathfrak{v} j.
 Res. Guajaci $\mathfrak{v}\beta$.
 Extr. Aconit. \mathfrak{v} j.
 Sacch. alb. \mathfrak{v} x.

Mucilag. G. Tragacanth. q. s.

ut f. Rotul. No. XV.

D. S. Viermal täglich ein Zeltchen. *Weikard.*

Nº. 693.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. destill. $\bar{3}\beta$.

adde

Syr. Papav. alb. $\bar{5}jj$.

M. D. S. Täglich drei bis viermal 10—20 Tropfen
in Schleim. *Hufeland.*

Nº. 694.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}I\beta$.

Extr. Conii maculat. gr. X.

solve in

Aq. Foeniculi $\bar{3}v$ —vj.

adde

Syr. Rub. Idaeii $\bar{3}\beta$ —I β .

M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

Remer.

Nº. 695.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. destill. $\bar{5}j$.

adde

Vini stib. $\bar{5}jj$.

M. D. S. Alle 3 Stunden 10—15 Tropfen, mit der
Gabe steigend. *Wendt.*

Nº. 696.

Ry. Kali caust. gr. X.

solve in

Aq. Cort. Aurant. $\bar{3}j$.

M. D. S. Täglich viermal 10—20 Tropfen in einer
Tasse Kalbsbouillon. *Wetz.*

N^o. 697.

R_x. Sulph. aurat. antimon.
Extr. Arnicae ana ʒj.
Flor. Sulph. ʒβ.

M. f. l. a. c. Syr. Fumar. q. s.
Pil. pd. gr. II, Consp. pulv. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 12 Pillen. *Stoll.*

N^o. 698.

R_x. Guajaci ʒj.
Sap. med. ʒβ.
Calomel.
Sulph. aurat.
Camphor.
Pulv. Rad. Senegae ana ʒj.

M. f. l. a. Pil. gr. II.
Consp. Sem. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 8—10 Pillen. Zugleich
ein Thee von Guajacum. (Bei torpiden Subjecten
passend.) *Selle.*

No. 699.

R_x. Extr. Cicutae ʒj.
Pulv. Hb. Digital. purp. ʒβ.
Sulph. aurat. antim. ʒj.
Calomel, gr. x.

M. f. l. a. pil. pd. gr. I.
Consp. pulv. rad. Liquirit.
D. S. Morgens und Abends 10 Pillen. *Kortum.*

N^o. 700.

R_x. Sacch. alb. ʒIβ.
Flor. Sulph.

Rad. Irid. flor. ana ʒj.

Magnes. Nitri ʒβ.

M. f. Pulv. D.

S. Täglich dreimal eine Messerspitze mit Milch oder Wasser.

(Auch gegen Crusta lactea und Tinea capitis.)

*Vogler.*N^o. 701.R_x. Stib. sulph. nigr. ʒjj.

G. Asae foet. ʒjjj.

Extr. Cicutae ʒβ.

— Aconiti gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Zweimal täglich 8—10 Pillen (steigend).

*Richter.*N^o. 702.R_x. Res. Lign. Guajaci ʒj.

Sulph. stib. aurant. ʒIV.

Calomel. ʒj.

M. f. c. s. q. Bals. peruv.

Pil. No. LX. Consp.

D. S. Alle Abende 3—4 Pillen, (S. No. 759.)

*Richter.*N^o. 703.R_x. Magnes. alb. ʒβ.

Res. Guajaci

Limat. Martis ana ʒβ.

Sacch. alb. ʒjjj.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends eine Messerspitze voll.

Gölis.

N^o. 704.

- R_x. Extr. Cicut.
 Sap. venet. ana ʒβ.
 G. Ammoniaci
 Mass. pil. Ruf. ana ʒj.
 M. f. pil. pd. gr. III.
 Consp. Sem. Lycopod.
 D. S. Viermal täglich 2 Pillen. *Störk.*
-

N^o. 705.

- R_x. Stib. sulphurat. nigr.
 Pulv. Stipit. Dulcamar. ana ʒj.
 Extr. Dulcamar. ʒjj.
 M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 12 — 30 Pillen.
 (Auch gegen chronische Hautausschläge empfohlen.) *Althof. (Hufeland.)*
-

N^o. 706.

- R_x. Galbani
 Ammoniaci
 Sap. med. ana ʒj.
 Rad. Rhei ʒβ.
 Tart. stib. gr. XV.
 M. f. Pil. pd. gr. II.
 D. S. Morgens und Abends 10 — 15 Pillen. *Schmucker.*
-

N^o. 707.

- R_x. Fol. Digital. purp. gr. IV — VIII.
 Spong. marin. ust. ʒβ.
 Elaeosacch. Foeniculi ʒjj.
 M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.
 D. S. Täglich 2 — 3 Pulver. *Rust.*
-

N^o. 708.

- R_y. Sal. Herb. ʒj.
 Acet. Vini q. s. ad saturat.
 adde
 Anim. Rhei ʒj.
 Vini Antimon. ʒj.
 M. D. S. Täglich dreimal 30 — 50 Tropfen.

Selle.

N^o. 709.

- R_y. Extr. Tarax.
 — Fumar.
 — Trifol. fibr. ana ʒj.
 Aq. Cinnam. s. v. ʒijj.
 Tr. Valer. aeth. ʒj.
 — Rhei aq. ʒj.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Theelöffel.

Henke.

N^o. 710.

- R_y. Rad. Caryophyll. ʒβ.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 in finem coct. inmiscē
 Rad. Calam. aromat. ʒj.
 Col. ʒvj. adde
 Essent. Cort. Aurant.
 Tr. Rhei
 Liq. anodyn. Hoffm. ana ʒj.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Henke.

N^o. 711.

- R_y. Ungt. Neapolitan. ʒj.
 Sap. domest. ʒβ.
 Camphorae ʒj.

M. intime. D. S. Zum Einreiben, (Besonders bei einzelnen geschwollenen Drüsen.) *Schreger.*

N^o. 712.

R_x. Ungt. Hydrarg. ciner.

Ungt. Digital. purp.

Liniment. volat. ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Täglich ein bis zweimal in den Unterleib einzureiben. (S. No. 631. 632.) *Scheu.*

N^o. 713.

R_x. Sap. venet. $\bar{3}j$.

Camphor. $\bar{3}j$.

Liq. Ammon. vinos. $\bar{3}\beta$.

Ol. animal. Dipp. gtt. XX.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib und ad locum affectum. *Richter.*

N^o. 714.

R_x. Ungt. Althaeae $\bar{3}j$.

Fell. Taur. rec.

Sap. venet. ana $\bar{3}jjj$.

Petrol. $\bar{3}jj$.

Sal. C. C. vol. $\bar{3}\beta$.

Camphorae $\bar{3}j$.

M. f. Linimentum.

D. S. Alle drei Stunden einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Bei gleichzeitigen Würmern soll man $\bar{3}\beta$. Ol. Tanaceti hinzusetzen.)

Hufeland.

N^o. 715.

R_x. Rad. Squillae $\bar{3}jjj$.

Coq. c.

Lixiv. caust. suff. qt.

ad mucilag. Col. adde

Adipis suillae q. s.

ut f. Ungt. D.

S. Zum Einreiben auf den Unterleib, und auf die einzelnen angeschwollenen Drüsen. (Auch gegen Wassergeschwülste und Verhärtungen.)

*Hufeland.*N^o. 716.R_x. Extr. Dulcamar. ʒiβ.

— Senegae ʒj.

— Cicutae ʒβ.

solve in

Vini antimon. Huxh.

Aq. Cinnamom. ana ʒβ.

M. D. S. Täglich viermal 60—80 Tropfen, Monatlang zu gebrauchen. Zugleich alle 8 Tage eine Abführung mit Calomel und Jalappe; äusserlich Einreibungen mit Ungt. neapolitanum und Digitalis und stetes Tragen eines Empl. camphorat. Mynsichti; ein Fontanell in die Nähe der Geschwulst, und täglich ein halbes Bad aus einer Lauge von 3 Loth ungelöschtem Kalk und eben so viel Schwefel.

*Hufeland.*N^o. 717.R_x. Rad. Bryoniae ʒijj.

Flor. Sambuci ʒj.

G. Ammoniaci ʒβ.

Ammon. muriat. crud. ʒjj.

Hb. Cicutae ʒjj.

Aceti crudi q. s.

ut f. coquendo Empl.

D. S. Warm auf die Geschwulst zu legen.

(Gegen Gelenkgeschwülste, Scropheln, Struma,
Scirrhus.) *Plenk.*

N^o. 718.

Ry. Ferri pulv. ʒj.
Conch. ppt. ʒβ.
Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich drei bis viermal einen
Theelöffel.

(Gegen Kropf.)

Gölis.

N^o. 719.

Ry. Nihil. alb. ʒiv.
Oss. Sep.
Putam. ovor. ana ʒjj.
Panni scarlat. ʒβ.

M. et vase clauso comburantur et redig. in pulv.
D. S. Morgens und Abends 18 Gran zu nehmen,
und zur Vollmondszeit eine Purganz.

(Wie bei No. 718.)

De Haen.

N^o. 720.

Ry. Antimon. crudi ʒjj.
Lact. Sulph.
G. Guajaci
Extr. Arnicae
— Cicutae ana ʒj.

Hb. Digital. purp.

Barytae mur. ana ʒβ.

M. f. l. a. pil. pd. gr. II.

Consp. pulv. Calam. aroma

D. S. Dreimal täglich 8 Pillen.

(Wie bei No. 718.)

Jahn.

N^o. 721.

R_x. Antim. crud. ℥vj.
 Res. Guajaci ℥β.
 Extr. Aconiti ℥j.
 Sacch. alb. ʒx.

M. f. l. a. c. Mucilag. G. Tragacanth.

Rotul. pd. gr. VI.

D. S. Dreimal täglich ein Zeltchen.

(Wie bei No. 718. Auch gegen veraltete Halsdrüsengeschwülste empfohlen.)

Stoll. (Greding.)

N^o. 722.

R_x. Spong. tost. ℥vj.

Aq. font. ℥iv.

bull. paulisp. Col. adde

Aq. Ment. pip. ℥iβ.

Syr. Cort. Aurant. ℥j.

Liq. Ammon. anisat. ℥j.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

(Wie bei No. 718.) *Richter.*

N^o. 723.

R_x. Spong. marin.

Cort. lign. Suberis

Lap. Pumicis ana ℥j.

M. D. S. Alle Abende eine halbe Drachme in einem

Bolus.

(Wie bei No. 718.) *Bate.*

N^o. 724.

R_x. Cinnabar. Antimon. ʒj.

Spong. ust.

Millep. praep. ana gr. XV.

M. f. Pulv. D. S. Drei Wochen lang Morgens und
Abends ein solches Pulver.

(Wie bei No. 718.)

Prosser.

N^o. 725.

R_x. Spong. marin. tost. $\bar{3}\beta$.

Sem. Coff. tost. $\bar{3}\text{II}\beta$.

Rad. Jalapp. $\bar{3}\text{I}\beta$.

Cort. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.

G. Guttae $\bar{3}\text{j}$.

Elaeosacch. Citri $\bar{3}\text{jij}$.

M. f. Pulv. D. S. Täglich dreimal 2 Messerspitzen
voll.

(Wie bei No. 718.)

Weikard.

N^o. 726.

R_x. Spong. marin. $\bar{3}\beta$.

Magnes. carb.

Kali nitrici

Sacch. alb. ana $\bar{3}\text{j}$.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Dreimal täglich einen Kaffeelöffel voll.

(Wie bei No. 718.)

Mead. (Clarus.)

N^o. 727.

R_x. Spong. combust.

Antimon. crud.

Flor. Sulph.

Hb. Cicutae

Conch. pp, ana part. aeq.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends eine halbe
bis ganze Drachme.

(Wie bei No. 718.)

Kortum.

N^o. 728. a)

- R_x. Spong. tost. $\bar{\text{I}}\beta$.
 Hb. Digital. $\bar{\text{I}}j$.
 Ebull. aq. f. $\bar{\text{I}}\text{IV}$.
 Col. adde
 Spir. Sal. ammon. anisat. $\bar{\text{I}}j$.
 Syr. Althaeae $\bar{\text{I}}\beta$.
- M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 718. Besonders gegen Struma lym-
 phatica.) *Jahn.*

N^o. 728. b)

- R_x. Spong. marin.
 Tart. crud. ana $\bar{\text{I}}\text{IV}$.
 Lap. Spong.
 Alum. crud.
 Corii russ. ana $\bar{\text{I}}j$.
- M. Calcin. in vase fictil. bene claus.
 per $\frac{1}{4}$ hor. ut f. pulv. niger.
- S. Pulv. strumalis Hausleutneri.

- R_x. Pulv. strumal. Hausleutneri $\bar{\text{I}}vj$.
 coq. c. Aq. ft. q. s.
 Col. $\bar{\text{I}}\text{IX}$ admisce
 Aq. Cinnamomi
 Syr. Cort. Aurant. ana $\bar{\text{I}}\beta$.
- M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 728. a.) *Hausleutner.*

N^o. 729.

- R_x. Spong. marin. tost. $\bar{\text{I}}\beta$.
 Coq. ex Aq. ft. suff. qt.
 Col. $\bar{\text{I}}$. adde
 Extr. Saponariae $\bar{\text{I}}j$.

M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

(Wie bei No. 718.)

Thilenius.

N^o. 730.

R_x. Tart. tartarizat.

Spong. tost.

Sacch. alb. ana ʒβ.

Sal. ammon. dep.

Rad. Imperator.

Cinnamom. acut. ana ʒjj.

Sulph. Antim. aurat. ʒj.

Piperis longis ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Wenig reizbaren, an stärkeren lymphatischen Kröpfen leidenden Personen täglich, Morgens und Abends einen gehäuften kleinen Theelöffel. Reizbaren, magern, mit kleinen Kröpfen behafteten Subjecten täglich einmal einen Theelöffel. Am besten ist es, wenn das Pulver trocken verschluckt wird.

(Wie bei No. 718.) *Hedenus. (v. Gräfe.)*

N^o. 731.

R_x. Lapid. Spong.

Spong. marin. ust. ana ʒjjj.

M. f. Pulv. Divide in partes IX (ad XII) aeq.

D. S. Bei abnehmendem Monde Morgens und Abends ein Pulver. Zugleich örtlich ein Empl. diasulph. Rulandi.

(Wie bei No. 718.)

Vogler.

N^o. 732.

R_x. Camphorae ʒj.

Ol. Olivar.

- Spir. Ammon. comp. ana \mathfrak{z} jj.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Gegen Struma.)

Copland.

N^o. 733.

- Ry. Liq. Sal. ammon. caust. $\mathfrak{z}\beta$.
 Tr. Cantharid. \mathfrak{z} jj.
 Spir. camphorat. \mathfrak{z} l β .
 Extr. Hyoscyami $\mathfrak{z}\beta$.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 732.)

Osiander.

N^o. 734.

- Ry. Kali hydriodici $\mathfrak{z}\beta$ — j.
 Axung. porci \mathfrak{z} l β .
 M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Nuss
 gross in die Kropfgeschwulst einzureiben.
 (Wie bei No. 732. Auch gegen Drüsenan-
 schwellungen und solche Verhärtungen im All-
 gemeinen empfohlen.)

Coindet.

N^o. 735.

- Ry. Sap. med. gr. x.
 Pulv. Ari comp. gr. v.
 Fell. Tauri gr. j.
 M. D. S. Die Hälfte Mittags, die andere Hälfte
 Abends.
 (Gegen Atrophia infantum.)

Rosenstein. (Jahn.)

N^o. 736.

- Ry. Extr. Aconiti gr. vj.
 Vini stib. \mathfrak{z} j.

M. D. S. Täglich viermal 10 — 30 Tropfen.
(Wie bei No. 735.) *Hecker.*

N^o. 737.

Ry. Extr. Cicutae \mathfrak{B} — gr. xv.
Tr. Rhei aq.
Tr. Aurant. comp. ana \mathfrak{J} j.
Liq. Kali acet.
Syr. Cort. Aurant. ana \mathfrak{J} j.

M. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 735.) *Hecker.*

N^o. 738.

Ry. Extr. Cascarill. \mathfrak{J} j.
solve in
Aq. Foeniculi $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$.
— Cinnamomi \mathfrak{J} jj.
adde
Syr. Althaeae $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 735.) *Hufeland.*

N^o. 739.

Ry. Rad. Graminis
— Althaeae ana \mathfrak{J} jj.
— Taraxaci \mathfrak{J} j.
— Salep. \mathfrak{J} jj.
Rasur. C. Cerv. $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$.
Sem. Foeniculi \mathfrak{J} jj.

C. C. D. S. Drei Esslöffel voll in drei Nösel Wasser
zu kochen, und täglich zu trinken.
(Wie bei No. 735.) *Stark.*

N^o. 740.

- R. Spec. aromat. ℥j.
 Hb. Rutae
 Rad. Calami aromat. ana ℥β.
 C. C. M. Divide in partes VI aeq.
 D. S. Morgens und Abends eine Portion ins Bad.
 (Wie bei No. 735.) *Rusch.*
-

N^o. 741.

- R. Extr. Conii gr jiiij — vj.
 solve in
 Aq. Melissae ℥j.
 adde
 Tr. Rhei aq. ℥j.
 M. D. S. Täglich dreimal einen halben Esslöffel.
 (Gegen Tabes mesaraica.) *Hecker.*
-

N^o. 742.

- R. G. Asae foet.
 Extr. Quassiae
 Sap. med. ana ℥j.
 G. Ammoniacy
 Aloës lucid. ana ℥β.
 M. f. l. a. pil. pd. gr. jii.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.
 (Gegen Rhachitis. S. No. 708, 735.)
Richter.
-

N^o. 743.

- R. Liq. Terrae fol. Tart.
 Syr. Cichorei ana ℥j.
 Extr. Graminis ℥jiiij.
 Vini stib. ℥jiiij.

Sap. antimon. (vel G. Guttae) \mathfrak{z} j.
 M. D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Theelöffel.
 (Wie bei No. 742.) *Schaeffer.*

N^o. 744.

R \mathfrak{y} . Rad. Rubiae tinct. $\mathfrak{z}\beta$.
 Coq. leni igne cum Aq. ft. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 et Tart. solub. $\mathfrak{z}\text{jj}$. per horam.
 Col. adde
 Mellis despumat. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 M. D. S. Dem entwöhnten Kinde täglich 8 Unzen.
 (Wie bei No. 742.) *Levet.*

N^o. 745.

R \mathfrak{y} . Rad. Rubiae tinct. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 Cort. Aurant. sicc.
 Sem. Foeniculi contus. ana gr. xj .
 Concis. coq. c.
 Aq. font. $\mathfrak{z}\text{v}$. ad Col. $\mathfrak{z}\text{jjj}$.
 M. D. S. Zum täglichen Getränk.
 (Wie bei No. 742.) *Rosenstein.*

N^o. 746.

R \mathfrak{y} . Croc. mart. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Lap. Cancr. ppt. $\mathfrak{z}\beta$.
 Cinnabaris $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. Pulv. Divide in partes L aeq.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Wie bei No. 742.) *Camper.*

N^o. 747.

R \mathfrak{y} . Medullae oss. Tauri $\mathfrak{z}\text{jjj}$.
 Liqutatis et refrigeratis

adde

Mixt. oleoso-balsamicae $\bar{3}\beta$.Bals. ind. nigr. $\bar{5}\text{ijj}$.

D. ad vasculum. S. Zum Einreiben in das Rückgrat, den Thorax und die Gelenke der Extremitäten. —

(Wie bei No. 742. — S. auch die gegen Scropheln angewandten innerlichen und äusserlichen Mittel.) *Wendt.*

S c o r b u t.

N^o. 748.R_x. Malt. Hordei $\bar{3}\text{vj}$.Coq. c. aq. ft. suff. q. per $\frac{1}{4}$ hor.

adde

Sem. Foeniculi IV .Rad. Liquirit. $\bar{3}\text{ij}$.

Stent in digest. vase bene clauso
per XXIV hor. Col.

D. S. Täglich 1—4 Pfund zu verbrauchen.

*Husham.*N^o. 749.R_x. Rasur. Raphan. rust. $\bar{3}\text{ijj}$.Ferri pulv. $\bar{3}\text{j}$.Pulv. Rad. Rhei $\bar{3}\beta$.Rad. Zingiberis $\bar{5}\text{ij}$.Vini alb. gener. $\&\text{ijj}$.

Stent in infus. per XII hor.

Col. D. S. Täglich viermal $\frac{1}{2}$ —1 Theetasse voll.

Richter.

N^o. 750.R_x. Extr. Trifol. fibr.

— Centaur. min. ana ʒj.

solve in

Aq. flor. Chamomill. ʒiv.

adde

Spir. Cochleariae ʒij.

Acid. sulph. dilut. ʒj.

M. D. S. Esslöffelweise.

*Richter.*N^o. 751.R_x. Acid. nitr. fum.

— muriat. ana ʒβ — ʒj.

Aq. destill. ʒiv.

M. D. S. Täglich 3 — 4 Esslöffel.

*Köchlin.*N^o. 752.R_x. Acid. muriat.

Extr. Cort. Chin.

Terrae Japon.

Tr. Myrrhae ana ʒβ.

Syr. Moror.

Mell. rosat. ana ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln des blutenden Zahnfleisches. (Auch gegen die Geschwüre.)

*Richter.*N^o. 753.R_x. Acid. muriat.

— nitric. ana ʒβ.

Ol. Lini ʒiv.

M. f. l. a. Linimentum.

D. S. Zum Reiben scorbutischer Flecke. Zugleich innerlich No. 751.

Giebler.

G i c h t.

N^o. 754.

Ry. Flor. Arnicae ʒijj.

inf. Aq. f. suff. qt.

in Col. ʒvj. solve

Extr. Aconiti gr. ʒj.

adde

Tr. Guajaci ammon. ʒj.

Syr. Senegae ʒβ.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Bei vorhandenem fieberhaften Zustand.)

Berends.

N^o. 755.

Ry. Sap. venet. ʒijj.

Res. Guajaci

Pulv. Rad. Rhei ana ʒj.

Extr. Aloës aq. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich dreimal 4—8 Pillen.

Richter.

N^o. 756.

Ry. Crem. Tart. ʒj.

G. Guajaci ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Viermal täglich ein Pulver.

Kämpf.

N^o. 757.

Ry. Flor. Sulph. ʒj.

Res. Guajaci ʒβ.

Antim. crud. ʒijj.

M. f. c. s. q. Syr. Cort. Aurant.
 Pil. pd. gr. ꝑ. Consperg.
 D. S. Täglich dreimal 8 — 10 Pillen.
 (S. No. 1166.)

Quarin.

No. 758.

Ry. Rad. Sarsaparill. ꝑiv.
 Antim. crud. in sacc. lig. ꝑvj.
 Coq. in Aq. ft. ꝑIX ad
 consumpt. ꝑj. Sub. fin. coct.
 adde
 Pulv. Rad. Liquirit. ꝑß.
 Sem. Anisi ꝑj.

Col. D. S. Täglich drei bis viermal eine halbe
 Theetasse.

(S. No. 1076.)

(Richter.)

No. 759.

Ry. Aethiop. antim. ꝑj.
 Extr. Stipit. Dulcamar.
 G. Guajaci ana ꝑjj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. ꝑj.
 Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich dreimal 5 — 8 Pillen,
 (Auch gegen Scropheln und Herpes.)

Rust.

No. 760.

Ry. Extr. Aconit.
 Sulph. aurat. Antim. ana gr. ꝑj.
 Pulv. Lapid. Cancror. ꝑj.
 Mellis q. s. ut f. Boli No. II.

D. S. Morgens und Abends einen Bolus, und eine
 Tasse Thee nachzutrinken.

J. A. Schmidt.

No. 761.

- Rx. Antim. crud. ʒj.
 Flor. Sulph. ʒβ.
 Sacch. alb. ʒj.
 Rad. Calam. aromat. ʒj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Arthritis mit Atonie der Unterleibs-
 Eingeweide.)
Richter.

No. 762.

- Rx. Cort. Pernv. ʒβ.
 — Cinnamom. ʒβ.
 Antim. crud.
 Sacch. alb. ana ʒj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle drei Stunden einen Thee-
 löffel.
 (Wie bei No. 581.)
Richter.

No. 763.

- Rx. Antim. crud.
 Stipit. Dulcamar. ana ʒj.
 Extr. Trifol. fibr. (vel Card. bened.) ʒj.
 M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 581.)
Richter.

No. 764.

- Rx. Antim. crud. ʒβ.
 Asae foet. ʒj.
 Extr. Aconit. ʒβ.
 Extr. Card. bened. q. s.
 ut. f. Pil. pd. gr. jj.
 Consp. pulv. Cinnamom.

- D. S. Täglich dreimal 8 Pillen. (steigend)
(Gegen Arthritis mit Krämpfen und Unterleibs-
Stockungen.) *Richter.*

N^o. 765.

- R.* Calomel.
Sulph. aurat. Antim.
Extr. Aconit. ana gr. jj.
Stipit. Dulcamar.
Sacch. alb. ana ʒj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XVI.
D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Gegen Arthritis.) *Richter.*

N^o. 766.

- R.* Sulph. aurat. Antim.
Calomel.
Extr. Aconit. ana ʒβ.
Res. Guajac.
Succi Liquirit. ana ʒjjj.
Extr. Stipit. Dulcamar. ʒv.
M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnam.
D. S. Täglich viermal 8 Pillen.
(Wie bei No. 585.) *Richter.*

N^o. 767.

- R.* Flor. Sulph. ʒβ.
Res. Guajac. ʒjj.
Antim. crud. ʒiβ.
M. f. c. s. q. Syr. Cort. Aurant.
Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnam.
D. S. Täglich 8 — 10 Pillen.
(Wie bei No. 585.) *Quarin.*

N^o. 768.

- R. Calcis antim. sulph. Ph. boruss. $\mathfrak{J}\beta$.
 Coq. c. aq. ft. \mathfrak{E} V ad \mathfrak{E} IV vase clauso.
 D. S. Zu zwei bis drei Pfund täglich zu trinken.
 (N. B. Die Flaschen müssen wohl verstopft werden.)

*Hufeland.*N^o. 769.

- R. Natri carb. \mathfrak{J} .
 Extr. Absynth. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Aq. Menth. pip. $\mathfrak{J}\text{IV}$.
 Syr. Cort. Aurant. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

*Richter.*N^o. 770.

- R. Sulph. aurat. Antim. gr. XXV.
 Pulv. Rad. Valerianae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Sap. venet. $\mathfrak{J}\beta$.
 Extr. Dulcimar. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 M. f. Pil. pd. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 D. S. Täglich viermal 10 Pillen.

*Richter.*N^o. 771.

- R. Aethiop. min. $\mathfrak{J}\beta$.
 G. Guajac.
 Sap. venet. ana $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Sulph. aurat. Antim. $\mathfrak{E}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 M. f. c. Extr. amar. q. s. Pil.
 pond. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$. Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Abends und Morgens 10 Pillen.

*Baldinger.*N^o. 772.

- R. Sap. Amygdal. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 G. Guajaci $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 — 15 Pillen.

Theden.

No. 773.

Ry. Cort. peruv. ʒj .

Res. Guajac. $\text{ʒ}\beta$.

Extr. Aconit. $\text{ʒ}\beta$.

Ol. Cajeput. ʒj .

M. f. Pulv. S. Täglich zwei bis viermal einen
Theelöffel. *v. Gräfe.*

No. 774.

Ry. G. Guajac. ʒj .

Flor. Sulph. ʒj .

Calomel. ʒj .

Rad. Irid. flor.

Sem. Foeniculi ana $\text{ʒ}\beta$.

Laudan. puri gr. ij .

Sacch. albi $\text{ʒ}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends einen
Kaffeelöffel voll in Wasser gerührt. *Stark.*

No. 775.

Ry. Lign. Guajaci ʒij .

— Sassafras

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit.

— Graminis ana ʒj .

Sem. Foeniculi ʒj .

C. M. D. S. Zwei starke Esslöffel mit einem Maass
Wasser auf die Hälfte eingekocht. — Als Holz-
trank.

(Auch gegen Syphilis und Flechten.)

Murray.

No. 776.

R. Tur. Pini
 Bacc. Juniperi
 Ras. Ligu. Guajac.
 Rad. Liquirit. ana part. aeq.
 C. C. M. D. S. Zum Thee. *Seiler.*

No. 777.

R. Guajaci
 Hydrarg. stib. sulph. ana ʒj.
 Extr. Dulcamar. ʒjj.
 M. f. c. s. q. Syr. simpl.
 Pil. pd. gr. jj. Consp. Sem. Lycopod.
 D. S. Morgens und Abends 8 Pillen. *P. Frank.*

No. 778.

R. Res. Guajaci ʒj.
 Aq. Foeniculi ʒvj.
 Mucilag. G. arab. q. s.
 ut f. l. a. Emulsio,
 adde
 Syr. emuls. ʒβ.
 Spir. Nitr. dulc. gtt. XX.
 M. D. S. Morgens, Mittags und Abends zwei Ess-
 löffel. *Hufeland.*

No. 779.

R. Tr. Guajac. amm. ʒjj.
 — thebaic. ʒβ.
 — Antimon. acris ʒβ.
 M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 10 — 20 Tropfen.
v. Gräfe.

N^o. 780.

Ry. Tr. Guajac. volat. ʒj.
 — Absynth. (vel Caryophyllat.)
 — Aconit. (vel thebaic.) ana ʒj.

M. D. S. Morgens, Mittags und Abends 15—30
 Tropfen (steigend). *Stark.*

N^o. 781.

Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Extr. Aconit.
 Calomel.
 Sulph. stib. aurant. ana gr. ij.
 Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich zweimal ein Pulver.

(Besonders gegen Arthritis cephalica.)

Hufeland.

N^o. 782.

Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Mucilag. G. arab. ʒj.
 ter. aff. sensim
 Aq. Ment. pip. ʒix.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Täglich drei bis viermal einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 783.

Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Vitell. ov. No. I.
 tere cum
 Aq. Cinnamom. ʒj.
 adde
 Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Den Tag über in zwei bis drei Portionen
zu verbrauchen. *Richter.*

N^o. 784.

Ry. Pulv. rad. Senegae

Sap. venet.

Res. Guajac.

Stipit. Dulcimar.

Antim. crud. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich zwei bis dreimal 8—12 Pillen.

Richter.

N^o. 785.

Ry. Res. Guajaci ʒij.

Spirit. succi Sacch. ℥IV.

Digere in sol. per VIII dies.

D. S. Monatelang täglich zwei bis dreimal 1—2

Theelöffel.

(Specificum antipodagricum Emerigonis.)

Emerigon.

N^o. 786.

Ry. Tr. Guajaci ammon. ʒβ.

Mucilag. G. arab.

Syr. Amygdal. ana ʒj.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Thee-

löffel.

Richter.

N^o. 787.

Ry. G. Asae foet. ʒj.

Tart. stibiati gr. ʒj.

solve in

Liq. Ammon. acet. ʒj.

Aq. flor. Chamomill. $\bar{\text{z}}\text{iv}$.
adde

Syr. flor. Chamomill. $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Täglich drei bis viermal einen Esslöffel.
Richter.

N^o. 788.

Ry. Antimon. crud.

Extr. Myrrhae aq.

— stipit. Dulcamar. ana $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp.

D. S. Täglich drei bis viermal 8 Pillen.

Richter.

N^o. 789.

Ry. Ol. Tereb. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Mellis $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Morgens und Abends einen Theelöffel.
(Besonders gegen arthritische Affectionen im
Hüftgelenke.)

Herz.

N^o. 790.

Ry. Rad. Ari

— Aristoloch.

Cort. Winteran.

Sem. Petrosel. ana gr. vj .

Fol. Sennae gr. j .

M. f. Pulv. D. S. Alle Morgen um 9 Uhr ein
solches Pulver.

Zugleich *b*)

Ry. Aq. Cinnamom.

Tr. Cort. Aurant. ana $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Spir. Vitrioli $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. D. S. Mittags und Abends eine Stunde nach
dem Essen 60 Tropfen mit Wasser oder Wein.

Leidenfrost.

N^o. 791.

R_x. Extr. Aconiti ʒβ — j.
Vin. antim. Huxh. ʒj.

M. D. S. Täglich dreimal 15 — 30 Tropfen (steigend).
Richter.

N^o. 792.

R_x. Extr. Pulsatill.
Vini stib. ʒβ.

M. D. S. Täglich dreimal 20 — 60 Tropfen.
(Besonders gegen beginnende Cataracta und
Amaurosis arthritica.)
Rust.

N^o. 793.

R_x. Cort. Pruni padi ʒj.
Spir. Vini rectificati ʒijj.
Aq. font. ʒv.

Digere leniter in vase clauso.

Refrig. exprime. Cort. remanent.

Coq. in Aq. font. ʒvjjj.

Decoct. Colat. misce c. Infuso.

D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Bremer.

N^o. 794.

R_x. Extr. Dulcamar. ʒj.
Pulv. stipit. Dulcamar.
Antim. crud. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich drei bis viermal 20 — 30 Pillen.

Richter.

N^o. 795.

R_x. Stipit. et Fol. Rhododendri chrys. ʒjj.
inf. c. aq. f. ʒlxx. Stent in

O 2

II. Chronische Krankheiten.

digest. vase bene clauso per XXIV hor.
ad. ebull. usque. Col.

D. S. Täglich zweimal eine halbe Theetasse.
Cölpin.

N^o. 796.

R_x. Fol. Sabin. rec.
Sacch. alb. ana $\bar{\text{z}}\beta$.
Cont. pulv. in conserv.
Divide in partes XII aeq.

D. S. Alle vier Stunden einen Theil. *Rave.*

N^o. 797.

R_x. Magnes. carb. $\bar{\text{z}}\beta$.
Aq. Menth. virid. $\bar{\text{z}}\text{iv}$.
Acet. Colchici
Syr. Aurant. ana $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Alle drei Stunden einen Esslöffel.
Scudamore.

N^o. 798.

R_x. Tr. Gratiolae $\bar{\text{z}}\text{j}$.
(eodem modo ac Tr. Aconiti paratae)
Vini hispanici $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. D. S. Um die andere Stunde einen Theelöffel.
(Wird für den Hauptbestandtheil des Eau mé-
dicinale d'Husson gehalten.)

Wolf. (M. J. Schmidt.)

N^o. 799.

R_x. Phosphor. gr. jj .
subige exact. long. trit. ex
Mucilag. G. arab. q. s.
ut. f. c. Aq. font. $\bar{\text{z}}\text{vj}$.
Emulsio, cui adde

Syr. Amygdalar. $\bar{3}$ j.
Spir. sulph. aeth. gtt. XXX.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Hufeland.

N^o. 800.

Ry. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. jj.

Alcohol. vini $\bar{3}$ j.

Res. Guajac. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Morgens und Abends 20 Tropfen.

Lentin. (Richter.)

N^o. 801.

Ry. Rad. Gent. rubr.

— Aristoloch. rotund.

Summitat. Chamaedrys

— Chamaepitys

— Gent. minor. ana p. aeq.

G. M. f. Pulv. D. S. Drei Monate lang jeden Morgen eine Drachme.

(Pulvis antipodagricus Portlandi.)

N^o. 802.

Ry. Lign. Sarsaparill. $\bar{3}$ iv.

— Sassafras

Cort. Chinae ana $\bar{3}$ jj.

Rad. Liquirit. $\bar{3}$ j.

Coq. ex Aq. font. Cong. jj.

per $\frac{1}{2}$ horam. Deinde stent clause

super cinere calid. per horas XII.

Postea ebull. ad tertiae partis consumpt.

Cum primum ab igne amoveatur, infunde

Sem. Anisi $\bar{3}$ β.

Post horas II col. et postea depur.

per resid. et liq. clarus reponat. in

lagen. vitr. probe clausis.

S. Theelöffelweise.

(Besonders gegen Podagra gerühmt.)

*Sydenham.*N^o. 803.

Rx. Phosphori gr. IV.

solve in

Ol. Tereb.

— Lini express. ana $\bar{3}j$.

adde

Camphorae $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}j$.

M. D. S. Täglich zweimal einzureiben.

(Auch gegen Lähmung empfohlen.)

*Horn.*N^o. 804.Rx. Bals. peruv. $\bar{3}jj$.Spir. Vini $\bar{3}vj$.

M. D. S. Mehrmals täglich in die leidenden Gelenke einzureiben.

*Hoffmann. (Hufeland.)*N^o. 805.

Rx. Liq. Sal. ammon. caust.

Camphorae ana $\bar{3}j$.Ol. Terebinth. $\bar{3}lv$.

M. D. S. Zum Einreiben.

*Ackermann.*N^o. 806.Rx. Bals. Meccae $\bar{3}vj$.Chin. rubr. $\bar{3}j$.Crocī $\bar{3}\beta$.

Salviae

Sarsaparill. ana $\bar{3}j$.

Macera per horas XXXXVIII Balsamum
cum Spir. Vini $\bar{3}$ lβ — et medicamina alia cum altera
Spir. Vini parte. Tum filtra et miscē totum.

D. S. Zu Breiumschlägen geschüttet und überzu-
schlagen (zu $\bar{3}$ jj.) *Pradier.*

N^o. 807.

R̄. Tr. Gentianae

— Calami aromat. ana part. aeq.

M. D. S. Auf Brei zu Umschlägen.

Nasse.

N^o. 808.

R̄. Hb. Cicutae

— Hyoscyami ana M. j.

Sap. med. $\bar{3}$ β.

G. M. D. S. Mit Milch gekocht zum Umschlag.
(Auch gegen Herpes.) *Hecker.*

N^o. 809.

R̄. Sal. ammon. dep. $\bar{3}$ lβ — jj.

Merc. subl. corrossiv. $\bar{2}$ j — $\bar{3}$ β.

Spirit. Sabinæ $\bar{3}$ iv — vj.

Aq. Sabinæ $\bar{3}$ xjj — xvjjj.

M. D. S. Zu einer hinreichenden Menge Regen-
wasser geschüttet, zu Localbädern. *Kopp.*

N^o. 810.

R̄. Summitat. Juniperi

Fol. jun. Quercus

— Rubi nigri

Hb. Salviae sylv. ana M. IV.

Coq. ex Aq. font. Mens. IV.

D. S. Kochend in eine Badewanne geschüttet.

Der nakte mit drei bis vier wollenen Decken umhangene Kranke sitze auf einem Stuhl, so dass er von der Flüssigkeit nicht berührt werde; er trinke zwei bis drei Tassen Fliederthee, und bleibe $1\frac{1}{2}$ Stunden im Dampfe sitzen. Alle drei bis vier Tage zu wiederholen. *Sproegel.*

N^o. 811.

R_x. Merc. praecip. alb. \mathfrak{z} j — \mathfrak{v} IV.
Ungt. Digital. purp. \mathfrak{z} j.

M. exactiss. D. S. Drei bis viermal einzureiben und die Stelle mit Wachstuch (oder Wachstaffet) zu bedecken.

(Diese Salbe erregt einen künstlichen Ausschlag, welcher sehr schnell erscheint und weniger schmerzhaft und zerstörend eingreift als die Autenriethsche Salbe (s. No. 631.), und ist ausser gegen Gicht auch gegen Phthisis trachealis, Dysphagia, Tussis convulsiva, Scropheln und Ophthalmia scrophulosa empfohlen.)
Kopp.

N^o. 812.

R_x. Tart. emet. \mathfrak{z} ijβ.
Axung. porci \mathfrak{z} j.

M. f. Ungt. D. S. Täglich dreimal eine Haselnuss gross einzutreiben.

(Von Autenrieth zwar zuerst gegen Keuchhusten empfohlen, allein auch gegen Arthritis, zurückgetretene chronische Exantheme und Phthisis trachealis sehr hilfreich.)

Autenrieth.

N^o. 813.

R_x. Laud. liq. Sydenham. \mathfrak{v} IV.
Ol. Olivar. \mathfrak{v} XX.

M. D. S. Umgeschüttelt auf Flanell an die leidende Stelle.
Vogler.

Krampfkrankheiten.

Insofern die Krämpfe von Säure, Würmern u. s. w. herrühren, sind auch jene Rubriken nachzusehen. (S. auch Autenrieth's Salbe No. 812, welche in Krampfkrankheiten von Horn und-Feiler sehr empfohlen wird.)

N^o. 814.

R_x. Rad. Valer. ʒj.
— Irid. flor. ʒiβ.
— Liquirit. ʒjj.
Sem. Anisi ʒβ.
Croci opt. gr. vjjj.
Magnes. Sal. amar. ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich zwei bis dreimal eine Messerspitze voll.

(Gegen die Krämpfe der Kinder von Säure.)
Hufeland.

N^o. 815.

R_x. Extr. Cort. reg.
— Cort. Aurant. ana ʒj.
Aq. Foeniculi
— Cinnamomi ana ʒj.
Tr. Valer. aeth. ʒj.
Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Theelöffel.

(Wie bei No. 814.)
Henke.

N^o. 816.

R_x. Extr. Valer. ʒjj.
— Hyoscyam. gr. v.

solve in

Aq. Meliss.

— Cinnamom. ana $\bar{3}\beta$.

adde

Liq. anodyn. Hoffm. gtt. XX.

M. D. S. Alle Stunden ein bis zwei Theelöffel.

(Wie bei No. 814.)

Henke.

N^o. 817.

R_y. Sem. Sinap. $\bar{3}\beta$.

Spir. Vin. gall. $\bar{3}\text{jj}$.

Aq. font. $\bar{3}\beta$.

Digere per aliquot horas.

Col. adde

Liq. Ammon. carb. $\bar{3}\text{jj}$.

M. D. S. Täglich zweimal einen Esslöffel in Wasser zu nehmen.

(Gegen Krämpfe von Schleim im Unterleibe.)

Adair.

N^o. 818.

R_y. Ol. Lini

Syr. Althaeae ana $\bar{3}\text{jj}$.

M. D. S. Umgeschüttelt Esslöffelweise. *Richter.*

N^o. 819.

R_y. Opii puri gr. IV.

Nitri dep.

Sacch. Lact. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in part. VI aeq.

D. S. Alle zwei bis drei Stunden ein Pulver.

Richter.

N^o. 820.

R_y. Tr. Opii simpl. $\bar{5}\text{j}$.

Acid. sulph. dil. $\bar{3}\text{jjj}$.

Syr. Violar. $\bar{3}$ jj.

M. D. S. Zu 1—2 Theelöffel.

*Richter.*N^o. 821.

Ry. Rad. Ipecacuanhae
 Camphorae ana gr. \bar{ij} .
 Opii puriss.
 Calomel. ana gr. j.
 Sacch. alb. \bar{ij} .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Vor Schlafengehn ein Pulver mit warmem
 Chamillenthee zu nehmen.

*Richter.*N^o. 822.

Ry. Opii puriss. gr. v—x.
 Camphor. ras. \bar{ij} .

Ammon. carb. pyro-ol. \bar{ij} IV.

M. f. Pulv. Divide in part. X aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Besonders gegen Krämpfe der Bewegungs-Or-
 gane.)

*Richter.*N^o. 823.

Ry. Ol. Amygdal. $\bar{3}$ jj.
 Mucilag. G. arab. $\bar{3}$ vj.

M. exact. et adde

Decoct. Rad. Salep. $\bar{3}$ x.Opii puriss. gr. \bar{ij} —IV.(Tr. thebaicae \bar{ij} — $\bar{3}\beta$.)

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

(Besonders bei Unterleibskrämpfen.)

*Richter.*N^o. 824.*Ry.* Extr. HyoscyamiFlor. Zinci ana \bar{ij} .

Magnes. carb. $\bar{5}j$.Sacch. Lactis $\bar{5}vj$.M. f. Pulv. D. S. Kindern 2—6 Gran, Erwachsenen 10—30 Gran pro dosi. *Richter.*N^o. 825.Rx. Extr. Hyoscyami $\bar{5}j$.Aq. Laurocerasi $\bar{3}\beta$.M. D. S. Täglich drei bis viermal 20—50 Tropfen. *Jahn.*N^o. 826.Rx. G. Asae foet. $\bar{5}jj$.Extr. Cicutae $\bar{5}j$.— Aconit. $\bar{3}\beta$.

Calcmel. gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. \bar{ij} .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Wie bei No. 823.) *Richter.*N^o. 827.Rx. Hb. Digital. $\bar{3}\beta$.

inf. Aq. fervid. suff. qt.

Col. $\bar{3}vj$. addeAq. Cinnamom. simpl. $\bar{5}j$.M. D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Esslöffel. *Richter.*N^o. 828.Rx. Sem. Datur. Stramon. $\bar{5}jj$.Vini hispan. $\bar{5}vjjj$.Spir. Vini $\bar{5}j$.

Digere leni calore per VIII dies.

Col. D. S. Zu 5 bis 20 Tropfen pro dosi. *Hufeland.*

N^o. 829.

- R. Moschi opt. $\mathfrak{D}\beta$ — $\mathfrak{J}\beta$.
 Elaeosacch. Cinnamom. $\mathfrak{J}\text{jj}$.
 M. f. Pulv. subtiliss.
 terendo adde sensim
 Ag. Cinnamom. (vel Menthae) $\mathfrak{J}\text{v}\text{jjj}$.
 Syr. Cort. Aurant. $\mathfrak{J}\text{j}$.
 M. D. S. Ungeschüttelt alle 1 — 2 Stunden zwei
 Esslöffel. *Richter.*

N^o. 830.

- R. Moschi opt. gr. XII — XXIV.
 tere cum
 Amygdal. dulc. excort. q. s.
 ut f. l. a. Emuls. add.
 Aq. Cinnam. s. v. $\mathfrak{J}\text{iv}$.
 Syr. Amygdal. $\mathfrak{J}\beta$.
 M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.
Richter.

N^o. 831.

- R. Castor. gr. jjj — vj .
 Rad. Valer. min.
 Sacch. alb. ana $\mathfrak{D}\text{j}$.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.
 D. S. Ein Pulver pro dosi.
 (Besonders auf die Sphäre der Genitalien wirkend.)
Richter.

N^o. 832.

- R. G. Galb.
 — Asae foet.
 Extr. Myrrhae aq. ana $\mathfrak{J}\text{j}$.
 Castor.
 Camphorae

Ammon. carb. pyro-oleos. ana gr. V.

Ol. Cajeput. gtt. j.iii.

M. f. c. s. qt. Bals. peruv. Pil. pd. gr. j.ii.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 10 — 20 Pillen.

Richter.

N^o. 833.

R_x. Opii gr. v.

Camphorae ℥j.

Ammon. pyro-oleos. ℥iv.

M. f. Pulv. Divide in partes X aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

Hecker.

N^o. 834.

R_x. Camphorae rasae gr. j.ii.

Kali nitrici

Sacch. alb. ana ℥j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.

(Besonders bei gleichzeitig gestörter Hautfunction.)

Richter.

N^o. 835.

R_x. Camphorae rasae ℥β — j.
terendo misce c.

Aq. flor. Sambuci ℥iv.

Aceti Vini acerrimi ℥j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 834.)

Richter.

N^o. 836.

R_x. Camphorae rasae ℥j.

Succi Citri unius rec. express.

Vini alb. generos. ℥j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 834.)

Richter.

N^o. 837.

Ry. Camphorae gr. v.
Ammon. carb. pyro-ol. gr. vjij.
Mucilag. G. arab.
Syr. Althaeae ana ʒβ.
Aq. flor. Sambuci ʒjjj.

M. f. l. a Emulsio.

D. S. Alle Stunden einen Theelöffel. *Richter.*

N^o. 838.

Ry. Moschi c. Sacch. alb. trit. ʒjj.
Ammon. carb. pyro-ol. ʒβ—j.
Aq. Meliss. ʒvj.
Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 1—2 Stunden einen
Esslöffel. *Richter.*

N^o. 839.

Ry. Aether. vitriol. (vel acet.) ʒj.
Aq. Cinnamom. ʒjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Besonders bei grosser Schwäche.)

Hecker.

N^o. 840.

Ry. Aether. vitriol.
Tr. Valer. ana ʒjj.
— thebaicae ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden 15—20 Tropfen.
(Wie bei No. 839.) *Hecker.*

N^o. 841.

- Ry. Liq. anodyn. Hoffm.
Tr. Valer. ana ʒj.
M. D. S. Stündlich 30 — 40 Tropfen auf Zucker.
(Wie bei No. 839.) *Hecker.*
-

N^o. 842.

- Ry. Ol. Chamomill. ʒß.
Spir. muriat. aeth. ʒj.
M. D. S. Täglich dreimal 10 Tropfen.
Heim.
-

N^o. 843.

- Ry. Extr. Valer. ʒvj.
Ol. Valer. s. q. Sacch. alb. trit. gtt. VI.
Aq. flor. Aurant. ʒvj.
Syr. opiat. ʒj.
M. D. S. Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen
Esslöffel. *Richter.*
-

N^o. 844.

- Ry. Asae foet. ʒjj.
tere c. vitell. ovi,
adde
Aq. Meliss. ʒv.
Syr. Croci ʒj.
M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 823.) *Richter.*
-

N^o. 845.

- Ry. Asae foet. ʒjj.
solve in
Liq. Ammon. acet. ʒj.
adde

Aq. Hyssopi ʒijj.

Syr. Croci ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 846.

Ry. Asae foet. ʒj.

Ammon. carb. pyro-ol. ʒβ.

Opii puriss. gr. XV.

solve in

Tr. Castor. ʒijj.

M. D. S. Zu 30—40 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 847.

Ry. Stip. sulph. nigr.

Asae foet. ana ʒβ.

Extr. Cicutae ʒj.

— Aconiti ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ij. Consp.

D. S. Zu 8—10 Pillen dreimal täglich (steigend).

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 848.

Ry. Tr. Asae foet. ʒβ.

— Castor.

Aether. sulph. ana ʒij.

Tr. Opii crocat. ʒj.

M. D. S. Zu 60 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 849.

Ry. G. Ammoniaci

Extr. Tarax.

Sap. med. ana $\mathfrak{3j}$.

Asae foet.

Aloës lucid. ana $\mathfrak{3}\beta$.

M. f. Pil. pd. gr. \mathfrak{jj} . Consp.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Wie bei No. 823.)

Richter.

N^o. 850.

R_x. Rad. Valer. $\mathfrak{3}\beta$.

Castor.

Ammon. carb. pyro-ol. ana $\mathfrak{3}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in part. XV aeq.

D. S. Täglich zwei bis dreimal ein Pulver.

Richter.

N^o. 851.

R_x. Pulv. Cort. Chinae $\mathfrak{3j}$.

— Rad. Valer. $\mathfrak{3jj}$ — \mathfrak{jjj} .

— Cort. Cinnamom. $\mathfrak{3}\beta$.

Syr. Croci $\mathfrak{3iv}$.

M. f. l. a. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen starken Theelöffel.

Richter.

N^o. 852.

R_x. Extr. Valer.

Asae foet. ana $\mathfrak{3jj}$.

Ol. Valer. gtt. \mathfrak{jj} .

M. f. Pil. pd. gr. \mathfrak{jj} . Consp.

D. S. Täglich dreimal 12 Pillen.

Richter.

N^o. 853.

R_x. Rad. Valer.

— Liquirit.

Hb. Menthae crisp.

— Meliss.

— Chamomill. ana part. aeq.

C. D. S. Zu einem Theelöffel auf drei Tassen Thee.

Dürr.

No. 854.

Rx. Rad. Valer.

Fol. Aurant.

Summitat. Millefol. ana ʒj.

Fol. Salviae

Hb. Menthae ana ʒiβ.

— Chamomill. vulg.

— — roman.

Sem. Foeniculi ana ʒjj.

G. C. M. f. Spec. D. S. Zum Thee. *Kämpf.*

No. 855.

Rx. Fol. Aurant. virid.

Rad. Caryophyll.

— Valer. minor.

Summitat. Millefol. ana p. aeq.

G. M. D. S. Abends 1—3 Esslöffel mit einem Pfund Regenwasser zu übergießen, und nachdem es die Nacht zugedeckt gestanden, am andern Morgen durch Leinwand zu seihen. Dann Morgens, Nachmittags und Abends jedesmal den dritten Theil davon trinken zu lassen.

Hufeland.

No. 856.

Rx. Flor. Zinci

Extr. Hyoscyami ana ʒj.

Magnes. Sal. amar. ʒj.

Sacch. Lact. ʒviβ.

M. f. Pulv. D. Alle vier Stunden 5—30 Gran mit
Milch oder Wasser.

(Besonders gegen Epilepsie, Chorea, Tetanus,
Trismus.) *Vogler.*

N^o. 857.

R_x. Zinci sulph. gr. j̄j.
Mucilag. G. arab. ʒj.

solve in

Aq. Cinnamom. s. v.
adde

Syr. Cinnamom. ʒβ.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
Richter.

N^o. 858.

R_x. Plumbi acet. gr. vj.
(Opii puriss. gr. j̄j̄j̄.)
Sacch. alb. ʒj̄j̄.

M. f. Pulv. Divide in part. XII aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

Richter.

N^o. 859.

R_x. Plumbi acet.
(Opii puriss.) ana gr. v.
Extr. Lign. Quass.
Rad. Liquirit. ana ʒj.

M. f. Pil. No. LX. Consp.

D. S. Morgens und Abends 3—6 Pillen.

Richter.

N^o. 860.

R_x. Cupri sulphurico-ammon. gr. IV.
Micae panis alb.
Sacch. alb. ana gr. Xj̄j̄.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp.

D. S. Morgens und Abends eine Pille mit einer Tasse (Gersten-)Schleim, steigend zu 2—4 Pillen. (In jeder Pille ist $\frac{1}{4}$ Gran Cupr. sulph. amm.)
Richter.

N^o. 861.

Ry. Cupr. sulph. ammon. $\bar{5}j$.
solve in

Liq. Ammon. carb. $\bar{3}j$.

M. D. S. Zu 30 Tropfen pro dosi, steigend.

Boerhaave.

N^o. 862.

Ry. Argent. nitr. fusi

Opii puriss. ana gr. v.

Extr. Lign. Quass.

Pulv. Rad. Liquirit. ana $\bar{5}j$.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends drei Pillen.

Richter.

N^o. 863.

Ry. Sem. Lini contus. $\bar{3}j$.

Micæ panis alb. duriuscul. $\bar{3}jj$.

Hb. Hyoscyami concis. $\bar{3}\beta$.

Coq. c. s. q. lactis ad consist.

Cataplasmat. adde

Ol. Lini $\bar{3}l\beta$.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.

(Besonders bei Unterleibs-Krämpfen.)

Richter.

N^o. 864.

Ry. Flor. Malvae

— Verbasci

Hb. Hyoscyami ana $\mathfrak{z}j$.

Farin. Sem. Lini $\mathfrak{v}j$.

Concis. coq. c. s. q. Lactis

ad consist. Cataplasmat.

adde

Butyr. recent. insuls. $\mathfrak{z}jj$.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.

(Wie bei No. 863.)

Richter.

N^o. 865.

R \mathfrak{x} . Extr. Hyoscyami $\mathfrak{z}jjj$.

Opii puriss. $\mathfrak{z}j$.

Liq. Ammon. acet. q. s.

ad consist. Liniment. tenuior.

M. D. S. Zum Einreiben.

Richter.

N^o. 866.

R \mathfrak{x} . Liq. Ammon. caust. $\mathfrak{z}\beta$.

Ol. Hyoscyami infus. $\mathfrak{z}jj$.

Tr. Opii crocat. $\mathfrak{z}jjj$.

M. D. S. Zum Einreiben.

Richter.

N^o. 867.

R \mathfrak{x} . Ungt. Althaeae $\mathfrak{z}jj$.

Liq. Ammon. caust.

Tr. Opii crocat. ana $\mathfrak{z}jj$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Selle nimmt statt des Liq. Ammon. caust.
eine Drachme Camphora.)

Richter.

N^o. 868.

R \mathfrak{x} . Ol. Olivar. $\mathfrak{z}j$.

— destill. Ment. pip.

— Carvi ana $\mathfrak{z}jj$.

Laud. liq. Sydenh. \mathfrak{J} j — \mathfrak{J} j.M. D. S. Warm auf den Unterleib einzureiben.
*Henke.*N^o. 869.R \mathfrak{y} . Bals. peruv.
Tr. Opii
Naphthae Vitrioli ana \mathfrak{J} j.
Alcohol. Vini \mathfrak{J} j.M. D. S. Wie bei No. 868. *Henke.*N^o. 870.R \mathfrak{y} . Spir. Angel. comp. \mathfrak{J} jj.
Mixt. oleoso-balsam. $\mathfrak{J}\beta$.M. D. S. Zum Einreiben.
(Auch gegen Paralysen.) *Wendt.*N^o. 871.R \mathfrak{y} . Ol. Hyoscyami
— Papav. alb. ana $\mathfrak{J}\beta$.
Spir. Sal. ammon.
Liq. C. C. succ.
Laud. liq. Sydenh. ana \mathfrak{D} jj.M. f. Liniment. D. S. Alle zwei Stunden einen
Kaffeelöffel einzureiben.(Besonders gegen Colica, Hysterie, falsche
Wehen, und Strangurie.) *Stark.*

Hypochondrie und Hysterie.

N^o. 872.R \mathfrak{y} . G. ammoniaci
Sap. venet.

Pulv. Rad. Rhei

Fell. Tauri inspiss. ana ʒj.

Tart. stib. in s. q. Aq. f. sol. Gr. VI.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich dreimal 10—20 Pillen.

(Gegen Hypochondrie.)

*Richter.*N^o. 873.

R̄. Tart. stib. gr. vj.

Tart. natronat. ʒij.

Fell. Taur. inspiss. ʒβ.

solve in

Aq. Menthae pip. ʒvjij.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 872.)

*Richter.*N^o. 874.

R̄. Sap. venet.

Asae foet.

Extr. Tarax. ana p. aeq.

M. f. Pil. pd. gr. jjj.

D S. Täglich dreimal 10 Pillen.

(Wie bei No. 872.)

*Richter.*N^o. 875.

R̄. Sal. ammon. dep. ʒij.

Extr. Centaur. minor. ʒβ.

solve in

Aq. Menth. pip. ʒvj.

adde

Oxymell. squill. ʒvj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 872.)

Richter.

N^o. 876.

- Ry. Magnes. carb.
 Tart. dep.
 Sulph. dep.
 Rad. Rhei
 Flor. Chamomill.
 Elaeosacch. Foeniculi ana $\bar{3}\beta$.
- M. f. Pulv. D. S. Täglich einigemal einen Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 872. — Pulv. ephracticus Sellii.
 S. No. 391.) *Selle.*
-

N^o. 877.

- Ry. Crem. Tart.
 Rad. Rhei
 Cort. Aurant. ana $\bar{3}j$.
 Ol. Cajeput. *gtt.* vj .
- M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.
 (Wie bei No. 872. Vorher ein Abführmittel.)
Tissot.
-

N^o. 878.

- Ry. Tr. Asae foet.
 — Castor.
 Aether. sulph. ana $\bar{3}j$.
- M. D. S. Täglich drei bis viermal 30 — 40 Tropfen.
 (Wie bei No. 872.) *Richter.*
-

N^o. 879.

- Ry. Extr. Millefol.
 — Valer. ana $\bar{3}jj$.
 solve in
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}iv$.
 adde
 Spir. sulph. aeth. $\bar{3}j$.

(Liq. Ammon. succin. ʒj.)

M. D. S. Täglich 4 — 6 Esslöffel.

*Richter.*N^o. 880.R_x. Asae foet. ʒjjj.

Extr. Tarax.

— Chamomill.

— Millefol. ana ʒβ.

Acidi succinici gr. XXX.

Syr. Chamomill. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Abends 12 — 14 Pillen.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 881.R_x. Extr. Marrubii alb.

— Centaur. min. ana ʒj.

Aq. Cinnamom. vinos. ʒiβ.

M. D. S. Täglich fünfmal 40 Tropfen.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 882.R_x. Rad. Valer. ʒiβ.

Cort. Chinae ʒiβ.

— Winteran. ʒβ.

Ol. Cajeput. gtt. X.

M. f. Pulv. Divide in partes IX aeq.

D. S. Täglich viermal ein Pulver.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 883.R_x. Tr. Valer. aeth. ʒjj.

— Opii crocat. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden 30 Tropfen.
(Gegen Hypochondrie und Hysterie.)

Hecker.

N^o. 884.

Ry. Rad. Rhei
Magnes. carb. ana gr. XXIV.
Castor. gr. vj.

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal.
(Bei hysterischen Anfällen von Magensäure.)

Richter.

N^o. 885.

Ry. Elect. e Senna ʒvj — x.
Acid. tartar. ʒjj.
Sacch. alb. ʒβ.
Aq. flor. Aurant. ʒij.
Aether. sulph. ʒβ.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel bis zur Wirkung.

(Gegen Hysterie mit Verstopfung.) *Richter.*

N^o. 886.

Ry. Tr. Rhei aq. ʒijj.
— Castor. simpl. ʒjj.
Syr. Mannae ʒj.
Spir. sulph. aeth. ʒβ.

M. D. S. Esslöffelweise.
(Wie bei No. 885.)

Richter.

N^o. 887.

Ry. Asae foet. ʒj.
Galbani
Myrrhae ana ʒβ.
Castor. gr. xx.

M. f. c. Tr. Valer. q. s.

Pil. pd. gr. jj. D.

S. Täglich dreimal 3—6 Pillen.

(Gegen Hysterie S. No. 871.) *Sydenham.*

N^o. 888.

Ry. Spir. nitr. dulcis

Tr. thebaicae ana ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden 20—25 Tropfen.

(Wie bei No. 887.)

Stark.

N^o. 889.

Ry. Croci ʒj.

Flor. Aurant. ʒj.

Chamomill. ʒjjj.

C. M. f. Spec. D. S. Zu einem Theelöffel auf drei Tassen Thee.

(Wie bei No. 887.)

Berends.

N^o. 890.

Ry. Aloës succotr. ʒβ.

Croci opt.

Rad. Rhei

Agarici

Myrrhae

Rad. Zedoar.

— Gentianae ana ʒβ.

C. C. M. inf. c.

Spir. Vini gall. ʒxjj. (vel Cong. β.)

(aut cum Spir. frument. opt. Cong. j.)

Digere per XIV dies loco calido, Col.

D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

(Wie bei No. 887.)

Sprögel.

N^o. 891.R_x. Asae foet. ʒj.

Castor. ʒβ.

Extr. Chamomill. q. s.

ut f. pil. No. CXX. Dent. ad
vitrum bene obturatum.

8. Alle drei Stunden zehn Pillen.

(Wie bei No. 887.)

*Schubarth.*N^o. 892.R_x. Tr. Castor. simpl.

Spir. sulph. aeth. ana ʒj.

M. D. S. Im Anfall zu 60 Tropfen.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 893.R_x. Liq. C. C. succ. ʒj.

Ol. Cajeput. gtt. Xj.

Spir. sulph. aeth. ʒj.

M. D. S. Zu 15 — 30 Tropfē pro dosi.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 894.R_x. Tr. Opii simpl.

Sp. nitrico-aeth. ana ʒβ.

Liq. Ammon. succ. ʒj.

M. D. S. Zu 20 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 895.R_x. Asae foet. ʒβ.

Liq. Ammon. acet.

Syr. Croci ana ʒj.

Aq. Ment. pip. ʒβ.

M. D. S. In zwei Hälften (die zweite eine Viertelstunde nach der ersten) zu nehmen.
(Wie bei No. 887.) *Richter.*

No. 896.

Rx. G. Galb.
— Asae foet.
Extr. Angelicae ana ʒj.
Pulv. Castor.
Crocii orient. ana ʒβ.

Opii puriss. gr. xv.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zu sechs Pillen pro dosi (steigend).

(Wie bei No. 887.)

Richter.

No. 897.

Rx. Extr. Hyoscyami ʒj.
solve in

Liq. Ammon. succin. ʒj.

M. D. S. Zu 16 Tropfen pro dosi (steigend).

(Wie bei No. 887.)

Richter.

No. 898.

Rx. Pulv. Castor gr. x.

Tr. Opii crocat. gtt. xx.

Aq. Menth. pip. ʒijj.

Syr. flor. Chamomill. ʒijj.

M. D. S. Alle viertel Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 887.)

Richter.

No. 899.

Rx. Spir. matrical. ʒijj.

Tr. Asae foet.

Tr. Opii simpl. ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Auf die Herzgrube einzureiben.

(Wie bei No. 887.)

Richter.

N^o. 900.

Rx. Ol. Hyoscyami

— Chamomill. coct. ana $\bar{3}\beta$.

Liq. Ammon. carb.

— C. C. succ.

Tr. Opii crocat. ana $\bar{3}j$.

Ol. Succini $\bar{3}j$.

— Menthae pip. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Einen Esslöffel in den Bauch oder die Herzgrube einzureiben.

(Wie bei No. 887.)

Richter.

N^o. 901.

Rx. G. Myrrhae

Rad. Columbo

Ferri sulph. crystall. ana $\bar{3}j$.

Castor.

Aloës succotr. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. c. suff. q. Extr. Absynth.

Pil. pd. gr. $\bar{3}j$. Consperg.

D. S. Abends und Morgens 10 Pillen.

(Zur Nach-Cur gegen Hysterie. S. No. 551.
569, 578, 579, 593.)

Richter.

N^o. 902.

Rx. Rad. Valer. pulv. $\bar{3}j$.

Cort. peruv. pulv. $\bar{3}j$.

Sal. C. C. $\bar{3}j$.

Syr. Croci q. s. ut f. l. a. Elect.

D. S. Theelöffelweise.

(Gegen hysterisches Kopfweh. Migräne.)

Grent.

N^o. 903.R_x. Tr. Valer. aeth. (vel martial.) ℥j.

Extr. Hyoscyami ℥j.

M. D. S. Alle Stunden 15 Tropfen mit Pfeffer-
münzthee.

(Wie bei No. 902.)

*Jahn.*N^o. 904.R_x. Asae foet. in vit. ovi solut ℥β—j.

Infus. flor. Chamomill. ℥vj.

M. D. S. Zum Clystir.

(Gegen Hysterie, und besonders gegen Globus
und Nodus hystericus.)*Richter.*

Epilepsie. — Chorea. Raphanie.

N^o. 905.R_x. Rad. Valer. ℥j.

Limat. Ferri ℥jjj.

Myrrhae

Olibani

Extr. Tormentill. ana ℥β.

M. f. Pil. pd. gr. jjj.

D. S. Täglich drei bis viermal 10 Pillen.

(Gegen Epilepsie von Onanie.)

*Quarin.*N^o. 906.R_x. Rad. Valer. min. ℥β.

Magnes. carb.

Sal. Ammon. dep. ana gr. XXIV.

Ol. Cajeput. gtt. XXXjj.

M. f. Pulv. D. in vitro.

- S. Täglich dreimal einen Theelöffel. (S. No. 856.)
(Gegen Epilepsie.) *Berends.*
-

N^o. 907.

Ry. Magnes. alb. $\bar{\text{z}}\beta$.

Visci querni

Sacch. alb. ana $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Croci $\bar{\text{z}}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Alle 2—3 Stunden eine Messerspitze voll in Wasser oder Thee gerührt.

Wie bei No. 906. (Besonders bei Säure.)

(*Pulvis antiepilepticus Marchionis.*)

N^o. 908.

Ry. Rad. Artemisiae vulg. gr. x— $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Sacch. alb. gr. x.

M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.

S. Alle 3—4 Stunden ein Pulver. (Zu einer Drachme

Rad. Artemisiae täglich.)

(Wie bei No. 906.)

Giltermann.

N^o. 909.

Ry. Lap. infernal. $\bar{\text{z}}\beta$.

Extr. Gentianae rubr.

Succi Liquirit. inspiss. ana $\bar{\text{z}}\text{l}\beta$.

Opii puri gr. IV.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Lycopod.

D. S. Abends und Morgens drei Pillen. (Monate lang.)

(Wie bei No. 906.)

Heim.

N^o. 910.

Ry. Argenti nitrici fusi gr. x.

solve in

Aq. destill. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Sol. filtrat. instilla
 Liq. Natri muriatici q. s.
 ad praecipitandum. Praecipitatum
 sedulo ablutum solve in
 Liq. Ammon. caust. $\text{℥}\beta$.
 adde

Acidi muriat. ($\text{℥}\text{jj}$.) q. s.
 ut praecipitatio evitet, et
 Argent. muriatic. in statu
 solutionis permaneat.

Pondus fluidi filtrati aeq. sit $\text{℥}\text{ii}\beta$.

D. S. Vor der Luft zu bewahren, und zehnjährigen Kindern zu drei Tropfen (steigend zu sechs Tropfen) dreimal täglich mit destillirtem Wasser zu geben.

(Gegen Epilepsie mit Scropheln.)

Kopp.

N^o. 911.

R̄. Asae foet.

Castor. moscov. ana $\text{℥}\text{j}$.

Acid. succ. conc. $\text{℥}\beta$.

Ol. animal. Dippel. gtt. xx.

Tr. Myrrhae q. s. ut f. l. a.

Pil. pd. gr. v. Consp.

D. S. Zu 2—5 Pillen.

Wie bei No. 906. (Auch gegen Chorea.)

Diderit.

N^o. 912.

R̄. Argenti nitrici gr. j— jj .

Succi Liquirit. $\text{℥}\text{j}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 1—3 Pillen.

(Wie bei No. 906.)

Schäffer.

No. 913.

R̄. Argent. nitr. fusi ʒβ.

Extr. Valer. ʒj.

M. f. c. Pulv. Rad. Valer.

Pil. opd. gr. j. Obduc. fol. argent.

D. S. Morgens zwei und Abends drei Pillen.

(Wie bei No. 906.) *Richter.*

No. 914.

R̄. Camphorae ʒβ.

Sacch. alb.

Mucilag. G. arab ana ʒβ.

solve in

Acet. vini calid. ʒvj.

adde

Aq. flor. Sambuci ʒvj.

Syr. Papav. Rhœad. ʒj.

M. D. S. Alle 1—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 906.) *Locher.*

No. 915.

R̄. Phosphori gr. IV.

Aeth. sulph. ʒjjj.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden zehn Tropfen in

Wasser.

(Wie bei No. 906.) *van Hoven.*

No. 916.

R̄. Phosphori gr. jj.

Aeth. sulph. ʒβ.

Ol. Valerianae ʒj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden 20—30 Tropfen auf

Zucker.

(Wie bei No. 906.) *Löbenstein — Löbel.*

No. 917.

Ry. Phosphori gr. j.

Ol. animal, Dippel. \mathfrak{z} j.Ol. Valer. \mathfrak{z} j.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 10 Tropfen.

Bei gleichzeitiger Lähmung einzelner Glieder,
in diese eine Einreibung von

b) Ry. Phosphori gr. IV.

solve in

Ol. Sabinae \mathfrak{z} j.

adde

Ol. Caryophyllor. \mathfrak{z} j.M. D. S. Täglich zwei bis dreimal damit einzu-
reiben.(Wie bei No. 906.) *Löbenstein — Löbel.*

No. 918.

Ry. Ol. Tereb. rectific. $\mathfrak{z}\beta$.— Olivar. puriss. \mathfrak{z} jjj.D. ad vitr. capacit. $\mathfrak{z}\beta$.

adde

Phosphori gr. jj.

tunc digere in Aq. fervid. saep. agitand.

usque omnes Phosphori globul. disparuer.

adde

G. arab. in Aq. ft. \mathfrak{z} IV. subact. $\mathfrak{z}\beta$.Syr. Cinnamom. $\mathfrak{z}\beta$.M. D. S. Alle 3—4 Stunden einen kleinen Ess-
löffel.

(Wie bei No. 906.)

Schulz.

No. 919.

Ry. Liq. anodyn. mineral. Hoffm.

(vel Spir. Nitri. dulc.)

Spir. Sal. ammon. aromat. ana \mathfrak{z} jj.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 20 — 30 Tropfen.
(Wie bei No. 906.) *Hirschel.*

N^o. 920.

Ry. Sem. Sinap. alb. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
— Piperis alb. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
G. Asae foet. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
Sem. Levistici $\mathfrak{J}\mathfrak{b}$.

M. f. Pulv. Divide in part. VI aeq.

D. S. Alle Monate beim ersten Viertel des Mondes,
um den andern Tag zwei Pulver. (Ein Jahr lang
zu gebrauchen.)

(Wie bei No. 906.)

Sprögel.

N^o. 921.

Ry. Rad. Valer. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
Fol. Aurant. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
Sal. ammoniac. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
Ol. Cajeput. gtt. IV.

M. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 906.)

Ragoloi. (nach Knopf.)

N^o. 922.

Ry. Rad. Valer. $\mathfrak{J}\mathfrak{b}$.
Magnes. alb.
Sal. ammoniaci ana gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
Ol. Cajeput. gtt. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Wie bei No. 921. (S. No. 906.)

Ragoloi. (nach Gmelin und Feuerstein.)

N^o. 923.

Ry. Fol. Aurant. $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$.
Coq. in Aq. ft. $\mathfrak{J}\mathfrak{x}\mathfrak{x}$.

per horas $\text{jj} - \text{jjj}$ vase clauso.

Col. adde

Vini rubri ̄x .

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Täglich zwei bis viermal 6 — 8 Loth.
(Wie bei No. 906.) *de Haen.*

N^o. 924.

R_y. Fol. Aurant. virid. ̄vj .

Rad. Valer. ̄jj .

Inf. c. s. qt. Aq. f.

Col. ̄vj , adde

Syr. Aurant. ̄j .

M. D. S. So viel als möglich davon zu nehmen.
(Wie bei No. 906.) *Locher.*

N^o. 925.

R_y. Pulv. Cort. Chinae ̄vj .

— Rad. Serpentar. virg. ̄jj .

Syr. Paeoniae q. s. ut f. Elect.

D. S. Morgens und Abends eine Drachme, 3 — 4
Monate lang, dann blos 3 — 4 Tage vor dem Neu-
und Vollmond.

(Wie bei No. 906.)

Fuller.

N^o. 926.

R_y. Flor. Sulph.

Rad. Paeoniae pulv.

— Valer. sylv. pulv. ana ̄jjj .

Cinnabaris Antimon. ̄jj .

Moschi

Castor. ana ̄j .

Syr. simpl. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 906)

Bisset (Burserius.)

N^o. 927.R_x. Lign. Visci contus $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.Rad. Paeoniae cont. $\bar{\text{ʒ}}\text{i}$.Aq. comm. $\&\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.Coq. ad rem. $\&\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.

in finem coct. adde

Rad. Valer. sylv. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Lilior. Convall.

Flor. Tiliae

Hb. Galei lutei ana $\bar{\text{ʒ}}\beta$.Syr. Paeoniae $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

M. D. S. Täglich 3—4 Gläser lauwarm zu trinken.

(Wie bei No. 906.)

*Geoffroy.*N^o. 928.R_x. Cupri sulphurico-ammoniat. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

solve in

Aq. destillat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$

M. D. S. Täglich 3 mal 5 Tropfen (steigend).

(Gegen Chorea St. Viti. S. No. 106. 856. 911.)

*Niemann.*N^o. 929.R_x. Asae foet. \mathcal{V} .Extr. Nucis vom. \mathcal{J} .

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Lycopod.

D. S. Zu 6—10 Pillen pro dosi.

(Wie bei No. 928.)

*Niemann.*N^o. 930.R_x. Spir. Vini

Butyr rec.

Ol. Tereb. coct. ana. pt. aeq.

Q 1

M. D. S. Zum Einreiben in die tauben Fingerspitzen.
(Gegen Raphanie.) *Taube.*

Angina. Asthma. Tussis. (Tussis
convulsiva.)

N^o. 931.

R_y. G. Ammoniaci ʒj.

solve in

Oxymell. squill. ʒj.

adde

Vini emetici ʒj.

Syr. Althaeae ʒiv.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Angina.)

Selle.

N^o. 932.

R_y. Extr. Lactucae virosae gr. XVI.

solve in

Aq. Cinnamomi ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 15 Tropfen.

(Wie bei No. 930.)

(*Hufeland's Journal. — Scudamore.*)

N^o. 933.

R_y. Flor. Sulph.

Extr. Inulae

— Glycyrrhizae ana ʒj.

G. Ammoniaci ʒj.

Rad. Irid. Flor. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp. Lycopod.

D. S. Zu 8 — 10 Pillen pro dosi.

(Gegen Asthma; besonders von Erschlaffung
und Schleim-Anhäufung in den Lungen.)

Quarin.

N^o. 934.

- R_x. Asae foet. ʒj.
 solve in
 Liq. Ammon. acet. ʒj.
 Aq. Hyssopi ʒj.
 M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Asthma Millari.)

*Millar. (Schäffer.)*N^o. 935.

- R_x. Asae foet. ʒβ.
 Moschi genuini gr. vjij.
 Mucilag. G. arab. ʒβ.
 Misce terendo et adde
 Aq. Flor. Tiliae ʒiβ.
 Sacch. alb. ʒj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 934.)

*Wendt.*N^o. 936.

- R_x. Rad. Valer. min. ʒjij.
 inf. Aq. f. suff. qt. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Col. refrigerat. adde
 Moschi genuini gr. vjij.
 Liq. Ammon. pyro-oleosi ʒj.
 Tr. Ambrae ʒj.
 Syr. Flor. Aurant. ʒβ.
 M. D. S. Alle halbe Stunden 2 Theelöffel.
 (Wie bei No. 934.)

*Wendt.*N^o. 937.

- R_x. Moschi genuini gr. XXIV.
 Sacch. alb. ʒj.

Contr. exactiss. adde

Syr. Flor. Aurant. $\bar{3}j$.

Aq. Foeniculi $\bar{3}l\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 934.)

Sundelin.

N^o. 938.

Rx. Camphorae $\bar{3}j$.

 solve in

Aeth. sulph. $\bar{3}jj$.

 adde

Tr. Opii croc.

Mixt. oleoso - bals. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Alle 2 Stunden 20 Tropfen.

(Gegen Asthma überhaupt. S. No. 301.)

Hufeland.

N^o. 939.

Rx. Rad. Helen.

 — Irid. Flor.

 — Squill, ana $\bar{3}j$.

Benzoës

Myrrhae

Sem. Anisi

Succ. Liquirit.

G. Ammon. pur. ana $\bar{3}\beta$.

Croci $\bar{3}jjj$.

M. f. c. Spir. Vin. rectific. \mathcal{Q} . j.

l. a. Elix.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 938.)

Hufeland.

N^o. 940.

- R. Sap. venet.
 G. Asae foet. ana ʒj.
 Pulv. Cort. Aurant. gr. X.
 M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Zu 10—15 Pillen pro dosi.
 (Gegen Asthma vom Genuss saurer Dinge.)
Richter.
-

N^o. 941.

- R. G. Ammon. ʒj.
 solve in
 Oxymell. Squillae ʒj.
 adde
 Aq. Petrosel. ʒjjj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Asthma urinosum.) *Fordyce.*
-

N^o. 942.

- R. Nitri dep.
 Milleped. ppt.
 Baccar. Juniperi ana ʒj.
 Rad. Squill. gr. IX.
 M. f. Pulv. Divide in part. IX. aeq.
 D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
 (Wie bei No. 941.) *Richter.*
-

N^o. 943.

- R. Kali carb. dep. gr. X.
 Tr. Cardamom. comp. ʒjjj.
 Syr. simpl. ʒβ.
 Aq. Menth. pip.

M. D. S. Abends vor Schlafengehn zu nehmen.
(Gegen Asthma nocturnum. Incubus.)

Waller.

N^o. 944.

Rx. Ammon. carb. sicc. gr. X.

Tr. Capsici ʒβ.

Syr. Croci ʒβ.

Aq. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 943.

Waller.

N^o. 945.

Rx. Extr. Myrrhae aq.

— Marrub. alb.

G. ammon. dep. ana ʒjj.

Sulph. aurat. antim. ʒj.

Succi Liquirit. ʒjjj.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp.

D. S. Täglich 3—4 mal 4—6 Pillen.

(Gegen Asthma ex debilitate.)

Richter.

N^o. 946.

Rx. G. Asae foet.

— Galbani

Extr. Myrrhae aq. ana ʒjj.

Vitriol. Mart. ʒj.

Tr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich 2—3 mal 12—15 Pillen.

(Wie bei No. 945.)

Richter.

N^o. 947.

- R_y. Pulv. Rad. Squill.
 Extr. Cascarill. ana ʒj.
 Sulph. stib. aurant.
 Ammon. carb. pyro-ol. ana ʒβ.
 Ol. Anisi gtt. VI.
 Succi Liq. dep. q. s.
 ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Zu 7 Pillen pro dosi.
 (Wie bei No. 945.)

*Richter.*N^o. 948.

- R_y. Aq. Menth. pip.
 — Raphan. rust. ana ʒijj.
 Liq. Ammon. acet. ʒij.
 Sacch. alb. ʒβ.
 Sal. succ. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.
 (Wie bei No. 945.)

*Cullen.*N^o. 949.

- R_y. Kali carb. ʒj.
 Aq. Menth. pip. ʒiv.
 Spir. Sulph. aeth. ʒjj.
 M. D. S. Esslöffelweise.
 (Gegen Asthma convulsivum.)

*Wolf.*N^o. 950.

- R_y. G. Asae foet. ʒiβ.
 Extr. Valer. ʒj.
 — Aconiti
 — Squillae ana gr. vj.
 Castor. ʒβ.
 Sal. volat. C. C. gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Täglich 3 mal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 949. Zur Nach-Cur.)

Richter.

N^o. 951.

Ry. Mannae ʒj.
 Aq. Cerasor. nigr. ʒijj.
 Spir. Sal. ammon. anisat. ʒβ.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Brustbeschwerden und Husten.)

Hecker.

N^o. 952.

Ry. Spec. diaireos ʒvj.
 Rad. Paeoniae ʒjj.
 — Glycyrrhizae
 Flor. Sulph. ana ʒβ.
 Magnes. Nitri ʒj.
 Croci opt. ʒβ.
 Sacch. alb. ʒiiβ.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 3 — 4 Stunden eine halbe
 Drachme bis ʒjj. mit Wasser.
 (Gegen Husten. S. No. 246. 247. 248. 249.)

Vogler.

N^o. 953.

Ry. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) ʒβ
 Flor. Zinci
 Extr. Hyoscyami ana ʒβ.
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952.
 (Auch gegen Tussis convulsiva empfohlen.)

Vogler.

N^o. 954.

- R_y. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) \mathfrak{V} v.
 Nitri dep. \mathfrak{J} j.
 Rad. Ipecacuanhae gr. \mathfrak{J} jj.
 (vel Sulph. aurat. antim. gr. \mathfrak{V} j.)
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952. *Vogler.*

N^o. 955.

- R_y. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) \mathfrak{J} jjj.
 (Sal. ammon. pur.)
 Sem. Anisi stellati ana $\mathfrak{J}\beta$.
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952. *Vogler.*

N^o. 956.

- R_y. Flor. Sulph. lot. \mathfrak{J} jj — v.
 Succi Liquirit.
 Sacch. Lactis
 Rad. Liquirit. ana \mathfrak{J} jjj.
 — Irid. Flor. \mathfrak{J} j.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 952.) *Kopp.*

N^o. 957.

- R_y. Flor. Arnicae
 Nitri. antim. ana \mathfrak{J} j
 Camphorae gr. X.
 Opii gr. \mathfrak{J} jj.
 M. f. Pulv. D. S. Einigemal täglich einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 952. Besonders gegen trocken
 Reizhusten.) *Selle.*

N^o. 958.

- R_y. Rad. Liquirit.
 — Irid. flor. ana \mathfrak{J} jj.
 Sulph. depurat. $\mathfrak{J}\beta$.

II. Chronische Krankheiten.

Flor. Benzoës ℥j.

Sacch. alb. ʒijj.

Ol. Anisi aeth.

— Foeniculi aeth. ana gtt. X.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 2 mal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 952. Besonders bei Atonie der
Lungen.) *Wedel.*

No. 959.

R̄. Rad. Althaeae

— Graminis ana ʒj.

— Taraxaci

— Liquiritiae ana ʒβ.

Stipit. Dulcamar. ʒvj.

Fol. Sennae ʒj.

Sem. Foeniculi ʒj.

C. C. M. D. S. Brustthee.

(Wie bei No. 952.)

Stark.

No. 960.

R̄. Infus. Rad. Liquirit.

Decoct. Sem. Lini ana ʒβ.

Extr. Dulcamar. gr. X.

Oxymell. simpl. ʒjjj.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 952. Besonders für Kinder.)

Gölis.

No. 961.

R̄. Mucilag. Salep. ʒijj.

Spirit. Minderer. ʒj.

Massae pil. de Cynogloss. ℥j.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ — 1 Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 952.) *Stark.*

N^o. 962.

R^x. Hb. Nasturtii aq.
 — Cichorei
 — Veronicæ Beccabung.
 — Cerefolii ana M. j.

C. M. D. S. Mit $\frac{1}{2}$ ℥ Kalbfleisch und $\frac{1}{2}$ Maass Wasser zu einem Schoppen eingekocht, Morgens zu nehmen.

(Wie bei No. 952, Besonders bei gleichzeitiger grosser Schwäche.) *Best.*

N^o. 963.

R^x. G. Ammoniaci ʒj.
 Sulph. aurat. antim. gr. vj.
 Syr. Althæeae ʒijj.

M. f. l. a. Linctus.

D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einige Kaffeelöffel.

(Wie bei No. 952, Auswurf-befördernd.)

J. A. Schmidt.

N^o. 964.

R^x. Ol. Amygdal. dulc. rec. express. ʒj.
 Syr. Diacodii ʒijj.
 Opii puri pulv. gr. j.

M. f. l. a. Linctus.

D. S. Alle Stunden 1—2 Theelöffel.

(Wie bei No. 952.)

J. A. Schmidt.

N^o. 965.

R^x. Moschi gr. jj.
 Laud. liq. Sydenh. gtt. jiii.
 Liq. C. C. succ. ʒj
 Syr. Diacod. ʒiβ.

M. D. S. Theelöffelweise.
(Wie bei No. 952.)

Kämpf.

N^o. 966.

R_x. Ol. Olivar. alb. rec. express. ℥β.
Spec. diatragacanth. ℥j — ℥β
Syr. Papav. alb. ℥vj.
Aq. Flor. Sambuci ℥jj.

M. f. l. a. Linctus. D. S. Theelöffelweise.
(Wie bei No. 952.)

Kämpf.

N^o. 967.

R_x. Extr. Enulae ℥j.
Pulv. Hb. Digital. purp.
— Rad. Ipecacuanhae ana gr. X.
Opii puri gr. v — vj.
M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.
Consp. pulv. Lycopodii.

D. S. Alle 3 Stunden eine Pille.

(Wie bei No. 952. Besonders in veralteten
Fällen.)

Heim.

N^o. 968.

R_x. Sulph. Antim. gr. jj.
Opii puri gr. j.
Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pul. D. S. Abends vor Schlafengehn zu nehmen.
(Wie bei No. 952. Besonders gegen nächtli-
chen Husten.)

Weikard.

N^o. 969.

R_x. Opii puri
Rad. Ipecacuanhae ana gr. Xv.
Syrupi simpl. q. s.

ut f. Pil. No. XXX. Consp.

D. S. Morgens eine, Abends zwei Pillen. (Auch alle 4—6 Stunden eine Pille.)

(Wie bei No. 952 und 968.) *Weikard.*

N^o. 970.

R_x. Rad. Belladonnae gr. j.

Laud. puri gr. β.

Sacch. alb. ℥IV.

M. f. Pulv. Divide in part. vjij. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver, bis das Gesicht roth wird.

(Gegen Keichhusten. Zugleich No. 971. und 972.) *Gölis.*

N^o. 971.

R_x. Hb. Althaeae ℥j.

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit. ana ℥β.

C. C. M. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 970.)

Gölis.

N^o. 972.

R_x. Elect. anodyn.

Pulv. Rad. Belladonnae

Laud. liquid. ana ℥j.

G. arab. ℥jjj.

M. f. l. a. Ungt. D.

S. Auf Leder gestrichen in die Magengegend zu legen.

(Gegen Keichhusten.)

Gölis.

N^o. 973.

- Ry. Rad. Belladonnae gr. jj.
 — Ipecacuanhae gr. Iß. — jj.
 Flor. Sulph. lot. gr. XXXII.
 Sacch. Lact. gr. vjjj.
 M. f. Pulv. Divide in part. vjjj. aeq.
 D. S. Täglich 3 mal ein Pulver (mit der Bella-
 donna in der Gabe steigend).
 (Gegen Keichhusten. S. auch No. 471. 631.
 632. 953.) Kopp.
-

N^o. 974.

- Ry. Rad. Belladonnae gr. jiiij — v.
 — Liquirit.
 Sacch. alb. ana 5jjj.
 Pulv. Ipecacuanhae comp. gr. Xjj.
 Sulph. dep. gr. XX — XXV.
 Ol. Anisi aeth.
 — Succini ana gtt. jj — jjj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden eine Messer-
 spitze voll.
 (Wie bei No. 973.)
 (*Horn's Archiv, 1817. — Nasse.*)
-

N^o. 975.

- Ry. Hb. Belladonnae 5jj.
 Rad. Belladonnae 5j.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 Col. ♂ j. adde
 Sacch. alb. q. s. ut f. Syrupus.
 D. S. Zu einem oder mehreren Theelöffeln voll.
 (Wie bei No. 973.) Schäffer.
-

N^o. 976.

R_x. Extr. Cicutae gr. j.
Hb. Cicutae gr. V.

M. D. S. Zu $\frac{1}{2}$ —2 Gran in 2 Unzen Wasser gelöst und in zwei Tagen Theelöffelweise zu verbrauchen.

(Wie bei No. 973.)

Butter.

N^o. 977.

R_x. Extr. Cicutae gr. XV.
solve in

Aq. Menth. pip.
— font. ana $\bar{\text{I}}\text{V}$

adde

Syr. (Papav.) $\bar{\text{I}}\text{jjj}$.

M. D. S. Alle 4 Stunden von einem Theelöffel zu einem Esslöffel (dem Alter nach) zu geben.

(Wie bei No. 973.)

Armstrong.

N^o. 978.

R_x. Extr. Cicutae
solve in

Aq. Foeniculi $\bar{\text{I}}\text{jj}$.
adde

Tr. Opii benzoicae $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Syr. Opii $\bar{\text{I}}\bar{\beta}$.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 973.)

Hecker.

N^o. 979.

R_x. Extr. Lactucaae viros. gr. IV—VI.
Sacch. Lactis $\bar{\text{I}}\text{jj}$.

M. f. Pulv. Divide in partes xjj. aeq.

D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 973.)

Gumprecht.

N^o. 980.R_x. Extr. Hyoscyami ʒβ.

solve in

Vini Antimonii Huxh. ʒjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 5—15 Tropfen, so dass ein Kind von einem Jahre täglich 2 Gran Extr.

Hyoscyami bekommt.

(Wie bei No. 973.)

*Hufeland.*N^o. 981.R_x. Aq. Amygdal. amar. ʒjj.

— Flor. Tiliae ʒiv.

Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Stündlich einen Esslöffel.

(Wie bei No. 973.)

*Wendt.*N^o. 982.R_x. Ol. Olivar. alb. ʒβ.

Syr. Diacodii ʒβ.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 973. Auch gegen Cardialgie und Colik.)

*Vogler.*N^o. 983.R_x. Infus. Rad. Liquirit.

Decoct. Sem. Lini ana ʒiβ.

Kali nitrici gr. X.

Pulv. Doveri gr. j—jj.

Laud. liq. Sydenh. gtt. jj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No 973.)

Gölis.

N^o. 984.

- R_x. Liq. C. C. succ.
 Elix. pectoral. Reg. Dan. ana pt. jj.
 Laud. liq. Sydenh.
 Vin. antim. Huxh. ana pt. j.
 M. D. S. Alle Stunden 20—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 973.) *Jahn.*
-

N^o. 985.

- R_x. Elix. pect. reg. Dan. ʒvj.
 Spirit. Nitri dulc. ʒjj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒβ.
 M. D. S. Täglich 4 mal 10—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 973.) *Rühling.*
-

N^o. 986.

- R_x. Tr. Opii gtt. vj—vjjj.
 Aq. Foeniculi ʒj.
 Syr. Cinnamom. ʒβ.
 M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Für 1—3 Jahr alte Kinder.)
Henke.
-

N^o. 987.

- R_x. Tr. Opii gtt. XV—XX.
 Aq. Foeniculi ʒj.
 Liq. anodyn. Hoffm. ʒβ.
 Syr. Cort. Aurant. ʒβ.
 M. D. S. Für ein 4—10 Jahr altes Kind, in zwei
 Tagen zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 973.) *Henke.*
-

N^o. 988.

R_x. Extr. Cort. reg. ʒβ.
 Aq. Foeniculi ʒiβ.
 Liq. anodyn. Hoffm. ʒj.
 Tr. thebaicae gtt. xv.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Besonders bei gleichzeitiger grosser Schwäche.) *Henke.*

N^o. 989.

R_x. Rad. Ipecacuanhae gr. jiiij.
 G. arab.
 Magnes. carb. ana ʒβ.
 Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Divide in partes xij. aeq.

D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.) *Vogler.*

N^o. 990.

R_x. Asae foet. ʒj.
 Mucilag. G. arab.
 Syr. Althaeae ana ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Für ein 3 — 4 Jahr altes Kind.) *Kopp.*

N^o. 991.

R_x. Asae foet. ʒiβ.
 Mucilag. G. arab. q. s.
 ut f. Pil. No. XXX.

Consp. pulv. Rad. Irid. Flor.
 D. ad vitr. S. Täglich sechsmal eine Pille in
 Obstmus.
 (Wie bei No. 973.) *Kopp.*

N^o. 992.

- R_x. Moschi opt. gr. ijij .
 Laud. puri gr. β .
 G. arab. ʒj .
 Sacch. alb. ʒij .
 M. f. Pulv. Divide in part. vj. aeq.
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

*Gölis.*N^o. 993.

- R_x. Moschi opt. gr. $\text{ij}\beta$.
 Sulph. stib. aurant. gr. β .
 Zinci oxydati albi gr. β .
 Sacch. alb. gr. V.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. q. l.
 D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

*Hintze.*N^o. 994.

- R_x. Moschi gen. gr. ijij — vj.
 Liq. Ammon. succ. ʒj .
 Aq. Foeniculi $\text{ʒ}\beta$.
 Syr. Althaeae ʒj .
 M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einen
 Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.)

*Tortual.*N^o. 995.

- R_x. Flor. Sulph. lot. gr. IV — X.
 Sacch. alb. gr. X.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

Horst.

N^o. 996.

- R_x. Hep. Sulph. salin. gr. vj.
 Mellis ℥j.
 Aq. Rosur. ℥j.
- M. D. S. Morgens und Abends eine solche Portion.
 (Wie bei No. 973.) *Hinze.*
-

N^o. 997.

- R_x Tart. tart. ℥iβ.
 solve in
 Aq. Foeniculi ℥jj.
 adde
 Vini stibiati ℥j.
 Syr. mannat. ℥β.
- M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.) *Osann.*
-

N^o. 998.

- R_x. Extr. Stipit. Dulcamar. ℥β — ℥jj.
 Kali tart. ℥iβ.
 solve in
 Aq. Foeniculi ℥jjj.
 adde
 Vini emet. ℥j.
 Syr. Althaeae ℥vj.
- M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No 973.) *Osann. (Göbel.)*
-

N^o. 999.

- R_x. Acid. muriat. pur. ℥jj — jjj.
 Aq. font.
 Sacch. alb. ana q. s. ad dil. et gr. sup.
- M. D. S. In einem Tage zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 973.) *Thiel.*
-

N^o. 1000.R_x. Spir. Sal. dulcis ʒj.

Syr. Corall ʒvjjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 973.)

*Werlhof.*N^o. 1001.R_x. Acid. tart. gr. IV.

Rad. Ipecacuanhae

Opii elect. ana gr. jj.

Amyli opt. ʒj.

Sacch. alb. ʒjjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 4 mal 8 Gran bis ʒj,
trocken oder mit Wasser zu nehmen.

(Wie bei No. 973.)

*Vogler.*N^o. 1002.R_x. Cantharidum

Camphorae ana ʒj.

Extr. Chinae ʒjjj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden 8—10 Gran in ei-
nem Julep.

(Wie bei No. 973.)

*Burton.*N^o. 1003.R_x. Tr. Cantharid. ʒjj.

Laud. liq. Sydenh. ʒjjj.

Elix. pectoral. Wedel. ʒjj.

Oxymell. squil. ʒj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 973.)

Burton.

N^o. 1004.

- R_x. Tr. Cort. peruv. spirit. ℥j.
 Elix. sudorif. (paregor. Lond.) ℥j
 Tr. Cantharid. ℥j.
 M. D. S. Täglich einigemal 20 — 40 Tropfen, bis
 gelindes Harnbrennen erfolgt.
 (Wie bei No. 973.) *Lettsom.*
-

N^o. 1005.

- R_x. Decoct. Cort. Chin. ℥vj.
 Elix. sudorif. ℥jij.
 Tr. Cantharid. ℥j.
 M. D. S. Einem 3 jährigen Kinde täglich eine
 halbe Unze,
 (Wie bei No. 973.) *Lettsom.*
-

N^o. 1006.

- R_x. Cort. Chin. ℥β.
 Coq. ex Aq. font. ℥v.
 Col. ℥j. adde
 Tr. Cantharid.
 — Opii Sydenh. ana gr. XV.
 Syr. pectoral. ℥j.
 M. D. S. Täglich 4 mal $\frac{1}{2}$ bis 1 Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.) *Bucholz.*
-

N^o. 1007.

- R_x. Cantharid. ℥j.
 Amygdal. dulc. excort. ℥iβ.
 Sacch. alb. ℥β.
 in mort. marm. prob. cont. f.
 lenta affus. Aq. Cal. ℥x.
 Emuls. Col. sine express.

- D. S. Alle 3—4 Stunden $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel (dem Alter nach).
(Wie bei No. 973.) *Bicker. (Richter.)*
-

N^o. 1008.

- R̄. Extr. Cort. peruv. frig. parat. ʒj.
Aq. Foeniculi ʒiβ.
Liq. anodyn. Hoffm. ʒj.
Tr. thebaicae gtt. xv.
Syr. Cort. Aurant. ʒj.
M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 973.) *Richter.*
-

N^o. 1009.

- R̄. Sem. Sinap. alb. ʒj.
Oxymell. squill. ʒj.
M. D. S. Alle Stunden 1—2 Theelöffel.
(Wie bei No. 973.) *Thilow.*
-

N^o. 1010.

- R̄. Camphorae gr. xjj.
Phosphori gr. jjj.
Ol. dest. Carvi ʒjjj.
M. D. S. Täglich 3 mal etwas in die Magengegend, die Brust und die Schultern einzureihen.
(Wie bei No. 973.) *Löbenstein - Löbel.*
-

Cardialgie. Colica.

N^o. 1011.

- R̄. Bismuth. oxydat. alb. gr. j—jjj.
Sacch. alb. ʒβ.

- Ol. Cinnamom. gtt. jj.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3—4 mal ein Pulver.
 (Gegen Cardialgie. S. No. 973.) *Hecker.*
-

N^o. 1012.

- R_x. Magister. Bismuth. gr. jj—jjj.
 Extr. Lactucæ virosæ gr. Iβ—jj.
 Magnes. alb. gr. IV.
 Rad. Ipecacuanhæ gr. $\frac{1}{4}$ —β.
 Elaeosacch. Chamomill. (v. Menth. pip.) gr. $\frac{r}{s}$ X.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3—4 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.) *Kopp.*
-

N^o. 1013.

- R_x. Bismuth. nitrici præcip. gr. jj.
 Magnes. ust. gr. X.
 Ol. Cajeputi gtt. jj.
 Sacch. alb. gr. vj.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.
 D. ad chartam ceratam.
 S. Täglich 2 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.) *Schubarth.*
-

N^o. 1014.

- R_x. Bismuth. nitrici præcip. $\vartheta\beta$.
 Extr. Valer. 5j .
 Ol. Valer. aeth. gtt. X.
 Pulv. Rad. Valer. q. s.
 ut. f. Pil. No. LX. D. ad vitr. bene claus.
 S. Täglich 3 mal 6 Pillen.
 (Wie bei No. 1011.) *Schubarth.*
-

N^o. 1015.

- Ry. Rad. Ipecacuanhae
 Opii thebaic. ana gr. IV.
 Alum. crud. gr. xvj.
 Elaeosacch. de Cedro gr. XXXijj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VIII. aeq.
 D. S. Alle Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.)

*Hecker.*N^o. 1016.

- Ry. Magnes. alb. ʒj.
 Lign. Quass. gr. V.
 M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Gegen Magenkrampf von Säure, S. früher
 unter Magenfehler.)

*Tode.*N^o. 1017.

- Ry. Liq. Ammon. carb, ʒvj.
 solve in
 Aq. flor. Chamomill. ʒijj.
 adde
 Syr. flor. Chamom. ʒvj.
 M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Cardialgie von Erkältung.)

*Richter.*N^o. 1018.

- Ry. Asae foet. ʒj.
 solve in
 Syr. Menth. pip. ʒj.
 adde
 Aq. Menth. pip. ʒijj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel, bis Lin-
 derung erfolgt.
 (Gegen Cardialgie von Flatulenz.)

Richter.

N^o. 1019.

R_x. Extr. Trifol. fibr. ʒij.
 Fell. Tauri inspissat. ʒj.
 Extr. Aloës gr. xjj.
 Castor. gr. X.
 Sap. venet. ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Täglich 4 mal 5 Pillen.

(Gegen Cardialgie aus Magenschwäche, Zugleich
 Hb. Millefolii als Thee.) *Schmitz.*

N^o. 1020.

R_x. Ol. Nucis moschat. express. ʒj.
 — destill. Menth. pip.
 — Lavandul. ana gtt. XV.
 — Succini rectific. ʒβ.
 Sal. vol. C. C. gr. X.

M. D. S. In die Herzgrube einzureiben.
 (Gegen Cardialgie.) *Richter.*

N^o. 1021.

R_x. Aq. Regin. Hungar.
 Spir. Serpylli ana ʒij.
 Tr. thebaicae ʒjjj.

M. D. S. Mit Löschpapier auf die Herzgrube zu
 legen.

(Wie bei No. 1020.) *Richter.*

N^o. 1022.

R_x Elect. theriac.
 Ol. Nucist. express. ana ʒj.
 Castor.
 Croci oriental.

Bals. peruv. ana $\bar{3}j$.
 Ol. de Cedro gtt. XX.
 Camphorae $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Auf die Magengegend zu legen.
 (Wie bei No. 1020.) *Richter.*

N^o. 1023.

Ry. Aven. excort.
 Flor. Chamomill. ana $\bar{3}j$.
 Coq. c.
 Aq. ft. q. s. ad Col. $\bar{5}vjjj$.
 adde

Ol. Lini
 Mell. crud. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Gegen Kolik. S. No. 406. 407. 463. 469. 560.
 871. 973.) *Richter.*

N^o. 1024.

Ry. Decoct. Flor. Chamomill. $\bar{3}x$.
 Spir. Nitri dulc. $\bar{3}jj$.
 in quo solut. Ol. Cajeput. gtt. IV.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Wie bei No. 1023.) *Vogler.*

N^o. 1025.

Ry. Salis Friderici contriti $\bar{3}j$.
 Sap. venet. rasi $\bar{3}\beta$.
 Sem. Lini contusi $\bar{3}i\beta$.

M. D. S. Mit 12 Unzen Semmelkrumen und kochendem Wasser zu Brei gemacht, welcher auf den Bauch zu legen ist.
 (Wie bei No. 1023.) *Vogler.*

No. 1026.

Ry. Aq. Cinnam. s. v. $\bar{5}$ jj.
 Tr. Rhei aquos. $\bar{5}$ j.
 Extr. Columb. $\bar{5}$ jj.
 Spir. Sulph. aeth. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Täglich 3 mal einen Esslöffel.
 (Zur Nach - Cur gegen Kolik.) *Richter.*

No. 1027.

Ry. Tr. Castor.
 Liq. anodyn. Hoffm. ana $\bar{5}$ j.

M. D. S. Zu 30 Tropfen in lauwarmem Chamillenthee.
 (Gegen Colica flatulenta.) *Richter.*

No. 1028.

Ry. Spir. Nitri dulcis $\bar{5}$ j.
 Tr. Cort. Aurant. $\bar{5}$ jj.

M. D. S. Zu 30 Tropfen in warmem Chamillenthee.
 (Wie bei No 1027.) *Richter.*

No. 1029.

Ry. Rad. Columb. $\bar{5}$ j.
 Opii puri gr. $\frac{1}{4}$ - β .

M. D. S. In einem halben Glas Wein zu nehmen.
 (Wie bei No. 1027.) *Schneider.*

No. 1030.

Ry. Magnes. carb. $\bar{5}$ j.
 Rad. Rhei $\bar{5}$ jj.
 — Valer. $\bar{5}\beta$.
 Elaeosacch. Foeniculi $\bar{5}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Colica infantum; auch gegen verschiedene andere krankhafte Erscheinungen, wie Unruhe, Schlaflosigkeit, Durchfall, Verstopfung u. s. w. bei kleinen Kindern empfohlen.)

Hufeland.

N^o. 1031.

Ry. Pil. e res. Jalapp. pharm. boruss. $\mathfrak{I}V$.

Opii gr. xj — Xvj .

M. f. Pil. pd. gr. jj .

D. S. Alle 2 Stunden 5 Pillen.

(Gegen Colica saturnina.)

Gebel.

N^o. 1032.

Ry. Alum. crud. $\mathfrak{I}\beta$.

solve in

Aq. font. destill. $\mathfrak{I}vj$.

adde

Syr. Althaeae $\mathfrak{I}vj$.

M. D. S. Alle 2 Stunden eine halbe Theetasse.

(Wie bei No. 1031.)

Grashuis.

N^o. 1033.

Ry. Ol. Ricini in

Vitell. ovar. subact. $\mathfrak{I}\beta$.

Aq. Menth. pip. $\mathfrak{I}j$.

Tr. thebaicae gtt. $vjjj$.

Syr. e mecon. $\mathfrak{I}j$.

M. D. S. Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 1031.)

Percival.

N^o. 1034.

- Ry. Boracis ʒiβ.
 Aq. Menth. crisp. ʒv.
 Tr. Opii crocat. ʒβ.
 Syr. Althaeae ʒiβ.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No 1031.)

*Sundelin.*N^o. 1035.

- Ry. Magnes. sulph. ʒj.
 solve in
 Aq. font. destill. ʒvjjj.
 adde
 Ol. Lini ʒj.
 Syr. Papap. ʒj.
 Extr. Opii gr. v.
 M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Ileus.)

*Sydenham. (Pringle.)*N^o. 1036.

- Ry. Cryst. Tart. ʒjj.
 Sacch. alb. ʒvj.
 Rad. Ipecacuanhae gr. jjj.
 M. D. S. Alle Stunden eine Messerspitze.
 (Wie bei No. 1035.)

*Vogler.*N^o. 1037.

- Ry. Crem. Tart. ʒβ.
 Cort. Chin. reg. alcohol. ʒj.
 M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Alle Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 1035.)

Vogler.

N^o. 1038.

R̄. Res. Jalapp. gr. IX.
 Sap. venet. gr. jiiij.
 tere. Dein affunde
 Ol. Olivar. Cochlear. jj.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle Stunden den
 vierten Theil zu nehmen.

(Wie bei No. 1035.)

Gruner.

N^o. 1039.

R̄. Calomel.
 Extr. Colocynth. ana ℥j — jiiij.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Zehn Pillen auf einmal, und nachher alle
 Stunden 5 Pillen, bis Stuhlgang erfolgt.

(Wie bei No. 1035.)

Donald Monro.

N^o. 1040.

R̄. Rad. Ipecacuanhae ℥jiiij.
 Coq. ex. Aq. ft. suff. qt.
 ad Col. ℥vj.
 adde

(Ol. Olivar. vel Ricini ℥β.)

M. D. S. Zum Clystier.

(Wie bei No. 1035.)

Michel. (M. J. Schmidt.)

N^o. 1041.

R̄. Tart. stib. gr. vjiiij.
 solve in

Aq. font.

Aceti Vini ana ℥jiiij.

M. D. S. Zum Clystier.

(Wie bei No. 1035.) (*Hufeland's Journal.*)

N^o. 1042.

R_x. Asae foet. ʒj.
 Infus. flor. Chamomil.
 ex ʒj. parat. ʒvj.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Wie bei No. 1035.)

Joerdens.

Eclampsie. Hydrophobie. u. s. w.

N^o. 1043.

R_x. Zinci oxydati albi
 Extr. Hyoscyami ana ʒj.
 Magnes. subcarb. ʒj.
 Sacch. Lactis ʒvj.

M. f. Pulv. D. S. Zu 10—30 Gran pro dosi.
 (Gegen Eclampsie.)

Vogler.

N^o. 1044.

R_x. Crem. Tart.
 Nitri dep. ana ʒj.
 Opii pulv. gr. ʒj.
 Aq. font. ʒjij.
 Syr. Papav. alb. ʒjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1043. — Auch gegen falsche
 Wehen.)

Vogler.

N^o. 1045.

R_x. Castorei gr. xvjjj.
 Nitri dep. ʒβ—j.
 Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Divide in partes vj. aeq.

D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 1043. Auch gegen Congestionen zum Uterus und Neigung zum Abortus.)

Berends.

N^o. 1046.

Rx. Rad. Ipecacuanhae gr. jj —IV.

Sacch. alb. gr. x.

M. f. Pulv. Divide in part. IV. aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver. (Bei gastrischer Complication setze man vor der Theilung einen Scrupel Kali sulphurici hinzu.)

(Wie bei No. 1043. Besonders gegen falsche Wehen.)

Ribke.

N^o. 1047.

Rx. Tr. Opii simpl. gutt. XX.

Spir. nitrico-aeth. ʒj .

Aq. flor. Aurant. ʒvj .

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel, bis die Wehen nachlassen, und erst bei ihrem allenfalsigen Wiedereintritt fortzufahren. —

(Gegen Nachwehen.)

Formey.

N^o. 1048.

Rx. Verm. majal. No. X.

Rad. Valer.

— Pimpinell.

— Agrimon.

Visci querni ana ʒβ .

M. f. c. Roob Sambuci Electuarium.

D. S. Alle zwei Stunden einen vollen Theelöffel.

(Gegen Hydrophobie. S. No. 105)

Kemme. (Schwartz.)

N^o. 1049.

- R_x. Calomel. gr. VIβ.
 Camphorae gr. vj.
 Cantharid. gr. j.
 M. f. c. Mucilag. G. arab. pil. pd. gr. j.
 D. S. Eine Pille pro dosi.
 (Wie bei No. 1048.)

*Werlhof.*N^o. 1050.

- R_x. Cantharid. gr. j.
 Calomel.
 Pulv. fol. Belladonnae ana gr. jj.
 Camphorae gr. IV.
 M. f. c. Mucilag. G. arab. Pil. No. VI.
 D. S. Morgens und Abends 1—2 Pillen.
 (Wie bei No. 1048.)

*Berends.*N^o. 1051.

- R_x. Lichen. einer. ʒj.
 Piper. nigr. ʒij.
 C. M. Divide in part. IV. aeq.
 D. S. Jeden Morgen nüchtern eine Portion in einem Schoppen warmer Milch, und einen Monat lang warme Bäder.
 (Wie bei No. 1048.)

*Mead.*N^o. 1052.

- R_x. Pulv. Rad. Cynosbati ʒjj.
 Vitell. ovor. No. jjj.
 M. D. S. Zu einem Kuchen gebacken, und Morgens nüchtern im Bett zu nehmen.
 (Wie bei No. 1048.)

Andry.

N^o. 1053.

Ry. Rad. Valer. ʒj.

Aq. font. ʒj.

Vini alb. ʒijj.

M. D. S. Morgens nüchtern im Bette zu trinken,
und nachher Thee von Flor. Aurant. —

(Wie bei No. 1048.)

*Bouteille.*N^o. 1054.

Ry. Pulv. Scarabaeor. majal. gr. j.

Camphorae gr. jj.

Nitri dep. gr. vj.

Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.

D. S. Alle 2—4 Stunden ein Pulver in Milch.

(Wie bei No. 1048.)

*Schäffer.*N^o. 1055.

Ry. Scarab. maj. No. VIII.

Theriac. andromed. ʒβ.

Sal. C. C. ʒjj.

Camphorae ʒj.

Spir. Minderer. ʒvjjj.

M. D. S. Zu einem halben bis ganzen Esslöffel.

(Wie bei No. 1048.)

*Selle.*N^o. 1056.

Ry. Scarab. majal. melle suffocat. No. XXIV.

Pulv. Rad. Serpentar. virg. ʒj.

— Lign. Ebeni ʒjj.

Spong. Sorbi aucupar. ʒj.

Plumbi rasi ʒj.

Theriaci ʒijj.

M. f. Elect.

D. S. Fünf — zehn jährige Kinder erhalten 20 — 40 Gran; — 20 jährige Subjecte 60 Gran; — 30 jährige 70 — 90 Gran.

(Wie bei No. 1048.)

(*Preussische Lattwerge. Heim. Schönwald.*)

N^o. 1057.

Ry. Hb. Rutae graveol.
— Dipsaci fullon. ana $\mathfrak{v}\text{ijj}\beta$.
Sedi acris $\mathfrak{z}\text{j}$ et $\mathfrak{z}\beta$.
Zibeti gr. j.

M. D. S. Auf ein Butterbrod.

(Wie bei No. 1048.)

(*Consbruch.*)

N^o. 1058.

Ry. Sal. Tart. dep. $\mathfrak{z}\text{ijj}$.
solve in
Aq. flor. Chamomill.
— Cinnamom. ana $\mathfrak{z}\text{ijj}$.
adde

Syr. Papav. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunden (abwechselnd mit einer Dosis von 5 — 15 Tropfen Tr. thebaicae) einen Esslöffel. Zugleich öftere Clystiere von Seifenwasser, und Bäder, in welchen Lapis causticus chirurgorum (in jedem Bad $\mathfrak{z}\text{ij}$.) aufgelöst werden.

(Gegen Tetanus. s. No. 856.)

Stütz.

N^o. 1059.

Ry. Spirit. Lavandulae $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Liq. Ammon. anisat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Zum Einreiben in die regio epigastrica.
(Gegen Singultus der Kinder.) *Siebold.*

N^o. 1060.

Ry. Tr. Arnicae ʒij.
— Colocynth.
— Capsici ana ʒj.
Ol. Sabinae ʒβ.

M. D. S. Täglich 4 mal 15 — 20 Tropfen.
(Gegen Paralysis (rheumatica) ohne gleichzeitige entzündliche Affectionen. — S. No. 623. 870. 917. b.) *Horn.*

N^o. 1061.

Ry. Phosphori ʒjj.
solve in
Ol. Sabinae ʒβ.
adde

Liq. Ammon. caust. ʒij.

M. f. l. a. Liniment. D. S. Täglich 2 — 3 mal das gelähmte Glied damit einzureiben. *Görden.*

N^o. 1062.

Ry. Phosphori gr. IV.
solve in
Ol. Terebinth.
— Lini express. ana ʒj.
adde

Camphorae ʒβ — ʒj.

M. D. S. (Wie bei No. 1061.) *Horn.*

N^o. 1063.

Ry. Phosphori gr. X.
Camphorae ʒjj.
Axung. porci ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben,
(Wie bei No. 1061.)

Hufeland.

N^o. 1061.

R. Tr. Cantharid. ℥j — ʒj.

Aq. Petrosel. ʒvjjj.

Tart. boraxat. ʒj.

Tyr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel. Zugleich *b*.

R. Phosphori gr. XXIV.

OL. Olivar. ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 1061.)

Autenrieth.

N^o. 1065.

R. Rasur. Lign. Guajaci ℥jjj.

— — Sassafras ℥iβ.

pon. in sacculo, et coq. c. Aq. ft. Modiis vj — vjj.
per horae fere quadrantem. Ante finem adde saccu-
lum cum

R. Bacc. Lauri ℥jjj.

Cort. Winteran. ℥β.

Rad. Irid, flor.

— Cyperi

— Calami aromat.

— Angelicae ana ʒxjj.

M. D. S. Der Kranke sitze Morgens eine Stunde
in diesem (warmen) Bade, werde dann in eine
wollene Decke eingeschlagen, trinke einen Schluck
Wein, und warte im Bett die eintretende Haut-
ausdünstung ab.

(Wie bei No 1061.)

Fuller.

N^o. 1066.R_x. Camphorae ℥j.

G. arab. ℥iv.

Aq. flor. Sambuci ℥iv.

Syr. Diacod. ℥j.

M. f. l. a. Emuls. D. S. Täglich 3—4 mal 1—2

Esslöffel.

(Gegen Satyriasis.)

*Auenbrugger. (Berends.)*N^o. 1067.R_x. Extr. Gratiolae

Sem. Foeniculi ana ℥j.

Sacch. alb. ℥vj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 3 mal einen halben

Scrupel (steigend zu ℥β).

(Gegen Melancholie und Manie. Besonders von

Stockungen in den Abdominal-Eingeweiden.)

*Koźrzewsky.*N^o. 1068.R_x. Extr. Gratiolae ℥β.

— Belladonnae gr. v.

Aq. Laurocerasi ℥β.

M. D. S. Alle Stunden 20—30 Tropfen.

(Wie bei No. 1067.)

*Hufeland.*N^o. 1069.R_x. Extr. Gratiolae ℥j — j.

solve in

Aq. Cerasorum ℥jj.

adde

Aq. Laurocerasi ℥j — j.

Mellis puri ℥vj. — ℥j.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2—4 Stunden einen
Esslöffel.

(Wie bei No. 1067.) *Lentin. (Jahn.)*

Syphilis. Mercurialkrankheit.

N^o. 1070.

R_x. Lign. Guajaci ʒij.

— Sassafras

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit.

— Graminis ana ʒj.

Sem. Foeniculi ʒj.

C. M. Zwei Esslöffel mit einem Maass Wasser
zur Hälfte eingekocht, als Ptisane zu trinken.

(Auch gegen Flechten empfohlen.) *Murray.*

N^o. 1071.

R_x. Rad. Bardanae

— Saponar.

— Sarsaparill. ana ʒij.

Cort. Mezerei

Stipit. Dulcamar. ana ʒiβ.

Lign. Quassiae ʒijj.

M. f. Spec. D. S. Mit 3—4 ℥ Wasser gekocht,
zur Ptisane. *Weikard.*

N^o. 1072.

R_x. Res. Guajac. nativ. ʒj.

Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Emuls. c.

Aq. font. ʒvj.

adde

Spir. Nitr. aeth. $\mathfrak{z}\beta$ Syr. Amygdal. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

*Richter.*N^o. 1073.

Ry. Ras. Lign. Guajaci

Cort. Guajaci ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Lign. Sassafras $\mathfrak{z}\beta$.Rad. Liquirit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Coq. c. Aq. ft. suff. qt.

per hor. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$. In fin. coct. addeSpir. Vin. rectific. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.(vel Aq. Cinnamom. s. v. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.)Col. \mathfrak{z} II. D. S. Für 2 Tage.*Hecker.*N^o. 1074.Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Coq. c. Aq. ft. \mathfrak{z} . $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$. ad \mathfrak{z} . \mathfrak{j} .

adde

Kali carb. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.M. D. S. Täglich zu verbrauchen. *Neumann.*N^o. 1075.Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.Ichthyocollae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$.G. arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Stibii sulphurat. nigr.

in saccul. ligat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$.Coq. c. Aq. ft. \mathfrak{z} . VI.ad rem. \mathfrak{z} . $\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.D. S. Die Hälfte den Tag über in 3 Portionen
zu verbrauchen.*(Decoctum Felsii)**Fels.*

N^o. 1076.

- Ry. Cort. Nuc. jugland.
 rudit. tus. \mathfrak{X} .
 macer. nocte in Aq. bull.
 dein mane adde
 Rad. Sarsaparill.
 — Chinae nodosae ana \mathfrak{J} .
 Antim. crud.
 Lap. Pumicis petia lig. ana $\mathfrak{J}\beta$.
 Coq. c. \mathfrak{L} X Aq. in olla bene clausa per aliquot
 horas; dein abjice petiam, et coque residuum ad
 \mathfrak{L} $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$. usque. *Decantatum* (non filtratum) deco-
 ctum exhib. D.
 S. Morgens und Abends ein Pfund zu verbrauchen.
 (*Decoctum Pollini.*) Auch gegen atonische
 Gicht und Mercurialkrankheit empfohlen.
Pollin.

N^o. 1077.

- Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{X}\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 coq. c. Aq. ft. \mathfrak{L} XXIV.
 per $\frac{1}{4}$ hor. adde
 Alum. saccharat. $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\beta$.
 Merc. dulcis $\mathfrak{J}\beta$.
 Cinnab. antimon. \mathfrak{J} .
 in nodul. lig. sub finem coct.
 admisce
 Fol. Sennae $\mathfrak{J}\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
 Rad. Liquirit. $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\beta$.
 Sem. Anisi vulg. $\mathfrak{J}\beta$.
 Col. \mathfrak{L} xvj. Sign. *Decoctum Zittmanni forte.*
 tunc
 Ry. Resid. Decoct. fort.
 Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{J}\mathfrak{V}\mathfrak{j}$.
 Coq. c. Aq. ft. \mathfrak{L} XXIV.

sub finem coct. adde

Cort. Citri

Cort. Cinnamom.

Cardanom. min. ana ʒijj.

Bad. Liquirit. ʒvj.

Col. ℞ XIV. Sign. *Decoctum Zittmanni tenue.*

Morgens eine Flasche Decoct. fort. Abends eine
Flasche Decoct. tenue. *Zittmann.*

N^o. 1078.

℞. Fol. Sennae ʒiβ.

Rad. Sarsaparill. ʒijj.

Rad. lign. Guajaci

— — Sassafras

Rad. Chinae nodos.

— Irid. flor.

— Aristoloch. rotund. ver.

— — long. ver.

Sem. Anisi vulg.

Rad. Jalappae.

— Polypod. vulg.

Tart. dep. ana ʒvj.

Antim. crud. in sacc. lig. ʒvj.

Nuc. jugland. una cum putam.

contus. No. VI.

Mixturim concis. et contus. affunde

Vini alb. generos. ℞ ij.

Tunc omnia loco calido digere

per horas XXIV. Digest. parata

adde

Aq. font. ℞. vj.

Coq. vase clauso usque ad

Consumt. tert. liq. part.

Col. serv. in lagen. D.

S. *Decoctum Vigaroux.*

In 24 Stunden 3 Gläser, jedes von etwa fünf Unzen, zu nehmen. Das erste Morgens nüchtern, das zweite eine Stunde vor dem Mittagessen, das dritte vor dem Schlafengehn.

Zugleich *b.*

Rx. Residua adhuc calida
leni igne denuo coque *c.*
Aq. font. \mathfrak{L} vj.
Vini alb. \mathfrak{L} jj.
usque ad consumpt. tert. part.
Col. et serva in lagen.

D. S. Bochetum Vigaroux.

Zum gewöhnlichen Getränk.

Vigaroux.

N^o. 1079.

Rx. Acidi phosphorici \mathfrak{z} j.

Tr. Cinnamom. \mathfrak{z} jj.

M. D. S. Stündlich 30 Tropfen in Wasser.

(Besonders gegen secundäre Syphilis und Knochenschmerzen.)

Burdach.

N^o. 1080.

Rx. Acid. phosphor. puri \mathfrak{z} j.

Aq. font. destil. $\mathfrak{z}\beta$.

Syr. Cerasor. \mathfrak{z} jj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 10 — 20 Tropfen
in Wasser zu nehmen.

(Wie bei No. 1079.)

Hufeland.

N^o. 1081.

Rx. Acid. nitr. fum. $\mathfrak{z}\beta$.

Decoct. Avenae \mathfrak{z} jj.

Syr. Sacchari \mathfrak{z} j.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.
 (Auch als Gargarisma bei syphilitischen Hals-
 Affectionen.) *Fricke.*

N^o. 1082.

Rx. Sal. Tart. dep.
 Aq. Cinnam. simpl. ana ℥j.
 Opii puriss. ℥ij.
 Aq. Cinnamom. c. v. ℥iv.
 separatim solvantur. Dein
 misceant. invicem et stent
 in balneo Mariae per ℥ijj. hebdom.
 saepius agitando. Col admisc.
 G. arab. ℥ijj.
 Sal. alcal. volat. ℥j.
 in
 Aq. Cinnamom. simpl. ℥vj.
 solut. Omnia in se mixta stent per aliquot
 dies in quiete, dein filtr. et serv. D.
 S. Täglich 3 mal 24 Tropfen in einer Tasse Infus.
 Althaeae.
 (Tr. antisyphilitica Besnardi.) *Besnard.*

N^o. 1083.

Rx. Tart. puriss. ℥ijj.
 solve in
 Aq. Meliss. ℥iv.
 adde
 Liq. Ammon. carb. ℥jj.
 Tr. terrae Catechu ℥β.
 M. D. S. Esslöffelweise. *Eichheimer.*

N^o. 1084.

Ry. Stibii sulphurat. nigr. ℥vjij.

Hydrarg. oxydat. rubri gr. ij.

Sacch. alb. ℥jj.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver mit schleimigem Vehikel. *Berg.*N^o. 1085.

Ry. Hydrargyri oxydati rubri gr. ij — iij.

Pulv. Opii puri gr. iv — vj.

Sacch. Lactis ℥jjj.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.

(Besonders bei syphilitischen Haut- und Knochen-Affectionen empfohlen.) *Wendt.*N^o. 1086.

Ry. Hydrarg. oxydat. rubr. gr. iv — vjjj.

Antim. crudi

Extr. Chaerophylli ana q. s. ut. f.

l. a. Pil. No. CLX. Consp. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen. Zugleich ein Decoctum Lign. Guajaci oder Sarsaparillae. *Ritter.*N^o. 1087.

Ry. Hydrarg. oxydat. rubr.

Opii puri ana gr. j.

Extr. Liquirit. q. s. ut f. Bolus.

D. S. Auf einmal zu nehmen. *Swediaur.*N^o. 1088.

Ry. Hydrarg. puriss.

Mellis ana ℥j.

Succi Liquirit. ℥jjj.

terant. simul, donec Hydrarg. pen.

disp. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Morgens und Abends 4—6 Pillen.

Swediaur.

N^o. 1089.

Rx. Hydrarg. purif. ʒj.

G. arab. ʒjjj.

affunde sensim

Aq. font. ʒjj.

tere, donec glob. Hydrarg. disp.

adde

Aq. Foeniculi ʒiv.

Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Täglich 2 mal einen Esslöffel.

Plenk.

N^o. 1090.

Rx. Hydrarg. purif. ʒj.

Pulv. G. arab. ʒjjj.

Syr. de Cichor. c. Rheo ʒjj.

tere in mort. marin. donec

Hydrarg. dispar. adde

Micæ panis albi durisc. ʒß.

subige in massam, ex qua form.

Pil. pd. gr. jj. Consp. sem. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 9 Pillen.

Richter.

N^o. 1091.

Rx. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. jjj.

Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Morgens einige Stunden nach dem Frühstück ein Pulver, und Abends eins zwischen 5—6

Uhr; 3 Tage lang, dann einen Tag Nichts, und so fort mit der Dosis zu 2 Pulvern steigend, und

wieder auf eins zurückgehend. Zugleich örtlich
auf Geschwüre. No. 1280. *Schönemann.*

N^o. 1092.

R_x. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. j.
Rad. Liquirit. ℥β.
M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
D. S. Morgens und Abends ein Pulver. *Hecker.*

N^o. 1093.

R_x. Hydrarg. nitrici ʒ℥β.
Aeth. nitrici ʒβ.
Syr simpl. ʒxvj.
M. D. S. Täglich 2 mal einen Theelöffel,
Bouillon Lagrange.

N^o. 1094.

R_x. Extr. Liquirit. ʒjj.
Calomel.
Sulph. aurat. antim. ana ʒj.
M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s. Pil. pd. gr. jj.
Consp. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. *Plummer.*

N^o. 1095.

R_x. Extr. Chinae ʒjj.
— Cicutae ʒjj.
Calomel. gr. xv.
Sulph. stib. rubr. gr. x.
M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
D. S. Täglich 2 mal 8 Pillen. *Weikard.*

N^o. 1096.

R_x. Hydrarg. phosphor. gr. IV.
Cort. Cinnamom. gr. XIV.
Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. Divide in part. VIII. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver. *Hecker.*

N^o. 1097.

R_x. Merc. subl. corros. ʒβ.
Succi Liquirit. ʒj.
Spec. Diatragacanth. ʒjj.

M. f. Pil. No. C.

D. S. Täglich 1 — 4 Pillen.

(Auch gegen Lippenkrebs empfohlen)

Vogler.

N^o. 1098.

R_x. Merc. subl. corros. gr. IV.
solve in

Aq. Cinnamom. vinos. ʒjj.
adde

Tr. Opii simpl. ʒjj.

M. D. S. Täglich 3 — 4 mal 40 Tropfen in einer
Tasse Schleim. *Marcus.*

N^o. 1099.

R_x. Hydrarg. mur. corrosiv.
Opii puri ana gr. X.
Succi Liquirit. dep. ʒIV.
Aq. destill. simpl. q. s.

ut f. l. a. Pil. No. C.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends eine Pille (steigend zu
3 — 4 Pillen). *Wendt.*

N^o. 1100.

R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. X.
Aq. destill. gtt. pauc.

adde

Opii puri

Camphorae ana gr. X.

Pulv. Rad. Liquirit.

Extr. Liquirit. ana ʒj.

M. f. l. a. Pil. No. LX.

D. S. Morgens und Abends eine Pille. (In jeder
Pille ist $\frac{1}{6}$ Gran Sublimat.) *v. Gräfe.*

N^o. 1101.

R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. IV.
solve exactiss. in

Aq. Cinnamom. vinos. ʒj.

adde

Tr. Opii simpl. ʒβ.

M. D. S. Morgens und Abends 30 Tropfen.
Richter.

N^o. 1102.

R_x. Merc. subl. corros. gr. XV.
solve in

Aq. destill. ʒvj.

adde

Micae panis tritici ʒiiβ.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Liquirit.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. *Hoffmann.*

N^o. 1103.

R_x. Merc. subl. corros. gr. vj.
solve in

Aq. destill. ferv. q. s.

adde

Micae panis albi

Sacch. alb. ana q. s.

ut f. l. subig. Pil. No. CLXXX.

D. S. Morgens und Abends 1—3 Pillen. (Dreisig Pillen enthalten einen Gran Sublimat.)

*Hufeland.*N^o. 1104.R_x. Merc. subl. corros. gr. xjj.

solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Micae panis albi

Sacch. alb. q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. j. No. CCXL.

D. S. Um den andern Tag in einer Dosis gleich nach dem Mittagessen 4 Pillen; allmählig zu 30 Pillen steigend.

*Dzondi.*N^o. 1105.R_x. Merc. subl. corros. ʒj.

Axung. porci ʒj.

Tere exact. per horas II.

D. S. Alle Abende ʒβ. in die Fußsohlen einzureiben.

*Cirillo.*N^o. 1106.R_x. Merc. subl. corros.

Sal. ammon. pur. ana ʒβ.

solve in

Aq. Rosar. ʒiv.

Filtrat. adde

Axung. porci ʒiv.

Tere in mortar. vitr. in

II. Chronische Krankheiten.

balneo Mariae ad Aq. Rosar.

perf. evaporat.

Post refrigerat. adde

Ol. de Cedro gtt. XXX.

M. D. S. (Wie bei No. 1105.)

Hufeland.

N^o. 1107.

R_x. G. Guajaci
 Sacch. alb. ana ʒjj.
 Flor. Sulph.
 Sem. Foeniculi
 Rad. Irid. flor. ana ʒj.
 Calomel. gr. X.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Alle drei Stunden einen Scrupel. Zugleich
 Thee von Spec. Lignorum mit Lign. Guajaci.
 (Gegen Syphilis mit Gicht.) *Stark.*

N^o. 1108.

R_x. Cort. Mezerei
 Rad. Althaeae ana ʒjj.

C. M. S. Mit einer Kanue Wasser gekocht, täglich
 zu trinken.

(Gegen syphilitische Knochenschmerzen.)

Hufeland.

N^o. 1109.

Cort. Mezerei ʒj — jj.

Rad. Althaeae

— Liquirit. ana ʒiβ.

Coq. ex Aq. ft. ℥v.

ad Col. ℥jj.

D. S. Täglich $\frac{1}{2}$ ℥ in 3 Portionen zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 1108.) *Hufeland.*

N^o. 1110.

R_x. Strychnini nitrici gr. ℥β.
solve in

Alcohol. perf. ʒβ.

M. D. S. Abends vor Schlafengehn 3—30 Tropfen.
(Wie bei No. 1103.) *Fricke.*

N^o. 1111.

R_x. Aluminis
Camphorae

Cerussae ana ʒβ.

Merc. subl. corros. ʒj.

Acet. concentr.

Spir. Vini rectific. ana ʒβ.

M. D. S. Aeusserlich anzuwenden.

(Gegen syphilitische Hautauswüchse.)

Swediaur.

N^o. 1112.

R_x. Merc. subl. corros.
Vitrioli coerul. ana ʒj.

Lap. infernal. gr. vj.

M. D. S. Aeusserlich aufzustreuen, und nachher
etwas Wasser darauf zu tröpfeln.

(Wie bei No. 1111.)

Masius.

N^o. 1113.

R_x. Tr. kalinae ʒjj.

Aq. Laurocerasi ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden 35—40 Tropfen mit
Haferschleim.

(Gegen Tripper.)

Fricke.

N^o. 1114.

- R_y. Fol. Malvae $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 Rad. Althaeae $\bar{\text{I}}\text{j}$.
 Sem. Cannabis $\bar{\text{I}}\text{I}\text{I}\text{j}$.
 C. C. M. D. S. Einen Esslöffel voll mit 4—6
 Tassen Wasser gekocht, täglich zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 1113.) *Tode.*
-

N^o. 1115.

- R_y. Sem. Papav. $\bar{\text{I}}\beta$.
 Cont. c.
 Aq. font. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{j}$.
 ut f. l. a. Emuls.
 adde
 Aq. Laurocerasi $\bar{\text{I}}\text{j}$.
 M. D. S. Erwärmt 3—4 mal täglich einzuspritzen.
 (Wie bei No. 1113.) *Schlegel. (Wendt.)*
-

N^o. 1116.

- R_y. Lap. caustic. gr. vj.
 solve in
 Aq. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}$.
 adde
 Mucilag. Sem. Cydon. $\bar{\text{I}}\text{j}$.
 M. D. S. (Wie bei No. 1115.) *Walch.*
-

N^o. 1117.

- R_y. Kali carb. sicc. $\bar{\text{I}}\beta$.
 solve in
 Aq. font. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{j}$.
 Cola per chart.
 D. S. Mit Wasser vermischt und erwärmt einzu-
 spritzen.
 (Wie bei No. 1113.) *Richter.*
-

N^o. 1118.

Rj. Extr. Opii aquos. ℥β—℥j.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

Acet. saturn. ℥β.

Mucilag. Sem. Cydon. ℥β.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1113.)

*Richter.*N^o. 1119.

Rj. Hydrarg. mur. corros. gr. jj—jjj.

solve in

Aq. font. destill. ℥v.

Extr. Opii aq. ℥jj.

Mucilag. Sem. Cydonior. ℥j.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1113.)

*Richter.*N^o. 1120.

Rj. Aluminis gr. xv.

Aq. Rosar. ℥iv.

Opii puri gr. X.

Mucilag. G. arab. ℥β.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Gegen Tripper; besonders in chronischen Füllen.)

*Rust.*N^o. 1121.

Rj. Zinci sulphurici gr. iijj.

solve in

Aq. destill. ℥jj.

adde

Aq. Laurocerasi ℥j.

Tr. Opii simpl. ℥jj.

M. D. S. Wie bei No. 1120.

Rust.

N^o. 1122. -

- R_x. Terebinth.
 Extr. Gentianae ana ʒjij.
 Kino
 Ferri sulphurici ana ʒiβ.
 M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Täglich 4 mal 10 Pillen.
 (Gegen Nachtripper. — Besonders aus Atonie.
 S. No. 471.) *Blankard. (Walch. Wendt.)*

N^o. 1123.

- R_x. Bals. Copaivae ʒjij.
 Vitell. ovor. No. III.
 tere cum
 Aq. font. ʒv.
 — Cinnamom. vincts. ʒj.
 Syr. Cinnamom. ʒβ.
 M. D. S. Alle 3 Stunden 2 Esslöffel.
 (Wie bei No. 1122.) *Walch.*

N^o. 1124.

- R_x. Bals. Copaivae ʒβ.
 Extr. Stipit. Dulcamarae ʒjj.
 Pulv. Rad. Rhei ʒj.
 Pulv. G. arab. q. s.
 ut f. l. a. Pil. pd. gr. jj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Täglich 4 mal 7—8 Pillen.
 (Wie bei No. 1122.) *Clossius. (Wendt.)*

N^o. 1125.

- R_x. Bals. Copaivae ʒj.
 Spir. aeth. nitr. ʒiβ.
 Syr. Ononidis spinosae ʒiβ.

M. f. l. a. Linctus. D.
S. Wohl umgeschüttelt täglich 4 mal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 1122.) *J. A. Schmidt.*

N^o. 1126.

Ry. Bals. Copaivae ʒj.
Spir sulph. aeth. mart. ʒvj.
Tr. Cantharid. ʒβ.

M. D. S. Täglich 2—3 mal 25—30 Tropfen in einem Löffel starken Liqueurs. —

(Wie bei No. 1122.) *Richter.*

N^o. 1127.

Ry. Bals. Canad. ʒβ.
G. Guajaci ʒj.
Spir. Vini rectific. ℞β.
Digere leni calore, dein faecibus subsidentibus tincturam limpida[m] cola. Colaturae adde
Ol. destill. Menth. pip. ʒj.

M. D. S. Täglich 2—3 mal 40 Tropfen.

(Wie bei No. 1122.) *Falk.*

N^o. 1128.

Ry. Bals. peruv. ʒvj.
Vitell. ovor. No. ʒj.
Ol. Olivar.
Aceti Vini ana ʒjjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1122.) *Fricke.*

N^o. 1129.

Ry. Myrrhae elect. ʒiβ.
Ferri sulph. ʒjjj.
Pulv. Rad. Tormentill. ʒjj.
Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. jj .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 4 mal 7 Pillen.

(Wie bei No. 1122.)

Richter.

N^o. 1130.

Ry. G. Olibani

— Mastichis

Terrae japon.

Sang. Dracon. ana ʒj .

Tereb. venet q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. jj .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 2—3 mal 10—12 Pillen.

(Wie bei No. 1122.)

Richter.

N^o. 1131.

Ry. Catechu

Myrrhae ana ʒj .

solve in

Aq. Calc. ust. ʒiv .

M. D. S. Täglich 3 mal zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1122, S. No. 581, 582, 583, 584.)

Augustin.

N^o. 1132.

Ry. Extr. Opii gr. jjj .

Acet. saturn. gtt. vjjj .

Aq. destill. ʒiv .

Mucilag. G. arab. ʒβ .

M. D. S. Täglich 2 mal damit einzuspritzen.

(Wie bei No. 1122.) *Girtanner. (Wendt.)*

N^o. 1133.

- R_x. Bals. Copaivae ʒj.
 Vitell. ovor. No. I.
 (vel G. arab. ʒβ—j.)
 tere cum
 Aq. flor. Chamomill.
 (vel Aq. Rosar.) ʒiV.
 adde
 Tr. Opii simpl. ʒj—ʒβ—ʒj.
- M. D. S. Täglich 3—4 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Stark.*
-

N^o. 1134.

- R_x. Cort. Chinae opt. ʒj.
 Coq. c. Aq. ft. s. qt.
 per ½ hor. Col. refrig.
 adde
 Vini rubri ʒij.
 Aluminis crudi ʒj.
- M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Becker.*
-

N^o. 1135.

- R_x. Cort. Salicis laureae ʒj.
 Coq. c. Aq. ft. q. s. per
 ½ hor. in Col. ʒvjjj.
 solve
 Aluminis crudi ʒj.
- M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Cappel.*
-

N^o. 1136.

- R_x. Gallar. in pulv. redact. ʒβ.
 Coq. c. Aq. ft. q. s.
 in Col. ʒvjjj. solve

Aluminis crudi ʒj.

Zinci sulphurici gr. jʒ.

M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1122.)

*Kortum.*N^o. 1137.

℞. Cupri acet ʒiβ.

Spir. Sal. ammon. caust. ʒβ.

M. D. S. Zu 6 Tropfen mit einer Unze Aq. destill.
vermisch't zum Einspritzen.(Wie bei No. 1122. Besonders in hartnäckigen
Fällen.)*Girtanner.*N^o. 1138.

℞. Calomel. ʒβ.

Aq. destill. ʒvjjj.

M. D. S. Zum Einspritzen (3—4 mal täglich).

(Wie bei No. 1122.)

*Tode.*N^o. 1139.℞. Hydrarg. borussici gr. jʒ.
solve in

Aq. destill. ʒXIV.

Aq. Laurocerasi ʒjʒ.

M. D. S. Wie bei No. 1138.

(Auch gegen Milch-Abscesse.)

*Horn.*N^o. 1140.

℞. Lap. divini gr. vjjj.

Aq. saturnin. ʒvjjj.

M. D. S. Zum Einspritzen (täglich 3—4 mal).

(Gegen Nachtripper.)

Attenhofer.

N^o. 1141.

R_y. Acet. saturn. ʒj.
 Camphorae ʒβ.
 Ol. Tereb. ʒv.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *F. Hoffmann.*

N^o. 1142.

R_y. Acet. saturn. ʒj.
 solve in
 Aq. font. destill. ʒvj.
 adde
 Liq. Myrrhae ʒjjj.
 Tr. Opii simpl. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *Althof.*

N^o. 1143.

R_y. Acid. sulph. dilut. ʒj — 1β.
 Acet. saturnin. ʒjj.
 Aq. destill. ʒvjijj.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *Kessler.*

N^o. 1144.

R_y. Empl. diachyl. comp. ʒjj.
 — mercurial. ʒj.
 Antim. crud. praep.
 subtilissime pulverisat. ʒβ.

M. D. S. Zu Bougies.
 (Gegen Nachtripper von Verengerungen in
 der Harnröhre, und torpidem Zustand.)

Dease.

N^o. 1145.

R_y. Hydrarg. muriat. corros. gr. jj.
 (vel Lapid. divini gr. IV.)
 solve in
 Aq. font. destill. ʒjj.

S 2

adde

G. arab. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zu Bougies.

(Wie bei No. 1144. Bei mehr reizbarem Zustande passend, und selbst mit Extr. Opii $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$. oder Extr. Hyoseyami zu verbinden.)

*Richter.*N^o. 1146.R. Cerae \mathfrak{G} j.

Minii

Ol. Olivar. ana \mathfrak{G} $\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.

M. D. S. Zu Bougies.

(Wie bei No. 1145.)

*Hunter.*N^o. 1147.R. Lapid. Cancror. praep. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Vini albi rhenan. q. s.

ad saturat. D.

S. Morgens und Abends eine halbe Thectasse voll.
(Gegen Verhärtung der Epididymis oder des Hodens, vom Tripper herrührend.)

*v. Swieten. (Swediaur.)*N^o. 1148.

R. Extr. Myrrhae aq.

— Cort. peruv.

— Trifol. fibr. ana $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.Sulph. antim. $\mathfrak{D}\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.Calomel. $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$.Bals. Copaivae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Pulv. Rad. Liquirit.

— Hb. Cicutae ana $\mathfrak{D}\mathfrak{I}\mathfrak{V}$.M. f. Pil. pd. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Consp. pulv. Liquirit.

D. S. Täglich 2—3 mal 7—12 Pillen. Zugleich
Spec. Lignorum zum Thee.

(Gegen die Ueberreste des Trippers.)

Weikard.

N^o. 1149.

R. Calomel. ʒj.
Pulv. Opii ʒβ.
Adipis Suillae ʒj.

M. D. S. Auf Charpie gestrichen anzuwenden.

(Gegen Chanker.)

Rust.

N^o. 1150.

R. Liq. Hydrarg. nitr. gtt. X—XX.
Aq. destill. ʒjij.

M. D. S. Zum Betupfen.

(Wie bei No. 1149.)

Fritze.

N^o. 1151.

R. Hydrarg. mur. corros. gr. xjjj.

Aloës opt. ʒjjj.

Opii puriss. gr. X.

Aq. Calcis ʒvj.

Mell. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen schmerzhaftes Chanker.)

Vogel.

N^o. 1152.

R. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. vj.

Aq. destill. ʒv.

Tr. Opii ʒjij.

Mell. rosat. ʒvj.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Gegen Chanker im Halse.)

Richter.

N^o. 1153.

- R. Zinci sulph.
 Spir. Vini camph. ana $\bar{3}\beta$.
 Aq. ft. fervid. $\bar{2}$ jj.
 M. et cola per chartam.
- D. S. Waschwasser.
 (Zur Heilung der Chanker.)

*Richter.*N^o. 1154.

- R. Spec. ad Cataplastm. $\bar{5}$ jj.
 coq. c. aq. ft. q. s.
 ad consist. Cataplastm.
 adde
 Pulv. Sem. Sinap.
 Cepar. tostar. ana $\bar{3}$ j.
- M. f. Cataplastm. D. S. Warm aufzulegen.
 (Zur Zeitigung von Bubonen.)

*Horn.*N^o. 1155.

- R. Cepar. sub cinere assat. et contus.
 Farin. Sem. Lini ana $\bar{5}$ jj.
 Sap. nigr. $\bar{3}\beta$.
 C. c. aq. ft. suff. qt.
 in formam Cataplastm.
- D. S. Wie bei No. 1154.

*Kernd.*N^o. 1156.

- R. Cepar. sub cinere assat. et us.
 Sap. nigr. ana $\bar{5}$ jj.
 Farin. Sem. Sinap. $\bar{3}\beta$ —jj.
 Aq. font. fervid. q. s.
 ut f. l. calor. Cataplastm.
- D. S. Während die in glühende Asche gelegten

Zwiebeln braten, rührt man die Seife mit Wasser an, erwärmt sie und nimmt sie dann vom Feuer. Dann rührt man zuerst die gequetschten Zwiebeln und dann das Senfmehl darunter, und bringt die Masse nochmals zum Feuer. — Man erwärmt das Cataplasma, indem man es in ein mehrfach zusammengelegtes heisses Tuch einschlägt und erneuert die Masse alle 6 — 8 Stunden. Intercurrent schlägt man lauwarms Wasser und Nachts ein reizendes Pflaster (Empl. Ammoniacum) auf.
(Wie bei No. 1154.) *Baltz.*

No. 1157.

- ℞. Alcal. volat. veget. $\bar{5}\beta$.
Ol. Amygdal. dulc. $\bar{5}\nu$.
M. f. Liniment.
D. S. Zum Einreiben.
(Wie bei No. 1154.)

Peyrilhe.

No. 1158.

- ℞. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. jjj .
Sacch. alb. $\bar{5}\text{jjj}$.
M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.
D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.
(Gegen Lues infantum.)

Wendt.

No. 1159.

- ℞. Calomel. gr. jjj .
Anyli $\bar{5}\beta$.
Sacch. alb. $\bar{5}\text{I}\beta$.
M. f. Pulv. Divide in part. XII. aeq.
D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.

(Wie bei No. 1158. Besonders um die purgirende Eigenschaft des Quecksilbers zu vermindern.)

Wendt.

N^o. 1160.

- R_x. Calomel. gr. j.
 Magnes. alb. gr. vj.
 Sacch. alb. gr. xjj.
 (Flor. Sulph. gr. vj—IX.)
 M. f. Pulv. Divide in part. VI. aeq.
 D. S. Täglich 2—4 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1158.)

*Kopp.*N^o. 1161.

- R_x. Hydrarg. puri ʒvj.
 Sevi ovilli ʒβ.
 Tere in mortar. lapid. ad
 perf. Hydrarg. extinct.
 admisce
 Ol. Cacao ʒj.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 1158. Zu einer Mercurial-Cur
 anwendbar.)

*Wendt.*N^o. 1162.

- R_x. Vitrioli coerulei gr. xv—ʒβ.
 Tr. Myrrhae
 — Catechu
 — Kino ana ʒj.
 — Pimpinellae ʒv.
 Infus. Salviae ʒvj.
 Mell. crud. ʒvj.
 M. D. S. Stündlich den Mund auszuspülen und
 dann auszuspeien.
 (Gegen den Speichelfluss.)

*Kopp.*N^o. 1163.

- R_x. Acid. muriat. ʒjjj.
 Syr. Moror. ʒiβ.
 M. D. S. Unter soviel Salbei-Thee gemischt, dass

eine starke Säure vorherrschend ist, und damit den Mund stündlich auszuspülen. Zugleich Thee aus Rad. Enulae; und ein Empl. Meliloti um den Hals.

(Wie bei No. 1162.)

Kopp.

N^o. 1164.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Tr. Opii simpl. gtt. XX.

Aq. destill. ʒiv.

M. D. S. Umgerüttelt täglich 3 mal einen Esslöffel.

(Gegen Mercurialkrankheit.)

Dzondi.

N^o. 1165.

R_x. Hep. Sulph. kal. gr. XX.

Aq. destill. comm. ʒj.

Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Täglich in drei Portionen zu verbrauchen.

(Wie bei No. 1164.)

Dzondi.

N^o. 1166.

R_x. Calcis antimon. sulph. Ph. boruss. ʒiʒ.

Coq. c. aq. ft. ℞. V.

vase clauso ad rem. ℞. IV.

M. D. S. Täglich Tassenweise zu 2—3 ℞ zu nehmen.

(Wie bei No. 1164. Auch gegen atonische Gicht.)

Hufeland.

N^o. 1167.

R_x. Kali sulphurat. ʒj.

solve in

Aq. flor. Aurant. ʒvj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1164.)

Hecker.

N^o. 1168.

- R̄. Kali sulphurati
 Res. Guajaci
 Extr. Taraxaci ana ʒij.
 M. f. Pil, pd. gr. j.
 D. S. Täglich 3 mal 5 — 6 Pillen.
 (Wie bei No. 1164. — S. No. 1076.)

*Waltz.*N^o. 1169.

- R̄. Vitrioli coerul. gr. jij.
 solve in
 Aq. destill. ʒj.
 adde
 Tr. Myrrhae ʒj.
 Mell. rosat. ʒjjj.
 M. D. S. Mit einem Pinsel 3 mal täglich die Ge-
 schwüre zu betupfen.
 (Gegen Mercurial-Geschwüre.)

*Hahnemann.*N^o. 1170.

- R̄. Lap. infernal. gr. jij.
 solve in
 Aq. Rosar. ʒjjj.
 M. D. S. Wie bei No. 1169.

Walch.

Chronische Hautausschläge.
 S. No. 105. 183. 597. 632. 705. 1085. 1111.

N^o. 1171.

- R̄: Stib. sulph. nigri ʒβ.
 G. Guajaci
 Extr. Fumariae ana ʒj.

M. f. c. Tr. Rhei q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 4 mal 5 Pillen.

Richter.

N^o. 1172.

Ry. Stib. sulph. nigr. ℥β — j.

Magnes. carb. gr. v.

Cort. Cinnamom. gr. jjj.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver.

Richter.

N^o. 1173.

Ry. Hydrarg. sulph. nigr. gr. j — x.

Magnes. carb. gr. IV.

Elaeosacch. Foeniculi ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

Richter.

N^o. 1174.

Ry. Hydrarg. stib. sulph.

Res. Guajaci ana ʒβ.

Extr. Dulcemar. ʒj.

M. f. c. Syr. Cort. Aurant. q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends 8 Pillen.

Richter.

N^o. 1175.

Ry. Calomel

Sulph. stib. aurant. ana ℥j.

Res. Guajaci

Succi Liquirit. ana ʒβ.

G. arab. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends 2 — 6 Pillen.

Richter.

N^o. 1176.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. ij.

solve exact. in

Aq. font. destill. q. s.

adde

Opii puriss. gr. IV.

Camphorae gr. vjjj.

Sacch. alb. $\bar{3}\beta$.

Mic. pan. alb. q. s. ut f.

Pil. No. XL. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 3 — 5 Pillen.

*Hufeland.*N^o. 1177.R_x. Graphitis

Flor. Sulph.

Antim. crud. praep. ana $\bar{3}\beta$.

Extr. Pulsatill. nigr.

Pulv. Hb. Jaceae ana $\bar{3}j$.Camphorae $\bar{3}j$.

Syr. Fumar. q. s. ut f. Elect.

D. S. In 8 — 10 Tagen zu verbrauchen.

(Auch gegen Scrofuln.)

*Weinhold.*N^o. 1178.R_x. Graphitis $\bar{3}j$.Mellis despumat. $\bar{3}IV$.

M. f. Elect. D.

S. Morgens und Abends einen Theelöffel.

*Weinhold.*N^o. 1179.R_x. Res. Lign. Guajaci $\bar{3}j$.

Sulph. dep.

Tart. dep. ana $\bar{3}\beta$.

Ol. Anisi gtt. vj.

M. f. Pulv. Det. ad scatul.

S. Täglich 4 mal einen Theelöffel. *Richter.*

N^o. 1180.

R_y. Res. Lign. Guajaci ʒj.

Aq. Foeniculi ʒvj.

Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Emuls. adde

Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Dreimal täglich 2 Esslöffel. *Richter.*

N^o. 1181.

R_y. Rad. Tarax.

— Graminis

— Saponar. ana ʒj.

— Sarsaparill. ʒiβ.

Stipit. Dulcamar. ʒlv.

Cort. Ulmi ʒjj.

Coq. c. aq. ft. q. s.

Col ʒiv. D.

S. Zum Getränk.

Best.

N^o. 1182.

R_y. Cort. Ulmi campestr. ʒjj.

Coq. c. aq. ft. ʒjjj.

Col. ʒj. adde

Syr. Cort. Aurant. ʒjj.

M. D. S. Täglich zu verbrauchen. *Lettsom.*

N^o. 1183.

R_y. Fol. Sennae ʒv.

Rad. Polygod. ʒvj.

- Rad. Rhei
 — Oxylapathi ana $\bar{3}x$.
 Uvar. Corinth. $\& j$.
 Rad. Liquirit.
 Sem. Foeniculi ana $\bar{3}i\beta$.
 Rasur. Sassafras $\bar{3}ij$.
 Fol. Salviae
 — Agrimoniae
 Hb. Nasturt. aq.
 — Cochleariae ana M. \bar{ij} .
 M. f. Sacculus pro cerevis. Cong. V.
 D. S. Zum Frühlingstranke. *Bate.*
-

N^o. 1184.

- Rx. Rad. Graminis
 (— Saponar)
 — Tarax. ana $\bar{3}ijj$.
 Lapathi acuti $\bar{3}ijj$.
 C. M. D. S. Den vierten Theil mit 3 Pfund Wasser
 auf 2 $\&$ einzukochen und täglich zu trinken.
Haase.
-

N^o. 1185.

- Rx. Rad. Graminis
 Lign. Guajaci ana $\bar{3}vijj$.
 Turion. Pini $\bar{3}ijj$.
 Cort. Ulmi inter. $\bar{3}ijj$.
 M. f. Spec. D. S. In 2 $\&$ Wasser gekocht zu 1 $\&$
 Colatur, und täglich zu verbrauchen. *Weikard.*
-

N^o. 1186.

- Rx. Pulv. Rad. Helenii
 — — Imperator.
 — Cort. et Lign. Sassafr.
 — Lign. Guajaci

Pulv. Fol. Sennae

— Bacc. Juniperi ana $\bar{3}\beta$.— Sem Anisi $\bar{3}j$.

M. f. c. Mell. desp. s. q. Elect.

D. S. Täglich 3—4 mal einen Theelöffel. *Himly.*N^o. 1187.R_x. Cort. Ulmi camp. $\bar{5}j$.Coq. ex Aq. ft. $\bar{8}j$.Col. $\bar{5}vjjj$. addePlumbi acet. $\bar{5}j$.

M. D. S. Waschwasser.

*v. Gräfe.*N^o. 1188.R_x. Ol. Tart. per. deliq. $\bar{3}jjj$.Aq. Rosar. $\bar{5}vj$.

M. D. S. Waschwasser.

*Conradi.*N^o. 1189.R_x. Kali sulphurat.

(vel Calcar. sulph.

— Calcar. sulph. stib.) $\bar{5}jj$.Coq. c. Aq. ft. $\bar{8}vjj$ ad $\bar{8}IV$.

D. S. Waschwasser.

*Haase.*N^o. 1190.R_x. Zinci sulph. $\bar{5}j$.

solve in

Aq. destill. ferv. $\bar{5}vj$.

M. D. S. Waschwasser.

Haase.

N^o. 1191.

- R_x. Ol. Tart. per. deliq.
 Ol. Amygdal. dulc. rec. ana $\bar{3}\beta$ — \bar{j} .
 M. D. S. Zum Einreiben. *Conradi.*
-

N^o. 1192.

- R_x. Ol. Tereb. $\bar{3}\bar{j}$.
 G. arab. $\bar{3}\beta$.
 terendo admisce
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}\bar{v}\bar{j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben. (In die Nieren- und
 Lendengegend, an Armen und Schenkeln u. s. w.
 zur Einsaugung durch die lymphatischen Gefäße.)
Eggers.
-

N^o. 1193.

- R_x. Aq. Calcis vivae
 Ol. Amygdal. dulc. rec. ana $\bar{3}\bar{j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Besonders bei juckenden Ausschlägen und auch
 gegen Verbrennungen.) *Hufeland.*
-

N^o. 1194.

- R_x. Adipis suill. $\bar{3}\bar{v}\bar{j}\bar{j}$.
 supra len. ign. in vase terreo
 liquatis sensim agitando admisce
 Acid. nitrici Ph. boruss. $\bar{3}\bar{j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben. *Alyon.*
-

N^o. 1195.

- R_x. Magnes. oxydat. nigr. $\bar{3}\bar{v}\bar{j}$.
 Axung. porci $\bar{3}\bar{1}\bar{\beta}$.
 M. f. Ungt. D.
 S. Zum Einreiben. *Villard.*
-

N^o. 1196.

Ry. Graphitis \mathfrak{v} j.
Axung. porci \mathfrak{X} .

M. f. Ungt. D.

S. Zum Einreiben.

Weinhold.

N^o. 1197.

Ry. Graphitis \mathfrak{J} j.
Empl. saponat. \mathfrak{J} jj.

M. f. Empl. D. S. Auf die leidende Stelle.

(Bei empfindlichen Personen und geringer Ausdehnung des Uebels.)

Weinhold.

N^o. 1198.

Ry. Pulv. carb. lign. $\mathfrak{J}\beta$.

Axung. porci

(vel Ol. Amygdal. dulc

vel Mell. despunat.) \mathfrak{J} jjj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben.

(Besonders gegen Scabies, Herpes und Tinea capitis.)

Sorg. (Thomann.)

N^o. 1199.

Ry. Sulphuret. Stibii laevigat. $\mathfrak{J}\beta$.

Conserv. Hb. Cochleariae \mathfrak{J} j.

Syr. simpl. q. s. ut f. Bolus.

Disp. tal. q. l.

D. S. Täglich 2 mal einen Bolus.

(Gegen syphilitische Hautleiden besonders empfohlen.)

Swediaur.

N^o. 1200.

Ry. Acidi muriatici $\mathfrak{J}\beta$.

Axung. porci $\mathfrak{J}\mathfrak{u}\beta$.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben.

Plenk.

N^o. 1201.

- R_x. Sap. domest. ʒijj.
 Kali sulphurat. ʒβ.
 Ol. Papav. ʒvj.
 — Thymi aeth. ʒβ.

Liquef. sap. in balneo Mariae,
 et cum Kali in Ol. Pap. sol. misc.
 sub fin. add. Ol. Thymi. D. S. Zum Einreiben.
 (Besonders gegen Scabies empfohlen.)

Jadelot.

N^o. 1202.

- R_x. Hb. Cicutae ʒij.
 Mellis puri ʒij.
 M. f. Elect.
 D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Krätze. S. No. 1198. 1201.)

Baldinger.

N^o. 1203.

- R_x. Lign. Juniperi
 Rad. Tarax.
 — Graminis
 — Cichor. ana ʒiv.
 Rad. Polygal. Senegae
 Sem. Foeniculi
 — Petrosel.
 Bacc. Juniperi ana ʒβ.

C. M. D. S. Zum Thee.
 (Wie bei No. 1202.)

Selle.

N^o. 1204.

- R_x. Aq. Calcis ʒijj.
 Flor. Sulph. ʒj.

M. coq. ad. dissolut. Col.

D. ad lag. vitream.

S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1202.)

Leidenfrost.

N^o. 1205.

R_x. Axung. porci ʒiiß.

Flor. Sulph.

Vitriol. alb. pulv. ana ʒjj.

Ol. Bergamott. gtt. XX.

M. D. S. Krätzsalbe, zum Einreiben in die Kniegelenke und Handfläche.

(Auch gegen Herpes und Tinea capitis empfohlen.)

Vogler.

N^o. 1206.

R_x. Flor. Sulph.

Vitriol. alb.

Pulv. Baccar. Lauri ana pt. aeq.

M. f. c. Ol. laurin. express. q. s.

Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Jasser.

N^o. 1207.

R_x. Sap. alb. ʒj.

solve in

Aq. destill. q. s. ut f. c.

Flor. Sulph. ʒj.

Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Vogt.

N^o. 1208.

R_x. Axung. porci ʒjj.

Flor. Sulph. ʒj.

Sal. ammon. dep. ʒiß.

M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe zum Einreiben auf allen krätzigen Stellen.

(Zugleich lauwarmer Bäder und häufiges Abwaschen mit Seifenwasser. Soll in 14 Tagen bis 3 Wochen heilen.) *Fritze.*

N^o. 1209.

R_x. Flor. Sulph. $\bar{\text{3}}$ jj.

Sal. ammon. dep. $\bar{\text{5}}$ jj.

Axung. porci q. s. ut f. Ungt.
adde

Essent. Cinnamom. gtt. XXX.

M. D. S. In 8 Tagen zu verbrauchen, indem man den 1sten Tag einen Arm, dann den 2ten Tag ein Bein, hierauf den 3ten Tag den andern Arm u. s. w. einreiben lässt. *Pringle.*

N^o. 1210.

R_x. Flor. Sulph.

Sap. mollis ana $\bar{\text{8}}$ j.

Axung. porci $\bar{\text{8}}$ jij.

Rad. Helleb. alb. $\bar{\text{3}}$ lv.

Nitri dep. $\bar{\text{5}}$ jj.

M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

(Der Kranke wird nacht zwischen wollene Decken gelegt, und am ersten Tage werden ihm alle 6 Stunden 2 Loth der Salbe, später 1 Loth eingerieben. Bald brechen Pusteln hervor, welche schnell trocknen; hierauf, und wenn das Jucken aufhört, verlässt der Kranke die Decken und wäscht sich mit Seifenwasser ein. Die Decken selbst brauchen nicht für jeden Kranken erneuert zu werden, im Gegentheile erfolgt die Heilung durch gebrauchte Decken schneller,

und wohl in 24 bis 36 Stunden, längstens in 3 Tagen.)

(*Ungt. sulphuratum comp. Ph. Londin.*)

N^o. 1211.

Ry. Picis fluid. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.
Flor. Sulph. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
Cerae flavae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Ungt.

D. S. Morgens und Abends eine solche Portion in die Krätz-Pusteln einzureiben. *Wylie.*

N^o. 1212.

Ry. Axung. porci $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.
Flor. Sulph. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
Pulv. Hellebori nigri $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1211.

(Zugleich innerlich Acid. sulph. dilut.) *Wylie.*

N^o. 1213.

Ry. Flor. Sulph. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
Sap. domest. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. c. aq. f. s. g. Linimentum.

D. S. Hievon täglich 4 mal 4—6 Drachmen in alle Krätzstellen einzureiben.

(Diese Salbe scheint die vorzüglichste zu seyn, wenigstens hat sie auch dem Verf. dieses Werks in sehr vielen Fällen treffliche Dienste geleistet.)

Horn.

N^o. 1214.

Ry. Sap. dom.
Flor. Sulph.
Axung. porci ana pt. aeq.

D. S. Krätzsalbe. *van der Haar.*

N^o. 1215.

Ry. Flor. Sulph. $\bar{3}$ ij.
 Kali subcarbonici $\bar{3}$ j.
 Axung. porci $\bar{3}$ vjjj.
 M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

*Helmerich.*N^o. 1216.

Ry. Kali sulphurat. $\bar{3}$ iv.
 solve in
 Aq. font. $\bar{8}$ lβ.
 adde

Acidi sulphurici dil. $\bar{3}$ iv.
 M. D. S. Morgens und Abends die krätzigigen Stellen damit zu waschen und zu reiben. *Dupuytren.*

N^o. 1217.

Ry. Flor. Sulph. $\bar{3}$ β.
 Merc. praec. alb. $\bar{3}$ j.
 Axung. porci $\bar{3}$ lβ.
 Ol. laurin. $\bar{3}$ j.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Haselnuss gross in die Handfläche, die Ellbogen, Fusssohlen, das Kniegelenk (und selbst in die krätzigigen Stellen) am warmen Ofen einzureiben. *Hecker.*

N^o. 1218.

Ry. Kali carb. $\bar{3}$ β.
 Aq. Rosar. $\bar{3}$ j.
 Hydrarg. sulph. rubr. $\bar{3}$ j.
 Ol. essent. Bergamott. $\bar{3}$ β.
 Flor. Sulph.
 Adip. suillae $\bar{3}$ ix.

M. D. S. Krätzsalbe.

Bateman..

N^o. 1219.

- R_y. Flor. Sulph. ʒijj.
 Sal. ammon. dep. ʒj.
 Coq. c. Aq. Calcis viv. ℥v.
 ad ℥jjj. adde
 Hydrarg. mur. corros. ʒβ.

in suff. qt. Aq. Calcis sol.

- M. D. S. Krätzsalbe. Jeden Abend die Krätzstellen zu waschen. *Richter.*
-

N^o. 1220.

- R_y. Hydrarg. mur. praecip. ʒβ—j.
 Axung. porci ʒj—jj.

- M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Werlhof. (Weikard.)

N^o. 1221.

- R_y. Hydrarg. praecip. rubr. ʒj.
 Axung. porci ʒx.

- M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Richter.

N^o. 1222.

- R_y. Merc. subl. corros. ʒβ.
 Aq. destill. ℥j.

- M. D. S. Waschwasser gegen Krätze.

Weikard. (Horn.)

N^o. 1223.

- R_y. Merc. subl. corros. ʒβ—j.
 Opii puri gr. vjjj.
 Axung. porci ʒj.

- M. D. S. Täglich 2 mal eine Erbse gross in die Fusssohlen, und selbst in die stärksten Krätzstellen einzureiben. (S. No. 1106.)

Jahn.

N^o. 1224.

Ry. Hydrarg. mur. corros. ʒj.
 — praecip. rubr. gr. x.
 Spir. Angelicae
 — Anthos ana ʒj.
 Vitrioli albi ʒiv.

M. D. S. In einer Flasche Regenwasser zu lösen, und einen Theil der Mischung wieder mit 4 Theilen Regenwasser vermischt zum Abwaschen und Einreiben der Krätzstellen (nach vorhergegangener Reinigung mit warmem Seifenwasser), ein bis zweimal täglich zu brauchen. Jeden Tag nimmt man $\frac{1}{5}$ der Mischung mehr und des Wassers weniger, so dass die Mischung am 6sten Tage unverdünnt gebraucht wird; nach 5 Tagen setzt man allmählig wieder Wasser zu. Eiternde Krätz-Pusteln werden vor dem jedesmaligen Einreiben geöffnet. Diese Methode soll auch in veralteten Fällen sehr dienlich seyn und niemals schaden, *Reis*.

N^o. 1225.

Ry. Rad. Helenii ʒijj.
 coq. c. Aq. f. q. s.
 ad Mucilag. Col. et adde
 Adipis suill. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Krätzsalbe. (Besonders für Kinder anwendbar.)
Hufeland.

N^o. 1226.

Ry. Hydrarg. mur. corros.
 Butyr. Antimon. ana ʒj.
 Ungt. cantharid. ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Erbsengross einzureiben.
 (Zur Hervorrufung eines krätzähnlichen Ausschlags, bei Scabies suppressa retrograda.)
Autenrieth.

N^o. 1227.

Ry. Rad. Caric. arenar. ʒβ.

— Liquirit. ʒβ.

Cort. Ulmi ʒjj.

Coq. c. aq. ft. s. q.

Col. M. j. adde

Sal. Carolin. ʒj.

— alcal. min. ʒβ.

M. D. S. Täglich zu verbrauchen, und 3—4 Wochen lang fortzusetzen.

(Gegen Herpes. S. No. 183, 595, 759, 1070, 1198, 1205. *Heim.*)N^o. 1228.

Ry. Liq. sap. stib. ʒvj.

Tr. Colocynth. ʒjj.

M. D. S. Alle 3 Stunden 20 Tropfen mit Wasser.

(Wie bei No 1227.)

*Heim.*N^o. 1229.

Ry. Hb. Jaceae

Rad. Saponar.

— Lapathi acut.

— Sarsaparill.

Stipit. Dulcamar. ana ʒjj.

M. f. Spec. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 1227. Auch gegen Serpigo.)

*Hufeland.*N^o. 1230.

Ry. Lip. Kali oxymuriat. ʒjjj — v.

Ol. Olivar. ʒvjj.

M. D. S. Umgeschüttelt täglich 3 mal mit einem

Pinsel auf die Flechten zu tragen.

Kopp.

N^o. 1231.

- Ry. Cerae flavae
 Succī fol. Nicotianae ana ʒjij.
 Res. Pini ʒiij.
 Terebinthinae ʒj.
 M. f. l. a. Ceratum.
 D. S. Täglich 4 mal eine Haselnuss gross einzureiben.
 (Wie bei No. 1227.) *Consbruch.*
-

N^o. 1232.

- Ry. Axung. porci ʒj.
 Merc. nitrosi ʒij.
 M. exactiss. f. Ungt.
 D. S. Täglich 2 mal eine Haselnuss einzureiben.
 (Wie bei No. 1227. Auch gegen veraltete Geschwüre.) *Vogler.*
-

N^o. 1233.

- Ry. Acid. hydrocyan. ʒiij—jj.
 Spir. Vini rectific. ʒvj.
 M. D. S. Zum Betupfen.
 (Wie bei No. 1227.) *Schneider.*
-

N^o. 1234.

- Ry. Ungt. Cerussae ʒj.
 Lact. Sulphuris ʒij.
 Merc. subl. corros. gr. X.
 M. f. Ungt. D. S. Am Rande der Flechten einzureiben.
Rust.
-

N^o. 1235.

- Ry. Arsenici albi
 Flor. Sulph. ana ʒj.
 Aceti destill.
 Ungt. saturnin. ana ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1234. (Mit Vorsicht anzuwenden, und nur bei reizlosem Zustande allenfalls passend.) *Arnemann.*

No. 1236.

R̄. Arsenici albi gr. IV.
Opii puri gr X.
Cerati simpl. ʒI.

M. D. S. Dünn auf Leinen gestrichen und auf die Flechten zu legen. (S. No. 1235.) *Justamond.*

No. 1237.

R̄. Lact. Sulph. ʒj.
Acet. saturn. ʒj.
Aq. Rosar. ʒvjjj.

M. D. S. Die Flechten Morgens und Abends damit zu benetzen. *Bell.*

No. 1238.

R̄. Hydrarg. muriat. corros. gr. jij.
Lact. Sulph. ʒjj.
Acet. saturn. ʒβ.
Aq. Rosar. ʒvj — vjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt die Flechten mehrmals täglich damit zu benetzen, oder damit befeuchtete Leinwand-Compressen darüber zu legen. *Rust.*

No. 1239.

R̄. Merc. subl. corros. ʒj.
Empl. diachylon.
Empl. graphital. ana ʒj.

M. D. S. Auf die Flechten zu legen. (Empl. graphital. s. No. 1197.) *Rust.*

N^o. 1240.

- R_x. Merc. subl. corros. gr. IV.
 Acet. saturn. ℥β.
 Vitrioli albi ℥j.
 Aq. destill. ℥IV.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Prurigo pubis. S. No. 408. 409.)

Wendt.

N^o. 1241.

- R_x. Merc. praecip. rubri gr. XX—XXX.
 Axung. porci ℥j.

M. D. S. Zum Aufstreichen.

(Wie bei No. 1240. Besonders wo kleine Knötchen und Geschwürchen sind.)

Sims.

N^o. 1242.

- R_x. Flor. Zinci ℥j — jj.
 Ungt. pomat. ℥j.

M. f. Ungt. D. S. Auf die leidenden Stellen.

(Gegen Intertrigo.)

Henke.

N^o. 1243.

- R_x. Hb. Jaceae
 Sacch. Lact. ana ℥jjj.
 Sulph. praecip.
 Magnes. carb. ana ℥β.

M. f. Pulv. D. ad. scatul.

S. Alle 2 Stunden eine Messerspitze voll zu geben.

(Gegen Crusta lactea. S. No. 700. 1229.)

Jahn.

N^o. 1244.

- R_x. Lact. Sulph. ℥β.
 Hb. Jaceae
 Mellis puri ana ℥β.

M. f. l. a. Elect.

D. S. Täglich 4 mal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 1243.)

*Jahn.*N^o. 1245.R_x. Opii pulv. gr. vj.

Flor. Zinci ʒβ.

Butyr. rec. insuls. ʒj

M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle.

(Wie bei No. 1243.)

*Henke.*N^o. 1246.R_x. Hb. Jaceae ʒjj.

inf. c. aq. f. suff. qt.

per ½ hor. Col. refriger. ʒvj.

adde

Vini stibiati ʒj.

Syr. Althaeae ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 volle Theelöffel.

(Gegen Tinea capitis. S. No. 700. 1198.)

*Jahn.*N^o. 1247.R_x. Ungt. Althaeae ʒβ.

— Juniperi ph. austriac. ʒjj.

Acid. muriat. pur. ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 2—3 mal den Grind damit einzureiben,

(Wie bei No. 1246. Soll nach 6 Wochen gründliche Heilung bewirken.)

*Stoll. (Plenk.)*N^o. 1248.R_x. Acid. sulph. ʒj.

Axung. porci ʒvjijj.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1247.

Crampton.

N^o. 1249.

R_y. Bacc. Cocculi ind. $\bar{5}j$.
Axung. porci $\bar{5}jj$.

M. f. Ungt. D.

S. Täglich den ganzen Kopf damit einzureiben.
(Wie bei No. 1246. In 8—14 Tagen soll
Heilung eintreten.) *Hamilton. (Bateman)*

N^o. 1250.

R_y. Picrotoxini gr. X.

Axung. porci $\bar{5}j$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1249. *Jäger.*

N^o. 1251.

R_y. Kali sulphurici $\bar{5}jjj$.

Sap. hisp. $\bar{5}j$.

Aq. Calcis $\bar{5}vjjj$.

Spir. Vini rectific. $\bar{5}jj$.

M. D. S. Morgens und Abends die Grindstellen da-
mit zu waschen, *Barlow.*

N^o. 1252.

R_y. Virid. aeris

Calomel. ana $\bar{5}j$.

Ungt. pomat. rec. X.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends den Rand
des Grinds damit einzureiben. *Bicker.*

N^o. 1253.

R_y. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. j.

Aq. font. $\bar{5}iv$.

M. D. S. Mit Brodkrumen auf die Grindstellen
zu legen. *Duncan.*

N^o. 1254.

Ry. Hydrarg. mur. corrosiv.
Virid. aeris ana gr. vj.
Aq. font. ℞jij.

M. D. S. Die Grindstellen damit zu waschen.

Desault.

N^o. 1255.

Ry. Acet. saturnin. gtt. XL.
Extr. Myrrhae ℥β.
Mell. rosat. ℥β.
Aq. font. Cong. j.

M. D. S. Leinene Compressen hiemit zu befeuchten, und nach vorheriger Abwaschung der Grindstellen (mit einem Decoct aus Feigen und darin aufgelöster Mandelseife,) und Erweichung derselben (mit einem Brei von gelben Rüben oder Mangold-Blättern,) über dieselben zu legen. —

Grigg.

N^o. 1256.

Ry. Merc. praecip. rubr. gr. XV—XX.
Myrrhae pulv. ℥β.
Mell. puri ℥ij.

M. f. Ungt. Zum Bestreichen der grindigen Stellen. (Besonders Nachts und am Tage No. 1255 anzuwenden.)

Grigg.

N^o. 1257.

Ry. Cep. assat.
Cerae flav.
Picis ana ℥IIβ.
Sap. ℥vj.
Sem. Foenu graeci pulv. ℥ijj.
Ol. Olivar. ℥j.

M. f. Ceratum. D. S. Auf Leinwand oder Leder dick gestrichen aufzulegen, und dann mit einem Cataplasma emolliens zu bedecken.

(Gegen offenen Carbunculus, mit gleichzeitig zerstörten Stellen im Zellgewebe.) *Bücking.*

N^o. 1258.

R̄. Cinnabar. artef. ʒj.

Ciner. e calc. antiq. combust. gr. vjij.

Sang. Dracon. gr. xjj.

Arsenici albi ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Mit Wasser zu einem Brei angemengt, dann mit einem Pinsel $\frac{1}{4}$ Linie dick auf die Stellen aufgetragen und mit Feuerschwamm bedeckt. Nachdem etwa nach 8 Tagen sich ein Schorf ablöst, wird die eiternde Fläche mit Bals.

Locatelli (R̄. Ol. Olivar. ʒiv. Cer. flav. ʒiβ.

Tereb. comm. ʒijj. Bals. Copaiv. ʒβ. G. Kino ʒijj.

M. f. l. a. Ungt.) zur Heilung gebracht.

(Gegen Muttermäler. Doch nur mit grosser Vorsicht anwendbar.) *Bernard.*

N^o. 1259.

R̄. Boracis ʒβ.

solve in

Aq. Rosar.

— flor. Aurant. ana ʒβ.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Leberflecke, rothe Nasen, u. s. w. besonders während der Menstruation.)

Hufeland.

N^o. 1260.

R̄. Furfur. Amygdal. ʒj.

Aq. Rosar. ʒvjjj.

M. f. Emulsio,

adde

Tr. Benzoës ʒjjj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Rauheit der Haut, Abschuppung derselben u. s. w.)

Conradi.

N^o. 1261.

R̄. Boracis venet. ʒj.

solve in

Aq. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1260.)

Conradi.

N^o. 1262.

R̄. Vitriol. alb. ʒjj.

Acet. saturn. ʒj.

Tr. Benzoës ʒβ.

Aq. Rosar. (non salit.) ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1260. Auch gegen Acne punctata.)

v. Walther.

N^o. 1263.

R̄. Rad. Hellebor. alb. ʒjj.

coq. c. aq. ft. ʒjjj.

in Col. ʒjj. solve

Sal. Ammon. dep. ʒjjj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Lepra.)

Reece.

N^o. 1264.

R̄. Picis liq.

Sevi ovilli ana pt. aeq.

M. f. Ungt. D. S. Zum Bestreichen.

(Wie bei No. 1263.)

Willan.

N^o. 1265.

Ry. Bals. peruv. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Liq. Kali carb. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Flor. Sulph. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{\beta}$.
 Ungt. pomat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No 1264. *Scultet.*

N^o. 1266.

Ry. Butyr. rec. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{\beta}$.
 Tereb. venet. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.
 Cerae alb. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$.
 Leni igne calef. adde
 Hydrarg. oxydat. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 — muriat. corros.
 Natri muriat. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Aceti Vini q. s.

ut f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1264. *Golotti.*

N^o. 1267.

Ry. Hb. Vincae pervincae $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{j}$.
 inf. aq. fervid. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{j}$. et
 digere per noct. tunc coque
 per $\frac{1}{4}$ hor. Col.

D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.
 (Gegen Weichselzopf.)

J. Frank.

N^o. 1268.

Ry. Empl. Cicutae
 — Asae foet. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Empl. Cantharid. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. f. Empl.

D. S. Den Rückgrat entlang zu legen.
 (Wie bei No. 1267.)

J. Frank.

III. Oertliche Krankheiten.

Unter der Rubrik „örtliche Krankheiten“ sind theils solche Uebel, welche wirklich als wie locale auftreten, theils solche, deren Behandlung doch vorzugsweise eine äusserliche ist, zusammen gestellt, obwohl allerdings Geschwüre, Augenkrankheiten u. s. w. sehr häufig von innern krankhaften Zuständen des Organismus abhängig sind, und demnach ausser der örtlichen, auch noch eine allgemeine Behandlung erfordern. Für letztere sind dann die einzelnen Krankheitsformen theils unter den acuten, theils unter den chronischen Krankheiten nachzusehen. —

G e s c h w ü r e.

S. No. 1169. 1170. 1232.

N^o. 1269.

R_x. Thuris ʒj.
Mastichis
Caryophyllor.
Galangae
Macis
Cubeb. ana ʒβ.
Lign. Aloës ʒj.
M. f. Pulv. et adde
Mellis puri ℥β.
Tereb. venet. ℥j.
Spir. Vini q. s.
et destilla in balneo Mariae.

D. S. Täglich einige Tropfen aufzutropfeln.

Fuller.

N^o. 1270.

R_x. Ungt. de Styrace
 Carb. lign. Tiliae ana $\bar{\text{z}}$ j.
 Camphorae
 Myrrhae ana $\bar{\text{z}}$ j — jj.
 Ol. Tereb. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Mit Charpie aufzulegen.

Rust.

N^o. 1271.

R_x. Tereb. Laricis $\bar{\text{z}}$ j.

Cerae flavae $\bar{\text{z}}$ jj.

Solve leni igne,

et admisce

Ol. Terebinth. $\bar{\text{z}}$ jj.

M. D. S. Zum Verband.

(Besonders gegen alte Geschwüre.)

Trachini.

N^o. 1272.

R_x. Argenti nitrici fusi $\bar{\text{z}}$ β.

solve in

Aq. (vel Infus.) flor. Chamomill. $\bar{\text{z}}$ vj.

adde

Tr. Opii simpl. $\bar{\text{z}}$ β.

M. D. S. Leinene Lappchen damit befeuchtet, auf die Geschwüre zu bringen.

(Besonders gegen alte, unreine, Jaxe Geschwüre, zur Beschränkung abnormer Granulation und Beschleunigung der Vernarbung.)

Rust.

N^o. 1273.

R_x. Argenti nitrici fusi $\bar{\text{z}}$ β.

solve in

Aq. destill. $\bar{\text{z}}$ vj — vjjj.

adde

Extr. Chamomillae

— Cicutae

Tr. Opii simpl. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Leinene Lämpchen damit befeuchtet auf die Geschwüre zu bringen.

(Gegen scrophulöse Geschwüre.) *Rust.*N^o. 1274.R̄. Spir. Cochleariae $\mathfrak{z}\beta$.— Lavandulae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Mell. rosat. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Zum Gurgeln.

(Gegen scorbutische Halsgeschwüre. S. No. 752. 753. 1270.) *Richter.*N^o. 1275.R̄. Putam. Nuc. jugland. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Coq. c. aq. ft. suff. qt.

ad Col. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

D. S. Damit befeuchtete Compressen auf die Geschwüre zu legen.

(Gegen arthritische Geschwüre.) *Rust.*N^o. 1276.

R̄. Asae foet.

Sap. med, ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.G. Ammoniaci $\mathfrak{z}\beta$.

Acet. Squill. q. s.

ut f. l. a. Empl.

D. S. Auf die Geschwüre.

(Wie bei No. 1275.) *Schmucker. (Rust.)*

N^o. 1277.

- R_x. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. vj — Xjj.
 Extr. Cicutae
 — Chamomill. ana ʒjj.
 Tr. Opii simpl. ʒ^lβ.
 Mell. rosat. ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln.
 (Gegen syphilitische Halsgeschwüre.) *Rust.*

N^o. 1278.

- R_x. Camphorae ʒj.
 Ol. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1277. S. No. 1149. 1150.
 1151. 1152. 1153. 1272. *Rust.*

N^o. 1279.

- R_x. Fol. Sabinæ ʒvj.
 Rad. Calami ʒjj.
 coq. c. aq. ft. q. s.
 in Col. ʒvjjj. solve
 Hydrarg. mur. corros. gr. vj.

M. D. S. Zum Gurgeln.
 (Wie bei No. 1277. Auch bei schon eingetre-
 tener Caries des Gaumens noch als heilsam
 empfohlen.) *Vogler.*

N^o. 1280.

- R_x. Hydrarg. oxydat. nitri ʒjj.
 Butyr. rec. non salit. ʒjj.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 3 mal eine Linse gross
 auf's Geschwür.

(Gegen syphilitische Geschwüre. — In der
 Charité zu Berlin legt man blos in lauwarmes
 Wasser getauchte Charpie über. S. No. 1091.)
Schönemann.

No. 1281.

R̄. Calomel. ʒj.

Aq. Calcar. ust. ʒiv.

Opii puri ʒjj—iv.

M. D. S. Zum Verband.

(Wie bei No. 1280.)

Rust.

No. 1282.

R̄. Hydrarg. oxydat. rubr. ʒj.

Ungt. Basilic. ʒj.

M. D. S. Dünn auf Charpie gestrichen aufzulegen,

(Wie bei No. 1280.)

Fritze.

No. 1283.

R̄. Alum. crudi

Cupri sulphurici ana ʒβ.

Aq. font. ʒxjj.

M. D. S. Mit Plumaceaux auf die Geschwüre zu bringen.

(Wie bei No. 1280.)

Fricke.

No. 1284.

R̄. Ungt. Zinci ʒβ.

Bals. peruv. ʒj.

Pulv. Lap. infernal. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Aufgestrichen und 2—3 Tage, bis sie mit dem Eiter oder dem Schorf abgestossen wird, liegen zu lassen.

(Zur völligen Vernarbung syphilitischer Geschwüre, wenn sie bald heil sind.) *Fricke.*

N^o. 1285.

Ry. Flor. Sulph. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Sal. Ammon. dep. $\mathfrak{z}\text{i}$.
 Coq. c. Aq. Calcis \mathfrak{v} .
 ad Col. \mathfrak{v} $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 adde

Hydrarg. mur. corros. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Damit befeuchtete Compressen aufzulegen.
 (Gegen scabiöse Geschwüre.) *Rust.*

N^o. 1286.

Ry. Acet. saturn. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Ol. Olivar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Wie bei No. 1285.

Rust.

N^o. 1287.

Ry. Rad. Sarsaparill.
 Stipit. Dulcamar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Cort. Mezerei
 Rad. Liquirit. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

C. M. S. Vier Esslöffel voll mit 2 \mathfrak{v} Wasser auf
 1 \mathfrak{v} einzukochen, und von der Colatur täglich
 einige Gläser zu trinken.

(Gegen cariöse Geschwüre.)

Mollwitz.

N^o. 1288.

Ry. Arsenici albi gr. $\text{vj} - \text{x}$.
 Opii puri gr. $\text{xj} - \text{xx}$.
 Zinci oxydati albi $\mathfrak{z}\beta$.
 Butyr. rec. $\mathfrak{z}\text{i}$.
 Cerae flavae $\mathfrak{z}\text{i}\beta$.

M. exactiss. D. S. Mit Plumaceaux auf das Ge-
 schwür zu bringen.

(Gegen Krebsgeschwüre.)

Harless.

N^o. 1289.

- Ry. Hydrarg. mur. corros. ℥j.
 G. arab.
 Aq. destill. ana ℥j.
 M. f. Ungt. spissum.
 D. S. Mit Plumaceaux auf das Geschwür zu bringen.
 (Gegen fistulöse und callöse Geschwüre.)
v. Graefe.

N^o. 1290.

- Ry. Kali caust. ℥j.
 solve in
 Aq. font. ℥vj.
 M. D. S. Zum Verband.
 (Gegen atonische Geschwüre.) *Wetz.*

N^o. 1291.

- Ry. Carb. lign. Tiliae
 Cort. peruv. ana ℥β.
 — Salicis laureae
 Rad. Calami aromat. ana ℥j.
 M. f. Pulv. D. S. Mit Wein auf die Geschwüre
 zu streuen.
 (Gegen brandige Geschwüre.) *Berends.*

A u g e n k r a n k h e i t e n .

N^o. 1292.

- Ry. Extr. Saturn. ℥β — j.
 Album. ovor. No. I.
 solut. in
 Aq. Rosar. ℥vjij.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Gegen Augenentzündung. S. No. 243, 251.)
Hecker.

N^o. 1293.R_x. Alum. crud. ℥j—3β.

solve in

Aq. Rosar. ℥vj.

adde

Mucilag. Sem. Cydonior. ℥j.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1294.R_x. Extr. Saturn. ℥j.Opⁱi ℥jj.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

adde

Mucilag. Sem. Cyd. ℥β.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1295.R_x. Zinci sulphurici ℥j.

Plumbi acet.

Spir. Vini camphorat. ana ℥j.

Aq. destill ℥vj.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1296.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. jj.Extr. Opⁱi

(vel Extr. Hyoscyami) ℥β.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

adde

Mucilag. G. Tragacanth. ℥β.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1297.

R_y. Camphorae gr. XV.
 trit. cum
 Mucilag. Sem. Cydon. $\bar{3}\beta$.
 adde
 Aq. Rosar. $\bar{3}j$.

M. D. S. Wie bei No 1292.

Hecker.

N^o. 1298.

R_y. Ammon. muriat. $\bar{9}j$.
 Cupri acet. gr. vj.
 Camphor. c. Sacch. trit. $\bar{9}\beta$.
 Aq. Calcis viv. $\bar{3}vjjj$.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1299.

R_y. Vini stib.
 Tr. Opii croc. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1300.

R_y. Hydrarg. oxydat. rubr. $\bar{9}j$.
 Ungt. pomat. $\bar{3}j$.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Linse
 dick in die Augenlieder einzureiben.

(Gegen Augenentzündungen.)

Hecker.

N^o. 1301.

R_y. Hydrarg. praecip. alb.
 Camphorae ana $\bar{9}j$.
 Ol. destill. Caryophyll. gtt. IV.
 Ungt. pomat. $\bar{3}j$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

Hecker.

N^o. 1302.

- R_y. Acid. nitrici dil. ℥β.
 Hydrarg. puri q. s. ad saturat.
 Digere in aren. calid. donec Hydrarg.
 solv. dein et adde
 Camphorae ℥j.
 in Ol. Olivar. ℥j. solut.
 Butyr. rec. non. salit. ℥IV.
 M. f. in mortar. calef. Ungt.
 D. S. Wie bei No. 1300.
 (Wird in chronischen Fällen besonders empfoh-
 len.) *Hecker.*
-

N^o. 1303.

- R_y. Hydrarg. oxydat. rubr. gr. vj.
 Tr. Opii
 Acet. saturn. ana ℥β.
 Butyr. rec. insuls. ℥jj.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300. *Rust.*
-

N^o. 1304.

- R_y. Hydrarg. ammon. muriat. ℥j.
 Ungt. rosat. ℥j.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300. *Rust.*
-

N^o. 1305.

- R_y. Aeruginis
 Nitri puri
 Alum. crud. ana ℥jjj.
 Camphorae ℥℥β.
 Laud. liq. Sydenham. q. v.
 M. D. S. Mit hinreichender Menge Schleim ver-
 dünnt, ins Auge zu tröpfeln.
 (Gegen Augenentzündungen.) *Beer.*
-

N^o. 1306.

- Ry. Mucilag. Sem. Psyll.
 — — Cydon, ana ʒj.
 Aq. Rosar. ʒjj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (In Anfang von Ophthalmien.)

*Reil.*N^o. 1307.

- Ry. Merc. subl. corros. gr. j.
 Laud. liq. Sydenh. ʒjjj.
 Aq. Rosar. ʒvj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (In den spätern Zeiträumen von Ophthalmien.)

*Conradi.*N^o. 1308.

- Ry. Tart. emet. gr. vj.
 Aq. Rosar. ʒjj.
 M. D. S. Wie bei No. 1307.
 (Auch gegen Hornhautflecken empfohlen.)

Reil.
*Vogler.*N^o. 1309.

- Ry. Tut. praep. ʒj.
 Vitriol. alb. gr. vj.
 Merc. praecip. rubr. gr. XXV.
 Butyr. rec. insuls. ʒj.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

*Richter.*N^o. 1310.

- Ry. Aluminis ʒjj.
 Plumbi acet. ʒj.
 Aq. Rosar. ʒvjijj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (Gegen Ophthalmien mit schlaffer unschmerz-
 hafter Röthe.)

Richter.

N^o. 1311.

Ry. Merc. praec. rubr. ʒβ.
 Opii gr. jj.
 Cerae alb. ʒj.
 Butyr. rec. insuls. ʒjj.

leni igne calef. M. f. Ungt.

D. S. Täglich 4 mal eine Linse gross mit einem
 Pinsel ins Auge zu tragen.

(Gegen Ophthalmien mit zähem Eiter.)

Richter.

N^o. 1312.

Ry. Acet. saturn. ʒβ.
 Aq. Rosar. ʒvj.
 Sal. Ammon. dep. ʒβ.
 Spic. Vini rectific. ʒjj.

M. D. S. Augenwasser.

(Gegen trockne Ophthalmien.)

Theden. (Richter.)

N^o. 1313.

Ry. Extr. Saturn. gtt. vjjj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒjj.
 Aq. flor. Sambuci ʒvjj.

M. D. S. Wie bei No. 1312. *De la Fontaine.*

N^o. 1314.

Ry. Mucilag. Sem. Cydonior. gr. vj.
 Opii gr. IV.
 Sacch. Saturn. gr. jj.
 Aq. Rosar. ʒjjj,
 Tr. Croci ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1312.

Boerhaave. (Richter.)

N^o. 1315.R_x. Acet. saturn. ʒβ.

Aq. Rosar. ʒvj.

Lap. divin. ʒiβ.

Spir. Vini rectific. ʒjj.

M. D. S. Augewasser.

(Gegen feuchte Ophthalmien. Auch gegen O.
scrophulosa.) *Richter.*N^o. 1316.R_x. Lap. divini gr. X.

Sal. Ammon, dep. gr. V.

Aq. Rosar. ʒjj.

M. D. S. (Wie bei No. 1315.)

*Richter.*N^o. 1317.R_x. Vitriol. alb. ʒj.

Butyr. rec. insuls. ʒjj.

M. D. S. Augensalbe.

(Gegen feuchte Ophthalmien.) *Richter.*N^o. 1318.R_x. Vitriol. alb. ʒj.

Sacch. Saturn.

Spir. Vini camphorat. ana ʒjj.

Aq. flor. Chamomill. ʒvjjj.

M. D. S. Augewasser. (Wie bei No. 1315.)

*Richter.*N^o. 1319R_x. Butyr. insuls. ʒjj.

Merc. praec. rubr. ʒj.

intime mixtis adde

Aceti saturn. \mathfrak{v} j.

tere donec omnis humiditas dispreat.

D. S. (Wie bei No. 1317.)

Sprögel.

No. 1320.

℞. Vitrioli albi gr. \mathfrak{ij} .Aq. Rosar. \mathfrak{v} jjj.Mucilag. Sem. Cydon. \mathfrak{v} j.Tr. Opii crocat. \mathfrak{v} β.

M. Stent per horas VI, tum col

D. S. Täglich 1—2 mal einen Tropfen ins Auge
fallen zu lassen.(Gegen torpide Augenentzündungen und Blen-
norrhöen.) *v. Gräfe.*

No. 1321.

℞. Aq. Foeniculi \mathfrak{v} jjj.— reg. Hungar. \mathfrak{v} β.Sal. volat. oleosi \mathfrak{v} β.M. D. S. Täglich 3—4 mal das Auge damit zu
waschen.(Gegen asthenische Augenentzündung.) *Reil.*

No. 1322.

℞. Aq. Rutae

— Rosar. ana \mathfrak{v} jj.Tr. Myrrhae aq. \mathfrak{v} jj.Mucilag. Sem. Cydon. \mathfrak{v} β.M. D. S. Mit Bäuschchen auf die Augen zu legen.
(Gegen Ophthalmie.) *Stark.*

N^o. 1323.

R_x. Flor. Chamomill.
 — Sambuci ana ʒvj.
 Camphorae tritae gr. V — ʒβ.

M. D. S. Zu Kräutersäckchen auf die Augen.
 (Gegen Ophthalmia catarrhalis.) *Weller.*

N^o. 1324.

R_x. Tutiae praep. gr. XV.
 Vitriol. alb. gr. 1β.
 Merc. praecip. rubr. gr. vj.
 Butyr. rec. insuls. ʒjj.
 M. f. Ungt. D. S. Augensalbe.
 (Gegen torpide Ophthalmia catarrhalis oder O.
 arthritica.) *Vogel. (Weller.)*

N^o. 1325.

R_x. Lapid. divini gr. X.
 Sal. Ammon. gr. V.
 solve in
 Aq. destill. ʒjj.
 M. D. S. Mit leinenen Läppchen aufs Auge zu
 gebrauchen.
 (Gegen torpide Ophthalmia rheumatica.)
Richter.

N^o. 1326.

R_x. Fol. Absynth.
 Flor. Arnicae
 — Chamomill. vulg.
 — Sambuci ana ʒβ.
 Terant. in pulv. med. subtilitat.
 D. S. Zu Kräutersäckchen, erwärmt auf's Auge zu legen.
 (Gegen Ophthalmia arthritica.)
J. A. Schmidt.

N^o. 1327.

R_x. Flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 — Sambuci ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Hb. Menthae pip. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.
 Farinae Secalin. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Wie bei No. 1326.

Benedict.

N^o. 1328.

R_x. Lapid. divini c. Aerug. parat. gr. vjij — xjj.
 solve in

Aq. destill. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

adde

Acet. saturn. gtt. xjj — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Tr. Opii crocat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Aq. comm. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.

M. D. S. Augengewasser.

(Wie bei No. 1326.)

Benedict.

N^o. 1329.

R_x. Pulv. Extr. Belladonn. aer. sicc. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

— — Hyoscyami

— Opii puri ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Mit Speichel vermischt in die Umgegend
 der Augen einzureiben.

(Gegen Ophthalmia scrophulosa.) *v. Gräfe.*

N^o. 1330.

R_x. Calomel. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

Aq. Rosar. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

— Calcis. viv. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

Extr. Hyoscyami $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zu Umschlägen aufs Auge.

(Wie bei No. 1329.)

v. Gräfe.

N^o. 1331.

- R_y. Merc. praecip. alb.
 Lact. Sulph. ana ʒj.
 Axung. porci ʒij.
 M. D. S. Auf den Wirbel des Kopfs einzureiben.
 (Wie bei No. 1329.) *Rowley.*
-

N^o. 1332.

- R_y. Merc. subl. corros. gr. β — j.
 solve in
 Aq. Plantaginis ʒiv — vj.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1333.

- R_y. Tutiae praep. ʒj.
 Aloës
 Calomel. ana gr. jj.
 Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 M. f. Ungt. D. S. Täglich 4 mal eine Erbse gross
 ins Auge zu bringen.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1334.

- R_y. Virid. aeris gr. IV.
 Sal. Ammon. dep. gr. jj.
 solve in
 Aq. Calcis ʒvjjj.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1335.

- R_y. Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 Vitriol. cypr. gr. X.
 Camphorae gr. IV.
 Tutiae praep. gr. vj.

M. f. Ungt. D. S. Jeden Abend eine Linse gross
einzureiben.

(Gegen Ophthalmia psorica.)

Weller.

N^o. 1336.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Camphorae ʒj.

Aq. Rosar. ʒvjj.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No. 1335.)

v. Gräfe.

N^o. 1337.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Acet. saturn. ʒj.

Aq. Rosar. ʒvjj.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No 1335.)

Bell.

N^o. 1338.

R_x. Hb. Jaceae ʒβ.

inf. c. Aq. f. ʒvj.

Col adde

Tr. Opii simpl. ʒβ.

M. D. S. Zum Auswaschen des Auges.

(Gegen Ophthalmia ex crusta lactea.)

Benedict.

N^o. 1339.

R_x. Dauci Carot. rasp. ʒj.

Decoct. Malti q. s.

ad Catapl. consist.

D. S. Als Brei auf das Auge zu legen, oder zwi-
schen feine Leinwand zum Cataplasma.

(Gegen Ophthahnia scorbutica.)

Reil.

N^o. 1340.R_y. Merc. praecip. alb. $\bar{5}$ j.Axung. porci $\bar{5}$ vjjj.

M. D. S. Augensalbe.

(Gegen contagiöse Ophthalmien.) *Büttner.*N^o. 1341.R_y. Acid. Vitriol. concentr. et dep. gutt. $\bar{3}$ jj.Aq. destill. simpl. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Zum Eintröpfeln in's Auge.

(Gegen Ophthalmia aegyptiaca. S. auch bes.
No. 1303.) *Rust.*N^o. 1342.R_y. Argenti nitrici crystall. gr. j — jj.
solve inAq. destill. $\bar{5}$ jj.

Solutio filtrata detur in vitro charta nigra obducto.

S. Zum Eintröpfeln ins Auge.

(Gegen Fleisch-Exrescenzen bei Ophthalmia
aegyptiaca.) *Rust.*N^o. 1343.R_y. Arsenici gr. $\bar{2}$ jj — $\bar{3}$ jj.

solve in

Aq. destill. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Wie bei No. 1342.

*Müller.*N^o. 1344.R_y. Zinci sulphurici gr. j.

solve in

Aq. destill. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Gegen Ophthalmia neonatorum, im Anfang.)

Saunders.

N^o. 1315.

R_x. Vitriol Zinci gr. ꝑꝑ.
 Aq. Rosar. ʒijj.
 Tr. thebaicae ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1344.

Hecker.

N^o. 1346.

R_x. Aq. destill. ʒx.
 Vitriol. alb. ʒj.
 Extr. Saturn. ʒβ.
 (Spir. Vini camphorat. ʒijj.
 Aluminis crudi ʒj.)

M. D. S. Täglich 2—4 mal das Auge damit zu reinigen.

(Wie bei No. 1344. Später mit dem Zusatz von Spir. V. camph. und Alum. crud.)

J. A. Schmidt. (Weller.)

N^o. 1347.

R_x. Camphorae pt. j.
 Vitriol. alb.
 Bol. armen. ana part. IV.

M. D. S. Hievon ʒβ. auf ʒj. Aq. fervid. und die Colatur als Augenwasser zu gebrauchen.

(Wie bei No. 1344.) *Warl. (Scarpa.)*

N^o. 1348.

R_x. Merc. praecip. alb. gr. ꝑꝑ—IV.
 Flor. Zinci gr. vj—vjjj.
 Extr. Rad. Ratanbiae gr. x—xjj.
 Butyr. insulsi ʒβ—jj.

M. D. S. Die Augenlieder täglich mehrmals damit zu bestreichen.

(Wie bei No. 1344. Auch gegen Ophthalmoblenorrhoe überhaupt.)

Küllerich.

N^o. 1349.

- R_x. Merc. praecip. rubr. gr. vj.
 Opii puri gr. vjij.
 Butyr. rec. insuls. ʒjj.
 M. f. Ungt. D. S. Zwischen die Augenlieder zu
 streichen.
 (Gegen Iritis.) *Weller.*
-

N^o. 1350.

- R_x. Ungt. Hydrarg. ciner. ʒjj.
 Tr. Opii crocat. gtt. XV—XX.
 M. f. Ungt. D. S. Abends eine Erbse gross in die
 Augenlieder einzureiben, und nachher das Auge
 mit einer erwärmten leinenen Compresse zu be-
 decken.
 (Gegen Iritis syphilitica.) *Weller.*
-

N^o. 1351.

- R_x. Opii puri gr. vjij.
 Extr. Hyoscyami ʒj.
 Ungt. Hydrarg. ciner. ʒjj.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1350. *Weller.*
-

N^o. 1352.

- R_x. Extr. Hyoscyami ʒj.
 solve in
 Aq. destill. ʒj.
 M. D. S. Alle 4 Stunden einige Tropfen lauwarm
 in's Auge zu tröpfeln.
 (Gegen Iritis.) *J. A. Schmidt.*
-

N^o. 1353.

- R_x. Boli alb. ʒiv.
 Merc. praecip. alb. ʒβ.
 Axung. porci ʒβ.

III. Oertliche Krankheiten.

M. f. Ungt. D. S. Zuweilen eine Linse gross in die Augenlieder einzureiben.
(Gegen Augenliederdrüsenentzündung mit Excoriation) *Weller.*

N^o. 1354.

Ry. Flor. Zinci $\mathfrak{3}\beta$.
Opii gr. IV.
Ungt. rosat. $\mathfrak{3}\jmath$.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 3 mal eine Linse gross in den Augenliederrand einzureiben.
(Gegen Excoriation des Augenliederrands nach Psorophthalmie.) *Couradi.*

N^o. 1355.

Ry. Merc. subl. corros. gr. j.
Aq. destill. $\mathfrak{3}\text{IV}$.

M. D. S. Augenwasser.
(Gegen Jucken der Augenlieder von Ophthalmie.) *Richter.*

N^o. 1356.

Ry. Cort. Chin. reg. $\mathfrak{3}\jmath$.
Coq. c. aq. ft. sulf. qt.
in Col. $\mathfrak{3}\text{vjij}$. solve
Sal. Ammon. dep. $\mathfrak{3}\text{jj}$.
Camphorae $\mathfrak{3}\text{jj}$.
adde

Spir Vini rectificatissimi $\mathfrak{3}\jmath$.
M. D. S. Zu Umschlägen mit leinenen Compressen.
(Gegen Gangraena der Augenlieder.) *Le Febure.*

N^o. 1357.

- R. Merc. praecip. rubr. $\mathfrak{z}\beta$.
 Tutiae praep.
 Bol. armen. ana \mathfrak{z} j.
 Butyr. rec. express. \mathfrak{z} jj.
- M. D. S. Auf die Augenlieder zu streichen.
 (Gegen Anschwellung der Augenlieder.)
 St. Yves.

N^o. 1358.

- R. Hb. Cicutae M. j.
 Sem. Lini contus. \mathfrak{z} j.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 ad consist. Cataplasma.
 sub finem coct. adde
 Camphorae subact. $\mathfrak{z}\beta$.
- M. D. S. Breiumschlag.
 (Gegen Tylosis.)
 Beer.

N^o. 1359.

- R. Pulv. Hb. Hyoscyami
 — — Cicutae
 Farinae Sem. Lini pt. aeq.
 Coq. c. aq. ft. q. s. ad
 Catapl. consist. D.
- S. Breiumschlag.
 (Wie bei No. 1358.)
 v. Gräfe.

N^o. 1360.

- R. Hb. Cicutae $\mathfrak{z}\beta$.
 — Hyoscyami
 Farin. Sem. Lini ana $\mathfrak{z}\beta$.
 C. M. et coq. c. Lactis q. s.
 ad Catapl. consist. D.

- S. Stündlich lauwarm umzuschlagen.
(Zur Beförderung der Eiterung gegen entzündete und schmerzhaftige Gerstenkörner.)
Richter.
-

N^o. 1361.

- R_x. Ungt. Hydrarg. ciner. fort. ʒj.
Camphorae tritae
Extr. Conii maculat. ana gr. xʒj.
M. exactiss. D.
S. Täglich einigemal etwas in die Geschwulst einzureiben.
(Gegen Chalazion.)
Weller.
-

N^o. 1362.

- R_x. Terrae ponderosae salit. ʒj.
solve in
Aq. Laurocerasi ʒj.
M. D. S. Täglich 2—4 mal 15—20 Tropfen innerlich zu nehmen.
(Gegen Blepharospasmus, und die mit Phlyctänen der Cornea und Sclerotica verbundene Ophthalmia scrophulosa)
Hopf.
-

N^o. 1363.

- R_x. Hb. Belladonnae ʒβ—j.
Coq. in Aq. font. ʒvj.
per ½ hor. Col. adde
Aq. Laurocerasi ʒβ—iβ.
M. D. S. Mit Bäuschchen auf's Auge zu legen.
(Gegen Blepharospasmus scrophulosus.)
v. Ammon.
-

N^o. 1364.

- R_x. Tr. Stramonii ʒj.
 Aq. destill. ʒvj.
 M. D. S. Kühl als Umschlag anzuwenden.
 (Gegen Blepharospasmus.) *Hufeland.*
-

N^o. 1365.

- R_x. Aq. Goulardi
 — Rosar. ana ʒij.
 Opii puri gr. vjij.
 M. D. S. Mit Compressen auf's Auge zu legen.
 (Wie bei No. 1364.) *Conradi.*
-

N^o. 1366.

- R_x. Merc. subl. corros. gr. ij.
 Extr. Opii aq. ʒβ.
 solve in
 Aq. Rosar. ʒiv.
 adde
 Mucilag. Sem. Cydonior. ʒβ.
 M. D. S. Wie bei No. 1365.
 (Besonders für Kinder.) *Hecker.*
-

N^o. 1367.

- R_x. Flor. Chamomill. ʒj.
 — Arnicae ʒβ.
 Inf. c. aq. fervid. suff. qt.
 ad Col. ʒxj. D.
 S. Lauwarm mit Läppchen auf die Augenlieder zu
 schlagen.
 (Gegen hysterischen Blepharospasmus.)
v. Gräfe.
-

N^o. 1368.

Ry. Ol. Lauri ʒβ.
 — Macis ʒj.
 — Caryophyll. ʒβ.
 Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. In die Augenlieder einzureiben.
 (Gegen Blepharoptosis.)

*Reil.*N^o. 1369.

Ry. Tr. Cantharid.
 Spir. Serpylli
 (vel Aq. reg. Hungar.) ana pt. aeq.

M. D. S. In die Augenlieder und Augenbraumgegend einzureiben.

(Wie bei No. 1368.)

*Richter.*N^o. 1370.

Ry. Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 Merc. praecip. rubr. gr. X.
 Vitrioli Cypri gr. ʒj.
 Tutiae praep. gr. vʒj.
 Camphorae subact. gr. j.

M. f. Ungt. D.

S. Eine Linse gross zwischen die Augenlieder zu bringen.
 (Gegen Augenliederrose. Auch gegen Ophthalmia morbillosa und Geschwüre der Hornhaut.)

*Beer.*N^o. 1371.

Ry. Spir. Vini gall. ʒjj.
 Aq. destill. ʒβ.

D. S. Augewasser (3—4 mal täglich zu gebrauchen).

(Gegen Thränenfluss nach Ophthalmien.)

Richter.

N^o. 1372.

- R. Extr. Saturn.
 Spir. Vini camphorat. ana ʒj.
 Aq. Chamomill. ʒvjij.
 Vitrioli alb. ʒj.
- M. D. S. Mit Lapfen auf's Auge zu legen.
 (Wie bei No. 1371. Auch gegen Lippitudo.)
Selle.
-

N^o. 1373.

- R. Argenti nitrici fusi gr. β - j.
 Aq. font. ʒj.
- M. D. S. Zur Injection in den Thranensack durch
 die Thranenpunkte.
 (Gegen Dacryocystalgie.)
Janin.
-

N^o. 1374.

- R. Vitrioli alb. pulv. ʒj.
 Butyr. rec. insuls. ʒij.
- M. f. Ungt. D.
- S. Eine Linse gross in einen Augenwinkel jedes
 Auges zu bringen.
 (Gegen Augentriefen.)
Reil.
-

N^o. 1375.

- R. Fol. Atropae Belladonnae ʒij.
 Coq. c. Aq. ft. suff. qt.
 ad Col. ʒvjij.
- D. S. Mit Compressen lauwarm auf die Augen zu
 legen.
 (Gegen schmerzhaftige Augen-Blennorrhoen.)
v. Grafe.
-

N^o. 1376.R_x. Fol. Belladonnae ʒj.

Digere c. s. q. Aq. fervid.

Col. ʒvj. adde

Aq. Calcis vivae rec. parat. ʒvj.

Pulv. Hydrarg. mur. mit. ʒj.

M. D. S. Als Umschlag zu gebrauchen.

(Gegen Blennorrhöen der Augen mit häufigem Ausfluss und nachlassenden Schmerzen.)

*v. Gräfe.*N^o. 1377.R_x. Argenti nitrici gr. x.

solve in

Aq. destill. ʒj.

M. D. S. Täglich ein paarmal in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen torpide Augen-Blennorrhöen mit häufigem eiterartigem Ausfluss. — Mit Vorsicht anzuwenden.)

*v. Gräfe.*N^o. 1378.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. j.

Aq. flor. Sambuci (vel Rosar.) ʒiv.

Mucilag. Sem. Cydonior. ʒβ.

Tr. Opii crocat. ʒj.

Aceti saturn. ʒβ.

M. D. S. Umgeschüttelt täglich einigemal in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen syphilitische Augen-Blennorrhöen.)

*Rust.*N^o. 1379.R_x. Vitriol. alb. gr. jj.

Aq. Rosar. ʒjj.

M. D. S. Augengewasser.
(Gegen trübe Cornea von Erschlaffung der
Conjunctiva.) *Richter.*

N^o. 1380.

R. Tart. stib. gr. j — x.
Ol. Ricini
Butyr. insulsi ana ʒj.

M. D. S. Augensalbe.
(Gegen Leucoma.) *Wizmann.*

N^o. 1381.

R. Rad. Senegae ʒβ.
Tart. tartar. ʒvj.
Magnes. carb. ʒjj.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends einen Thee-
löffel voll zu nehmen. Zugleich magere Diät.
(Gegen Pannus oculi.) *Schmalz.*

N^o. 1382.

R. Pulv. Rad. Senegae ʒvj.
Extr. Taraxaci q. s.
ut. f. l. a. pil. pd. gr. jj — jjj.
Consp. pulv. Cort. Cinnamom.

D. S. Täglich 2 — 3 mal 6 — 12 Pillen.
(Wie bei No. 1381.) *v. Ammon.*

N^o. 1383.

R. Sacch. alb. ʒvj.
Alum. crud. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Täglich 2 — 3 mal mit einem Pinsel etwas
in's Auge zu streichen.

(Wie bei No. 1381. Auch gegen Pterygium.)
Ware.

N^o. 1384.

R. Vitrioli albi ʒj.
solve in

Aq. destill. ʒijj — IV.

M. D. S. Täglich einigemal mit einem Pinsel auf die Augen zu bringen.

(Gegen Pterygium und Staphyloma.) *Richter.*

N^o. 1385.

R. Vitrioli albi gr. jj — vj.
solve in

Aq. Opii ʒijj — jiiij.

M. D. S. Umgeschüttelt täglich 2-4 mal zu gebrauchen.
(Gegen Hornhautflecken. Auch gegen chronische Encanthisis.)

v. Ammon.

N^o. 1386.

R. Sal. Tartari gr. jj — vj.
solve in

Aq. destill. ʒj.

M. D. S. Alle 4 (— 2) Stunden einzuträufeln.

(Gegen Opacitäten der Hornhaut, und Hornhautflecken.)

Himly.

N^o. 1387.

R. Boracis

Sacch. alb. ana ʒj.

Extr. Aloës aq.

— Opii aq. ana. gr. Xjj.

Aq. Rosar. ʒiV.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No. 1386.)

Beer. (Richter.)

N^o. 1388.

R. Natri muriat.

Conch. praep. ana pt. aeq.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Mit einem Pinsel täglich 1 — 2 mal etwas in's
Auge zu bringen.(Wie bei No. 1386. Mit der Dosis des Natrum
wird allmählig gestiegen, und dasselbe zuletzt
unvermischt in's Auge gebracht.)*Kranz. (Rust.)*N^o. 1389.

R. Merc. subl. Hahnem. gr. jj.

Ol. Nucis jugland. ʒjj.

M. exactiss. D. S. Täglich 2 — 3 mal etwas auf
den Fleck zu bringen.

(Gegen Hornhautflecken.)

*Hufeland.*N^o. 1390.

R. Flor. Zinci ʒβ.

Ol. Nuc. jugland. ʒj.

Ungt. adip. suill. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 2 mal eine Linse gross
mit einem Pinsel in's Auge zu bringen.

(Wie bei No. 1389.)

*J. A. Schmidt.*N^o. 1391.

R. Butyr. rec. ʒβ.

Cerae alb. ʒβ.

Merc. praecip. rubr.

subtiliss. pulv. et

Ol. ovar. ʒj.

subacti gr. x.

III. Oertliche Krankheiten.

Butyro et cera leni igne liquefactis admisce intime Mercurium oleo bene subactum.

D. S. Wie bei No. 1390. *J. A. Schmidt.*

N^o. 1392.

Ry. Butyr. rec. $\bar{5}\beta$.
 Cerae alb. $\bar{3}\beta$.
 Merc. praecip. rubr. gr. Xjj.
 Vitrioli albi gr. vjjj.
 Aeruginis gr. vj.
 Camphorae gr. IV.

M. D. S. Wie bei No. 1390. *v. Walther.*

N^o. 1393.

Ry. Butyr. rec. $\bar{5}jj$.
 Cerae alb. $\bar{3}j$.
 Merc. praecip. rubr. $\bar{3}\beta$.
 Opii puriss. gr. ijjj.

M. leni igne in mortar. vitr.

D. S. Wie bei No. 1390.

Richter.

N^o. 1394.

Ry. Butyr. rec. insuls. $\bar{5}jj$.
 Merc. praecip. rubr. gr. xv.
 Tutiae praep. gr. vj.

M. D. S. Wie bei No. 1390.

Beer.

N^o. 1395.

Ry. Liq. hep. must. flav. $\bar{5}j$.
 Butyr. rec. insuls. $\bar{3}\beta$.
 Merc. praecip. rubr. gr. xv.
 Vitriol. alb. gr. vj.

M. D. S. Wie bei No. 1390.

Beer.

N^o. 1396.

R̄. Calomel. gr. vj.

Aloës gr. IV.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Mit einem feuchten Pinsel täglich einigemal
etwas auf die Cornea zu streichen.

(Gegen Hornhautflecken.)

*Boerhaave. (Richter.)*N^o. 1397.

R̄. Sal. vol. C. C. gr. v.

Fell. Tauri inspiss. ʒj.

Extr. Chelidon. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1396.

*Richter.*N^o. 1398.

R̄. Fell. Tauri

Extr. Cicutae

Cort. Chinae reg. ana ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Wie bei No. 1396.

*Reil.*N^o. 1399.

R̄. Sacch. alb.

Crem. Tart.

Boli albi ana part. aeq.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Wie bei No. 1396.

*Baldinger.*N^o. 1400.

R̄. Liq. Ammon. caust. gtt. v—x.

Ol. Nuc. jugland. ʒβ.

M. D. S. Mit einem Pinsel 3—4 mal täglich etwas auf die Flecken zu bringen.
(Gegen Hornhautflecken.) *v. Gräfe.*

N^o. 1401.

R_x. Ol. Nuc. jugland. ʒjij.
Fell. Tauri ʒj.
Ammon. carb. pyro-ol. gr. vjij — x.
M. D. S. Wie bei No. 1400. *Richter.*

N^o. 1402.

R_x. Spir. Minderer. ʒj.
Extr. Cicutae
Fell. Tauri inspiss. ana ʒj.
Extr. Opii gr. vj.
Aq. Rosar. ʒj.
M. D. S. Wie bei No. 1400. *Richter.*

N^o. 1403.

R_x. Aq. flor. Chamomill. ʒvj.
Aq. benedict. Ruland. ʒjij.
Tr. Aloës
— Myrrhae ana ʒjij.
M. D. S. Täglich einigemal etwas in's Auge zu tröpfeln.
(Gegen Hornhautflecken.) *Selle.*

N^o. 1404.

R_x. Sal. Ammon. dep. ʒβ.
solve in
Aq. Rosar. ʒjij.
M. D. S. Wie bei No. 1403. *Richter.*

N^o. 1405.

R_x. Merc. solub. Hahnem. gr. x.
 solve in

Aq. Laurocerasi ʒvj.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

Richter.

N^o. 1406.

R_x. Merc. solubil. corros. gr. j.

Opii colati gr. vjij.

solve in

Aq. Rosar. ʒij.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

Beer.

N^o. 1407.

R_x. Kadmii sulphurici gr. j — vj.

solve in

Aq. destill. ʒβ.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

v. Gräfe.

N^o. 1408.

R_x. Acid. sulph. concentr.

Croci oriental. ana gr. IV.

M. D. S. Mit einem Hölzchen etwas aufzutragen,
 und nach etwa 10 Minuten sorgfältig abzuwischen.

(Gegen Entropium und fungöse fauligte Ge-
 schwüre im Auge.)

Helling. (Kust.)

N^o. 1409.

R_x. Tart. stib. gr. xij.

Sap. venet.

G. ammon.

— Galbani

III. Oertliche Krankheiten.

Fell. Tauri inspiss.

Pulv. Rad. Rhei ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp. Lycopod.

D. S. Täglich 3 mal 15 Pillen.

(Gegen Amaroſe.)

Eitmüller.

N^o. 1410.

R̄. Sap. Antim.

Extr. Arnicae

Calomel. ana ʒj.

Camphorae

Croci ana ʒj.

Theriaca ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. ʒj.

D. S. Täglich 3 mal 7 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Kämpf.

N^o. 1411.

R̄. G. Galbani

— Sagapeni

Sap. venet. ana ʒj.

Rad. Rhei opt. ʒiβ.

Tart. stibiati gr. xvj.

Succi Liquirit. dep. ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 15 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Schmucker.

N^o. 1412.

R̄. Hydrarg. mur. corros. gr. j.

G. arab. ʒjij.

Aq. destill. ʒvj.

Tr. thebaicae \mathfrak{J} j.M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
(Wie bei No. 1409.) *Wedemeyer.*

No. 1413.

R \mathfrak{y} . Phosphori gr. j.
solve inOl. animal. Dippel. \mathfrak{J} j.M. D. S. Zu 2—3 Tropfen pro dosi.
(Wie bei No. 1409.) *Löbenstein - Löbel.*

No. 1414.

R \mathfrak{y} . Pulv. Rad. Valer.

— Flor. Arnicae

Asae foet. ana \mathfrak{J} j.Extr. Pulsatill. $\mathfrak{J}\beta$.

Tart. stib. gr. Xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamomi.

D. S. Täglich 3 mal 8—15 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Rust.

No. 1415.

R \mathfrak{y} . Extr. Pulsatill. $\mathfrak{J}\beta$.

solve in

Vini stibiati $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Täglich 3 mal 20—60 Tropfen.

(Wie bei No. 1409.)

Rust.

No. 1416.

R \mathfrak{y} . Hb. Pulsatill. nigric. \mathfrak{J} j—jjj.

Digere vase clauso c. s. q.

III. Oertliche Krankheiten.

Vini gall. per horam integram.

Col. \mathfrak{z} vjj. addeSyr. Cinnamom. \mathfrak{z} j.Naphthae Aceti \mathfrak{z} j.

M. D. S. Esslöffelweise (steigend) zu nehmen.
 (Wie bei No. 1409.) v. Gräfe.

No. 1417.

R \mathfrak{x} . Pulv. Fol. Pulsatillae nigr. \mathfrak{z} j.

Extr. Pulsatill. nigr. q. s.

ut f. l. a. M. pil. e q.

f. pil. No. LX.

D. S. Täglich dreimal (steigend) 1—7 Pillen.
 (Wie bei No. 1409.) v. Gräfe.

No. 1418.

R \mathfrak{x} . Merc. vivi \mathfrak{z} j.Sacch. alb. \mathfrak{z} jjj.

Pulv. Lilior. alb.

— Rad. Valer. ana \mathfrak{z} j.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Schnupftabak.

(Wie bei No. 1409.)

Richter.

No. 1419.

R \mathfrak{x} . Merc. dulc. \mathfrak{z} j.

Camphorae

Res. Guajac.

Sacch. canad. ana \mathfrak{z} jj.

Pulv. Cort. Chin. reg.

— Rad. Hellebori ana gr. v.

Ol. Cajeput. gtt. v.

M. f. Pulv. subtiliss.

Divide in part. XX aeq.
D. S. Täglich ein Pulver als Schnupftabak zu gebrauchen.

(Wie bei No. 1400.)

Kleber.

N^o. 1420.

R_x. Ol. Menth. pip. ℥j.
Liq. Ammon. caust. ʒjj.
Naphth. sulph. ℥j.

M. D. S. Tropfenweise in die Umgegend des Auges einzureiben.

(Gegen Amaurose. Auch gegen Lähmung der Augenlieder, und Amblyopie.) *v. Gräfe.*

N^o. 1421.

R_x. Spir. Menthae
— Serpyll.
— Anthos
— Lavandul. ana ʒβ.
Liq. Ammon. anisat. ℥j.
Bals. Vitae Hoffm.

M. D. S. Wie bei No. 1420.

v. Gräfe.

N^o. 1422.

R_x. Spir. Formicar. ʒj.
Tr. Anthos ʒjj.
Ol. Caryophyll. dest. ʒj.
— Cajeput. ℥j.

M. D. S. In die Angengegend einzureiben.
(Wie bei No. 1420.) Abwechselnd die folgende Nummer.

Löbenstein-Löbel.

III. Oertliche Krankheiten.

No. 1423.

R. Ol. animal. Dipp. ʒj.
 Phosphori gr. ij.
 Ol. Menthae pip. ʒʒ—j.

M. D. S. Wie bei No. 1422.

Löbenstein-Löbel.

No. 1424.

R. Spir. Sal. ammon.
 Tr. Castor. ana pt. aeq.

M. D. S. In das obere Augenlid und die Augenbrauengegend einzureiben.

(Wie bei No. 1420.)

Richter.

No. 1425.

R. Spir. Lavandulae
 — Lilior. Convall.
 — Anthos
 — Sal. ammon. caust. ana ʒj.

M. D. S. Einige Tropfen in die Hände zu giessen und sie vor die Augen zu halten.

(Wie bei No. 1420.)

Schmucker.

No. 1426.

R. Calomel.
 Opii puri ana gr. iij—IV.

M. f. Pulv. Dent. tal. dos. No. VI.

S. Abends ein Pulver mit Speichel in die Augenbraun- und Stirngegend einzureiben.

(Gegen arthritische und venerische Augenschmerzen.)

Rust.

N^o. 1427.

R_y. Sal. culinar. gr. jj — vj.
solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Täglich einigemal etwas in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen Mydriasis.)

Weller.

N^o. 1428.

R_y. Flor. Arnicae ʒj .

Hb. Rutae ʒj .

Digere c. Aq. ferv. s. q.

vase bene clauso per horam

integram ad Col. ʒxj .

D. S. Zu Umschlägen.

(Gegen Commotionen, Contusionen und Blutergießungen in der Augengegend.) *v. Gräfe.*

N^o. 1429.

R_y. Extr. Strammon. gr. x .

solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Täglich einmal etwas in's Auge zu tröpfeln.

(Zur Erweiterung der Papille.) *Arnemann.*

N^o. 1430.

R_y. Extr. Hyoscyami ʒβ — j.

solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Wie bei No. 1429.

Himly.

N^o. 1431.

Ry. Extr. Belladonnae ℥β.

solve in

Aq. destill. ℥β.

M. D. S. Wie bei No. 1429.

*Langenbeck.*N^o. 1432.

Ry. Pulv. Hb. Belladonnae ʒj.

Digere per horam integram

cum Aq. fervid. ℥β.

Col. D. S. Einen Tropfen zwischen die Augenlieder und den Bulbus zu tröpfeln.

(Wie bei No. 1429.)

v. Gräfe.

Verbrennung, Erfrierung u. s. w.

N^o. 1433.

Ry. Ol. Lini ℥xij.

Album. ovor. No. IV—V.

M. intime. D. S. Alle 1—2 Stunden die Brandstellen damit zu bestreichen.

(Gegen Verbrennungen. S. No. 1193.)

*Mynsicht.*N^o. 1431.

Ry. Butyr. rec. insuls.

Cerae flavae ana pt. aeq.

Ter. c. pauxillo Aquae destill.

D. S. Wie bei No. 1433.

Stahl.

N^o. 1435.

- R. Sal. ammon. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 solve in
 Aq. font. $\bar{\text{ʒ}}\text{IV}$.
 adde
 Spir. camphorat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
- M. D. S. Zu Umschlägen mit leinenen Compressen.
 (Gegen leichte Frostbeulen.) *Rust.*
-

N^o. 1436.

- R. Petrolei $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Lid. Ammon. caust. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
- M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1437.

- R. Petrolei $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 Spir. Lavandulae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Tr. Opii simpl. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
- M. D. S. Als Waschwasser zu benutzen.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1438.

- R. Spir. camphorat.
 Acet. saturn. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
- M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1439.

- R. Sevi ovilli $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 Gerae flavae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Resin. comm. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Terebinth. $\bar{3}\beta$.Ol. Olivar. $\bar{3}j$ — $\bar{3}\beta$.

Calef. M. D. S. Erwärmt auf Leinwand zu streichen.

(Wie bei No. 1435.)

*Richter.*N^o. 1440.R_x. Boracis $\bar{3}j$.Ungt. rosati $\bar{3}j$.

M. D. S. Abends einzureiben.

(Wie bei No. 1435.)

*Hufeland.*N^o. 1441.R_x. Ol. Terebinth. $\bar{3}j$.Cerae flavae $\bar{3}\beta$.Ol. ovor. $\bar{3}j$.

M. D. ad vitrum, S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 1435.)

*Sprögel.*N^o. 1442.R_x. Cerae $\bar{3}j$.Terebinth. $\bar{3}j$.Mellis $\bar{3}\beta$.

Ol. Olivar. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 1435.)

*Bate.*N^o. 1443.R_x. Empl. Lithargyri $\bar{3}\beta$.Bals. peruv. $\bar{3}\beta$ — j .Opii puri $\bar{3}\beta$ — j .

M. D. S. Auf Leinwand zu streichen.

(Wie bei No. 1435.)

Rust.

N^o. 1444.

- R_x. Flor. Arnicae $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 inf. c. Aq. ferv. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 stent in digest. per horam.
 Colaturae adde
 Kali nitrici $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
- M. D. S. Alle 2 Stunden ein halbes Theeköpfchen.
 (Gegen Contusionen und Sugillationen mit
 Fieber.) *Thilenius.*
-

N^o. 1445.

- R_x. Farin. trit. $\mathfrak{z}\text{IV}$.
 coq. c. Aceti Vini
 suff. qt. ad Catapl. consist.
- D. S. Zu Umschlägen.
 (Zur Zertheilung von Sugillationen.) *Tode.*
-

N^o. 1446.

- R_x. Cupri sulphurici
 Zinci sulphurici
 Aeruginis ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Mellis rosat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 Aq. font. Mens. \mathfrak{j} .
- M. D. S. Wundspiritus.
 (Gegen alte atonische Wunden.) *Schmalz.*
-

N^o. 1447.

- R_x. Tereb. venet. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Cerae flavae $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 Solve leni calore,
 mox refrigerat. adde
 Ol. Terebinth. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
- M. D. S. Wundbalsam.
 (Wie bei No. 1446.) *Frehme.*
-

N^o. 1448.

R_x. Ungt. Elemi ʒj.
Pulv. Cort. peruv. ʒj.

M. intime. D. S. Auf Plumaceaux gestrichen anzuwenden.

(Zur Verhütung fauliger Zersetzung in tendinösen Wundflächen. Zugleich wird die Wunde mit einem Decoct. saturat. Cort. peruv. ausgewaschen.)
v. Gräfe.

N^o. 1449.

R_x. Ungt. digestiv. ʒβ.
Merc. praecip. rubr.
Pulv. Cantharid. ana ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Verband.

(Zum Verband cauterisirter Wunden nach dem Hundsbisse.)
Hufeland.

N^o. 1450.

R_x. Merc. subl. corros.
Vitriol. de Cypr. ana gr. x.
Lap. infernal. gr. vj.

M. f. Pulv. subtiliss. D. S. Etwas auf die Stelle zu bringen, und nachher etwas Wasser nachzutropfeln.

(Zur Entfernung von Fleischwucherungen in Wunden, Geschwüren u. s. w.)
Krüger.

N^o. 1451.

R_x. Hb. Salviae ʒjj.
inf. c. Aq. fervid.
suff. qt. Col. ʒjj.
adde
Syr. nigri domest. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen und Befeuchten der wunden Warzen.

(Gegen wunde Brustwarzen. No, 266. 267.)

Kluge.

N^o. 1452.

Rx. Ostr. praep. ʒj.

G. arab. ʒjj.

Mastich. elect. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Zum Bestreuen.

(Wie bei No. 1451.)

Vogler.

N^o. 1453.

Rx. Bals. ind. nigr. ʒj.

Vitell. ovor. No. jj.

solv. adde

Spir. Lavandul. ʒjj.

M. D. S. Zum Bepinseln.

(Wie bei No. 1451.)

Jörg.

N^o. 1454.

Rx. Ol. Cacao ʒjjj.

Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln.

(Wie bei No. 1451.)

M. J. Schmidt.

N^o. 1455.

Rx. G. arab. ʒjj.

Bals. peruv. ʒj.

Ol. Amygdal. ʒiβ.

Aq. Rosar. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen.

(Wie bei No. 1451.)

Müller. (Schmidt.)

No. 1456.

R. Sem. Lycopod.
 Flor. Zinci ana ʒβ.
 Ungt. pomat. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Bestreichen.
 (Wie bei No. 1451.)

Pittschaff.

No. 1457.

R. Calomel. ʒj.
 Ungt. pomat. ʒjj.
 Ol. Cerae
 — Hyperici ana gtt. xvj.
 Bals. ind. nigr. gtt. xx.
 Tr. thebaicae gtt. vj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden eine Erbse gross
 zureiben, und von den Augen abzuwaschen.
 (Wie bei No. 1451.)

Vogel.

No. 1458.

R. Boracis ʒj.
 Vitell. ovor.
 Album. ovor. ana ʒjj—ʒjjj.
 Ol. Amygdal. dulc. rec. ʒj.
 Bals. peruv. nigr. ʒiβ—jj.

M. D. S. Täglich 3—4 mal etwas zureiben.
 (Wie bei No. 1451.)

Harless.

No. 1459.

R. Bals. peruv. ʒj.
 tere c. Vitell. ov. No. I.
 adde
 Ag. vulnerar. Theden.
 (vel Spir. Serpylli) ʒjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt die Warzen damit zu be-
streichen und dann mit folgendem Pulver zu be-
streuen: ℞. Pulv. Cort. peruv. ʒj. Pulv. G.
arab. ʒjj. M. f. Pulv. subtiliss. D. —

(Wie bei No. 1451.) *Jörg.*

No. 1460.

Bals. nigr. ʒβ.

Butyr. Cacao ʒjj.

M. D. S. Dünn auf ein feines Stückchen Lein-
wand zu schmieren, und aufzulegen.

(Wie bei No. 1451.) *Ribke.*

No. 1461.

℞. Sal. ammon. pulv.

Sap. hisp.

Hb. Hyoscyami ana ʒβ.

Sem. Lini contus. ʒiβ.

Aq. fervid. q. s. ut. f.

Cataplasma. D.

S. Zu Umschlägen.

(Gegen Milchstockungen in den Brüsten.)

Vogler.

No. 1462.

℞. Sperm. Ceti ʒj.

Cerae albae ʒjj.

Galbani ʒβ.

Ol. Sambuci q. s.

ut f. Emplastrum.

D. S. Warm aufzulegen.

(Wie bei No. 1461. — S. N. 1139.) *Bate.*

N^o. 1463.R_x. Extr. Belladonnae gr. j.

solve in

Aq. Lantocerasi ʒj.

M. D. S. Täglich 3 mal 40—50 Tropfen zu nehmen.
(Gegen Scirrhus. — Besonders Sc. ventriculi.)*Hufeland.*N^o. 1464.R_x. Succ. rec. express. Fol. Hyoseyami

— — — Papav. albi

— — — Phellandrii aq. ana ʒjij-IV.

Leni igne coq. et inspiss.

in finem admisce

Cerae albae liquef. ʒIV—vjjj.

Ol. Lavandul. ʒβ—j.

M. D. S. Auf Leinwand gestrichen auf die schmerz-
hafte Stelle zu legen.

(Gegen schmerzhaft exulcerirte Scirrhen.)

*J. A. Schmidt.*N^o. 1465.R_x. Guajaci

Asae foet.

Extr. Conii maculat. ana ʒj.

— Aconiti ʒβ.

Calomel. gr. xv.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Gegen Scirrhus. S. No. 717.)

*Jahn.*N^o. 1466.R_x. Sulph. stib. aurant. ʒj.

G. Ammoniaci

Extr. Conii maculat. ana ʒjj.

Sap. medicat. $\mathfrak{z}\beta$.M. f. Pil. pd. gr. \mathfrak{jj} .

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Täglich 2—3 mal 4—8 Pillen.

(Gegen Scirrhus der Brust, der Achseldrüsen

u. s. w.)

*Rust.*N^o. 1467.

R̄. Sal. ammoniaci

Succi Liquirit. ana \mathfrak{j} .

Extr. Taraxaci q. s.

ut f. l. a. Bolus. Dent. tal. dos. q. l.

S. Alle 2—4 Stunden einen Bolus, welchen man
in mehrere Theile theilen kann.

(Gegen Scirrhus Oesophagi, Vesicae, Prostatae,

Recti u. s. w.)

*Fischer.*N^o. 1468.R̄. Cinnabar. factit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Cinerum sol. antiq. ust. gr. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.Sang. Dracon. gr. $\mathfrak{x}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. f. Pulv. D.

S. Mit Speichel zur Salbe gemacht, eine Linie
dick aufgetragen, und nach dem Abfallen der
Borke mit Bals. Locatelli (s. No. 1258.) zu ver-
binden.

(Gegen Krebs. S. No. 105. 1097. 1283.)

*(Frère.) Cosme.*N^o. 1469.R̄. Pulv. (Frère) Cosme (No. 1468.) gr. \mathfrak{ij} .Misce cum $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Ungt. seq.

R̄. Extr. Cicutae

III. Oertliche Krankheiten.

Bals. peruv. ana ʒj.

Acet. saturn. ʒj.

Tr. Opii gtt. x.

Cerati simpl. ʒj.

M. D. S. Fünf Tage lang zum Verband, und jedesmal mit Fliederblüthentheelosgeweicht. Dann bis zur Heilung mit der Salbe ohne Arsenik zu verbinden.

(Wie bei No. 1468.)

*Hellmund.*N^o. 1470.

Ry. Axung. porci ʒij.

Pulv. Rad. Imperator. ʒiβ.

Tr. Rad. Imperator. ʒij.

M. f. Ungt. D. S. Auf Leinwand gestrichen, Morgens und Abends aufzulegen.

(Gegen Gesichtskrebs)

*Mylius.*N^o. 1471.

Ry. Hydrarg. mur. corros. gr. jj — IV.
solve in

Aq. Laurocerasi ʒij.

M. D. S. Zum Verband.

(Gegen offenen Krebs.)

*Horn.*N^o. 1472.

Ry. Extr. Conii maculat. ʒj.

— Hyoscyami ʒβ.

Pulv. Hb. Belladonnae ʒj.

Liq. Ammon. acet. q. s.

ut f. Catapl. ten.

D. S. Die Hälfte auf Leder gestrichen aufzulegen.
(Wie bei No. 1471.)

Richter.

N^o. 1473.

- R_x. Asae foet.
 Acid. phosphor. sicci
 Pulv. Rad. Althaeae ana \mathfrak{z} jj.
 M. f. c. s. q. Aq. destill.
 Pil. pd. gr. \mathfrak{z} j. D.
 S. Täglich 2 mal 6 — 7 Pillen.
 (Gegen Caries. S. No. 1287.) *Rust.*
-

N^o. 1474.

- R_x. Acid. phosphor. dilut. \mathfrak{z} jj.
 Decoct. Salep. ten. \mathfrak{z} vj.
 Syr. Rubi idaei $\mathfrak{z}\beta$ — j.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 1473. — Auch gegen Speichel-
 fluss empfohlen.) *Wendt.*
-

N^o. 1475.

- R_x. Acid. phosphor. \mathfrak{z} j.
 Aq. font. \mathfrak{z} vjj.
 M. D. S. Zum Verband.
 (Wie bei No. 1473. Wo reichlicher Ausfluss
 ist, besonders passend.) *Rust.*
-

N^o. 1476.

- R_x. Aeth. Vitrioli
 Tr. Opii simpl. ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Ol. Caryophyll. \mathfrak{z} j.
 M. D. S. Einige Tropfen auf Baumwolle in den
 hohlen Zahn.
 (Gegen cariöse Zähne und Zahnschmerzen.) *Rust.*
-

N^o. 1477.

- R_x. Aeth. Vitrioli
 Tr. Opii simpl. ana pt. aeq.
 M. D. S. Zuweilen einen Theelöffel voll in die
 Wange der leidenden Seite einzureiben.
 (Wie bei No. 1476.) *Rust.*
-

N^o. 1478.

- R_x. Ol. Cajeput. ʒjj.
 Pulv. Opii
 Camphorae tritae ana ʒjj.
 Ol. Nucistae express. ʒvj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476) *Sprögel.*
-

N^o. 1479.

- R_x. Opii
 Camphorae ana gr. ij.
 Ol. Caryophyllor.
 Tr. Pimpinell. jamaic. ana gtt. j.
 M. f. Pil. No. IV.
 D. S. In den hohlen Zahn.
 (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1480.

- R_x. Tr. Pimpinell. jam.
 Liq. min. Hoffm. ana ʒjj.
 Tr. anodyn. ʒj.
 Ol. Caryophyll. gtt. xjj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1481.

- R_x. Tr. Pimpinell. jam.
 Tr. anodyn. ana ʒj.
 Ol. Caryophyll. gtt. xjj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1482.

- Rx. Pulv. Mastiches
 — Sandaracae ana ʒj.
 Sang. dracon. ʒβ.
 Opii crud. gr. vj.
 Ol. Anthos destill. gtt. vjjj.
 Spir. Cochlear. q. s.
 ut f. Mass. Emplastr.
- D. S. Eine Bohne gross in den Zahn.
 (Wie bei No. 1476.)

*Vogler.*N^o. 1483.

- Rx. Aluminis ʒj.
 Tr. Myrrhae
 — Chinae comp. ana ʒj.
- M. D. S. Zum Betupfen des Zahnfleisches.
 (Gegen wackelnde Zähne.)

*Bluff.*N^o. 1484.

- Rx. Ferri carbonici gr. IV.
 Elaeosacch. Macidis ʒβ.
- M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Täglich 4 mal ein Pulver.
 (Gegen Carcinoma.)

*Rust.*N^o. 1485.

- Rx. Extr. Calendulae
 — Conii maculat.
 Ferri oxydat. fuscii ana ʒj.
 Pulv. Hb. et Flor. Calendul. ʒiβ.
- M. f. Pil. gr. jj. Consp. Lycopod.
 D. S. Täglich 3 mal 5—6 Pillen.
 (Wie bei No. 1483.)

Rust.

N^o. 1486.

- R_x. Extr. Calendulae
 — Conii maculat. ana $\bar{\text{ij}}$.
 solve in
 Aq. Laurocerasi $\bar{\text{ij}}$.
 adde
 Tr. Opii simpl. $\bar{\text{β}}$.
 M. D. S. Zum äusserlichen Gebrauch.
 (Wie bei No. 1483.)

*Rust.*N^o. 1487.

- R_x. Flor. Calendul.
 Hb. Calendul.
 Hb. Conii maculat. ana $\bar{\text{ij}}$.
 Inf. c. Aq. fervid. s. q.
 Digere vase clauso per $\frac{1}{2}$ hor.
 Col. $\bar{\text{ij}}$. adde
 Liq. Ferri muriat. oxydat. $\bar{\text{β}}$.
 Aq. Laurocerasi $\bar{\text{vj}}$.
 M. D. S. Mit Lämpchen aufzulegen.
 (Wie bei No. 1483.)

*Rust.*N^o. 1488.

- R_x. Hydrarg. mur. corros. $\bar{\text{ij}}$.
 Ferri sulph. $\bar{\text{ij}}$.
 Spir. Vini rectificatiss. $\bar{\text{ij}}$.
 M. D. S. Mit Charpie aufzulegen.
 (Gegen Condylomata.)

*Rust.*N^o. 1489.

- R_x. Hydrarg. mur. corros. $\bar{\text{ij}}$.
 Camphorae $\bar{\text{ij}}$.
 Alcohol. Vini $\bar{\text{ij}}$.
 M. D. S. Alle 2 Tage damit zu bepinseln.
 (Wie bei No. 1487.)

Freiberg.

N^o. 1490.

- R_x. Pulv. Hb. Sabinae
 Axung. porci ana ʒjij.
 M. D. S. Zum Bestreichen.
 (Wie bei No. 1487.)

*Horn.*N^o. 1491.

- R_x. Pulv. Cantharid. ʒj.
 Hydrarg. mur. corros. ʒj.
 Liq. Stibii mur. ʒjij.
 Adipis suillae ʒβ.
 M. f. Ungt. D. S. Auf Leinwand gestrichen auf-
 zulegen.
 (Wie bei No. 1487.)

*Horn.*N^o. 1492.

- R_x. Merc. subl. corros.
 Camphorae ana gr. xjj.
 Alum. crud.
 Sacch. Saturn. ana ʒj.
 Misce. Terendo adde
 Aceti concentrati ʒjij.
 Solutioni vitro inmissae
 adde
 Aeth. sulph. ʒj.
 Conquass. D. S. Zum Bestreichen.
 (Wie bei No. 1487.) *Plenk. (Fricke.)*

N^o. 1493.

- R_x. Sal. ammon. puri ʒβ.
 Spir. Vini comm. ʒij.
 Aq. font. simpl. ʒxvj—xx.
 M. D. S. Zu Umschlägen mit flanellenen oder
 leinenen Compressen.
 (Zur Zertheilung von Geschwülsten.) *Vogler.*

N^o. 1494.R_x. Pulv. G. arab.

— Colophon. ana pt. aeq.

M. intime. D. S. Den vorgefallenen Mastdarm hiermit täglich 3—4 mal zu bestreuen.

(Gegen Prolapsus ani.)

v. Klein.

N^o. 1495.R_x. Aceti concentrati

Spir. Vini rectificati ana ʒβ.

Hydrarg. muriat. corros. ʒj.

Aluminis

Camphorae

Cerussae ana ʒβ.

M. D. S. Zum Betupfen.

(Gegen Warzen.)

*Swediaur. (Plenk. Ullmann.)*N^o. 1496.R_x. Hydrarg. mur. corrosiv. ʒj — ʒβ.

solve in

Spir. Vini rectificat. ʒj.

M. D. S. Täglich ein bis zwei mal zu bestreichen.

(Wie bei No. 1494.)

v. Walther.

N^o. 1497.R_x. Empl. de Galbano crocat.

— Ammoniac.

— Diachylon. c. G. ana ʒβ.

Camphorae ʒjj.

M. f. Empl. D. S. In kleinen, nur die Warzen zu bedeckenden Stücken aufzulegen.

(Wie bei No. 1494. Auch gegen Hühneraugen.)

Fritze.