
II. Chronische Krankheiten.

W a s s e r s u c h t.

No. 105. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

N^o. 276.

R_y. Crem. Tart. solub. ʒj.

Borac. venet. ʒj.

Extr. Trifol. fibr. ʒj.

Aq. flor. Naphae ʒvj.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden 1 — 2 Esslöffel.

Lentin.

N^o. 277.

R_y. Hb. Fumariae ʒj.

Coq. in s. q. Aq. per $\frac{1}{2}$ hor.

Col. refrig. ʒiv.

adde

Liq. Kali acet. ʒβ.

Spir. mur. aeth. ʒjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Wendt.

N^o. 278.

R_y. Extr. Lactucæ virosæ ʒjj.

Tr. Digital. purp. ʒβ.

Aq. Cinnam. c. v. $\bar{3}$ l β .

M. D. S. Alle 2 Stunden 30 — 50 Tropfen.
Schneider.

N^o. 279.

Ry. Arcani dupl. $\bar{3}$ vj.

Rad. Jalapp. $\bar{3}$ jj.

— Squillae gr. vj.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
Conradi.

N^o. 280.

Ry. Crem. Tart. $\bar{3}$ l β .

Magnes. alb. $\bar{3}$ j.

Rad. Squillae

Sacch. alb. ana $\bar{3}$ l β .

M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden eine gute Messerspitze voll in Wasser gerührt zu nehmen.
Jahn.

N^o. 281.

Ry. Crem. Tart. $\bar{3}$ l β .

Limaturae Ferri $\bar{3}$ jj.

Rad. Squillae $\bar{3}$ j.

Ol. Sassafras gtt. vjjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 3 — 4 mal eine gute Messerspitze voll.
Kausch.

N^o. 282.

Ry. Sal. Herb. $\bar{3}$ j.

Acet. squill. q. s. ad saturat.

Aq. Petrosel. $\bar{3}$ jjj.

Extr. Tarax. $\bar{3}$ jjj.

Roob Juniperi \mathfrak{Vj} .
M. D. S. Esslöffelweise.

Fritze.

 N^o. 283.

R_x. Extr. Squillae gr. X — xvj.
Liq. Kali acet. \mathfrak{Vj} .
Aq. Petrosel. \mathfrak{IIV} .
Syr. Rhei $\mathfrak{I}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Quarin.

 N^o. 284.

R_x. Sal. Tart. \mathfrak{Vj} .
Acet. squill. q. s. ad sat.
Aq. Chamomill. \mathfrak{IIV} .
Extr. Card. bened.
— Fumariae
— Trifol. fibr.
— Millefol. ana \mathfrak{Ij} — \mathfrak{jj} .
Tr. Antimonii
— Martis aperitiv. ana \mathfrak{Ij} .

M. D. S. Esslöffelweise.

(Besonders bei Hydrops von Unterleibs - Ver-
stopfungen.)

Selle.

 N^o. 285.

R_x. Rad. Helen. \mathfrak{Vj} .
inf. c. Aq. suff. q.
per $\frac{1}{2}$ hor.
Col. refrig. \mathfrak{IIV} .
adde
Kali carb. Acet. squill.
perf. sat. $\mathfrak{I}\beta$.
Syr. flor. Aurant. $\mathfrak{I}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Wendt.

N^o. 286.

R̄. Rad. Squillae rec. ʒj.
Kali acet. ʒβ.
Spir. Vini rectificati
Aq. destill. simpl. ana ʒijj.

Digere per tres dies. D.

S. 10 — 80 Tropfen in Wein (steigend).

Berends.

N^o. 287.

R̄. Rad. Squillae concis. ʒij.
Kali caust. ʒj.
Digere c. Spir. V. rectificati ʒj.
per triduum. Exprime. Filtra.
D. S. 10 — 30 Tropfen (steigend).

Hufeland.

N^o. 288.

R̄. Camphorae
G. Guajaci ana ʒj.
Tart. emet.
Opii puri ana gr. jj.
Syr. simpl. q. s. ut f.
Pil. No. XX. D.

S. Zweimal täglich 3 Pillen. (Zugleich ein starkes
China - Decoct.)

Sproegel.

N^o. 289.

R̄. Sulph. stib. aurant.
Rad. Squill.

H 2

II. Chronische Krankheiten.

Gummi Guttae

Extr. Pimpinellae ana ℥j.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zwei bis dreistündlich eine Pille.
(Gegen Hydrops frigidus.)*Heim.*N^o. 290.

R̄. Ipecacuanhae

Rad. Squillae

Sulph. stib. aurant. ana ʒβ.

Galbani ʒj.

Extr. Pimpinellae ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Cinnamomi.

D. S. Dreimal täglich 5 Pillen.

*Heim.*N^o. 291.

R̄. Extr. Pimpinell. alb.

Pulv. Squillae

Sulph. aurat. antim.

Gummi Guttae ana ℥j.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Alle 2 — 3 Stunden eine Pille.

*Heim.*N^o. 292.

R̄. Gummi Guttae ℥j.

— arab. ʒj.

Aq. font. ʒiv.

Liq. Kali subcarb. ʒj.

Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

N^o. 293.

R̄. Crem. Tart. ʒj — ʒβ.

Pulv. Rad. Jalapp. ʒj.

Roob Sambuci

Oxymell. squill. ana ʒvj.

M. f. Elect. D. S. Bis zum Purgiren alle 2 Stunden 3 — 4 Theelöffel.

Weikard.

N^o. 294.

R̄. Extr. Helleb. vinos. ʒjj.

— Myrrhae ʒj.

Pulv. Card. bened. q. s.

ut f. Pil. No. XC.

D. S. Dreimal täglich 8 Pillen.

Bacher.

N^o. 295.

R̄. Aq. Petrosel. ʒiv.

Elaeosacch. Juniperi ʒjj.

Syr. Althaeae ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen vollen Theelöffel.

(Für Kinder.)

Wendt.

N^o. 296.

R̄. Rad. Levistici ʒj — j̄j̄j̄.

inf. aq. f. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.

Col. refrig. ʒvj. adde

Spir. muriat. aeth. ʒj. — ʒj.

Syr. flor. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen vollen Esslöffel.

(Für Kinder.)

Wendt.

N^o. 297.R_x. Bals. Copaivae ʒj.

Ungt. Rorismarini comp. ʒj.

M. D. ad vasculum. S. Zum Einreiben in den Damm
und die Schaamgend.

(Für Kinder.)

*Wendt.*N^o. 298.R_x. Vitrioli Cupri

Cort. Winter. ana ʒj.

Gummi arab. q. s. ut. f.

Pil. No. XXIV.

D. S. Abends beim Schlafengehn eine Pille.

*Wright.*N^o. 299. a)R_x. Fol. siccat. Hb. Nicotianae, virg. ʒj.

Aq. ft. ebull. ℥j.

Macerate per horam in vase clauso
in balneo Mariae posito; deinde
exprime hujus infusi ʒXIV. Colat.
adde

Spir. Vini rectificati ʒj.

M. D. S. Morgens 50, Abends 100 Tropfen; steigend bis zu 200 Tropfen;

zugleich *b*)R_x. Fol. sicc. Hb. Nicot. virg. ʒj.

Spir. Vini tenuioris ℥j.

Digere per 4 dies et cola.

D. S. Von 50 — 100 Tropfen Abends zu nehmen.

*Fowler.*N^o. 300.R_x. Hb. Pyrolae umbellatae ʒj.

inf. c. aq. ft. ℥j.

ad Col. ℥j.

D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.

*Sommerville.*N^o. 301.

Ry. Rad. Armoraciae ras. ℥v.
 digere frig. in vase clauso cum
 Cerevisiae ℥jj. per hor. XXIV.
 Col. adde

Syr. communis ℥j.

M. D. S. Tassenweise zu 1 — 2 ℥ täglich.
 (Auch bei Dysurie, Enuresis, Asthma pituitosum,
 und Verschleimung der Harnwege.)

*Hufeland.*N^o. 302.

Ry. Sem. Genistae ℥jj.
 Baccar. Juniperi M. jj.
 Rad. Petroselini M. jjj.
 Rad. Triticis rep. M. j.

C. C. coq. c. Aq. ft. q. s.

ad Col. Cong. dimid. D.

S. Zum gewöhnlichem Getränk.

*Sproegel.*N^o. 303.

Ry. Rad. Squillae pulv. ℥j.
 Digere per hor. XXXXVIII.
 cum

Vini albi mosellani Cong. β.

Col. D. S. Alle zwei Stunden eine Tasse voll.

Sproegel.

N^o. 304.

R_x. Fol. Prassii
 Ligni Cervin.
 Fol. Hepat.
 Hb. Absynth. vulg.
 — Acetosell. ana M. j.
 C. C. adde
 Sal. Absynthii ʒj.
 suspende in sacculo
 in
 Cerevisiae rec. Cong. IV.
 Digere per horas XXIV.

D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. Zu einem
 Pfund täglich. *Bate.*

N^o. 305.

R_x. Rad. Iridis
 — Enulae
 — Squillae ana ʒβ.
 Hb. Marrubii
 Flor. Sambuc. ebuli ana ʒj.
 Fol. Sennae ʒiβ.
 Agarici ʒjj.
 inf. cum
 Vini albi ℥IV. Col.

D. S. In einigen Tagen Morgens nüchtern aufzu-
 trinken. *Bate.*

Mittel gegen einzelne Arten
 der Wassersucht.

N^o. 306.

R_x. Summitat. Absynth. ʒj.
 Rad. Calami aromat.

Rad. Gentianae

— Imperator. ana $\bar{\text{ʒ}}\beta$.Bacc. Laur. $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.— Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{I}\beta$.Sem. Sinap. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.C. C. inf. c. Vini \mathcal{R} IV.Digere vase clauso per XXIV. horas
saepius agitando. Cola.

D. S. Dreimal täglich 2 Unzen (4 Löffel.)

(Gegen Anasarca.)

*v. Swieten. (Weikard).*N^o. 307.R $\bar{\text{y}}$. Hb. Digital. purp. rec. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.Coq. ex Aq. ft. \mathcal{R} I β .Col. $\bar{\text{ʒ}}\text{IX}$ adde

Aq. Juniperi

Syr. Cort. Aurant. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{I}\beta$.

M. D. S. Alle vier Stunden zwei Esslöffel, bis Erbrechen, Purgiren oder häufiger Urinabgang erfolgt.

(Gegen Anasarca)

*Warren.*N^o. 308.R $\bar{\text{y}}$. Calomel. gr. II β .Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.

D. S. Zweimal täglich ein Pulver.

(Gegen Hydrocephalus.)

*Göhlis.*N^o. 309.R $\bar{\text{y}}$. Ungt. Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.— Hydrarg. ciner. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$. — $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Kopf.

(Gegen Hydrocephalus.)

Göhlis.

N^o. 310.

- Ry. Hb. Digital. purp. gr. IX.
 Opii puriss. gr. jvj.
 Elaeosacch. Menth. pip. ʒjij.
 M. f. Pulv. Divide in partes IX. aeq.
 D. S. Täglich drei Pulver.
 (Gegen Hydrothorax.)

*Richter.*N^o. 311.

- Ry. Calomel.
 Sulph. stib. aurant.
 Opii
 Rad. Squill. ana gr. j.
 Sacch. alb. gr. XII.
 M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. XII.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Gegen Hydrothorax.)

*Richter.*N^o. 312.

- Ry. Roob Sambuci
 — Ebuli
 — Juniperi ana ʒvi.
 Pulv. Squill. comp. pharm. Lond.
 — Rad. Bryoniae
 Extr. Elater. ana ʒj. — ʒβ.
 Elect. theriac. ʒj.
 M. f. c. Syr. Rosar. Elect.
 D. S. Dreimal täglich eine Kastanie gross zu
 nehmen.
 (Zugleich ein diuretischer Thee.)
 (Gegen Hydrothorax.)

*P. Frank.*N^o. 313.

- Ry. Liq. Kali acet. ʒβ.
 Spir. nitric. aeth. ʒjij.

Oxymell. Colchici $\overline{\text{V}}$.

- M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel; zugleich ein
Decoctum Rad. Senegae und Rubiae tinctorum.
(Gegen Hydrothorax.) *Kämpf.*

N^o. 314.

- Ry. Hydrarg. oxydat. subsulph. gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$.
Sacch. alb. $\text{D}\beta$.
M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. VI.
S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Gegen Hydrothorax.) *Heim.*

N^o. 315.

- Ry. Hb. Digital. purp. gr. j.
Extr. Lactucæ virosæ gr. jj — IV.
Sacch. alb. $\text{D}\beta$.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No XII.
D. S. Alle 2 — 3 Stunden ein Pulver.
(Gegen Hydrothorax; besonders das heftige
Herzklopfen beruhigend; auch gegen Ascites
empfohlen.) *Toel.*

N^o. 316.

- Ry. Pulv. Rad. Jalapp. $\text{D}\beta$.
Calomel. gr. jj .
Hb. Digital. purp. gr. j.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. s.
D. S. Alle drei Stunden ein Pulver, bis wässrige
Stühle erfolgen.
(Gegen Hydrothorax.) *Wolf.*

N^o. 317.

- Ry. Sap. venet. $\overline{\text{V}}\beta$.
Gummi Ammoniac.

- Rad. Squillae
 Milleped. ana $\bar{3}j$.
 Ol. Anisi gtt. VIII.
 M. f. Pil. pd. gr. $\bar{j}j$.
 Consp. pulv. Lycopod.
 D. S. Morgens und Abends 12—15 Pillen.
 (Gegen Hydrothorax. Auch gegen Ascites.)
Baldinger.
-

N^o. 318.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{3}j$.
 — stib. gr. IV.
 M. f. Pulv. Divide in partes XVI. aeq.
 D. S. Täglich 3—6 Pulver in Wasser zu nehmen.
 (Gegen Ascites.)
Richter.
-

N^o. 319.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{5}j$.
 Boracis venet. $\bar{5}j$.
 solve in
 Decoct. fervid. Petrosel. $\bar{3}vj$.
 adde
 Oxymell. squill. $\bar{5}j$.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Ascites.)
Sachtleben.
-

N^o. 320.

- R \bar{y} . Tart. dep. $\bar{5}j$.
 Rad. Zingiberis
 Conserv. Rosar. ana $\bar{5}j$.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut. f. Elect. D.
 S. Theelöffelweise.
 (Gegen Ascites.)
Monro.
-

N^o. 321.

- R. Tart. dep. $\bar{5}$ vj.
 Pulv. Rad. Rhei
 Spec. aromat. pharm. Lond. ana $\bar{3}$ j.
 Oxymell. squill. q. s.
 ut. f. Elect. D.
- S. In 24 Stunden 3—4 Theelöffel, bis 3—4
 Stühle erfolgen.
 (Gegen Ascites.)
- Fordyce.*
-

N^o. 322.

- R. Cort. Chin. reg. $\bar{3}$ j.
 Coq. c. Aq. font. q. s.
 in Col. ferv. $\bar{3}$ vjjj.
 solve
 Tart. dep. $\bar{3}$ jjj.
- M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.
 (Gegen Ascites.)
- P. Frank.*
-

N^o. 323.

- R. Tart. boraxat. $\bar{3}$ j.
 Spir. nitr. aeth. $\bar{3}$ jj.
 Oxymell. squill. $\bar{3}$ j.
 Aq. Menth. crisp. $\bar{3}$ vjjj.
- M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.
 (Gegen Ascites.)
- Selig.*
-

N^o. 324.

- R. Gummi Guttae gr. vjjj.
 ter. c. Vit. ov. No. I.
 Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}$ jj.
- M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
 (Gegen Ascites.)
- Werthoff.*
-

N^o. 325.R_x. Gummi Guttae ʒβ.

solve in

Liq. Kali carb. ʒβ.

M. D. S. Drei bis viermal täglich 30 Tropfen.

(Gegen Ascites.)

*Richter.*N^o. 326.R_x. Tart. dep.

Rad. Rhei ana ʒj.

Gummi Guttae gr. IV—XII.

Tart. stib. gr. β.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. VI.

D. S. Jeden Morgen nüchtern ein Pulver zu nehmen.

(Gegen Ascites.)

*Sachtleben.*N^o. 327.R_x. Gummi Ammoniaci ʒjj.

Nitri dep. ʒiβ.

Sal. Ammon. dep. ʒβ.

Pulv. Rad. Squillae ʒβ—ʒjj.

Magnes. Nitri ʒj.

Sulph. Antim. aurat. gr. V.

Aq. font. ʒvj.

Syr. Althaeae ʒvj.

M. D. S. Umgeschüttelt alle Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

*Vogler.*N^o. 328.R_x. Rad. Squillae rec. ʒj.

Cort. Aurant.

Rad. Calami aromat. ana ʒjj.

inf. c.

Vini boni alb. ℞jjj.

Digere per tres dies.

Col. adde

Oxymell. squill. ℥jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 329.

℞. Kali sulph. ℥β.

Rad. Squill. rec. ℥j.

Sem. Foeniculi ℥jjj.

Cort. Cinnam. ℥β.

Elaeosacch. Cinnam. ℥jjj.

M. f. Pulv. D. S. Alle 3 Stunden zwei Theelöffel.

(Gegen Ascites.)

Regnaudat.

N^o. 330.

℞. Rad. Squillae gr. IX.

Kali nitrici

Baccar. Juniperi

Rad. Ari ana ℥j.

M. f. Pulv. Divide in partes IX aeq.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver mit einer Tasse

Wachholderbeerenthee.

(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 331.

℞. Pulv. Rad. Squill. ℥β.

Sulph. stib. aurant.

Ammon. carb. pyro-oleos. ana ℥j.

Extr. Elater. ℥jj.

Ol. Anisi gtt. vj.

Succi Liq. q. s. ut f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. 5 bis 10 Pillen auf einmal.
(Gegen Ascites.)

Vogler.

N^o. 332.

R_x. Pulv. Rad. Squillae gr. X.
— Piper. nigr.
Kali nitrici ana gr. XV.
Pulv. Rad. Ipecacuanhae gr. V.
Opii puriss. gr. ꝑꝑ.
M. f. c. Syr. q. s. Bolus.
D. S. Auf einmal zu nehmen.
(Gegen Ascites.)

Fordyce.

N^o. 333.

R_x. Extr. Squillae gr. β—j.
Ammon. muriat. mart. gr. vj.
Elaeosacch. Ment. pip. ꝑj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 334.

R_x. Extr. Squillae gr. xꝑꝑ.
solve in
Aq. Ment. pip. ꝑvj.
adde
Liq. Kali acet.
Syr. Fumar. ana ꝑj.
M. D. S. Vier bis sechsmal täglich einen Ess-
löffel.
(Gegen Ascites.)

Richter.

N^o. 335.

R_x. Kali carb. puriss. ꝑj.
Acet. squill. q. s. ad. sat.

Tr. Opii simpl. gtt. XXX.

Aq. Cinnam. s. v. $\bar{3}$ jj.

M. D. S. Morgens, Nachmittags und Abends je-
desmal den dritten Theil der Mischung.

(Gegen Ascites. Besonders nach Intermittens.)

Leake.

N^o. 336.

Ry. Acet. squill. $\bar{3}$ β.

Kali carb. puriss. $\bar{5}$ j.

Aq. Menth. pip. $\bar{3}$ vj.

Tr. Antim. $\bar{5}$ jj.

— Opii simpl. $\bar{5}$ j.

Syr. Cort. Aurant. $\bar{3}$ β.

M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 335.)

Leake.

N^o. 337.

Ry. Oxymell. squill.

Aq. flor. Sambuci ana $\bar{3}$ iv.

Liq. Kali acet. $\bar{3}$ β.

M. D. S. Täglich dreimal 1 — 2 Esslöffel.

(Gegen Ascites; wird besonders gut vertragen,
und ist auch nicht so widerlich zu nehmen,
als die andern Zusammensetzungen mit Squilla.)

Richter.

N^o. 338.

Ry. Rad. Senegae

Sap. med.

Tereb. loric. ana $\bar{5}$ jj.

Pulv. Cort. Chinae reg. $\bar{3}$ β.

Syr. simpl. q. s. ut f. Elect.

D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
(Gegen Ascites.) *Berends.*

N^o. 339.

Ry. Pomor. Colocynth. ʒij.
ebull. per VI. Min. c.

Aq. font. q. s.

Col. ℥jj. adde

Spir. sulph. aeth. ʒjj.

Syr. Cort. Aurant. ʒjj.

M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
(Gegen Ascites. Besonders bei torpidem Zu-
stand.) *Sydenham.*

N^o. 340.

Ry. Res. Jalapp.

Calomel.

Sap. med. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnam.

D. S. Täglich 9 Pillen auf einmal zu nehmen.
(Wie bei No. 339.) *Brocklesby.*

N^o. 341.

Ry. Extr. panchymag. Crollii ʒj.

Elater. gr. XV.

Ol. Cinnamom. gtt. jj.

M. f. Pil. pd. gr. j.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 339.)

Sydenham.

N^o. 342.

Ry. Scammonii ʒj.

Antimon. crud.

Crocī mart. aperit. ana ʒβ.
M. f. Pulv. D. S. Täglich 20 Gran mit einem Sy-
rup zu einem Bolus gemacht.
(Wie bei No. 339.) *Dover.*

N^o. 343.

Ry. Fol. Digital. purp. rec. ʒIV.
Concis. coq. c.
Aq. font. ℞ II. ad rem. ℞β.
Col. adde
Spir. Vini gall. ʒβ.
M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel, bis zur
Uebelkeit.
(Gegen Ascites, besonders mit krampfhafter Af-
fection und Verstopfung in den Unterleibs-Ein-
geweiden.) *Richter.*

N^o. 344.

Ry. Hb. Digital. purp. gr. j—jjj.
Calomel. gr. j.
Opii puriss. gr. β.
Elaeosacch. Menth.
Sacchar. alb. ana gr. vj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
(Wie bei No. 343.) *Richter.*

N^o. 345.

Ry. Extr. Digital. purp.
solve in
Vini stib. ʒj.
Tr. Opii simpl. ʒj.
M. D. S. Dreimal täglich 16—30 Tropfen.
(Wie bei No. 343.) *Quarin.*

N^o. 346.R_x. Extr. Digital. purp. ℥j.

Aether. sulph. ℥β.

Aq. Menth. pip. ℥x.

M. D. S. Alle 3 — 4 Stunden 1 — 4 Esslöffel.

(Wie bei No. 343.)

*Quarin.*N^o. 347.R_x. Extr. Digital. purp. ℥β.

Liq. Kali acet. ℥jj.

Tr. Opii simpl. gtt. XXXII.

M. D. S. Umgeschüttelt 3 mal täglich 1 — 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 343.)

*Richter.*N^o. 348.R_x. Tr. Digital. ℥jjj.

— Squillae kalin. ℥j.

M. D. S. Alle 2 Stunden 30 Tropfen.

(Wie bei No. 343.)

*Horn.*N^o. 349.R_x. Raphan. rust.

Baccar. Juniperi ana ℥j.

Contus. intime in mortar. vitreo

adde

Sal. Tart. puriss. ℥j.

Vini boni rhen. ℥ IV.

M. D. S. Drei bis viermal täglich 3 — 6 Esslöffel.

(Gegen Ascites.)

*Monro.*N^o. 350.R_x. Ciner. Genist. ℥ jj.

inf. c.

Vin. rhen. opt. ℥ IV.

Baccar. Juniperi contus. M. j.

Stent in digest. per XXIV hor.

Col. D.

S. Drei bis viermal täglich ein Spitzglas voll.
(Gegen Ascites.) *van Swieten.*

N^o. 351.

R_y. Kali carb.

Hb. Absynth. ana $\bar{\text{ʒ}}$ j.

inf. cum

Vin. rhen. \mathcal{R} jj.

Digere per XXIV hor. Col.

D. S. Vier bis sechs Unzen in 24 Stunden zu ver-
brauchen.

(Gegen Ascites.)

P. Frank.

N^o. 352.

R_y. Kali carb. $\bar{\text{ʒ}}$ j.

Ferri pulv. $\bar{\text{ʒ}}$ IV.

Sem. Sinap. contus. $\bar{\text{ʒ}}$ jj.

inf. c.

Cerevis. amar. rec. \mathcal{R} xjj.

Stent in digest. per II dies. Col.

D. S. Drei bis viermal täglich eine halbe Theetasse voll.

(Gegen Ascites.)

P. Frank.

N^o. 353.

R_y. Pulv. Cantharid. gr. j.

Gamphor. gr. jjj.

M. f. c. Mucilag. G. arab.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends eine Pille.

(Gegen Ascites; bei reizlosem torpidem Zustande.)

Richter.

N^o. 354.

R_x. Pulv. Cantharid. ʒβ—ʒj.
 Amygdal. dulc. ʒj.
 Sacch. alb. ʒβ.

Cont. in mort. lap. et fiat
 lent. aff. Aq. Cal. ʒx. Emuls.

D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 353.) *Herwig. (Hufeland.)*

N^o. 355.

R_x. Succ. Milleped. rec. express.

Liq. Kali acet. ana ʒβ.

Aq. Petrosel. ʒIV.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden 1—2 Esslöffel.

(Gegen frischen Ascites mit gereiztem Zustande.)

Richter.

N^o. 356.

R_x. Extr. Lactucae viros. gr. jj.

Hb. Digital. purp. gr. β.

Sacch. alb. gr. xjj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.

(Gegen Ascites. Fast als specifisch empfohlen.)

(Hufeland's Journal.)

N^o. 357.

R_x. Pulv. Cort. Chin. reg.

— — Aurant.

— Rad. Gentianae ana ʒβ.

— Cort. Cinnamom. ʒjj

Ferri pulverati ʒjj.

inf. c.

Vini boni rhen. ℥jj.

Stent in digest. loco calido saepius agit.
per XXIV hor. Col. D.

S. Dreimal täglich ein Weinglas voll.

(Gegen Ascites aus Atonie.)

Richter.

N^o. 358.

R_x. Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{\text{v}}\text{ijj}$.

Tr. Ferri acet. aeth. $\bar{\text{v}}\text{j}$.

Extr. Cort. peruv. frig. parat. $\bar{\text{v}}\beta$.

M. D. S. Dreimal täglich einen halben Esslöffel.

(Wie bei No. 357.)

Richter.

N^o. 359.

R_x. Pulv. Cort. Chin. reg.

— Rad. Gentianae

Ammon. muriat. mart. ana $\bar{\text{v}}\text{j}$.

Oxymell. squill.

Syr. Cort. Aurant. ana q. s. ut f. Elect.

D. S. Alle 3 Stunden ein Paar Drachmen zu nehmen.

(Besonders gegen Hydrops nach intermittirenden
Fiebern.)

Quarin.

N^o. 360.

R_x. Cupri sulph.

Opii puriss. ana gr. β .

Pulv. Cort. Cinnamom. gr. j.

M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s. pil. No. XII.

D. S. Morgens und Abends eine Pille.

(Wie bei No. 357.)

Chalmers.

N^o. 361.

R_x. Acet. squill. $\bar{\text{v}}\text{iv}$.

Liq. Kali carb. q. s. ad saturat.

Gummi Ammoniaci $\bar{\text{v}}\text{jj}$.

II. Chronische Krankheiten.

Extr. Chelidonii $\bar{5}j$.

Tart. stib. gr. vjj .

Aq. Menth. pip. $\bar{5}jjj$.

M. D. S. Alle drei Stunden 3 Esslöffel.

(Besonders gegen Ascites, von Verstopfung in
den Eingeweiden.) *Richter.*

N^o. 362.

Ry. Pulv. Rad. Arnicae $\bar{5}j$.

Sap. med.

G. Ammoniac. ana $\bar{5}jj$.

Extr. Chelidon. $\bar{5}\beta$.

Tart. stib. gr. jjj .

M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj .

Consp. D. S. Dreimal täglich 10—30 Pillen.

(Wie bei No. 361.)

Richter.

N^o. 363.

Ry. Tart. stib. gr. xjj .

Gummi Ammoniac.

Gummi Asae foet.

Sap. med.

Extr. Conii maculat. ana $\bar{5}jj$.

— Aloës aq. $\bar{5}j$.

M. f. Pil. pd. gr. j . Consperg.

D. S. Dreimal täglich 10—15 Pillen.

(Wie bei No. 361.)

Richter.

N^o. 364.

Ry. Hb. Digital. purp. $\bar{5}jj$.

inf. c.

Aq. ferv. q. s. ad Col. $\bar{5}j$.

Refrig. adde

Ol. Tereb. $\bar{5}j$.

Vitell. ovor. No. II.

F. l. a. Emuls. adde

Extr. Squillae ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib.

(Gegen Ascites.)

*Schubarth.*N^o. 365.

℞. Baccar. Juniperi contus. ℞j.

inf. c. Aq. ferv. q. s. Exprime

D. S. Die heissen Wachholderbeeren zwischen Tüchern um das angeschwollene Gelenk gelegt, und oft erneuert.

(Bei Hydrops extremitatum aut articularum; besonders nach intermittirenden Fiebern.)

*Bluff.*N^o. 366.

℞. Sal. ammon. puri ʒβ.

Aq. font. ʒxxx.

Spir. Vini rectificatiss. ʒijj.

M. Solutio calefacta D.

S. Mit Tüchern zu Umschlägen.

(Gegen Hydrops articularum.)

*Vogler.*N^o. 367.

℞. Lithargyri ʒvj.

Boli armeni ʒj.

Mastich.

Myrrhae ana ʒβ.

Aceti Vini ℞j.

Coque per $\frac{1}{4}$ horae. S. Dicke Tücher in diese Mischung zu tauchen, und lauwarm überzuschlagen.

(Gegen Hygroma cysticum patellae.)

Heister.

N^o. 368.

- R_x. Antim. tart.
 Hb. Digital. ana gr. j.
 Calomel. gr. V.
 M. f. Pulv. D. tal. Dos. q. l.
 S. Alle 2 Stunden ein Pulver, bis Purgiren erfolgt. Zugleich 3 — 4 mal täglich einen Esslöffel von einem Infusum Hb. Digitalis.
 (Gegen Hydrocele.) *Schaw.*
-

N^o. 369.

- R_x. Sal. ammon. dep. $\overline{\text{ʒ}}\beta - \overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
 solve in
 Aq. destill. $\overline{\text{ʒ}}\text{x}$.
 M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Gegen Hydrocele infantum; schon seit den ältesten Zeiten empfohlen.)
v. Graefe.
-

N^o. 370.

- R_x. Sal. ammon. dep. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Aceti
 Spir. Vini. rectific. ana $\overline{\text{ʒ}}\text{iv}$.
 M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Gegen Hydrocele.) *Keate.*
-

B l u t f l ü s s e.

N^o. 371.

- R_x. Tr. Digital. purp. $\overline{\text{ʒ}}\text{jj}$.
 — Opii crocat. $\overline{\text{ʒ}}\beta$.
 Syr. Cinnamom. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
 M. D. S. Alle 3 Stunden 30 Tropfen.
 (Gegen Blutflüsse mit Erethismus) *Hecker.*

N^o. 372.

- R_x. Tereb. venet. ʒjij.
 Acid. sulph. concentr. ʒv.
 M. in vitro aperto et successive
 adde
 Spir. Vini rectificati ʒijj.
 M. D. S. Alle Stunden 15—30 Tropfen.
 (Gegen Blutflüsse mit dem Charakter der Paralyse.)
Hecker.
-

N^o. 373.

- R_x. Opii gr. j.
 Cinnamomi ʒj.
 Ferri sulphurici gr. IV.
 Sacch. alb. ʒijj.
 M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.
 D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden ein Pulver, bis zum
 Nachlassen des Blutflusses.
 (Wie bei No. 372.)
Hecker.
-

N^o. 374.

- R_x. Kino ʒβ.
 Aluminis ʒj.
 Cort. Cinnamom. gr. xxxxvjjj.
 Sacch. alb. ʒijj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VI aeq.
 D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 372.)
Berends.
-

N^o. 375.

- R_x. Aluminis crudi
 G. Kino ana gr. v.—ʒβ.
 M. f. Pulv. D. tal. Dos. No. XII.
 D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 372.)
Conradi.
-

N^o. 376.

R_x. G. arab. ʒj.
 Cupri sulphurici ʒjj.
 Gummi Kino ʒj.
 Lap. haematit. ʒβ.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Zum Einstreuen.

(Bei äusserlichen Blutungen aus Wunden u. s. w.)
v. Gräfe.

N^o. 377.

R_x. G. Kino ʒβ.
 — arab. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Ein in Essig getauchtes Charpie-Bäuschchen mit diesem Pulver zu bestreuen, und auf die Stichwunde zu legen, dann grössere Charpie-Bäuschchen aufzulegen, und das Ganze mit einem Heftpflaster zu befestigen.

(Gegen zu lange andauernde Blutungen aus Blutigelstichen.)
Lentin.

N^o. 378.

R_x. Boli armen.
 Alum. rupei ana ʒβ.
 Sang. Dracon. ʒjj.
 Colcothar. vitriol. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Mit Eiweiss vermischt und auf Wieken gestrichen in die Nase zu bringen.

(Gegen Epistaxis.)

Griffith.

N^o. 379.

R_x. Ol. Hyoscyami coct. ʒβ.
 G. arab. ʒvj.

- Syr. Althaeae \mathfrak{J} j.
 M. int. et aff. sensim
 Aq. Cerasor. nigr. \mathfrak{J} vj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Haemoptysis spastica.) *Harless.*
-

N^o. 380.

- Ry. Hb. Digital.
 Opii puri
 Calomel. ana gr. j.
 M. f. Pulv. Disp. tal. D. q. l.
 D. S. Alle ein bis zwei Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 379.) *Richter.*
-

N^o. 381.

- Ry. Plumbi acet. gr. v.
 Opii puri $\mathfrak{D}\beta$.
 Extr. Millefol.
 Rad. Liquirit. ana \mathfrak{J} j.
 M. f. l. a. pil. No. LX.
 D. S. Alle 4—6 Stunden 3 Pillen.
 (Gegen Haemoptysis und Metrorrhagia atonica.)
Jahn.
-

N^o. 382.

- Ry. Syr. Violar. $\mathfrak{J}\beta$.
 Acid. sulph. dilut. $\mathfrak{J}\beta$.
 Tr. Opii simpl. gtt. XXIV—XL.
 M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden 1—2 Theelöffel.
 (Gegen Haemoptysis atonica.) *Richter.*
-

N^o. 383.

- Ry. Extr. Lign. campech. \mathfrak{J} jj.
 Sal. essent. Tart. \mathfrak{J} j.

Aq. Cerasor. nigr. $\bar{3}v$ j.

Syr. Rubi Idaei $\bar{3}v$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 382.)

Kohlhäs.

N^o. 384.

R_x. Cupri sulphurici oxydati gr. IV.

solve in

Aq. Cinnamomi $\bar{6}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel, so dass keine Uebelkeit erfolgt.

(Wie bei No. 382.)

Hecker.

N^o. 385.

R_x. Acid. phosphor. $\bar{3}j$.

Aq. font. destill. $\bar{3}\beta$.

Syr. Cerasor. nigr. $\bar{3}jj$.

M. D. S. Alle Viertelstunden 10 — 30 Tropfen.

(Wie bei No. 382.)

(Hufeland's Journal.)

N^o. 386.

R_x. Ol. Amygdal. dulc.

Syr. Papav. alb. ana. $\bar{3}j$.

G. arab. $\bar{3}j$ — \bar{jj} .

M. D. S. Alle halbe Stunden $\frac{1}{2}$ — 2 Theelöffel.

(Gegen Melaena und Mictus cruentus.)

Weikard

N^o. 387.

R_x. Lactis Mens. \bar{j} .

Aluminis $\bar{3}j$.

Sacch. alb. q. s. ad. gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Melaena. Das Mittel half in einem Falle, wo bereits alles Andere fruchtlos angewandt worden war.)

Bang.

N^o. 388.

Ry. Tr. Opii simpl. ʒβ.
 Aether. acet. ʒj — j̄j.
 Aq. Cinnam. simpl. ʒj — j̄j.
 — flor. Aurant. ʒiv — v.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ — 2 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Melaena, cum indicatione vitali.)

Berends.

N^o. 389.

Ry. Tart. dep.
 Magnes. carb.
 Sulph. praecip.
 Sem. Foeniculi ana ʒj̄j.
 Camphorae gr. v̄j̄j̄.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.

D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver mit Thee von Hb. Millefolii.

(Gegen Molimina haemorrhoidalia.)

Richter.

N^o. 390.

Ry. Kali tart.
 Extr. Marrubii albi ana ʒj̄j.
 Aq. Meliss. ʒj̄j̄j̄.

M. D. S. Morgens und Abends jedesmal die Hälfte zu nehmen.

(Gegen Haemorrhoiden.)

Hecker.

No. 391.

- R_x. Kali tart. ʒjij.
 Rad. Rhei ʒj.
 (Sulph. praecip. ʒjj.)
 Magnes. carb. ʒβ.
 Elaeosacch. Foeniculi ʒvj.
 M. D. ad vitr. S. Drei bis viermal täglich einen
 Theelöffel.
 (Wie bei No. 390.) *Klein.*
-

N^o. 392.

- R_x. Lact. Sulph.
 Sap. med. ana ʒβ. — ʒj.
 Sacch. alb. ʒjj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Wie bei No. 390.) *Berends.*
-

N^o. 393.

- R_x. Kali tart. ʒβ.
 Extr. Myrrhae aq.
 Aloës ana ʒj.
 Aq. Menth. pip. ʒvj.
 M. D. S. Zweimal täglich einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 390.) *Hecker.*
-

N^o. 394.

- R_x. Gummi ammoniaci in gr. ʒjj.
 Aloës lucid.
 Limat. Ferri ana ʒj.
 Syr. balsam. q. s. ut. f. Pil. pd. gr. jijj.
 D. S. Täglich 4 — 6 Pillen, bis leichter Stuhl erfolgt.
 Zugleich ein Thee aus
 R_x. Hb. Millefolii M. j.
 Flor. Tiliae.

Flor. Cardam. prat. ana M. β.

Rad. Zingiberis ʒj.

M. f. Spec. D. S. Zun Thee. (Tassenweise.)

(Gegen Haemorrhoiden mit Verstopfung.)

Gaubius. (Weikard.)

N^o. 395.

Ry. Calomel.

Aloës ana gr. j.

M. f. Pil. q. 1.

D. S. Abends beim Schlafengehn eine Pille.

(Gegen die Verstopfung bei Hämorrhoidal-Kran-
ken.)

Weikard.

N^o. 396.

Ry. Sal. Seidlizens. ʒj.

Aq. Meliss. ʒj.

Tr. Rhei aq. ʒj.

Elaeosacch. Citri ʒβ.

M. D. S. Löffelweise, bis Stuhlgang erfolgt.

(Wie bei No. 395.)

Hecker.

N^o. 397.

Ry. Extr. Millefol.

— Lign. campech.

Elix. acid. Halleri ʒj.

Aq. Menth. pip. ʒj.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden 50—60 Tropfen. Zu-

gleich äusserlich ein Cataplasma aus Semmelkrumen
mit Acet. saturn., oder mit Alaunmolken.

(Gegen zu heftigen Hämorrhoidal-Fluss.)

Sprögel.

N^o. 398.

Ry. Extr. Hellebori nigri ʒj.

Boracis

II. Chronische Krankheiten.

Extr. Myrrhae aq.

Elaeosacch. Cinnamom. ana ℥j.
solve in

Aq. Cinnamom. s. v. ℥ijj.
adde

Syr. Cort. Aurant. ℥β.

M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.
(Gegen unterdrückte Hämorrhoiden.)

Richter.

N^o. 399.

Rx. Aloës ℥j.

Pulv. fol. Sennae ℥j.

G. Asae foet.

— Galbani

— Myrrhae ana ℥β.

Ferri sulph. ℥ijj.

Croci oriental.

Macis ana ℥β.

M. f. c. Syr. flor. Chamomill. q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consperg.

D. S. Jeden Abend 10 Pillen.

(Wie bei No. 398.)

Richter.

N^o. 400.

Rx. Aloës

G. Asae foet.

Extr. Hellebori nigr.

Ferri sulphurici

Croci oriental. ana ℥j.

Elix. propr. q. s. ut f. Pil.

pond. gr. jj. Consperg.

D. S. Alle Abende 8 Pillen.

(Wie bei No. 398.)

Richter.

N^o. 401.

- R_y. Butyr. Cacao ʒβ.
 Ol. coct. Hyoscyami
 Spermaceti ana ʒjj.
 Camphorae ʒjj.
 Croci ʒj.
- M. f. Ungt. D. S. Auf leinene Läppchen gestrichen,
 und diese alle 3 Stunden frisch aufgelegt.
 (Gegen heftige Hämorrhoidal-Schmerzen.)
Meyer.
-

N^o. 402.

- R_y. Ungt. Zinci
 — alb. camphorat.
 — de Linar. ana ʒjj.
- M. D. S. Wie bei No. 401.
Sprögel.
-

N^o. 403.

- R_y. Flor. Linariae Pug. jj.
 Axung. porc. purif. q. s.
 Coque ut f. Ungt.
 Expresso et refrig. admisce
 Vitell. ov. No. I.
- M. D. S. Zum Aufstreichen auf die Haemor-
 rhoiden.
 (Wie bei No. 401.)
Wolf.
-

N^o. 404.

- R_y. Butyr. rec. non salit. ʒvjj.
 Amyli contrit. ʒj.
 Opii crud. pulv. ʒβ.
- M. D. S. Wie bei No. 402.
Vogler.
-

N^o. 405.

- R_y. Liniment. saponat. therieb. ʒβ.
 Aq. fl. Chamomill. (vel Aq. saturn.) ʒvj.

M. D. S. Zu Umschlägen.

(Gegen Haemorrhoides coecae urentes.)

Berends.

N^o. 406.

Ry. Calomel. gr. j — vj.

Pulv. G. arab. $\bar{\text{z}}\beta$.

Aq. Valerianae $\bar{\text{z}}\text{I}\beta$.

M. exactiss. D. S. Zum Clystir.

(Gegen krampfhaftige Hämorrhoidal-Beschwerden
im Mastdarm. Auch gegen Ascariden benutzt.)

Kopp.

N^o. 407.

Ry. Liniment. volatil.

Ol. Hyoscyami

— Chamomill. ana $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Camphor. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Tr. thebaicae $\bar{\text{z}}\text{jjj}$.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib.

(Gegen Hämorrhoidal-Kolik.)

Meyer.

N^o. 408.

Ry. Cremor. Lactis $\bar{\text{z}}\text{jjj}$.

Ol. Myrrhae p. del. $\bar{\text{z}}\text{jjj}$.

Pompholig. praep. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Gegen Ausschlag und heftiges Jucken am After
und an den Schaantheilen, von Hämorrhoiden
herrührend.)

Meyer.

N^o. 409.

Ry. Merc. praecip. alb. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Camphor. $\bar{\text{z}}\beta$.

Opii pulv. $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

Ungt. pomat. $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 408. Besonders gegen das Jucken
am Hodensack von Hämorrhoiden.) *Meyer.*

N^o. 410.

R_x. Opii $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Nitri dep. $\bar{\text{ʒ}}\text{v}\beta$.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 15 Gran.

(Gegen Metrorrhagia inflammatoria.)

Weikard.

N^o. 411.

R_x. Elix. Vitriol. Mynsicht. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Tr. Castor. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

— Opii crocat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. Zu 20 — 30 Tropfen.

(Gegen Metrorrhagia spastica.)

Richter.

N^o. 412.

R_x. Aq. Menth. pip.

— Meliss. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{ijj}$.

Tr. Cinnamom. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Lap. haematit. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

Syr. Melissae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ Stunden 3 Esslöffel.

(Gegen passive Metrorrhagie.)

van Swieten (Plenk. Mursinna. Osiander. Ackermann.)

N^o. 413.

R_x. Lap. haematit. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Cort. Cinnamom. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{jj}$.

M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel mit
Chamillenthee.

(Wie bei No. 412.)

Stark.

N^o. 414.

R_x. Limatur. Ferri puriss. $\bar{\text{3}}\beta$.

Rad. Columb. 3IV .

— Rhei opt.

Cort. Cinnam. acut. ana 3jj .

Extr. Absynth. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. jj . Consp. pulv. Cinnam.

(Wie bei No. 412. Auch gegen Pollutio berühmt.)

Weikard.

N^o. 415.

R_x. Limat. Ferri puriss.

Sacch. ana $\bar{\text{3}}\beta$.

Cort. Cinnamom. $\bar{\text{3}}\beta$ — $\bar{\text{3}}\text{jj}$.

M. f. Pulv. D. S. Zweimal täglich 40—60 Gran.

(Wie bei Nr. 414.)

Weikard.

N^o. 416.

R_x. Rad. Tormentill.

Cort. Chinae ana gr. j .

Sacch. alb. $\text{3}\beta$.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 412.)

Bergius.

N^o. 417.

R_x. Aq. Menth. pip. $\bar{\text{3}}\text{jj}$.

Tr. Cinnamom. $\bar{\text{3}}\text{j}$.

Alum. crud. 3j .

Syr. Diacod. $\bar{\text{3}}\text{j}$.

M. D. S. Alle Stunden 1 — 1½ Esslöffel.
(Wie bei No. 412.)

Plenk.

N^o. 418.

R_x. Alum. rom. ʒj.
Sacch. Lact. ʒβ.
Cinnamom. acut. ʒjj.

M. f. Pulv. Divide in partes VIII aeq.

D. S. Täglich ein Pulver mit 1½ ℥ Milch bis zum Gerinnen zu sieden. Die mit hinreichendem Zucker versüßte Colatur wird kalt zur Hälfte Vormittags, zur andern Hälfte Nachmittags getrunken.

(Wie bei No. 412.)

Osiander.

N^o. 419.

R_x. Alum. kinosat. gr. j — jj.
Cort. Cinnamom.
— Cascarill. ana gr. v. — ʒβ.
Sacch. Lact. ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 412.)

Mursinna.

N^o. 420.

R_x. Rad. Rhei
Magnes. carb.
Boli armen. ana p. aeq.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel.

(Wie bei No. 412.)

v. Hildenbrandt.

N^o. 421.

R_x. Extr. Chinae frig. parat.
Aluminis crudi
Flor. Sal. ammon. mart.
Pulv. aromat. ana ʒβ.

K 1

Ol. Cinnamomi gtt. XII.

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Wie bei No. 412.)

Formey.

N^o. 422.

R_x. Sacch. Saturn. gr. vj.

Rad. Althaeae pulv.

Extr. Polygal. amar. ana ʒj.

M. f. Pil. No. LX. Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Zu 2—5 Pillen pro Dosi. Für einen Tag

10—20 Pillen.

(Wie bei No. 412. Siehe auch No. 381.)

Kopp.

N^o. 423.

R_x. Extr. Cort. Salicis ʒiβ.

Alum. rom. ʒβ.—ʒj.

Aq. Cinnamom. simpl. ʒv.

Syr. Rubi Idaei ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 412.)

Osiander.

N^o. 424.

R_x. Aluminis crudi gr. xv.

solve in

Aq. Menth. crisp. ʒiv.

adde

Tr. Cinnamomi ʒjjj.

Syr. Papav. ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 412.)

Rust.

N^o. 425.

R_x. Ol. Caryophyllor. gtt. x.

Naphthae Vitrioli ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 10 — 15 Tropfen.
(Wie bei No. 412.) *Thilenius.*

N^o. 426.

R̄. Vitrioli Cupri usti $\bar{\text{v}}\text{jjj}$.
Sang. Dracon. $\bar{\text{v}}\text{jj}$.
Spir. Vini rectificati $\bar{\text{v}}\text{XXXII}$.

Digere in vase vitreo clauso in balneo arenae per 4
dies, agitando aliquoties in die. Liq. decantetur.
S. 40 — 60 Tropfen täglich mit einer Unze Wasser
und einer Unze rothem Wein.
(Wie bei No. 412.) *Bishoprick.*

N^o. 427.

R̄. Secal. cornut. $\bar{\text{v}}\text{j}$.
Coq. c. Aq. ft. q. s. ad
Col. $\bar{\text{v}}\text{IV}$.
adde

Syr. Cinnamomi $\bar{\text{v}}\text{j}$.
M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden ein Drittheil davon zu
nehmen.
(Wie bei No. 412.)

Prescot. (Schneider. Carus.)

N^o. 428.

R̄. Magnes. alb.
Boli armen.
Elaeosacch. Macis ana $\bar{\text{v}}\text{jj}$.
Rad. Rhei. elect. $\bar{\text{v}}\text{j}$.

M. f. Pulv. D. ad scatul. S. Dreimal täglich einen
Theelöffel.
(Gegen habituelle Metrorrhagien.) *Rust.*

N^o. 429.

R̄. Elix. aperitiv. $\bar{\text{v}}\text{jjj}$.
Aq. Laurocerasi $\bar{\text{v}}\text{j}$.

M. D. S. Alle 3 Stunden 30—50 Tropfen.
(Gegen schmerzhaftes Menses.) *Jahn.*

N^o. 430.

℞. Aq. Menth. pip. $\overline{\text{ʒ}}\text{IV}$.
— Cinnamomi $\overline{\text{ʒ}}\beta$.
Tr. Castor.
— Valer aeth. ana $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
Syr. Papav. alb. $\overline{\text{ʒ}}\text{jj}$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ — 1 Stunden einen Esslöffel.
Zugleich;

℞. Lin. volatil. camphorat. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
Tr. Opii crocat. $\overline{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.
(Gegen schmerzhaftes Menses von Krämpfen. —
Besonders zu empfehlen.)

M. J. Schmidt.

N^o. 431.

℞. Fol. Sabinæ rec. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
inf. Aq. ferv. suff. qt.
Col. $\overline{\text{ʒ}}\text{vjjj}$. adde
Boracis $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.
Sacch. alb. $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.
(Gummi arab. $\overline{\text{ʒ}}\text{jj}$.)

M. D. S. Bei nicht vorhandener Menstruation
dreimal täglich einen Esslöffel; während der
Menstruation alle 1—3 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen schmerzhaftes Menses aus Schwäche.)

Kopp. (Sundelin.)

N^o. 432.

℞. Flor. Sulph.
Rad. Rub. tinct.
Nitri dep.

Sacch. Lact. ana ʒj.

M. f. Pulv. D.

S. Zwei — viermal täglich eine Messerspitze voll
in einem Glase Wasser.

(Gegen Amenorrhöe mit Congestionen nach
anderen Theilen.) *Vogler.*

N^o. 433.

Ry. Extr. Opii aq. gr. j.

Camphorae gr. j — IV.

Ammon. muriat. dep. ʒj.

Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. D. in vitr. S. Viermal täglich einen
Theelöffel.

(Gegen Amenorrhöe aus Schwäche.)

Berends.

N^o. 434.

Ry. Extr. Rad. Hellebori

Aloës succ.

Ammon. muriat. mart. ana j.

Croci oriental. ʒj.

Opii puriss. ʒβ.

M. f. c. Tr. Rhei vinos. q. s.

Pil. pd. gr. j — D.

S. Morgens und Abends 8 — 12 Pillen.

(Gegen Amenorrhöe aus Atonie.)

Hecker. (Richter.)

N^o. 435.

Ry. Gummi ammoniaci

Aloës lucid.

Ferri oxydat. nigr. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. j — D.

S. Morgens und Abends 3—4 Pillen.
(Wie bei No. 434.)

*Carus.*N^o. 436.

R_x. Rad. Graminis $\bar{3}\beta$.
Summitat. Millefol.
Flor. Chamomill.
Fibrar. Hellebori ana $\bar{3}\beta$.
Sem. Anisi stellati $\bar{5}jj$.
C. M. S. Zum Thee.
(Wie bei No. 434.)

*Jahn.*N^o. 437.

R_x. Aloës succ.
Myrrhae elect.
Crocī oriental.
Flor. Sulph. ana $\bar{3}\beta$.
Fell. Tauri inspissat. q. s.
ut f. Pil. pd. gr j. Consp.
D. S. Täglich 10—30 Pillen.
(Wie bei No. 434.)

*Richter.*N^o. 438.

R_x. Aloës dep. $\bar{3}\beta$.
Myrrhae elect. $\bar{5}jj$.
Elix. proprietat. q. s.
ut f. Pil. pd. gr. II. D.
S. Dreimal täglich 8—12 Pillen.
(Wie bei No. 434. Das Elix. proprietat. besteht aus gleichen Theilen Tr. Croci, Tr. Myrrhae und Tr. Aloës; und wird auch für sich zu 10—30 Tropfen ebenfalls zur Beförderung der Menstruation benutzt.)

Hecker.

N^o. 439.

R_x. Aloës succ. $\bar{3}\beta$.
 Fol. Sennae $\bar{3}jj$.
 Asae foet.
 Galbani
 Myrrhae ana $\bar{3}j$.
 Sal. Martis $\bar{3}vj$.
 Croci
 Macis ana $\bar{3}\beta$.
 Olei Succini gtt. XL.
 Syr. Artemisiae q. s.

ut f. l. a. pil. pd. gr. \bar{jj} . Consp. pulv. Lycopod.
 D. S. Drei bis vier Wochen lang jeden Abend
 5 bis 10 Pillen.

(Wie bei No. 434. Bei grosser Atonie.)

Fuller.

N^o. 440.

R_x Spir. Sal. ammon. caust.
 Tr. Croci
 Laud. liq. Sydenh. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Zweimal täglich 20—30 Tropfen in ei-
 nem Glase kalten Wassers.

(Wie bei No. 434.)

Freind.

N^o. 441.

R_x. Elix. propr. dulc. $\bar{3}jj$.
 Essent. Castor.
 Laud. liq. Sydenh. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Zwei bis viermal täglich 50 Tropfen in
 einer Tasse Melissen-, Rauten-, Majoran- oder
 Schaafergarben-Thee.

(Wie bei No. 434.)

Stark.

N^o. 442.

R_x. Aloës lucid.
 Myrrhae

Res. Juniperi

— Hederae

— Guajaci ana $\bar{3}\beta$.

Extr. Absynth.

— Millefol.

— Fumar.

— Card. bened.

Hellebori nigr. ana $\bar{3}j$.

Rad. Rhei pulv. $\bar{3}vj$.

Tereb. venet. $\bar{3}jj$.

M. f. Pil. pd. gr. j.

D. S. Zu 5—10 Stück pro Dosi.

(Wie bei No. 434. Auch gegen Stockungen in der Leber und den andern Abdominal - Eingeweiden, und gegen Schleimflüsse des Uterus und Rectum's empfohlen.) *Hufeland.*

N^o. 443.

R_x. Borac. venet. $\bar{3}jj$.

Flaved. Cort. Aurant.

Elaeosacch. Foeniculi ana $\bar{3}l\beta$.

Sacch. alb. $\bar{3}jjj$.

M. f. Pulv. D. S. Dreimal täglich 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 434.) *Stark.*

N^o. 444.

R_x. Elix. aperit. Claud.

Tr. Sabinæ ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle 2—4 Stunden 30—60 Tropfen.

(Gegen Amenorrhoea paralytica. Die Tr. Sabinæ wird aus 2—3 Unzen Fol. Sabinæ und 12 Unzen Spir. Vini rectific. bereitet.)

Schreger.

No. 445.

- R_x. Pulv. Hb. Sabinae $\mathfrak{I}\text{V}$.
Extr. Sabinae $\mathfrak{I}\text{ij}$.
Ol. aeth. Sabinae gtt. XXX.

M. f. Pil. No. LX. D.

S. Dreimal täglich 5 Pillen.

(Wie bei No. 444.)

v. *Wedekind.* (verbessert von *Sundelin.*)

No. 446.

- R_x. Extr. Fol. Taxi gr. j — xjj.
Calomel. gr. j — jjj.
Sacch. alb. gr. XV.
Ol. destill. Sabinae gtt. jj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 444.)

Hartmann.

No. 447.

- R_x. Boracis
Nitri dep. ana $\mathfrak{I}\text{j}$.
Magnes. alb. $\mathfrak{I}\text{j}\beta$.
Sacch. alb. $\mathfrak{I}\text{ij}$.

M. f. Pulv. D. S. Stündlich einen Theelöffel.

(Gegen unterdrückte Menses und Lochien. —
Bei gleichzeitigem Krampf kann man einen
Gran Opium hinzusetzen.)

Sprögel.

Fehler der Verdauung.

(Insofern eine vorhergegangene Krankheit die Ursache zu Leiden der Verdauung giebt, sind schon bei jenen mannichfache Mittel angegeben worden.)

N^o. 448.

R^x. Pulv. Lign. Quassiae ʒβ.
inf. c.

Aq. Calcis vivae ʒvj.
stent in digestione per horas XXIV.

Ebull. paulisp. Col. adde

Aq. Menth. pip. ʒjj.

Syr. Cort Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel.

(Gegen Magenschwäche.)

Richter.

N^o. 449.

R^x. Pulv. Lign. Quass. ʒjj.

— Cort. Cinnamom. ʒj.

Extr. Lign. Quass. q. s.

ut f. pil. pd. gr. II.

Consp. pulv. Cinnam.

D. S. Vor und nach dem Essen jedesmal 10 Pillen.

(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 450.

R^x. Lign. Quass.

Cort. Chin. reg. ana ʒj.

gross. pulv. stent in infus.

frig. per XXIV hor. cum

Aq. font. (vel. Aq. Cort. Aurant.) ℥ jj.

Aq. Cinnamom. ʒIV.

Col.

D. S. Zweimal täglich 1—2 Esslöffel.
(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 451.

Ry. Lign. Quassiae ʒj.
Cort. Cinnamon. ʒj.
Sacch. alb. ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes X aeq.
D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 452.

Ry. Extr. Taraxaci
— Graminis ana ʒj.
— Gentianae ʒj.
solve in
Aq. Cort. Aurant. ʒvj.
adde
Liq. anodyn. Hoffm.
Syr. Cinnamomi ana ʒβ.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 448.)

Hecker.

N^o. 453.

Ry. Extr. Centaurii minoris
— Gentianae ana ʒj.
Ferri oxydulati nigri ʒβ.
Syr. Cort. Aurant. q. s.
ut f. pil. pd. gr. II.
D. S. Zu 12 Pillen pro Dosi.
(Wie bei No. 448.)

Tissot.

N^o. 454.

Ry. Extr. Absynth.
Hb. Gentianae

Hb. Centaur. min.

Kali subcarbonici ana $\bar{\text{ʒ}}\beta$.Cort. Aurant. rec. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.C. C. digere cum Spir. Vini Cong. $\frac{1}{4}$ et Col.

D. S. Zu 90 — 100 Tropfen pro Dosi.

(Wie bei No. 448.)

*Tissot.*N^o. 455.Ry. Pulv. Cort. Chinae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.— Caryophyllor. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.Vini rhenani \mathcal{R} II.

Digere per XXXXVIII horas in vas. claus. Col.

D. S. Dreimal täglich ein kleines Glas voll.

(Wie bei No. 448.)

*Tissot.*N^o. 456.Ry. Cort. Chinae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.Rad. Gentianae rubr. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.Cort. Aurant. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.Vini alb. \mathcal{R} IV.

Digere per II dies. Cola et adde

Syr. Caryophyllor. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. (Wie bei No. 455.)

*Tissot*N^o. 457.Ry. Rad. Calami aromat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

— Gentianae

Fruct. Aurant. immat. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

D. S. Mit 2 Flaschen Burgunder an der Sonne digerirt, und täglich zweimal 1 — 2 Esslöffel zu nehmen.

(Wie bei No. 448.)

*Hecker.*N^o. 458.Ry. Cort. Aurant. $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.

Contus. in mort. marm. in

mass. pulviformis. Adde

Extr. Gentianae rubr. $\bar{3}\beta$.

M. digere cum Vini hispanici $\bar{8}$ j.

Col. D. S. Zu einem Löffel voll (mit Wein oder Wasser) zu nehmen.

(Wie bei No. 447. — Elixirium stomachicum
Rosensteinii.) *Rosenstein.*

N^o. 459.

R_x. Elix. visceral. Kleinii

Tr. Rhei aq. ana $\bar{3}j$.

Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}j$.

M. D. S. Drei bis viermal täglich einen Esslöffel.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitiger Verstopfung.) *Klein.*

N^o. 460.

R_x. Rad. Columb. $\bar{3}j$ jj.

Sal. ammon. dep.

Rad. Zingiberis ana $\bar{3}j$.

Elaeosacch. Menth. pip. $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

(Gegen Magenschwäche mit Schleim.) *Hecker.*

N^o. 461.

R_x. Extr. Cort. Angustur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}lv$.

adde

Tr. Valer. $\bar{3}j$ jj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Gegen torpide Magenschwäche.) *Hecker.*

N^o. 462.R_x. Extr. Absynth.

— Trifol. fibr. ana ʒj.

solve in

Aq. Menth. pip. ʒiv.

Tr. Cort. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Dreimal täglich einen Theelöffel voll mit rothem Wein zu nehmen.

(Wie bei No. 461.)

Richter.

N^o. 463.R_x. Pulv. Rad. Gentianae rubr.

— — Zedoariae ana ʒjj.

— — Columb.

— Lign. Quass. ana ʒβ.

— Cort. Aurant. ʒj.

— — peruv. ʒj.

inf. c.

Vini alb. generos. ℞ III.

Stent loco tepid. saep. agitando. Decant.

S. Viermal täglich ein Weinglas voll.

(Wie bei No. 461.)

Richter.

N^o. 464.R_x. Chocolat. c. Sacch. et Vanill. parat. ʒj.

terendo in mortar. adde

Pulv. Rad. Ipecacuanhae ʒj.

M. f. l. a. pasta, ex qua f. tab. No. LX.

D. S. Zweimal täglich ein Zeltchen.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitigen Blähungen.)

Richter.

N^o. 465.R_x. Pulv. Rad. Ipecacuanhae ʒj.

Catechu ʒj.

Ambrae griseae gr. jii.

Sacch. alb. $\bar{3}j$.

M. f. l. a. c. suff. qt. G. arab.

Trochisci No. LX.

D. S. Täglich ein Zeltchen; steigend.

(Gegen Magenschwäche mit gleichzeitigem Durchfall.) *Richter.*

N^o. 466.

R. Magnes. alb. $\bar{3}j$.

Sacch. alb.

Rad. Liquiritiae ana. $\bar{3}jj$.

Sem. Foeniculi

Cort. Aurantior. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Vier bis fünfmal täglich einen Theelöffel.
(Gegen Säure. S. No. 262.) *Rosenstein.*

N^o. 467.

R. Rad. Valer. min. $\bar{3}j$.

— Irid. florent. $\bar{3}1\beta$.

— Liquirit. $\bar{3}jj$.

Sem. Anisi $\bar{3}\beta$.

Crocī oriental. gr. vjjj.

Magnes. carb. $\bar{3}j$.

M. f. Pulv. D. ad scatul.

S. Zwei bis dreimal täglich (und öfter) eine Messerspitze voll.

(Wie bei No. 466.)

Hufeland.

N^o. 468.

R. Magnes. carb. $\bar{3}\beta$.

Rad. Rhei $\bar{3}j$.

Rad. Valer. sylv. $\bar{3}j$.

Elaeosacch. Foeniculi $\bar{3}jj$.

M. f. Pulv. D. S. Zu einer Messerspitze.

(Wie bei No. 466. Auch gegen Blähungen, Kolik, Unruhe, Schlaflosigkeit, Verschleimung,

Durchfall, Verstopfung u. s. w. bei kleinen Kindern empfohlen, und insofern diese Erscheinungen von Säure herrühren, sehr passend.)

Hufeland.

N^o. 469.

R_x. Aq. Foeniculi ʒj.
Syr. de Cichor. c. Rheo ʒVIIβ.
Tr. Rhei aq.
Pulv. Lapid. Cancror. ana ʒβ.
Crocī oriental. gr. IV.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 468.) *Hufeland.*

N^o. 470.

R_x. Sal. alcal. mineral. puriss. sicc.
pulv. et aq. sua crystall. orbatī ʒjj.
Crystall. Tart. ʒVI.
Sacch. alb. opt. sicc. (Sacch. Lact.) ʒβ.

M. D. S. Alle vier Stunden einen Kaffeelöffel voll, in einem Glase Brunnenwasser, umgerührt schnell zu trinken.

(Wie bei No. 466.) *Vogler.*

N^o. 471.

R_x. Magnes. Sal. amar. ʒj.
Rad. Ipecacuanhae gr. jiiij.
Sacch. alb. ʒvjj.
Ol. de Cedro (vel Anisi) gtt. VII — XII.

M. f. Pulv. Det. ad vitr.

S. Täglich zwei bis viermal eine Messerspitze voll.
(Wie bei No. 466. Auch gegen Fluor albus, Keuchhusten, Nachtripper, Harnblasen-Hämorrhoiden, und Fehler der Harnwege empfohlen.)

Vogler.

N^o. 472.

- R_y. Elix. acid. Halleri ʒβ.
 Decoct. Salep. ʒv.
 Syr. Rubi Idaei ʒj — Ib.

M. D. S. Während des Anfalls alle halbe Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Pyrosis.)

Seiler.

N^o. 473.

- R_y. Sap. med. ʒjj.
 Extr. Lign. Quass.
 Fell. Tauri inspissat. ana ʒj.
 Extr. Cort. Aurant.
 — Aloës aq. ana ʒj.

M. f. pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Im Anfall 8 Pillen.

(Wie bei No. 472.)

Richter.

N^o. 474.

- R_y. Kali carb. ʒjjj.
 Extr. Absynth. ʒjj.
 Aq. Ment. pip. ʒjjj.

M. D. S. Im Anfall Esslöffelweise.

(Wie bei No. 472.)

Richter.

N^o. 475.

- R_y. Magnes. Sal. commun.
 Sal. essent. Tart. ana ʒj.

M. D. ad scat. S. Alle zwei Stunden einen halben Theelöffel in einer halben Tasse Wasser während des Aufbrausens zu nehmen.

(Wie bei No. 466.)

Hufeland.

N^o. 476.

- R_y. Sap. venet. ʒj.
 Magnes. alb. ʒiβ.
 Rad. Rhei opt. ʒβ.
 Crem. Tart. ʒj.
 Sacch. alb. ʒjjj.
 M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.
 (Wie bei No. 466.)

*Stark.*N^o. 477.

- R_y. Conchar. ppt.
 Tart. vitriolat.
 Kali nitrici ana ʒj.
 M. f. Pulv. subtiliss. D.
 S. Täglich zwei bis dreimal einen Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 466.)

*Unzer.*N^o. 478.

- R_y. Chocolat. ʒjj.
 Magnes. calcinat. ʒj.
 Sacch. alb. ʒv.
 M. f. Trochisci pd. gr. XXIV.
 D. S. Im Anfall zu 1—2 Stück.
 (Wie bei No. 466.)

*Chevalier. (Hufeland.)*N^o. 479.

- R_y. Magnes. carb. ʒj.
 Lap. Cancr. ppt. ʒβ.
 Cort. Cinnamom. ʒj.
 Sacch. alb. ʒvj.
 pulv. f. c. Mucilag. G. arab. q. s.
 Trochisci gr. X. D.
 S. Drei bis viermal täglich ein Zeltchen.
 (Wie bei No. 466.)

J. A. Schmidt.

N^o. 480.R_x. Ol. Tart. per deliq. ʒβ.

Aq. Foeniculi ʒijj.

M. D. S. Morgens und Abends 80—90 Tropfen
oder einen Esslöffel,

(Wie bei No. 466.)

*Stark.*N^o. 481.R_x. G. Ammon.

Extr. Tarax.

Sap. venet. ana ʒj.

Asae foet.

Aloës ana ʒβ.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Gegen Schleim im Magen und Darmkanal.

Auch gegen Gicht empfohlen, S. auch No. 460.
468. 469.)*Jahn.*N^o. 482.R_x. Sap. venet.

Pulv. Rad. Rhei

G. Ammoniaci ana ʒjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Zweimal täglich 5 Pillen.

(Gegen Schleim im Magen und Darmkanal.)

*Richter.*N^o. 483.R_x. G. Guajaci ʒj.

Res. Jalapp. gr. X.

Calomel. gr. VI.

M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s.

Pil. pd. gr. II. D.

- S. Dreimal täglich 3 Pillen.
(Wie bei No. 482.)

Richter.

N^o. 484.

- R_x. Lign. Quassiae
Rad. Gentianae ana ʒj.
Elaeosacch. Menth. pip.
— Foeniculi ana ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.
D. S. Viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Blähungen. S. auch No. 464. 468. 469.)
M. J. Schmidt.
-

N^o. 485.

- R_x. Magister. Bismuth. gr. jj — jiiij.
Magnes. alb. gr. IV.
Elaeosacch. Anisi (Sacch. alb.) gr. vjjij.
(Rad. Ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$.)
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Täglich viermal ein Pulver.
(Gegen Ekel und Erbrechen. Wo Säure die
Ursache ist, s. No. 466 — 480.)

Kopp.

N^o. 486.

- R_x. Mixt. River. ʒiβ.
Tr. thebaicae ʒβ.
M. D. S. Alle drei Stunden 25 — 30 Tropfen in
Melissenthee.
(Wie bei No. 485.)

Stark.

N^o. 487.

- R_x. Essent. Ambrae ʒj.
Elix. Vitriol. Mynsicht. ʒjj.

- M. D. S. Drei bis viermal täglich 20 — 30 Tropfen.
(Gegen Vomitus Gravidarum, wo keine entzündliche Plethora ist.) *Waiz.*
-

N^o. 488.

- R_x. Rad. Columb. ʒj.
Opium puri gr. ʒj.
Elaeosacch. Menth. crisp. ʒj.
M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver in Wasser zu nehmen.
(Gegen Erbrechen. Aeusserlich Lin. volatil. und Tr. Opium zum Einreiben in die Magengegend.) *Vogel.*
-

N^o. 489.

- R_x. Tr. Cort. Aurant. ʒβ.
— Aloës
— Castor. ana ʒj.
M. D. S. Drei bis viermal täglich 50 Tropfen in Wasser.
(Wie bei No. 488.) *Vogel.*
-

N^o. 490.

- R_x. Nucis moschat. gr. ʒjʒ — IV.
Sacch. alb. ʒj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver in Wasser.
(Wie bei No. 488.) *Vogel.*
-

N^o. 491.

- R_x. Spir. Rorismarini ʒj.
Ol. Anisi gtt. vj.
M. D. S. Auf Löschpapier getropft, und auf die Magengegend zu legen.
(Besonders gegen das Erbrechen durch Fahren.) *Vogel.*

N^o. 492.

- R_x. Ol. Hyoscyami
 — Papav. alb. ana $\bar{3}\beta$.
 Liq. C. C. succ.
 Laud. liq. Syd. ana $\bar{5}\text{jj}$.
 M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben in die Magen-
 gegend.
 (Gegen das Erbrechen von der Seekrankheit.)
Krampf.

N^o. 493.

- R_x. Empl. de Galbano crocat. $\bar{3}\text{j}$.
 Camphorae $\bar{3}\text{j}$.
 Sal. vol. C. C.
 Opii puriss. ana $\bar{3}\beta$.
 Ol. Cajeput. gtt. XL.
 M. D. S. Auf Leder gestrichen, auf die ganze Ma-
 gengegend zu legen.
 (Wie bei No. 492.) (*Hufeland's Journal.*)

N^o. 494.

- R_x. Extr. Belladonnae gr. jj .
 solve in
 Aq. Laurocerasi $\bar{5}\text{jj}$.
 M. D. S. Dreimal täglich 40—50 Tropfen.
 (Gegen Erbrechen von Magenerweichung.)
Hufeland.

N^o. 495. a)

- R_x. Sal. Tart. acet. $\bar{3}\beta$.
 Extr. Cicut. $\bar{3}\beta$.
 — Nuc. vom. gr. xvj.
 — Tarax. $\bar{5}\text{jj}$.
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}\text{vj}$.
 Syr. Tarax. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Zugleich b)

R_x. Hb. Belladonnae gr. ĳĳ .

Sacch. alb. ĳ .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Alle Abende (oder einen Tag um den andern)
ein Pulver.

(Wie bei No. 494.)

Schmidtmüller.

N^o. 496.

R_x. Acid. pyro-lignos. ĳ .

Aq. flor. Naphae ĳĳ .

Syr. emulsiv. ĳ .

M. D. S. Alle Stunden einen halben Esslöffel.

Zugleich Gerstenschleim, Zuckerwasser, Fenchel- und
Anisthee.

(Gegen Gastromalacie. Besonders bei Kindern.)

Pittschafst.

N^o. 497.

R_x. Acidi nitrici dil. gr. IV — V.

Mucilag. G. arab. Vascul. Theae.

D. S. Vier bis fünfmal täglich pro Dosi.

(Wie bei No. 496.) *Nasse. (Wiesmann.)*

N^o. 498.

R_x. Decoct. Rad. Althaeae ĳĳ .

G. arab. ĳĳ .

Ferri muriat. ĳ .

Syr. Althaeae ĳv .

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel. Zu-

gleich auf den Kopf kalte Umschläge; auf die

Magengegend warme Umschläge mit Cort. Chin.

rubr., Cort. Salicis, Cort. Hippocast., Spec. aro-

mat. und rothem Wein.

(Wie bei No. 496.)

Pommer.

N^o. 499.

Ry. Empl. Theriaci $\bar{5}$ jj.
Morphii acet. gr. vj.

M. D. S. Auf Leder gestrichen, auf die Magen-
gegend zu legen.

(Wie bei No. 496.)

Margot.

N^o. 500.

Ry. Sap. venet. $\bar{3}\beta$.
Extr. Cicut. $\bar{5}$ jj.
Aeth. antim. $\bar{5}$ j.
Fell. Tauri inspiss. ana $\bar{5}\beta$.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Täglich drei bis viermal 8—10 Pillen.

(Gegen Induratio Pylori.)

Pezold.

N^o. 501.

Ry. G. Ammoniaci
Kali acet. s. Acet. squill.
q. s. ad. solut. et. inspiss. ana $\bar{5}$ jjj.
Sap. venet.

Pulv. Rad. Rhei

Extr. Chelidon. maj.

— Trifol. fibr.

Fell. Tauri inspissat. ana $\bar{5}$ j.

Extr. Lactuca^e viroae $\bar{3}\beta$.

Calomel.

Sulph. aurat. Antim. ana gr. XV.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Irid. florent.

D. S. Täglich zweimal 6—8 Pillen.

(Gegen Gekrösstockungen. Zugleich ein eisen-
haltiges Mineralwasser.)

Scheu.

B l e n n o r r h ö e n .

N^o. 502. a)R_x. Pulv. Rad. Columb.

Lign. Quassiae ana ʒβ.

Rad. Ipecacuanhae ʒβ.

Tr. thebaicae q. s.

ut. f. Pil. No. XV.

D. S. Abends 3 Pillen.

Zugleich b)

R_x. Infus. Lign. Quassiae ʒiβ.

Tut. praep. ʒβ.

Tr. thebaic. gtt. jiiij.

M. f. Haustus. D. S. Dreimal täglich pro Dosi.

(Gegen Diarrhoea. — S. No. 250, 442, 465, 468,

469, und die zur Dysenterie angegebenen Mittel.)

Lettsom.

503.

R_x. Cort. Querc.

— Granator.

— Tormentill. ana ʒjj.

Coq. c. Aq. font.

Lact. vaccin. ana ʒj.

per $\frac{1}{4}$ hor. In fin. coct. adm.

Cort. Cinnamon. contus. ʒjj.

Col. D. S. Zwei bis viermal täglich $\frac{1}{2}$ Tasse.

(Wie bei No. 502.)

*Swediaur.*N^o. 504.R_x. Extr. Gentianae ʒiβ.

Spec. diatragacanth. ʒβ.

Pulv. Terrae japon. ʒjj.

Opii gr. jiiij — IV.

Spir. Vitrioli acid. gtt. xjj.

L 1

No. 509.

- R. Rad. Salep. ʒβ.
 Coq. c. Aq. ft. ʒvjij.
 Col. adde
 Sal. Ammoniacy ʒj.
 Tr. Rhei aq. ʒj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒj.
 Syr. Diacodii ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 502.) *Stark.*

No. 510.

- R. Spir. Juniperi ʒij.
 Ol. destill. Caryophyll.
 Bals. Nucis moschat. ana ʒβ.

M. D. S. Täglich dreimal in den Rücken einzu-
 reiben.
 (Wie bei No. 502.) *Rosenstein.*

No. 511.

- R. Aq. Anhaltin. spir. ʒij.
 Tr. Bals. peruv.
 — — Nucist. ana ʒβ.
 Ol. Menth. pip.
 — Caryophyll. ana gtt. xjj.

M. D. S. Morgens und Abends den Unterleib da-
 mit einzureiben, und nachher eine warme Ser-
 viette aufzulegen.

(Wie bei No. 502.) *Fr. Hoffmann.*

No. 512.

- R. Ol. Nucis mosch. express. ʒiβ.
 — destill. Mastiches
 — — Menth. pip.

- Ol. destill. Carvi
 Bals. peruv. ara gtt. vj.
 M. D. S. Morgens und Abends etwas in die Ma-
 gengegend einzureiben.
 (Wie bei No. 502.) *Heister.*
-

N^o. 513.

- R_x. Empl. de Tacamahac. ℥j.
 Bals. peruv. q. s.
 Malax. S. Wie bei No. 512. *Vogel.*
-

N^o. 514.

- R_x. Extr. Columb. ℥j.
 Bals. Nuc. mosch. expr. ℥β.
 Laud. liq. Sydeuh. gtt. XX—XXX.
 Camphorae ℥β.
 M. D. S. Als Pflaster auf den Unterleib.
 (Wie bei No. 502. — Besonders für Kinder.)
Vogel.
-

N^o. 515.

- R_x. Vitell. ovi unius
 G. arab. ℥j.
 Aq. flor. Chamomill. ℥iv.
 M. D. S. Zum Clystir.
 (Gegen epidemischen Durchfall.)
v. Hildenbrandt.
-

N^o. 516.

- R_x. Sal. ammon. dep. ℥j.
 solve in
 Aq. flor. Chamomill. ℥j.
 Mucilag. G. arab. ℥j.
 adde

Tr. Rhei aq. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Esslöffel.

(Wie bei No. 515.)

Richter.

N^o. 517.

Ry. Tr. Rhei. aq. $\mathfrak{z}\jmath$.

Aq. flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.

Ol. Oliv. c. s. g. vitell, ov. subact.

Syr. opiat. ana $\mathfrak{z}\nu\jmath$.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 515. Besonders gegen heftige Schmerzen.)

Richter.

N^o. 518.

Ry. Amygdal. dulc. excort.

Sem. Papav. alb. ana $\mathfrak{z}\beta$.

Mucilag. G. arab. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.

ter. aff. sensim

Aq. fl. Sambuci $\mathfrak{z}\nu\jmath\jmath$.

f. l. a. Emulsio.

Adde

Syr. opiat. $\mathfrak{z}\jmath$.

M. D. S. Halbe Theetassenweise.

(Besonders gegen wässrigen Durchfall.)

Richter.

N^o. 519.

Ry. Gummi arab.

Flor. Chamomill, ana gr. xv.

Rad. Rhei gr. IV.

— Ipecacuanhae gr. β .

Croci oriental. gr. $\jmath\jmath$.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.

(Gegen wässrigen Durchfall mit gleichzeitigen
Leibschmerzen.) *Richter.*

N^o. 520.

R_x. Decoct. Rad. Althaeae
ex $\mathfrak{D}\text{IV}$ parat. $\mathfrak{Z}\text{ijj}$.
Extr. Dulcamar. gr. vjij .
Laud. liq. Sydenh. gtt. jj .
Syr. Diacodii $\mathfrak{Z}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
(Gegen katarrhalischen Durchfall. Besonders
bei Kindern.) *Gölis.*

N^o. 521.

R_x. Spir. Minderer.
Aq. flor. Sambuci ana $\mathfrak{Z}\text{ii}\beta$.
Tr. Aurant. $\mathfrak{Z}\beta$.
Syr. Diacod. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.
(Gegen katarrhalischen und rheumatischen
Durchfall.) *Vogel.*

N^o. 522.

R_x. Camphorae $\mathfrak{Z}\beta$ — $\mathfrak{Z}\text{j}$.
Pulv. G. arab.
Elaeosacch. Cinnamom. ana $\mathfrak{Z}\text{jj}$.
solve trit. in
Aq. Menth. pip. $\mathfrak{Z}\text{vj}$ — vjij .

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 521.) *Vogel.*

N^o. 523.

R_x. G. arab. $\mathfrak{Z}\beta$ — j .
Sacch. alb. $\mathfrak{Z}\text{jj}$.

Aq. Foeniculi $\bar{3}vj$.Spir. Minderer. $\bar{3}ij$.Tr. thebaic. $\bar{3}\beta - j$.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 521.)

*Vogel.*N^o. 524.R_y. Aq. flor. Sambuci $\bar{3}iv$.

Liq. Ammon. acet.

Syr. Amygdal. ana $\bar{3}j$.Roob Sambuci $\bar{3}jj$.Vini stib. $\bar{3}j$.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 521. Besonders bei gleichzeitigem
Fieberzustand.)*Richter.*N^o. 525. a)R_y. Sacch. Saturn.

Opii puri ana gr. jj.

Elaeosacch. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in partes XII aeq.

D. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver.

(Gegen colliquative Diarrhoea.)

*Vogel.*N^o. 525. b)R_y. Tereb. puriss. vitell.ov. int. subact. $\bar{3}\beta$.Elect. theriac. $\bar{3}\beta$.Lact. vaccin. rec. $\bar{3}iv$.M. D. S. Zum Clystir. (Der Kranke soll auf der
linken Seite liegen, und so lange als möglich das
Clystir bei sich zu behalten suchen.)

(Wie bei No. 525. a.)

van Swieten.

N^o. 526.

R_x. Decoct. Althaeae (vel Rad. Salep.) $\bar{3}$ jj.
Laud. liq. Syd, gtt. jj.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel.
(Gegen Diarrhoea infantum. S. No. 520.)

Gölis.

N^o. 527.

R_x. Elect. de Scord. $\bar{3}$ jj.
Tr. Cort. Aurant. (vel Tr. aromat.) $\bar{3}$ jjj.
Aq. Cinnamomi $\bar{3}$ IV.

M. D. S. Zu 1 — 2 Theelöffel mit Syrup.
(Wie bei No. 526.)

Weikard.

N^o. 528.

R_x. Calomel. gr. j.
Sacch. alb. $\bar{3}$ j.

M. f. Pulv. Divide in partes X (aut VIII) aeq.
D. S. Zwei bis dreimal täglich ein Pulver.

(Wie bei No. 526. Wenn grüne Stühle ab-
gehen, ist die Prognosis günstig zu stellen.)

Kopp.

N^o. 529.

R_x. Ol. Amygdal. dulc.
Pulv. G. arab.
Syr. Amygdal. ana $\bar{3}$ jj.
Aq. Cinnamom. s. v. $\bar{3}\beta$.
— Foeniculi $\bar{3}$ j.

M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Theelöffel.
(Gegen Diarrhoea infantum vom Zahndurch-
bruch.)

Richter.

N^o. 530.

- R_x. Extr. Gentianae rubr. ʒiiβ.
 Pulv. Squillae comp. Stahlii
 — G. ammoniaci ana ʒjj.
 Magnes. Nitri ʒβ.
 Sulph. aurat. Antimon. gr. xv.
 M. f. c. Spir. Vin. suff. qt. Pil. No. C.
 D. S. Täglich 5—7 Pillen.

(Gegen chronische Diarrhöe und Lienterie;
 besonders mit Infarctus der Eingeweide.)

Vogler.

N^o. 531.

- R_x. Conserv. Rosar. ʒvj.
 Theriaci ʒjjj.
 Pulp. Cydonior. q. s.
 ut. f. Elect. D.

S. Einigemal täglich ein Loth, ohne etwas nachzu-
 trinken.

(Gegen Lienterie.)

(P. Frank.)

N^o. 532.

- R_x. Cort. peruv. pulv. ʒjj.
 — Aurant. pulv.
 Rad. Serpentar. virg. pulv. ana ʒi.
 inf. c. Vin. lisbon. ℥jj. per IV dies.
 Col. admisce
 Aq. Cinnamom. vinos. ℥β.
 Spir. Lavandulae comp. ʒjj.

M. D. S. Alle 4—5 Stunden zwei bis drei Ess-
 löffel.

(Wie bei No. 531.)

Tompson.

N^o. 533.

- R_x. Limaturae Martis alcohol.
 Cort. Cinnamom. ana gr. xjj.

Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. f. Pulv. Divide in partes XII aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 531.)

Bucholz.

N^o. 534.

Ry. Spir. Juniperi $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.

Bals. moschat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Ol. Nuc. moschat. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Wiederholt in das Rückgrat einzureiben.

(Wie bei No. 531.)

Abhandl. f. pr. Aerzte. Bd. XXII.

N^o. 535.

Ry. Aq. flor. Sambuci $\bar{\text{ʒ}}\text{iv}$.

Pulv. Rad. Ipecacuanhae gr. j.

Nitri dep. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Spec. diatragacanth. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Spir. Vitriol. acid. gtt. XV.

Ol. Olivar. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.

(Gegen Cholera.)

Vogler.

N^o. 536.

Ry. Camphorae $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.

solve in

Liq. an. min. Hoffm. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden 20 Tropfen. (Zugleich

kalt Wasser zu trinken, bis das Erbrechen aufhört.)

(Wie bei No. 535.)

Bang.

N^o. 537.

Ry. Empl. Bacc. Laur. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Camphor.

Sal. vol. C. C. ana ʒβ.

Laud. pur. ʒj.

Ol. Nuc. mosch. express. ʒjj.

Ol. Menth. pip. ʒβ.

Ol. Caryophyll. ʒj.

Malax. D. S. Auf die Magengegend.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 538.

Rx. Liniment. saponat. ʒvj.

Tr. thebaicae ʒjj.

M. D. S. In die Magengegend einzureiben.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 539.

Rx. Camphor. (in Ol. Oliv. ʒjj. sol.) ʒj.

Tr. thebaicae ʒβ.

M. D. S. In die Magengegend einzureiben.

(Wie bei No. 535.)

Lind.

N^o. 540.

Rx. G. arab. ʒj.

Vitell. ovor. ʒiβ.

Aq. Foeniculi ʒiβ.

Ol. Amygdal. dulc. ʒβ.

Tr. thebaic. gtt. xv.

Syr. emuls. ʒvj.

M. D. S. Alle halbe Stunden 1 — 2 Theelöffel.

(Gegen Cholera vom Zahnen, bei Kindern.)

Vogel.

N^o. 541.

Rx. Tr. Asae foet. ʒvj.

Sulph. aurat. Antim. ʒiiβ.

- Ol. Tereb. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 30 Tropfen.
 (Gegen Icterus.)

*Herz.*N^o. 542.

- Ry. Acidi phosphorici ʒj.
 Infus. Hb. Theae ℥j.
 M. D. S. Tassenweise.
 (Wie bei No. 541.)

*Caleb Miller.*N^o. 543.

- Ry. Summitat. Absynth. ʒvj.
 inf. Aq. f. q. s.
 Col. ʒvjjj. adde
 Sal. Tart. gr. xxx.
 Tr. Mart. tart.
 — Succini ana ʒjj.
 Spir. Juniperi ʒjjj.

- M. D. S. In vier Portionen auf einen Tag zu ver-
 brauchen.
 (Wie bei No. 541.)

*Pringle.*N^o. 544.

- Ry. G. Ammoniaci
 Fell. Tauri inspiss.
 Extr. Arnicae ana ʒjjj.
 — Anagallidis ʒβ.
 M f. Pil. pd. gr. jj.
 D. S. Täglich dreimal 15—20 Pillen.
 (Wie bei No. 541.)

*Stoll.*N^o. 545.

- Ry. G. Ammoniaci ʒiv.
 Pulv. Rad. Rhei ʒjj.

Pulv. alt. Plummer. ℥j.

Sap. med. ℥jj.

Extr. Cicutae ℥j.

— Chelidonii maj. ℥jj.

M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. rad. Liquirit.

D. S. Morgens und Abends 10 — 12 Pillen.

(Wie bei No. 541. Besonders bei Leberver-
härtung.) *Flemming.*

N^o. 546.

R_x. Sap. venet.

Extr. Chamomill. ana ℥jj.

Limatur. Ferri ℥β — 1β.

M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Wie bei No. 541.) *Theden.*

N^o. 547.

R_x. Pulv. Rad. Ipecacuanhae ℥1β.

— Cort. Aurant. ℥jj.

Crem. Tart. ℥β.

ebull. paulisp. c.

Aq. font. ℥1V.

Col. adde

Syr. flor. Chamomill. ℥j.

M. D. S. Alle 3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 541.) *Baldinger.*

N^o. 548.

R_x. Kali nitrici ℥jj.

Crem. Tart. ℥j.

Extr. Opii gr. jj.

- solve in
 Aq. font. $\bar{3}$ jj.
 adde
 Syr. Papav. $\bar{3}\beta$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 541.) *Vogler.*
-

N^o. 549.

- R \bar{y} . Tart. solub. $\bar{3}\beta$.
 Extr. Graminis
 (vel Taraxaci vel Sap.) $\bar{3}$ jj.
 solve in
 Aq. font. $\bar{3}$ vj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 1—2 Esslöffel.
 (Gegen Icterus mit Unterleibs-Stockungen.)
Richter.
-

N^o. 550.

- R \bar{y} . Sap. venet. $\bar{5}$ jj.
 Extr. Tarax. $\bar{3}\beta$.
 Tr. Rhei aq. $\bar{3}$ jj.
 Aq. Ment. pip. $\bar{3}$ vjjj.
 Syr. Cert. Aurant. $\bar{3}\beta$.
 M. D. S. Alle halbe Stunden eine halbe Thee-
 tasse voll.
 (Wie bei No. 549.) *Richter.*
-

N^o. 551.

- R \bar{y} . Rad. Rub. tinctor.
 — Curcum. ana $\bar{5}$ j.
 Hb. Chelidon. maj.
 Summit. Centaur. min. ana M. I.
 Coq. in Vini rhen. et Aq. ft. ana $\bar{8}$ j.
 Col. adde
 Syr. rad. quinque aperient. $\bar{3}$ jj.

M. D. S. Morgens und Abends ein halbes Pfund
zu trinken.

(Wie bei No. 549.) *Sydenham.*

N^o. 552.

R_x. Tart. stib. gr. x.
G. Ammoniaci
Sap. venet. ana ʒj.
Extr. Cicutae
— Chelidon. maj.
— Aloës aq. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.

D. S. Täglich dreimal 8 Pillen.

(Wie bei No. 549; bei gleichzeitigem Torpor.)

Richter.

N^o. 553.

R_x. Liq. Terrae Fol. Tart. ʒj.
Extr. Aloës aq. ʒj.

M. D. S. Viermal täglich 2 Esslöffel.

(Wie bei No. 552.)

Richter.

N^o. 554.

R_x. Aloës succotr.
Pulv. Rad. Rhei ana ʒiβ.
Asae foet. ʒj.
Sap. venet. ʒvj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consperg.

D. S. Täglich dreimal 4 Pillen.

(Wie bei No. 552.)

Richter.

N^o. 555.

R_x. Sal. Herb. dep. ʒj.
Aceti Vini. q. s. ad sat.

- Aq. Cerasor. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Mellag. Graminis
 Oxymell. squill. ana $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 Vini Antimon. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 M. D. S. Esslöffelweise.
 (Gegen Icterus von Verschleimung der ersten
 Wege.) *Jahn.*

N^o. 556.

- Ry. Rad. Ipecacuanhae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ — $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Inf. per $\frac{1}{4}$ hor. c.
 Aq. fervid. $\bar{\text{ʒ}}\text{IV}$.
 Col. admisce
 Syr. Althaeae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Icterus ex spasm.) *Richter.*

N^o. 557.

- Ry. Ferri carb.
 Flor. Sulph.
 Crem. Tart. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Sacch. alb. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 M. f. Pulv. D.
 S. Dreimal täglich einen Theelöffel.
 (Gegen Icterus von zurückgetretenen Exanthe-
 men, mit gleichzeitigem Leiden des Uterus.)
Bluff.

N^o. 558.

- Ry. Sal. mirab. Glaub. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Extr. Tarax. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ — jj .
 Aq. font. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ — jj .
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Icterus Neonatorum mit Stuhlverhal-
 tung.) *Gölis.*

N^o. 559.

- R_x. Extr. Cicutae ʒj.
 — Hyoscyami ʒβ.
 Pulv. Hb. Belladonnae ʒj.
 Liq. ammon. acet. q. s. ad consist.
 Empl. ten.

D. S. Die Hälfte auf Leder gestrichen, in die Lebergegend zu legen.

(Gegen Icterus.)

Richter.

N^o. 560.

- R_x. Sal. Friderici contr. ʒj.
 Sap. venet. ras, ʒβ.
 Sem. Lini contus. ʒiβ.
 Ras. Pan. ʒxjj.
 Coq. c. aq. font. q. s. ad
 Consist. Cataplasma.

D. S. In die Lebergegend.

(Wie bei No. 559. Auch gegen Kolik.)

Vogler.

N^o. 561.

- R_x. Acidi nitrici
 — muriat. ana ʒj — iβ.

M. D. S. Zu einem Bad. (Für Kinder ʒβ — j.)
 (Gegen Icterus. Auch gegen Gallensteine empfohlen. — Dasselbe Bad bleibt drei bis viermal brauchbar; die Menge der Säuren aber muss nach den einzelnen Fällen zuweilen vermindert werden.)

Scott. (Hall. Bernhardt.)

N^o. 562.

- R_x. G. Kino ʒjj.
 Camphorae ʒβ.

Pulv. aromat. ℥j.

Flor. Zinci ℥β.

M. f. Pil. No. XX.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. (Zugleich ein Infusum Valerianae, und täglich eine halbe Unze Tr. G. Kino.)

(Gegen Diabetes.)

Shee.

N^o. 563.

Ry. Rad. Sarsaparill. ℥vj.

Uvar. Corinth. concis. ℥vjij.

Coq. ex Aq. ft. ℥ XII. ad ℥ VI.

In Col. extingue

Calcis vivae ℥β.

M. D. S. Dreimal täglich 3 Unzen.

(Wie bei No. 562.)

Fuller.

N^o. 564.

Ry. Myrrhae elect. ℥β.

G. Galbani

Extr. Trifol. fibr.

Terrae jap. ana ℥jj.

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens, Mittags und Abends 7 Pillen.

(Gegen Pollutionen und Saamenfluss. No. 414. 415.)

Tissot.

N^o. 565.

Ry. Acid. phosphor. vitr.

Pulv. Cort. Chin. opt.

Extr. Cort. Cascarill. ana ℥jj.

Limat. Martis ℥β.

Camphor, rasae ℥β.

M. f. Pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Cort. Cinnamom.

D. S. Dreimal täglich 10 Pillen. (Schwache Lungen
sind eine Gegenanzeige des Gebrauchs dieser Pillen.)

(Wie bei No. 564.)

Wurzer.

N^o. 566.

R_x. Pulv. Cort. peruv. ʒj.

— — Cascarill.

— Lign. Quass. ana ʒβ.

Sal. mart. ʒjj.

Elaeosacch. Cajeput. ʒvj.

M. D. S. Morgens und Abends einen grossen Thee-
löffel voll.

(Wie bei No. 564.)

Jördens.

N^o. 567.

R_x. Aq. Ment. pip. vin.

Spir. Formicar.

— Serpylli ana ʒjj.

Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen des Hodensacks.

(Wie bei No. 564. Wenn Atonie die Ursache ist.)

Jördens.

N^o. 568.

R_x. Extr. Bistortae ʒβ.

Pulv. Myrrhae

Vitriol. Mart. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Alle drei Stunden 6 Pillen.

(Gegen Pollutionen und Fluor albus.)

(Horn.)

N^o. 569.

Ry. Ferri sulphurici q. v.
 excandescat in crucibulo donec
 massa ex fusco rubra appareat;
 hujus massae in pulv. redact. ʒj.
 solve in

Vini de Madeira ʒj.

M. D. S. Zweistündlich 15 — 20 Tropfen. (Arca-
 num Weigeli.)

(Wie bei No. 568.) *Weigel. (Turte.)*

N^o. 570.

Ry. Ferr. sulph. ex alb. calc. ʒj.
 Extr. Gentianae q. s.
 ut f. Pil. No. CXX.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Alle zwei Stunden eine Pille, und in 6 Tagen
 zu 8 Pillen pro Dosi steigend.

(Gegen Fluor-a'lbis.) *(Horn.)*

N^o. 571.

Ry. Boli armen.
 Magnes. muriat.
 Elaeosacch. Macid. ana ʒvi.
 (Pulv. Rad. Rhei ʒj.)

M. f. Pulv. D. S. Täglich dreimal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 570.) *Rust. (Sundelin.)*

N^o. 572.

Ry. Aluminis
 Ammon. muriat. mart.
 Pulv. aromat.
 Extr. Cort. Chin. frig. par. ana ʒβ.
 Ol. Cinnam. aeth. gtt. xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj .
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. in vitro. S. Morgens und Abends 15—20 Pillen.
 (Wie bei No. 570.) *Formey.*

N^o. 573.

R_x. Ol. Vitriol. 3v .
 — Tereb. 3jj .
 Spir. V. rectific. 3jij .
 M. D. S. Täglich dreimal 30—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 570.) *Richter.*

N^o. 574.

R_x. Ol. Succin. rectific.
 Tereb. venet.
 Bals. Copaiv. ana $\text{3}\beta$.
 M. D. S. Dreimal täglich 30 Tropfen in Syr. simpl.
 und ein halbes Glas Portwein. Die Dosis kann
 auf 60 Tropfen steigen.
 (Wie bei No. 570.) *Horn.*

N^o. 575.

R_x. Extr. Aloës aq.
 — Myrrhae aq. ana $\text{3}\beta$.
 solve in
 Liq. Terrae fol. Tart. 3jj .
 M. D. S. Täglich dreimal 2 Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 570.) *Brendel.*

N^o. 576.

R_x. G. Kino
 — Myrrhae
 Extr. Marrub. alb. ana 3jj .
 Vitrioli Martis 3j .

M. f. Pil. pd. gr. jj .
 D. S. Täglich dreimal 8 Pillen.
 (Wei bei No. 570.)

*Weitz.*N^o. 577.

Ry. Myrrhae
 Ammoniaci
 Ferri oxydulati nigri ana 3jj .
 Rad. Valer. 3j .
 — Rhei $\text{3}\beta$.

M. f. c. s. q. Extr. Fumar.
 Pil. pd. gr. jjj . D.
 S. Täglich dreimal 4 Pillen.
 (Wie bei No. 570.)

*Bluff.*N^o. 578.

Ry. Hb. Millefol. 3j .
 — Lamii alb.
 — Cynogloss. ana 3j .
 Rad. Sant. rubri $\text{3}\beta$.
 Coq. in Aq. ft. 8 j .
 Adde

Terrae japon. 3jj .
 Macidis contusae 3j .
 Sacch. alb. 3jjj .

M. D. S. Morgens und Abends jedesmal 3 Unzen mit
 einem zu Schaum geschlagenen Eiweiss.
 (Wie bei No. 570.)

*Fuller.*N^o. 579.

Ry. Lign. Sassafras
 Rad. Sarsaparill.
 — Rub. tinct.
 — Bardanae
 — Liquirit. ana $\text{3}\beta$.

Coq. in Cong. II. Vin. ad dimid.

D. S. In einem Tage zu verbrauchen.

(Wie bei No. 570.)

*Sproegel.*N^o. 580.R_x. Flor. Lamii alb. ʒx.

— Consolid. maj. ʒvjjj.

Hormin. ʒiv.

C. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 570.)

*Bate.*N^o. 581.R_x. Extr. Opii aq. ʒj.
solve in

Aq. Rosar. ʒvjjj.

Acet. Saturn. ʒj.

Mucilag. Sem. Cydon. ʒj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Gegen Fluor albus.)

*Richter*N^o. 582.R_x. Acet. Saturn. ʒj.

Aq. destill. ʒj.

Spir. camphorat. ʒj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 581.)

*Richter.*N^o. 583.R_x. Calomel. ʒj.

Aq. Calcis vivae ʒxjj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 581.)

Sproegel.

N^o. 584.

- Ry. Terrae jap.
 Myrrhae ana ʒβ — j.
 Aq. Calcis vivae ʒijj.
 M. D. S. Zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 581. Besonders empfehlenswerth.)
Vogler. (M. J. Schmidt.)
-

N^o. 585.

- Ry. Sal. ammon. gr. X — ʒj.
 Pulv. Liquirit. ʒj.
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.
 (Gegen Fluor albus Vesica. S. No. 301.)
Büttner.
-

5N^o. 86.

- Ry. Ferri sulphurici cryst. ʒjj.
 Myrrhae ʒjjj.
 Pulv. Cort. Lign. Quass. ʒiv.
 M. f. c. Extr. Cort. Chin. pil. gr. jjj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Täglich dreimal 4 — 8 Pillen.
 (Gegen Galactirrhöe, besonders aus Verdauungs-
 schwäche.)
Berends.
-

N^o. 587.

- Ry. Sap. med.
 G. Asae foet.
 — Ammoniaci ana ʒiβ.
 Extr. Trifol. fibr. ʒjjj.
 — Aloës aq. ʒj.
 Sulph. aurat. Antim. ʒj.
 Aq. Foeniculi q. s.
 ut f. Pil. pd. gr. II, Consp.

D. S. Täglich deimal 10 — 15 Pillen.
(Gegen Chlorosis.)

Richter.

N^o. 588.

Ry. Lign. Quass.
Sacch. alb. ana ʒj.
Flor. Sal. amm. mart. gr. X.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XXIV.
D. S. Täglich viermal ein Pulver.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 589.

Ry. Ferri pulv. ʒjj.
Sulph. dep.
G. Myrrhae
Aloës lucid. ana ʒj.
Fell. Taur. inspiss. q. s.
ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
D. S. Morgens und Abends 12 Pillen.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 590.

Ry. Ferri pulv. ʒjj.
Sacch. alb. ʒβ.
Cort. Cascarill.
— Cinnamom. ana ʒj.
M. f. Pulv. D. ad scatul.
S. Täglich viermal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 587.)

Richter.

N^o. 591.

Ry. Extr. Cort. peruv. ʒjj.
G. Myrrhae
Sal. mart. ana ʒj.

M 1

Ol. Cinnam. gtt. IV.

M. f. pil. No. XL. Consp.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen.

(Wie bei No. 587.)

Leake.

No. 592.

R. Aloës succ. ʒj.

Ferri pulv. ʒjj.

Sulph. stib. aur. ʒβ.

Calomel. ʒj.

Ol. Sabin. gtt. XX.

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Abends vor dem Schlafengehn 2 Pillen.

(Wie bei No. 587.)

Weikard. (Kopp.)

No. 593.

R. Pulv. Cort. Chinae

— — Aurant.

— Rad. Gentianae ana ʒβ.

— Cort. Cinnam. ʒjj.

inf. c.

Vini boni alb. rhen. ℥ jj.

Stent in digest. per XXIV hor.

Col.

D. S. Täglich zwei bis dreimal ein kleines Weinglas

voll.

(Wie bei No. 587. S. No. 551. 569. 578. 579.)

Richter.

Krankheiten der Harnabsonderung.

N^o. 594.

- Ry. Rad. Apii
 — Petrosel. ana M. j.
 Hb. Rubiae tinct. $\bar{\beta}$.
 Spic. Adianth. cap. ven.
 — Cuscut.
 — Agrimon.
 — Cicer. rubr. ana M. β .
 Rad. Asari $\bar{\beta}$.
 — Calami $\bar{\beta}$.
 Sem. Anisi
 — Apii
 — Petrosel.
 — Foeni graeci
 — Dauci
 — Carvi ana $\bar{\beta}$ jj.
 Mlon.
 Cucum. ana $\bar{\beta}$ jjj.
 Coq. in Aq. ft. $\&$ VI. ad $\&$ IV.
 Colat. adde
 Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.
 D. S. Täglich zu 6 Unzen. (Wirkt diuretisch.)
 (Gegen Harnleiden. S. No. 301. 471.)
Augen. (Baten.)

N^o. 595.

- Ry. Asae foet. $\bar{\beta}$.
 Rad. Ipecacuanhae
 Opii
 Olei Menth. pip. ana gr. jj.
 M. f. l. a; pil. pd. gr. jj.
 Consp. Sem. Lycopod.

D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.

(Gegen Ischuria und Stranguria spastica.)

Conradi. (Richter.)

N^o. 596.

R̄. G. arab. ʒjj.

Aq. Petrosel. ʒvj.

— Laurocerasi ʒj.

Syr. Papav. alb. ʒβ.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel. (Zugleich warme Umschläge mit Hb. Hyoscyami und Cicutae in die Blasengegend.)

(Wie bei No. 595.)

Bluff.

N^o. 597.

R̄. Ol. Amygdal. dulc. ʒj.

Bals. peruv. gtt. XXX.

Syr. Althaeae ʒj.

Mucilag. G. arab. ʒβ.

Aq. Foeniculi ʒiv.

— Petrosel. ʒvjij.

M. f. l. a. Emuls. D.

S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Strangurie. Auch gegen die Schmerzen von Nieren- und Blasensteinen. S. No. 871.)

Kaempf.

N^o. 598.

R̄. Aluminis gr. X.

G. arab. ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich viermal ein Pulver.

(Gegen Enuresis paralytica.)

Selle.

N^o. 599.

R̄. Pulv. Cantharid. gr. jiiij.

Camphorae gr. X.

- Sap. venet. $\mathfrak{3j}$.
 M. f. l. a. pil. No. XL.
 Consp. pulv. Cinnanom.
 D. S. Täglich drei Pillen,
 (Gegen Enuresis paralytica der Wöchnerinnen.)
v. Siebold.
-

N^o. 600.

- Ry. Hb. Sabinæ $\mathfrak{3j}$.
 inf. Aq. fervid. $\mathfrak{3v}$.
 stent in digest. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Col. adde
 Camphoræ gr \mathfrak{jj} — \mathfrak{vj} .
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Blasenlähmung nach schwerer Nieder-
 kunft.) *Horn.*
-

N^o. 601.

- Ry. Ol. Lavandul.
 — Macidis destill. ana $\mathfrak{3j}$.
 Butyr. Cacao $\mathfrak{3j}$.
 M. D. S. Zum Einreiben in die Blasengegend.
 (Gegen Lähmung der Harnblase.) *Bluff.*
-

N^o. 602.

- Ry. Liq. nervin. Peerbom. $\mathfrak{3j}$.
 Tr. Cantharid. $\mathfrak{3j}$.
 M. D. S. Auf das Kreuz und Mittelfleisch einzu-
 reiben.
 (Gegen Lähmung des Blasenhal ses.)
Lentin.
-

Steinkrankheit.

N^o. 603.R_y. Tereb. venet. ʒvj.

Aq. font. ℥ j.

Vitell. ovor. q. s. ut f. Emuls.

D. S. Abends vor Schlafengehn in zwei Portionen zu trinken.

(Gegen Gallensteine. No. 561.) *Hecker.*N^o. 604.R_y. Natri sulph. ʒjj.

Aq. Calcis ℥ ʒ.

M. D. S. Vierzehn Tage lang jeden Morgen nüchtern eine solche Portion zu trinken.

(Wie bei No. 603.)

*Delius.*N^o. 605.R_y. Ol. Tereb.

Naphthae Vitrioli ana ʒβ.

M. D. S. Einigemal täglich 10—30 Tropfen zu nehmen, und Molken nachzutrinken. Das Mittel muss beharrlich gebraucht werden.

(Gegen Gallen- und Harnsteine.)

*Durande.*N^o. 606.R_y. Sodae ʒj.

Piper. hisp. gr. IV.

Sap. med. q. s. ut f. pil. No. XX.

D. S. Zu 3—6 Pillen pro Dosi.

(Gegen Harnsteine. S. No. 597.)

Egan.

N^o. 607.

- R. Tereb. venet. $\mathfrak{z}\beta$.
 Sap. venet.
 Succu Liquirit. ana $\mathfrak{z}\text{jjj}$.
 M. f. Pil. pd. gr. jj .
 D. S. Zu 10—15 Pillen.
 (Wie bei No. 606.)

*Richter.*N^o. 608.

- R. Sap. med.
 Natri carb. sicc. ana $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 M. f. c. Extr. Trifol. fibr. q. s.
 Pil. pd. gr. jj . Consp. pulv. rad. Liquirit.
 D. S. Dreimal täglich 3—10 Pillen.
 (Wie bei No. 606.)

*Berends.*N^o. 609.

- R. Rad. Caricis arenar. $\mathfrak{z}\beta$.
 — Liquirit. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 Cort. Ulmi $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 Coq. c.
 Aq. font. q. s.
 Col. $\mathfrak{z}\text{jj}$. adde
 Natri sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Natri carbonici $\mathfrak{z}\beta$.
 M. D. S. Täglich zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 606.)

*Heim.*N^o. 610.

- R. Kali carb. $\mathfrak{z}\beta$.
 solve in
 Aq. Cinnamom. s. v. $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 adde
 Syr. Diacodii $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Viermal täglich einen Esslöffel. Zu-
gleich viel Thee von Hb. Jaceae.
(Gegen Nierensteine, Nasensteine, und Thrä-
nensteine.) *v. Walther.*

N^o. 611.

R_x. Rad. Ononid. spinos.

Summitat. Virgaur. ana ʒβ.

M. f. Spec. D. S. Mit einer Kanne heissen Was-
sers zu übergiessen, und täglich eine solche Por-
tion zu trinken.

(Gegen Nierensteine.) *Muhrbeck. (Heim.)*

N^o. 612.

R_x. Hb. Uvae Ursi ʒβ.

G. arab. ʒjj.

Rad. Jalapp. ʒj.

Ol. Cort. Aurant. ʒβ.

Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. D. S. Zu ʒβ. Morgens und Abends.
(Gegen Steinbeschwerden.) *Quarin.*

S c h w i n d s u c h t e n .

N^o. 613.

R_x. Extr. Myrrhae aq. ʒjj.

Sacch. Lact. ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Einigemal täglich einen Thee-
löffel.

(Gegen Phthisis. S. No. 119. 631. 632.)

Hecker.

N^o. 614.

R_x. Fol. Pruni Padi No. XX.

C. D. S. Zu drei Tassen Thee; täglich zu trinken.

(Gegen Phthisis von organischen Herzfehlern.)
Lejeune.

N^o. 615.

- Ry. Aq. Laurocerasi ʒj.
Syr. Rubi Idaei ʒiβ — j̄j.
M. D. S. Täglich vier bis sechsmal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 614. Besonders beruhigend.)

Horn.

N^o. 616.

- Ry. Sem. Phellandrii aquat. gr. v.
Sacch. Lact.
G. arab. ana ʒβ.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Drei bis viermal täglich ein Pulver.
(Gegen Phthisis pulmonalis tuberculosa.)
(Hecker.)

N^o. 617.

- Ry. Extr. Card. bened. ʒvj.
— Senegae ʒj.
M. f. Pil. pd. gr. j̄j. Consp.
D. S. Täglich viermal 10 — 20 Pillen.
(Wie bei No. 616.)
Hecker.

N^o. 618.

- Ry. Bals. peruv. ʒβ.
Vitell. ovar. No. II.
solve in
Aq. font. ʒiV.
adde
Spir. Vini rectificati ʒj̄j.
Syr. Cinnamomi ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 616.)

*Hecker.*N^o. 619.

Ry. Hb. Cicutae ʒβ.
Sulph. stib. aurant.
Calomel. ana gr. j.
Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dös. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Wie bei No. 616.)

*Richter.*N^o. 620.

Ry. Tart. stib. gr. X.
G. Ammoniaci
— Galbani
Extr. Cicut.
Sap. venet. ana ʒj.
Pulv. Hb. Belladonn. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ij. Consp.

D. S. Täglich dreimal 9 Pillen.
(Wie bei No. 616.)

*Richter.*N^o. 621.

Ry. Ol. Ricini ʒjjj.
Tr. Opii croc. ʒβ — j.

M. D. S. Auf einmal.

(Gegen den heftigen Husten Schwindsüchtiger.)

*Hecker.*N^o. 622.

Ry. Pulv. Rad. Salep. ʒβ.
solve in
Aq. calidae ʒjj.
adde

Extr. Hyoscyami \mathfrak{B} .

Aq. flor. Naphae \mathfrak{Jij} .

Syr. Althaeae \mathfrak{Jj} .

M. D. S. Oefters einen Theelöffel voll.

(Wie bei No. 621.)

Hufeland.

N^o. 623.

R_x. Sem. Phellandrii aq. $\mathfrak{B}\beta$.

Hb. Digital. purp. $\mathfrak{B}\beta$ — \mathfrak{Jj} .

inf. Aq. fervid. \mathfrak{JIV} .

Col. adde

Spir. Nitri dulc. \mathfrak{Jj} .

Syr. Althaeae $\mathfrak{B}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Gegen Phthisis pulmonalis pituitosa.)

Jahn.

N^o. 624.

R_x. Lich. island.

Rad. Polygal. amar. ana \mathfrak{Jijj} .

— Liquirit. \mathfrak{Vj} .

Stipit. Dulcamar. \mathfrak{Jijj} .

C. f. Spec. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 623.)

Sachtleben.

N^o. 625.

R_x. G. Asae foet.

Pulv. Stipit. Dulcamarae ana \mathfrak{Jj} .

— Lign. Campech. \mathfrak{Jijj} .

Extr. Myrrhae aq. \mathfrak{Jij} .

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Täglich dreimal 9 Pillen.

(Wie bei No. 623.)

Richter.

N^o. 626.

R_x. Bals. peruv. vit. ov. sol. \mathfrak{Jij} .

Extr. Chin. aq. \mathfrak{Vj} .

- Mell. Rosar. $\bar{3}$ jj.
 M. exact. f. l. a. Elect.
 D. S. Alle 3 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 623.)

*Werthof.*N^o. 627.

- Ry. Kali sulphurat.
 Extr. Gentian. ana $\bar{3}$ jj.
 Pulv. Hb. Aconit.
 — Cort. Cinnamom. ana $\bar{3}\beta$.
 M. f. l. a. Pil. pd. gr. j. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 623.)

*Busch.*N^o. 628.

- Ry. Rad. Cichor.
 — Tarax. ana $\bar{3}$ j.
 — Liquirit.
 — Graminis
 Hb. Veron.
 — Tussilag.
 Sem. Carvi ana $\bar{3}\beta$.
 Cort. Aurant.
 — Cinnamom. ana $\bar{3}$ jj.
 M. C. C. D. S. Zum Thee.
 (Wie bei No. 623.)

*Richter.*N^o. 629.

- Ry. Succ. alb.
 Oliban.
 G. Benzoës ana $\bar{3}$ jj.
 — Guajaci
 Bals. tolut. ana $\bar{3}\beta$.
 P. Rosar. $\bar{3}$ j.
 M. f. Pulv. D. S. Räucherpulver.
 (Wie bei No. 623. Zum Einathmen der Dämpfe.)

Richter.

N^o. 630.

- R_x. Rad. Polygal. amar. ʒj.
 Coq. C. Aq. ft. ʒXII.
 Col. ʒVIII. adde
 Spir. muriat. aeth. ʒj.
 Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Vomica pulmonum nach dem Auswurfe
 des Eiters, und bei gleichzeitiger grosser Schwä-
 che.) *Berends.*

N^o. 631.

- R_x. Pulv. Sem. Phellandrii aq.
 Sacch. Lact. ana ʒβ.
 G. Myrrhae ʒjj.
 Hep. Sulph. ʒjj.

M. f. Pulv. subtiliss.
 D. S. Täglich vier bis sechsmal einen Theelöffel.
 (Gegen Phthisis pulmonalis exulcerata.) *Jahn.*

N^o. 632.

- R_x. Myrrhae elect. ʒjjj.
 Bals. peruv. v. canad. ʒiβ.
 Extr. Opii ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Alle zwei Stunden 2—3 Pillen.
 (Wie bei No. 631.) *Marcus.*

N^o. 633.

- R_x. Sacch. Saturn. gr. jj—IV.
 solve in
 Aq. Foeniculi ʒvj.
 adde
 Tr. Opii simpl. ʒβ.

M 2

M. D. S. Alle 2 Stunden einen starken Esslöffel voll.

(Wie bei No. 631. — S. auch No. 381. 422.)
Richter.

N^o. 631.

R_x. Plumbi acet. ʒj.
solve in
Aceti boni non destill. ʒj.
adde
Ferri sulphurici ʒiβ.
Spir. Vini rectificati ʒj.
Aq. Rosar. ʒjij.

M. D. S. Zu 20—30 Tropfen pro Dosi.
(Wie bei No. 631. Tr. antiphthisica Gram-
manni.) *Grammann. (Wedel.)*

N^o. 635.

R_x. Plumbi acet.
Ferri sulph. ana ʒj.
solve in
Spir. Vini rectificat. ʒj.

Reponat. in frig. donec. Spir. rubescat.
D. S. Zu 15—30 Tropfen pro Dosi.
(Wie bei No. 631. Tr. antiphthisica Fulleri.)
Fuller.

N^o. 636.

R_x. Auri oxymuriatici gr. IV.
solve in
Aq. Amygdal. amar. ʒβ.
adde

Aq. flor. Tiliae ʒiβ.
M. D. S. Täglich viermal 24 Tropfen in einem
Esslöffel Aq. destill.

(Gegen Phthisis tuberculosa und Tabes mesaraica; in den ersten Stadien.) *Wendt.*

N^o. 637.

- R_y. Hb. Uvae Ursi ℥j.
Elaeosacch. Foeniculi gr. v.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
D. S. Täglich 3 — 4 Pulver.
(Gegen Phthisis renalis und Phthisis vesicae. S. No. 618.) *Hecker.*
-

N^o. 638.

- R_y. Hb. Digital. ℥j.
inf. c. Aq. fervid. ℥iix.
Col. adde
Aq. Cinnamom. spirit.
Syr. Cort. Aurant. ana ℥j.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.
(Gegen Phthisis uterina.) *Hecker.*
-

N^o. 639.

- R_y. Succ. inspiss. Hb. Digital.
Opii thebaic. ana ℥β.
Pulv. Hb. Digital. q. s.
ut f. l. a. pil. pd. gr. j.
Consp. pulv. Cinnamom.
D. S. Morgens und Abends zwei Pillen.
(Wie bei No. 638.) *Hecker.*
-

W ü r m e r.

N^o. 640.

- R_y. Stanni limati ℥jj.
Sem. Santon. ℥j.

Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pulv. Divide in partes IV aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Gegen Würmer.)

Fordyce.

N^o. 641.

R̄. Stanni limati ʒj.

Rad. Jalapp. ℥j.

Mell. despumati ʒj.

M. f. Elect. D.

S. Alle vier Stunden drei Theelöffel.

(Wie bei No. 640.)

Bloch.

N^o. 642.

R̄. Rad. Valer.

Sem. Cynae ana ʒj.

inf. et. digere c.

Aq. ferv. suff. qt.

Col. ʒIV. adde

Extr. Nuc. jugland.

Liq. anodyn. Hoffm.

Essent. Cort. Aurant. ana ʒβ.

Syr. Cort. Aurant. ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 640. Bei zarten schwächlichen Kindern.)

Henke.

N^o. 643.

R̄. Sem. Santon.

Rad. Jalapp. pulv.

— Valer. pulv.

Sal. polychrest. Seign. ana ʒj.

Oxymell. squill. q. s. ut f. Elect.

D. S. Alle 2—3 Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 640.) *Störk.*

No. 644.

Ry. Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Fol. Sennae $\mathfrak{z}\beta$.

Tart. vitriolat. \mathfrak{z} j.

M. f. Pulv. Divide in partes III aeq.

D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden ein Pulver, bis Abfüh-
ren erfolgt.

(Wie bei No. 640.) *Bremser.*

No. 645.

Ry. Sem. Cynae (vel Tanaceti) $\mathfrak{z}\beta$.

Pulv. Rad. Valer. \mathfrak{z} jj.

— — Jalapp. $\mathfrak{z}\beta$ — \mathfrak{z} jj.

Tart. vitriolat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$ — \mathfrak{z} jj.

Oxymell. squill. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 640.) *Bremser.*

No. 646.

Ry. Rad. Valer. \mathfrak{z} jj.

Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Sem. Santon. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. pulv. cui addas

Oxymell. squill. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 640.) *Hecker.*

No. 647.

Ry. Pulv. Sem. Cynae \mathfrak{z} jj.

— Rad. Jalapp. \mathfrak{z} j.

Calomel. gr. \mathfrak{v} j— $\mathfrak{z}\beta$.

Aq. flor. Cassiae ʒβ.

Syr. flor. Persicae q. s.

ut f. Elect. D.

S. Alle 2 Stunden einen Kaffeelöffel, bis Abführen erfolgt.

(Wie bei No. 640.)

Vogler.

Nº. 648.

Ry. Calomel. gr. ʒj.

Rad. Jalapp. gr. XV.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal.

(Wie bei No. 640. Für Kinder von 6 Jahren.)

Henke.

Nº. 649.

Ry. Sem. Santon. ʒjj.

Rad. Jalapp.

— Valer.

Aethiop. min. ana ʒj.

Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. D.

S. Morgens, Mittags und Abends, jedesmal 2 Theelöffel in Wasser gerührt zu nehmen.

(Wie bei No. 640.)

Stark.

Nº. 650.

Ry. Asae foet. ʒj.

G. arab.

Calomel.

Sem. Sabadill. ana gr. X.

Mell. despumat. q. s.

ut f. l. a. Pil. gr. ʒj.

D. S. Die Hälfte Abends, die andere Hälfte Morgens zu nehmen.

(Wie bei No. 640. Besonders bei von Würmern herrührenden Nervenleiden.) *Kämpf.*

N^o. 651.

Ry. Aethiop. antim. ʒj.

Sem. Santon.

Rad. Jalapp. ana ʒβ.

Oxymell. squill. q. s.

ut f. Elect.

D. S. Mehrere Male täglich einen Theelöffel.

(Wie bei No. 640. Besonders bei gleichzeitigem Schleim.) *Jahn. (Osiander.)*

N^o. 652.

Ry. Pulv. Sem. Santon. ʒjj.

Chocolatae ʒβ.

Mucilag. G. Tragacanth. q. s.

ut. f. l. a. Trochisci No. XXX.

D. S. Alle drei Stunden 4—6 Stück.

(Wie bei No. 640.)

Fries.

N^o. 653.

Ry. Sem. Santon.

Hb. Tanacet. ana ʒjj.

Aethiop. min.

Rad. Jalapp. ana ʒiβ.

Cinnamom. ʒj.

pulv. adde

Sacch. alb. in Aq. Rosar. solut.

et ad consist. tabuland. coct. ʒiiβ.

Fiant Morsuli ʒj — jj.

D. S. Ein bis zweimal täglich eine Morselle.

(Wie bei No. 640.) *J. A. Schmidt.*

N^o. 654.

Ry. Sacch. alb. ad consist. tab. cocti ʒij.
Calomel. ʒj.
Pulv. Rad. Jalapp. ʒjjj.
— Macidis ʒj.

M. f. l. a. Rotul. gr. IV.

D. S. Morgens und Abends 1—6 Stück.

(Wie bei No. 640.) *Zwelfer. (Wendt.)*

N^o. 655.

Ry. Res. Jalapp. gr. VIII—IX.
Sap. med. gr. jvj.
trit. in mort. lap.
solve cum

Ol. Olivar. (vel Amygdal.) ʒiβ.

D. S. Umgeschüttelt alle 2—3 Stunden einen Ess-
löffel (Kindern einen halben Esslöffel), bis Ab-
führen erfolgt.

(Wie bei No. 640.) *Vogler.*

N^o. 656.

Ry. Extr. Nuc. jugland. ʒjj.
Aq. Cinnamom. s. v. ʒβ.
Mellis desp. ʒj.

M. D. S. Zwei bis dreijährigen Kindern dreimal
täglich 30—60 Tropfen.

(Wie bei No. 640.) *Fischer.*

N^o. 657.

Ry. Camphorae ʒjjj.
Petrol.
Ol. Tereb. ana ʒi.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 20—30 Tropfen.

(Wie bei No. 640.) *Mellin.*

N^o. 658.

Ry. Tr. Asae foet. ʒvj.
 Petrol. ʒβ.

M. D. S. Täglich viermal 40 Tropfen.
 (Wie bei No. 640.) *Schwarz. (Hufeland.)*

N^o. 659.

Ry. Rad. Valer.
 Sem. Cynae ana ʒβ.
 inf. et diger. c. Aq. ft. suff. qt.
 Col. ʒvjjj. adde
 Asae foet. in vitell. ov. subact. ʒj.

M. D. S. Zu zwei Clystiren.
 (Wie bei No. 640.)

Henke.

N^o. 660.

Ry. Fell. Tauri inspiss.
 Extr. Nuc. jugland. ana ʒjj.
 Axung. porci ℥j.
 M. leni igne et adde
 Ol. Tanaceti ʒjjj.

D. S. Zum Eiureiben auf den Unterleib.
 (Wie bei No. 640.)

Hecker.

N^o. 661.

Ry. Fell. Tauri inspissat. ʒj.
 Ol. Tanaceti ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.

(Wie bei No. 640.)

Sprögel.

N^o. 662.

Ry. Pulv. Aloës ʒj.
 — Colocynth.
 — Myrrhae ana ʒjjj.

Fol. Sabinae
 — Absynth.
 — Rutae
 — Tanacet.
 — Jugland.

Rad. Bryon. ana ʒj.

Cerae

Resinae ana ʒiV.

Ol. Rutae ʒj.

M. f. Emplastrum.

D. S. Auf den Nabel zu legen.

(Wie bei No. 640.)

Bate.

N^o. 663.

Ry. Extr. Tanacet.
 Sem. Santon. ana gr. vj.
 Ferri sulph. gr. IV.
 Ol. Valer. aeth. gtt. j.

M. f. Pulv. D. tal. Dos. q. l.

S. Täglich ein Pulver.

(Gegen Würmer; zur Radical-Cur.)

Rosenstein.

N^o. 664.

Ry. Ferri sulphurici
 Extr. Cort. peruv. ana ʒj.
 Pulv. Sem. Santon. ʒj.
 Syr. Cinnamom. q. s. ut f. Elect.

D. S. Täglich 3 — 4 Theelöffel.

(Wie bei No. 663.)

Selle.

N^o. 665.

Ry. Tr. Aloës ʒj.
 — Martis pomat. ʒj.
 Elix. Vitrioli ʒβ.

- M. D. S. Täglich 10 — 30 Tropfen in einem Glas Wasser oder rothem Wein.
(Gegen Würmer; zur Nach-Cur.) *Bremser.*
-

N^o. 666.

- R_x. Rad. Jalapp. $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\jmath$.
Calomel. gr. $\jmath\jmath$ — IV .
Sacch. alb. gr. $\text{X}\jmath\jmath$.
M. f. Pulv. D. tal. Dos. No. III.
D. S. Drei Morgen nacheinander ein Pulver.
(Gegen Ascariden.) *Richter.*
-

N^o. 667.

- R_x Pulv. Sem. Santon. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.
inf. Aq. f. q. s.
Col. refrig. $\mathfrak{z}\text{I}\beta$.
adde
Merc. subl. corrosiv. gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$.
Mucilag. G. arab. $\mathfrak{z}\jmath\jmath$.
M. D. ad vitrum. S. Das Glas so lange in warmes Wasser gestellt, bis die Mischung warm ist; und dann im Clystir applicirt.
(Gegen Ascariden. S. No. 406.) *Kopp.*
-

N^o. 668.

- R_x. Sem. Santonici gr. XV.
Rad. Rhei gr. $\text{X}\jmath\jmath$.
Aloës gr. vj.
Calomel. gr. $\jmath\jmath\jmath$.
Rad. Ipecacuanhae gr. j.
M. f. Pulv. D. S. Drei Tage nach einander jedesmal früh nach dem Aufstehen den dritten Theil.
(Gegen Spulwürmer. Für ein Kind von 3 — 4 Jahren.) *Andry.*
-

N^o. 669.

- R_x. Pulv. Sem. Cynae ʒj.
 — Rad. Jalapp. ʒj.
 Calomel. gr. vj—X.
 Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Theelöffel, bis 3—4
 Stuhlgänge erfolgen.

(Gegen Spulwürmer.)

Richter.

N^o. 670.

- R_x. Tereb. venet. ʒvj.
 Aq. ft. ʒj.
 Vitell. ov. q. s.

M. f. l. a. Emuls.

D. S. Abends in zwei Stunden zu trinken.

(Zur Ueberzeugung, ob ein Bandwurm vorhanden ist. — Nach dem Gebrauch gehen bei vorhandenem Bandwurme in der Nacht oder des folgenden Tages Stücke ab.)

Thilenius. (Kämpf.)

N^o. 671.

- R_x. Aeth. sulph. ʒj.
 Ol. Ricini ʒj.

M. D. S. Alle 1—4 Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Bandwurm.)

Alibert.

N^o. 672.

- R_x. Rad. Filicis ʒj—jij.
 Aq. Filicis (v. Tiliae) ʒiv—vj.

M. D. S. Nach einem Abführmittel am darauf
 folgenden Morgen im Bett liegend zu nehmen.
 Nach zwei Stunden:

- R_x. Scammon.
 Calomel. ana gr. X.

G. Guttae gr. vj.

Confect. Hyacynth. q. s.

ut. f. Bolus.

D. S. Auf einmal mit einer Tasse Thee.

(Wie bei No. 671.) *Nuffert.*N^o. 673.R_x. G. Guttae gr. xjj.

Sal. Absynth. ℥iβ.

Sap. Stark. gr. jj.

M. D. S. Morgens nüchtern mit einigen Tassen
Thee zu nehmen.(Wie bei No. 671.) *Herrenschwand.*N^o. 674.R_x. Calomel. ℥j.

Cinnab. antim.

Cornu Cerv. ust. ana ℥β.

M. D. S. In einem Löffel Wasser mit etwas Schleim
Abends zu nehmen. — Am andern Morgen
nüchtern:R_x. Rad. Filicis pulv. ℥j.

— Jalapp. pulv.

Hb. Card. bened.

Ebur. ust. ana gr. x.

Syr. Cort. Aurant. ℥β.

M. D. S. Auf einmal mit etwas Thee zu nehmen.

(Wird zwei bis dreimal wiederholt, wenn der
Bandwurm nicht gleich abgeht.)(Wie bei No. 671.) *v. Beck.*N^o. 675.R_x. Extr. Tanaceti

Asae foet.

Pulv. Sem. Santon. ana gr. xxxvj.

N 1

Ferri sulph.

Mell. despumat. ana gr. xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Bei abnehmendem Monde alle 2—3 Stunden 10 Pillen.

(Wie bei No. 671.)

*Rosenstein.*N^o. 676.R_x. Ol. Tereb. $\overline{\text{ʒ}}\text{ijj}$.Ol. animal. foet. $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.

Destill. e retorta vitrea tertia pars.

S. Morgens und Abends einen kleinen Theelöffel.

(Wie bei No. 671. — Oleum Chaberti.)

*Chabert.*N^o. 677.R_x. Rad. Jalapp. $\overline{\text{ʒ}}\text{iv}$.Sem. Carthami $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.Scammon. $\overline{\text{ʒ}}\beta$.G. Guttae $\overline{\text{ʒ}}\text{ij}$.

Digere cum Cong. II Spir. Vini.

D. S. Zu 30 bis 100 Tropfen.

(Wie bei No. 671.)

*Werlhoff.*N^o. 678.R_x. G. Guttae gr. x.

Sem. Colocynth. No. III.

Amygdal. dulc. No. I—III.

M. f. Pulv. et cum

Syr. Absynth. q. s. Bolus.

D. S. Alle acht Tage einen solchen Bolus. —
An den Zwischentagen:R_x. Aloës succotr.Asae foet. ana $\overline{\text{ʒ}}\text{j}$.

Sal. Absynth. $\mathfrak{z}\beta$.Ol. Rorismarini $\mathfrak{z}\text{jj}$.

Elix. proprietat. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. X.

D. S. Morgens und Abends zwei Pillen.

(Wie bei No. 671.)

Hautesierk.

N^o. 679.R_y. Sal. Absynth. $\mathfrak{z}\text{j}$.Sal. Tartari $\mathfrak{z}\text{jj}$.

G. Guttae gr. VIII — XII.

Mannae elect. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. D. S. Nach einer Abends genommenen Abführung

(mit Ol. Ricini) am andern Morgen zu nehmen.

(Wie bei No. 671.)

Viussen.

N^o. 680.R_y. Limat. Stanni $\mathfrak{z}\text{j}$.Pulv. Rad. Filicis $\mathfrak{z}\text{vj}$.Sem. Cynae $\mathfrak{z}\beta$.

Pulv. Rad. Jalapp.

Natri tart. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.*IX*M. D. S. Drei Tage lang alle Tage einen Theelöffel.
Sobald der Kranke Bewegungen verspürt:R_y. Rad. Jalapp.Natri tart. ana $\mathfrak{z}\text{jj}$.Scammon. $\mathfrak{z}\text{j}$.

G. Guttae gr. X.

M. f. c. Melle despumato Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel, bis der

Wurm abgeht.

(Wie bei No. 671.)

Mathieu.

N^o. 681.R_y. Aloës dep. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Asae foet.

Myrrhae ana gr. XV.

Camphorae ʒβ.

Ferri sulph. ʒiβ.

Liq. C. C. succ. gtt. X.

Syr. Absynth. q. s. ut

f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich 10—12 Pillen.

(Wie bei No. 671.)

Hecker.

N^o. 682.

R̄. Asae foet.

Fell. Taur. ana ʒjj.

Pulv. Rad. Jalapp. ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.

D. S. Zehn Pillen pro Dosi; steigend.

(Wie bei No. 671. — Auch gegen Infarctus.)

Mellin.

N^o. 683.

R̄. Calomel.

Rad. Rhei ana ʒj.

Scammon.

Syr. Absynth. ana gr. Xjj.

M. f. Bolus. D. S. Nach einer vorhergegangenen
Abführung zu nehmen; nachher:

R̄. Calomel.

Rad. Polypod.

Cort. Mori

Syr. Agarici alb. comp. ana ʒj.

Scammon. ʒβ.

M. f. Bolus.

(Wie bei No. 671.)

Rougere.

N^o. 684.

R̄. Calomel. gr. X.

Sem. Rutae gr. XV.

Hb. Sabinae ℥j.

Ol. Tanacetii gtt. xjj.

Syr. flor. Persicae q. s.

ut. f. Bolus, Disp. tal. Dos. No. II.

D. S. Zwei Tage nach einander einen solchen Bolus.

(Wie bei No. 671.)

*Rathier.*N^o. 685.

℞. Trochisc. Alhandal. gr. jiiij.

Aloës gr. vjjij.

Calomel.

Trochisc. Myrrhae ana gr. x.

Syr. Persicae q. s.

ut. f. Bol. Disp. tal. q. l.

D. S. Nach dem Neumonde drei Tage nach einander einen solchen Bolus.

(Wie bei No. 671. Zugleich Decoctum Portulacae und Rad. Filicis.)

*Laborde.*N^o. 686.

℞. Calomel. gr. x.

Panac. merc. gr. IV.

Diagryd. sulphurat. gr. Xjj.

Test. ovor. calcin. ℥j.

Syr. Persic. q. s.

ut. f. Bolus. D. S. Auf einmal. (Drei Tage lang.)

(Wie bei No. 671.)

*Lagene.*N^o. 687.

℞. Calomel.

Lapid. Cancr. ppt. ana gr. Xjj.

M. f. Pulv. D. S. Abends zu nehmen, und nach 2 Stunden $\frac{1}{2}$ bis 1 Unze Ol. Amygdal. — Am folgenden Morgen ein Drittheil von folgendem Pulver;

- R̄. G. Guttae gr. XXXvj.
 Hb. Card. bened.
 Rad. Angelicae
 Pulv. antiepilept. March. ana gr. vjjj.
 M. f. Pulv. S. Mit etwas Thee oder Fleischbrühe.
 Einige Stunden nachher das zweite und selbst
 das dritte Drittheil. —
 (Wie bei No. 671.) *Clossius.*

N^o. 688. a)

- R̄. Calomel.
 Extr. Aloës succ. ana gr. jjj.
 M. f. i. a. pil. No. III.
 D. S. Bei magerer Diät 8 Tage lang alle Abende
 diese Dosis.
 (Wie bei No. 671.) *Bongard.*

N^o. 688. b)

- R̄. Pulv. Rad. Valer. min. ʒvj.
 Fol. Sennae ʒjj.
 inf. Aq. ft. suff. qt.
 Col. ʒvj. adde
 Natri sulph. crystall. ʒjjj.
 Syr. mannat. ʒjj.
 Elaeosacch. Tanaceti ʒjj.
 M. D. S. Alle zwei Stunden 2 Eßlöffel, und schwarzen
 Kaffee mit vielem Zucker oder Syrup nach-
 zutrinken. — Mittags eine dünne Mehlsuppe, und
 Hering mit Heringsmilch. Abends 8 Uhr Herings-
 salat mit gehacktem rohen Schinken, Bolle, vie-
 lem Oel und Zucker. — Am darauf folgenden
 Tage von 6 Uhr Morgens an;
 R̄. Asae foetidae
 Extr. Graminis ana ʒjjj.
 Pulv. Guttae
 Pulv. Rad. Rhei
 — — Jalappae ana ʒjj.

Pulv. Rad. Ipecacuanhae
 Hb. Digital. purp.
 Salph. stib. aurant. ana $\mathfrak{D}\beta$.
 Calomel. $\mathfrak{D}\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.
 Ol. Tanaceti aeth.

— Anisi aeth, ana gtt. XV.

M. f. l. a. pil. pd. gr. $\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.

Consp. pulv. Lycopod. dent. ad vitr.

- S. Stündlich 6 Pillen mit einem Theelöffel Syrup;
 und eine halbe Stunde, nachdem die Pillen ge-
 nommen worden, einen Esslöffel Ol. Ricini. Da-
 zwischen schwarzen Kaffee mit vielem Syrup oder
 Zucker. Mittags Fleischbrühe, Abends Mehlsuppe
 mit frischer Butter und Zucker. —

Wo es zweifelhaft ist, ob ein Bandwurm vor-
 handen sei, gebe man vorher folgendes Pulver
 Morgens nüchtern, nachdem der Kranke Abends
 einen Herings-Salat gegessen, und viel Zucker-
 wasser getrunken hat.

Ry. Pulv. Rad. Jalappae gr. XV.

— Sem. Cynae $\mathfrak{D}\beta$.

Guttae

* Calomel. ana gr. vj.

Elaeosacch. Tanaceti $\mathfrak{J}\mathfrak{J}$.

- M. D. S. Morgens nüchtern mit Syrup zu neh-
 men, und Kaffee oder Fleischbrühe nachzutrin-
 ken. — Es erfolgen darauf starke Stühle, mit
 welchen Stücke des Bandwurms abgehn.

(Wie bei No. 671. — Dieses Mittel wurde von
 dem preussischen Ministerium der Medicinal-
 Angelegenheiten einer wiederholten Prüfung
 unterworfen, und fand sich als höchst wirksam
 in allen Fällen, weshalb es dem Entdecker für
 eine namhafte Summe abgekauft ward.)

C. A. Schmidt.

S c r o p h e l n.

N^o. 689.

- R_x. Calomel. \mathfrak{v} j.
 Res. Jalapp. \mathfrak{v} jj.
 Sacch. alb. \mathfrak{v} jjj.
 Mucilag. G. arab.
 q. s. ut f. l. a. Trochisc. gr. VI.
 Consp. Amyl.
 D. S. Von Zeit zu Zeit 2—3 Zeltchen.
 (S. No. 1177.)

*Fleisch.*N^o. 690.

- R_x. Calomel.
 Sulph. aurat. antim. ana gr. β .
 Hb. Cicutae gr. V—X.
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.
 D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
 (Pulvis Plummeri.) *Plummer. (Henke.)*

N^o. 691.

- R_x. Pulv. Antim. crud. $\mathfrak{v}\beta$.
 Elaeosacch. Citri \mathfrak{v} j.
 Pulv. Flor. Cassiae $\mathfrak{v}\beta$.
 M. f. c. s. q. Mucilag. G. Tragacanth.
 Trochisc. No. XXXXVIII.
 D. S. Zuweilen im Tage ein Zeltchen. *Fleisch.*

N^o. 692.

- R_x. Pulv. Antim. crud. \mathfrak{v} j.
 Res. Guajaci $\mathfrak{v}\beta$.
 Extr. Aconit. \mathfrak{v} j.
 Sacch. alb. \mathfrak{v} x.
 Mucilag. G. Tragacanth. q. s.

ut f. Rotul. No. XV.

D. S. Viermal täglich ein Zeltchen. *Weikard.*

Nº. 693.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. destill. $\bar{3}\beta$.

adde

Syr. Papav. alb. $\bar{5}jj$.

M. D. S. Täglich drei bis viermal 10—20 Tropfen
in Schleim. *Hufeland.*

Nº. 694.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}l\beta$.

Extr. Conii maculat. gr. X.

solve in

Aq. Foeniculi $\bar{3}v-vj$.

adde

Syr. Rub. Idaeii $\bar{3}\beta-l\beta$.

M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

Remer.

Nº. 695.

Ry. Barytae mur. $\bar{3}\beta$.

solve in

Aq. destill. $\bar{5}j$.

adde

Vini stib. $\bar{5}jj$.

M. D. S. Alle 3 Stunden 10—15 Tropfen, mit der
Gabe steigend. *Wendt.*

Nº. 696.

Ry. Kali caust. gr. X.

solve in

Aq. Cort. Aurant. $\bar{3}j$.

M. D. S. Täglich viermal 10—20 Tropfen in einer
Tasse Kalbsbouillon. *Wetz.*

N^o. 697.

R_x. Sulph. aurat. antimon.
Extr. Arnicae ana ʒj.
Flor. Sulph. ʒβ.

M. f. l. a. c. Syr. Fumar. q. s.
Pil. pd. gr. II, Consp. pulv. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 12 Pillen. *Stoll.*

N^o. 698.

R_x. Guajaci ʒj.
Sap. med. ʒβ.
Calomel.
Sulph. aurat.
Camphor.
Pulv. Rad. Senegae ana ʒj.

M. f. l. a. Pil. gr. II.
Consp. Sem. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 8—10 Pillen. Zugleich
ein Thee von Guajacum. (Bei torpiden Subjecten
passend.) *Selle.*

No. 699.

R_x. Extr. Cicutae ʒj.
Pulv. Hb. Digital. purp. ʒβ.
Sulph. aurat. antim. ʒj.
Calomel, gr. x.

M. f. l. a. pil. pd. gr. I.
Consp. pulv. rad. Liquirit.
D. S. Morgens und Abends 10 Pillen. *Kortum.*

N^o. 700.

R_x. Sacch. alb. ʒIβ.
Flor. Sulph.

Rad. Irid. flor. ana ʒj.

Magnes. Nitri ʒβ.

M. f. Pulv. D.

S. Täglich dreimal eine Messerspitze mit Milch oder Wasser.

(Auch gegen Crusta lactea und Tinea capitis.)

Vogler.

N^o. 701.

R_x. Stib. sulph. nigr. ʒjj.

G. Asae foet. ʒjjj.

Extr. Cicutae ʒβ.

— Aconiti gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.

D. S. Zweimal täglich 8—10 Pillen (steigend).

Richter.

N^o. 702.

R_x. Res. Lign. Guajaci ʒj.

Sulph. stib. aurant. ʒiv.

Calomel. ʒj.

M. f. c. s. q. Bals. peruv.

Pil. No. LX. Consp.

D. S. Alle Abende 3—4 Pillen, (S. No. 759.)

Richter.

N^o. 703.

R_x. Magnes. alb. ʒβ.

Res. Guajaci

Limat. Martis ana ʒβ.

Sacch. alb. ʒjjj.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends eine Messerspitze voll.

Gölis.

N^o. 704.

- R_x. Extr. Cicut.
 Sap. venet. ana ʒβ.
 G. Ammoniaci
 Mass. pil. Ruf. ana ʒj.
 M. f. pil. pd. gr. III.
 Consp. Sem. Lycopod.
 D. S. Viermal täglich 2 Pillen.

*Störk.*N^o. 705.

- R_x. Stib. sulphurat. nigr.
 Pulv. Stipit. Dulcamar. ana ʒj.
 Extr. Dulcamar. ʒjj.
 M. f. Pil. pd. gr. II. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 12 — 30 Pillen.
 (Auch gegen chronische Hautausschläge empfohlen.)
Althof. (Hufeland.)

N^o. 706.

- R_x. Galbani
 Ammoniaci
 Sap. med. ana ʒj.
 Rad. Rhei ʒβ.
 Tart. stib. gr. XV.
 M. f. Pil. pd. gr. II.
 D. S. Morgens und Abends 10 — 15 Pillen.

*Schmucker.*N^o. 707.

- R_x. Fol. Digital. purp. gr. IV — VIII.
 Spong. marin. ust. ʒβ.
 Elaeosacch. Foeniculi ʒjj.
 M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.
 D. S. Täglich 2 — 3 Pulver.

Rust.

N^o. 708.

- Ry. Sal. Herb. ʒj.
 Acet. Vini q. s. ad saturat.
 adde
 Anim. Rhei ʒj.
 Vini Antimon. ʒj.
 M. D. S. Täglich dreimal 30 — 50 Tropfen.

*Selle.*N^o. 709.

- Ry. Extr. Tarax.
 — Fumar.
 — Trifol. fibr. ana ʒj.
 Aq. Cinnam. s. v. ʒijj.
 Tr. Valer. aeth. ʒj.
 — Rhei aq. ʒj.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Theelöffel.

*Henke.*N^o. 710.

- Ry. Rad. Caryophyll. ʒβ.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 in finem coct. inmiscē
 Rad. Calam. aromat. ʒj.
 Col. ʒvj. adde
 Essent. Cort. Aurant.
 Tr. Rhei
 Liq. anodyn. Hoffm. ana ʒj.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

*Henke.*N^o. 711.

- Ry. Ungt. Neapolitan. ʒj.
 Sap. domest. ʒβ.
 Camphorae ʒj.

N 2

M. intime. D. S. Zum Einreiben, (Besonders bei einzelnen geschwollenen Drüsen.) *Schreger.*

N^o. 712.

R_x. Ungt. Hydrarg. ciner.
Ungt. Digital. purp.
Liniment. volat. ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Täglich ein bis zweimal in den Unterleib einzureiben. (S. No. 631. 632.) *Scheu.*

N^o. 713.

R_x. Sap. venet. $\bar{3}j$.
Camphor. $\bar{3}j$.
Liq. Ammon. vinos. $\bar{3}\beta$.
Ol. animal. Dipp. gtt. XX.

M. D. S. Zum Einreiben in den Unterleib und ad locum affectum. *Richter.*

N^o. 714.

R_x. Ungt. Althaeae $\bar{3}j$.
Fell. Taur. rec.
Sap. venet. ana $\bar{3}jjj$.
Petrol. $\bar{3}jj$.
Sal. C. C. vol. $\bar{3}\beta$.
Camphorae $\bar{3}j$.

M. f. Linimentum.

D. S. Alle drei Stunden einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Bei gleichzeitigen Würmern soll man $\bar{3}\beta$. Ol. Tanaceti hinzusetzen.)

Hufeland.

N^o. 715.

R_x. Rad. Squillae $\bar{3}jjj$.
Coq. c.

Lixiv. caust. suff. qt.
ad mucilag. Col. adde
Adipis suillae q. s.

ut f. Ungt. D.

S. Zum Einreiben auf den Unterleib, und auf die einzelnen angeschwollenen Drüsen. (Auch gegen Wassergeschwülste und Verhärtungen.)

Hufeland.

N^o. 716.

R_x. Extr. Dulcamar. ʒiβ.

— Senegae ʒj.

— Cicutae ʒβ.

solve in

Vini antimon. Huxh.

Aq. Cinnamom. ana ʒβ.

M. D. S. Täglich viermal 60—80 Tropfen, Monatlang zu gebrauchen. Zugleich alle 8 Tage eine Abführung mit Calomel und Jalappe; äusserlich Einreibungen mit Ungt. neapolitanum und Digitalis und stetes Tragen eines Empl. camphorat. Myrsichti; ein Fontanell in die Nähe der Geschwulst, und täglich ein halbes Bad aus einer Lauge von 3 Loth ungelöschtem Kalk und eben so viel Schwefel.

Hufeland.

N^o. 717.

R_x. Rad. Bryoniae ʒijj.

Flor. Sambuci ʒj.

G. Ammoniaci ʒβ.

Ammon. muriat. crud. ʒjj.

Hb. Cicutae ʒjj.

Aceti crudi q. s.

ut f. coquendo Empl.

D. S. Warm auf die Geschwulst zu legen.

(Gegen Gelenkgeschwülste, Scropheln, Struma,
Scirrhus.) *Plenk.*

N^o. 718.

R_x. Ferri pulv. ʒj.
Conch. ppt. ʒβ.
Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich drei bis viermal einen
Theelöffel.

(Gegen Kropf.)

Gölis.

N^o. 719.

R_x. Nihil. alb. ʒiv.
Oss. Sep.
Putam. ovor. ana ʒjj.
Panni scarlat. ʒβ.

M. et vase clauso comburantur et redig. in pulv.
D. S. Morgens und Abends 18 Gran zu nehmen,
und zur Vollmondszeit eine Purganz.

(Wie bei No. 718.)

De Haen.

N^o. 720.

R_x. Antimon. crudi ʒjj.
Lact. Sulph.
G. Guajaci
Extr. Arnicae
— Cicutae ana ʒj.
Hb. Digital. purp.
Barytae mur. ana ʒβ.

M. f. l. a. pil. pd. gr. II.
Consp. pulv. Calam. aroma
D. S. Dreimal täglich 8 Pillen.

(Wie bei No. 718.)

Jahn.

N^o. 721.

R_x. Antim. crud. ʒvj.
 Res. Guajaci ʒβ.
 Extr. Aconiti ʒj.
 Sacch. alb. ʒx.

M. f. l. a. c. Mucilag. G. Tragacanth.

Rotul. pd. gr. VI.

D. S. Dreimal täglich ein Zeltchen.

(Wie bei No. 718. Auch gegen veraltete Halsdrüsengeschwülste empfohlen.)

Stoll. (Greding.)

N^o. 722.

R_x. Spong. tost. ʒvj.

Aq. font. ʒiv.

bull. paulisp. Col. adde

Aq. Ment. pip. ʒiβ.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

Liq. Ammon. anisat. ʒj.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

(Wie bei No. 718.) *Richter.*

N^o. 723.

R_x. Spong. marin.

Cort. lign. Suberis

Lap. Pumicis ana ʒj.

M. D. S. Alle Abende eine halbe Drachme in einem

Bolus.

(Wie bei No. 718.) *Bate.*

N^o. 724.

R_x. Cinnabar. Antimon. ʒj.

Spong. ust.

Millep. praep. ana gr. XV.

M. f. Pulv. D. S. Drei Wochen lang Morgens und
Abends ein solches Pulver.

(Wie bei No. 718.)

Prosser.

N^o. 725.

R_x. Spong. marin. tost. $\bar{3}\beta$.

Sem. Coff. tost. $\bar{3}\text{II}\beta$.

Rad. Jalapp. $\bar{3}\text{I}\beta$.

Cort. Cinnamom. $\bar{3}\beta$.

G. Guttae $\bar{3}\text{j}$.

Elaeosacch. Citri $\bar{3}\text{jij}$.

M. f. Pulv. D. S. Täglich dreimal 2 Messerspitzen
voll.

(Wie bei No. 718.)

Weikard.

N^o. 726.

R_x. Spong. marin. $\bar{3}\beta$.

Magnes. carb.

Kali nitrici

Sacch. alb. ana $\bar{3}\text{j}$.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Dreimal täglich einen Kaffeelöffel voll.

(Wie bei No. 718.)

Mead. (Clarus.)

N^o. 727.

R_x. Spong. combust.

Antimon. crud.

Flor. Sulph.

Hb. Cicutae

Conch. pp, ana part. aeq.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends eine halbe
bis ganze Drachme.

(Wie bei No. 718.)

Kortum.

N^o. 728. a)

- R_x. Spong. tost. $\bar{\text{3}}\beta$.
 Hb. Digital. $\bar{\text{3}}j$.
 Ebull. aq. f. $\bar{\text{3}}\text{IV}$.
 Col. adde
 Spir. Sal. ammon. anisat. $\bar{\text{3}}j$.
 Syr. Althaeae $\bar{\text{3}}\beta$.
- M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 718. Besonders gegen Struma lym-
 phatica.) *Jahn.*

N^o. 728. b)

- R_x. Spong. marin.
 Tart. crud. ana $\bar{\text{3}}\text{IV}$.
 Lap. Spong.
 Alum. crud.
 Corii russ. ana $\bar{\text{3}}ij$.
- M. Calcin. in vase fictil. bene claus.
 per $\frac{1}{4}$ hor. ut f. pulv. niger.
- S. Pulv. strumalis Hausleutneri.

- R_x. Pulv. strumal. Hausleutneri $\bar{\text{3}}vj$.
 coq. c. Aq. ft. q. s.
 Col. $\bar{\text{3}}\text{IX}$ admisce
 Aq. Cinnamomi
 Syr. Cort. Aurant. ana $\bar{\text{3}}\beta$.
- M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 728. a.) *Hausleutner.*

N^o. 729.

- R_x. Spong. marin. tost. $\bar{\text{3}}\text{I}\beta$.
 Coq. ex Aq. ft. suff. qt.
 Col. $\bar{\text{Q}}\text{I}$. adde
 Extr. Saponariae $\bar{\text{3}}j$.

M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

(Wie bei No. 718.)

Thilenius.

N^o. 730.

R_x. Tart. tartarizat.

Spong. tost.

Sacch. alb. ana ʒβ.

Sal. ammon. dep.

Rad. Imperator.

Cinnamom. acut. ana ʒjj.

Sulph. Antim. aurat. ʒj.

Piperis longis ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Wenig reizbaren, an stärkern lymphatischen Kröpfen leidenden Personen täglich, Morgens und Abends einen gehäuften kleinen Theelöffel. Reizbaren, magern, mit kleinen Kröpfen behafteten Subjecten täglich einmal einen Theelöffel. Am besten ist es, wenn das Pulver trocken verschluckt wird.

(Wie bei No. 718.) *Hedenus. (v. Gräfe.)*

N^o. 731.

R_x. Lapid. Spong.

Spong. marin. ust. ana ʒjjj.

M. f. Pulv. Divide in partes IX (ad XII) aeq.

D. S. Bei abnehmendem Monde Morgens und Abends ein Pulver. Zugleich örtlich ein Empl. diasulph. Rulandi.

(Wie bei No. 718.)

Vogler.

N^o. 732.

R_x. Camphorae ʒj.

Ol. Olivar.

Spir. Ammon. comp. ana $\bar{3}$ jj.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Gegen Struma.)

Copland.

N^o. 733.

Ry. Liq. Sal. ammon. caust. $\bar{3}\beta$.

Tr. Cantharid. $\bar{3}$ jj.

Spir. camphorat. $\bar{3}$ l β .

Extr. Hyoscyami $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 732.)

Osiander.

N^o. 734.

Ry. Kali hydriodici $\bar{3}\beta$ — j.

Axung. porci $\bar{3}$ l β .

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Nuss gross in die Kropfgeschwulst einzureiben.

(Wie bei No. 732. Auch gegen Drüsenanschwellungen und solche Verhärtungen im Allgemeinen empfohlen.)

Coindet.

N^o. 735.

Ry. Sap. med. gr. x.

Pulv. Ari comp. gr. v.

Fell. Tauri gr. j.

M. D. S. Die Hälfte Mittags, die andere Hälfte Abends.

(Gegen Atrophia infantum.)

Rosenstein. (Jahn.)

N^o. 736.

Ry. Extr. Aconiti gr. vj.

Vini stib. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Täglich viermal 10 — 30 Tropfen.
(Wie bei No. 735.) *Hecker.*

N^o. 737.

Ry. Extr. Cicutae \mathfrak{B} — gr. xv.
Tr. Rhei aq.
Tr. Aurant. comp. ana \mathfrak{J} j.
Liq. Kali acet.
Syr. Cort. Aurant. ana \mathfrak{J} j.

M. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 735.) *Hecker.*

N^o. 738.

Ry. Extr. Cascarill. \mathfrak{J} j.
solve in
Aq. Foeniculi \mathfrak{B} β.
— Cinnamomi \mathfrak{J} jj.
adde
Syr. Althaeae \mathfrak{B} β.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 735.) *Hufeland.*

N^o. 739.

Ry. Rad. Graminis
— Althaeae ana \mathfrak{J} jj.
— Taraxaci \mathfrak{J} j.
— Salep. \mathfrak{J} jj.
Rasur. C. Cerv. \mathfrak{B} β.
Sem. Foeniculi \mathfrak{J} jj.

C. C. D. S. Drei Esslöffel voll in drei Nösel Wasser
zu kochen, und täglich zu trinken.
(Wie bei No. 735.) *Stark.*

N^o. 740.

- R. Spec. aromat. ℥j.
 Hb. Rutae
 Rad. Calami aromat. ana ℥β.
 C. C. M. Divide in partes VI aeq.
 D. S. Morgens und Abends eine Portion ins Bad.
 (Wie bei No. 735.) *Rusch.*
-

N^o. 741.

- R. Extr. Conii gr jii — vj.
 solve in
 Aq. Melissae ℥j.
 adde
 Tr. Rhei aq. ℥j.
 M. D. S. Täglich dreimal einen halben Esslöffel.
 (Gegen Tabes mesaraica.) *Hecker.*
-

N^o. 742.

- R. G. Asae foet.
 Extr. Quassiae
 Sap. med. ana ℥j.
 G. Ammoniacy
 Aloës lucid. ana ℥β.
 M. f. l. a. pil. pd. gr. jj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.
 (Gegen Rhachitis. S. No. 708, 735.)
Richter.
-

N^o. 743.

- R. Liq. Terrae fol. Tart.
 Syr. Cichorei ana ℥j.
 Extr. Graminis ℥jii.
 Vini stib. ℥jii.

Sap. antimon. (vel G. Guttae) \mathfrak{z} j.
 M. D. S. Alle zwei Stunden 1—2 Theelöffel.
 (Wie bei No. 742.) *Schaeffer.*

N^o. 744.

Ry. Rad. Rubiae tinct. $\mathfrak{z}\beta$.
 Coq. leni igne cum Aq. ft. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 et Tart. solub. $\mathfrak{z}\text{jj}$. per horam.
 Col. adde
 Mellis despumat. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 M. D. S. Dem entwöhnten Kinde täglich 8 Unzen.
 (Wie bei No. 742.) *Levet.*

N^o. 745.

Ry. Rad. Rubiae tinct. $\mathfrak{z}\text{jj}$.
 Cort. Aurant. sicc.
 Sem. Foeniculi contus. ana gr. xj .
 Concis. coq. c.
 Aq. font. $\mathfrak{z}\text{v}$. ad Col. $\mathfrak{z}\text{jjj}$.
 M. D. S. Zum täglichen Getränk.
 (Wie bei No. 742.) *Rosenstein.*

N^o. 746.

Ry. Croc. mart. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Lap. Cancr. ppt. $\mathfrak{z}\beta$.
 Cinnabaris $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. Pulv. Divide in partes L aeq.
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Wie bei No. 742.) *Camper.*

N^o. 747.

Ry. Medullae oss. Tauri $\mathfrak{z}\text{jjj}$.
 Liqutatis et refrigeratis

adde

Mixt. oleoso-balsamicae $\bar{3}\beta$.Bals. ind. nigr. $\bar{5}\text{jj}$.

D. ad vasculum. S. Zum Einreiben in das Rückgrat, den Thorax und die Gelenke der Extremitäten. —

(Wie bei No. 742. — S. auch die gegen Scropheln angewandten innerlichen und äusserlichen Mittel.) *Wendt.*

S c o r b u t.

N^o. 748.R_x. Malt. Hordei $\bar{5}\text{vj}$.Coq. c. aq. ft. suff. q. per $\frac{1}{4}$ hor.
addeSem. Foeniculi IV .Rad. Liquirit. $\bar{5}\text{jj}$.Stent in digest. vase bene clauso
per XXIV hor. Col.

D. S. Täglich 1—4 Pfund zu verbrauchen.

*Husham.*N^o. 749.R_x. Rasur. Raphan. rust. $\bar{5}\text{jj}$.Ferri pulv. $\bar{3}\text{j}$.Pulv. Rad. Rhei $\bar{3}\beta$.Rad. Zingiberis $\bar{5}\text{jj}$.Vini alb. gener. $\&\text{jj}$.

Stent in infus. per XII hor.

Col. D. S. Täglich viermal $\frac{1}{2}$ —1 Theetasse voll.*Richter.*

N^o. 750.

R_x. Extr. Trifol. fibr.
— Centaur. min. ana ʒj.

— solve in
Aq. flor. Chamomill. ʒiv.
adde

Spir. Cochleariae ʒjj.

Acid. sulph. dilut. ʒj.

M. D. S. Esslöffelweise.

Richter.

N^o. 751.

R_x. Acid. nitr. fum.
— muriat. ana ʒβ — ʒj.

Aq. destill. ʒiv.

M. D. S. Täglich 3 — 4 Esslöffel.

Köchlin.

N^o. 752.

R_x. Acid. muriat.

Extr. Cort. Chin.

Terrae japon.

Tr. Myrrhae ana ʒβ.

Syr. Moror.

Mell. rosat. ana ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln des blutenden Zahnfleisches. (Auch gegen die Geschwüre.)

Richter.

N^o. 753.

R_x. Acid. muriat.

— nitric. ana ʒβ.

Ol. Lini ʒiv.

M. f. l. a. Linimentum.

D. S. Zum Reiben scorbutischer Flecke. Zugleich
innerlich No. 751.

Giebler.

G i c h t.

N^o. 754.

Ry. Flor. Arnicae ʒij.

inf. Aq. f. suff. qt.

in Col. ʒvj. solve

Extr. Aconiti gr. ʒj.

adde

Tr. Guajaci ammon. ʒj.

Syr. Senegae ʒβ.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Bei vorhandenem fieberhaften Zustand.)

Berends.

N^o. 755.

Ry. Sap. venet. ʒijij.

Res. Guajaci

Pulv. Rad. Rhei ana ʒj.

Extr. Aloës aq. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich dreimal 4—8 Pillen.

Richter.

N^o. 756.

Ry. Crem. Tart. ʒj.

G. Guajaci ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. q. l.

D. S. Viermal täglich ein Pulver.

Kämpf.

N^o. 757.

Ry. Flor. Sulph. ʒj.

Res. Guajaci ʒβ.

Antim. crud. ʒijij.

M. f. c. s. q. Syr. Cort. Aurant.
 Pil. pd. gr. ꝑ. Consperg.
 D. S. Täglich dreimal 8 — 10 Pillen.
 (S. No. 1166.)

Quarin.

No. 758.

Ry. Rad. Sarsaparill. ꝑiv.
 Antim. crud. in sacc. lig. ꝑvj.
 Coq. in Aq. ft. ꝑIX ad
 consumpt. ꝑj. Sub. fin. coct.
 adde

Pulv. Rad. Liquirit. ꝑß.

Sem. Anisi ꝑj.

Col. D. S. Täglich drei bis viermal eine halbe
 Theetasse.

(S. No. 1076.)

(Richter.)

No. 759.

Ry. Aethiop. antim. ꝑj.
 Extr. Stipit. Dulcamar.
 G. Guajaci ana ꝑjj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. ꝑj.
 Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich dreimal 5 — 8 Pillen,
 (Auch gegen Scropheln und Herpes.)

Rust.

No. 760.

Ry. Extr. Aconit.
 Sulph. aurat. Antim. ana gr. ꝑj.
 Pulv. Lapid. Cancror. ꝑj.
 Mellis q. s. ut f. Boli No. II.

D. S. Morgens und Abends einen Bolus, und eine
 Tasse Thee nachzutrinken.

J. A. Schmidt.

No. 761.

- Rx. Antim. crud. ʒj.
 Flor. Sulph. ʒβ.
 Sacch. alb. ʒj.
 Rad. Calam. aromat. ʒj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.
 (Gegen Arthritis mit Atonie der Unterleibs-
 Eingeweide.)
Richter.

No. 762.

- Rx. Cort. Pernv. ʒβ.
 — Cinnamom. ʒβ.
 Antim. crud.
 Sacch. alb. ana ʒj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle drei Stunden einen Thee-
 löffel.
 (Wie bei No. 581.)
Richter.

No. 763.

- Rx. Antim. crud.
 Stipit. Dulcamar. ana ʒj.
 Extr. Trifol. fibr. (vel Card. bened.) ʒj.
 M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Täglich dreimal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 581.)
Richter.

No. 764.

- Rx. Antim. crud. ʒβ.
 Asae foet. ʒj.
 Extr. Aconit. ʒβ.
 Extr. Card. bened. q. s.
 ut. f. Pil. pd. gr. jj.
 Consp. pulv. Cinnamom.

- D. S. Täglich dreimal 8 Pillen. (steigend)
(Gegen Arthritis mit Krämpfen und Unterleibs-
Stockungen.) *Richter.*

No. 765.

- R.* Calomel.
Sulph. aurat. Antim.
Extr. Aconit. ana gr. jj.
Stipit. Dulcamar.
Sacch. alb. ana ʒj.
M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XVI,
D. S. Morgens und Abends ein Pulver.
(Gegen Arthritis.) *Richter.*

No. 766.

- R.* Sulph. aurat. Antim.
Calomel.
Extr. Aconit. ana ʒβ.
Res. Guajac.
Succi Liquirit. ana ʒjjj.
Extr. Stipit. Dulcamar. ʒv.
M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnam.
D. S. Täglich viermal 8 Pillen.
(Wie bei No. 585.) *Richter.*

No. 767.

- R.* Flor. Sulph. ʒβ.
Res. Guajac. ʒjj.
Antim. crud. ʒiβ.
M. f. c. s. q. Syr. Cort. Aurant.
Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnam.
D. S. Täglich 8 — 10 Pillen.
(Wie bei No. 585.) *Quarin.*

N^o. 768.

- R. Calcis antim. sulph. Ph. boruss. ʒiβ.
 Coq. c. aq. ft. ℞ V ad ℞ IV vase clauso.
 D. S. Zu zwei bis drei Pfund täglich zu trinken.
 (N. B. Die Flaschen müssen wohl verstopft werden.)

Hufeland.

N^o. 769.

- R. Natri carb. ʒj.
 Extr. Absynth. ʒjj.
 Aq. Ment. pip. ʒiv.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
 M. D. S. Täglich viermal einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 770.

- R. Sulph. aurat. Antim. gr. XXV.
 Pulv. Rad. Valerianae ʒjj.
 Sap. venet. ʒβ.
 Extr. Dulcimar. ʒjjj.
 M. f. Pil. pd. gr. jj.
 D. S. Täglich viermal 10 Pillen.

Richter.

N^o. 771.

- R. Aethiop. min. ʒβ.
 G. Guajac.
 Sap. venet. ana ʒjj.
 Sulph. aurat. Antim. ʒjj.
 M. f. c. Extr. amar. q. s. Pil.
 pond. gr. jj. Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Abends und Morgens 10 Pillen.

Baldinger.

N^o. 772.

- R. Sap. Amygdal. ʒjj.
 G. Guajaci ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 — 15 Pillen.

Theden.

No. 773.

Ry. Cort. peruv. ʒj .

Res. Guajac. $\text{ʒ}\beta$.

Extr. Aconit. $\text{ʒ}\beta$.

Ol. Cajeput. ʒj .

M. f. Pulv. S. Täglich zwei bis viermal einen
Theelöffel. *v. Gräfe.*

No. 774.

Ry. G. Guajac. ʒj .

Flor. Sulph. ʒj .

Calomel. ʒj .

Rad. Irid. flor.

Sem. Foeniculi ana $\text{ʒ}\beta$.

Laudan. puri gr. ij .

Sacch. albi $\text{ʒ}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends einen
Kaffeelöffel voll in Wasser gerührt. *Stark.*

No. 775.

Ry. Lign. Guajaci ʒij .

— Sassafras

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit.

— Graminis ana ʒj .

Sem. Foeniculi ʒj .

C. M. D. S. Zwei starke Esslöffel mit einem Maass
Wasser auf die Hälfte eingekocht. — Als Holz-
trank.

(Auch gegen Syphilis und Flechten.)

Murray.

No. 776.

R. Tur. Pini
 Bacc. Juniperi
 Ras. Ligu. Guajac.
 Rad. Liquirit. ana part. aeq.
 C. C. M. D. S. Zum Thee. *Seiler.*

No. 777.

R. Guajaci
 Hydrarg. stib. sulph. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Extr. Dulcamar. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 M. f. c. s. q. Syr. simpl.
 Pil. pd. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$. Consp. Sem. Lycopod.
 D. S. Morgens und Abends 8 Pillen. *P. Frank.*

No. 778.

R. Res. Guajaci $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Aq. Foeniculi $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Mucilag. G. arab. q. s.
 ut f. l. a. Emulsio,
 adde
 Syr. emuls. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.
 Spir. Nitr. dulc. gtt. XX.
 M. D. S. Morgens, Mittags und Abends zwei Ess-
 löffel. *Hufeland.*

No. 779.

R. Tr. Guajac. amm. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 — thebaic. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.
 — Antimon. acris $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.
 M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 10 — 20 Tropfen.
v. Gräfe.

N^o. 780.

- Ry. Tr. Guajac. volat. ʒj.
 — Absynth. (vel Caryophyllat.)
 — Aconit. (vel thebaic.) ana ʒj.

M. D. S. Morgens, Mittags und Abends 15—30
 Tropfen (steigend). *Stark.*

N^o. 781.

- Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Extr. Aconit.
 Calomel.
 Sulph. stib. aurant. ana gr. ij.
 Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich zweimal ein Pulver.
 (Besonders gegen Arthritis cephalica.)

Hufeland.

N^o. 782.

- Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Mucilag. G. arab. ʒj.
 ter. aff. sensim
 Aq. Ment. pip. ʒij.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Täglich drei bis viermal einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 783.

- Ry. Res. Guajac. ʒβ.
 Vitell. ov. No. I.
 tere cum
 Aq. Cinnamom. ʒij.
 adde
 Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Den Tag über in zwei bis drei Portionen
zu verbrauchen. *Richter.*

N^o. 784.

Ry. Pulv. rad. Senegae

Sap. venet.

Res. Guajac.

Stipit. Dulcimar.

Antim. crud. ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich zwei bis dreimal 8—12 Pillen.

Richter.

N^o. 785.

Ry. Res. Guajaci ʒj.

Spirit. succi Sacch. ℥IV.

Digere in sol. per VIII dies.

D. S. Monatelang täglich zwei bis dreimal 1—2

Theelöffel.

(Specificum antipodagricum Emerigonis.)

Emerigon.

N^o. 786.

Ry. Tr. Guajaci ammon. ʒβ.

Mucilag. G. arab.

Syr. Amygdal. ana ʒj.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Thee-
löffel.

Richter.

N^o. 787.

Ry. G. Asae foet. ʒj.

Tart. stibiati gr. ʒj.

solve in

Liq. Ammon. acet. ʒj.

Aq. flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\text{iv}$.

adde

Syr. flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Täglich drei bis viermal einen Esslöffel.

Richter.

N^o. 788.

Ry. Antimon. crud.

Extr. Myrrhae aq.

— stipit. Dulcamar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp.

D. S. Täglich drei bis viermal 8 Pillen.

Richter.

N^o. 789.

Ry. Ol. Tereb. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Mellis $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Morgens und Abends einen Theelöffel.

(Besonders gegen arthritische Affectionen im Hüftgelenke.)

Herz.

N^o. 790.

Ry. Rad. Ari

— Aristoloch.

Cort. Winteran.

Sem. Petrosel. ana gr. vj .

Fol. Sennae gr. j .

M. f. Pulv. D. S. Alle Morgen um 9 Uhr ein solches Pulver.

Zugleich *b*)

Ry. Aq. Cinnamom.

Tr. Cort. Aurant. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

Spir. Vitrioli $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Mittags und Abends eine Stunde nach dem Essen 60 Tropfen mit Wasser oder Wein.

Leidenfrost.

N^o. 791.

R_x. Extr. Aconiti ʒβ — j.
Vin. antim. Huxh. ʒj.

M. D. S. Täglich dreimal 15 — 30 Tropfen (steigend).
Richter.

N^o. 792.

R_x. Extr. Pulsatill.
Vini stib. ʒβ.

M. D. S. Täglich dreimal 20 — 60 Tropfen.
(Besonders gegen beginnende Cataracta und
Amaurosis arthritica.)
Rust.

N^o. 793.

R_x. Cort. Pruni padi ʒj.
Spir. Vini rectificati ʒijj.
Aq. font. ʒv.

Digere leniter in vase clauso.

Refrig. exprime. Cort. remanent.

Coq. in Aq. font. ʒvjjj.

Decoct. Colat. misce c. Infuso.

D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Bremer.

N^o. 794.

R_x. Extr. Dulcamar. ʒj.
Pulv. stipit. Dulcamar.
Antim. crud. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Täglich drei bis viermal 20 — 30 Pillen.

Richter.

N^o. 795.

R_x. Stipit. et Fol. Rhododendri chrys. ʒjj.
inf. c. aq. f. ʒlX. Stent in

O 2

digest. vase bene clauso per XXIV hor.
ad. ebull. usque. Col.

D. S. Täglich zweimal eine halbe Theetasse,
Cölpin.

N^o. 796.

R_x. Fol. Sabin. rec.
Sacch. alb. ana $\bar{\text{z}}\beta$.
Cont. pulv. in conserv.
Divide in partes XII aeq.

D. S. Alle vier Stunden einen Theil. *Rave.*

N^o. 797.

R_x. Magnes. carb. $\bar{\text{z}}\beta$.
Aq. Menth. virid. $\bar{\text{z}}\text{iv}$.
Acet. Colchici
Syr. Aurant. ana $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Alle drei Stunden einen Esslöffel.
Scudamore.

N^o. 798.

R_x. Tr. Gratiolae $\bar{\text{z}}\text{j}$.
(eodem modo ac Tr. Aconiti paratae)
Vini hispanici $\bar{\text{z}}\text{jj}$.

M. D. S. Um die andere Stunde einen Theelöffel.
(Wird für den Hauptbestandtheil des Eau mé-
dicinale d'Husson gehalten.)

Wolf. (M. J. Schmidt.)

N^o. 799.

R_x. Phosphor. gr. jj .
subige exact. long. trit. ex
Mucilag. G. arab. q. s.
ut. f. c. Aq. font. $\bar{\text{z}}\text{vj}$.
Emulsio, cui adde

Syr. Amygdalar. $\bar{3}$ j.

Spir. sulph. aeth. gtt. XXX.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hufeland.*N^o. 800.

R̄. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. jj.

Alcohol. vini $\bar{3}$ j.Res. Guajac. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Morgens und Abends 20 Tropfen.

*Lentin. (Richter.)*N^o. 801.

R̄. Rad. Gent. rubr.

— Aristoloch. rotund.

Summitat. Chamaedrys

— Chamaepitys

— Gent. minor. ana p. aeq.

G. M. f. Pulv. D. S. Drei Monate lang jeden Morgen eine Drachme.

*(Pulvis antipodagricus Portlandi.)*N^o. 802.R̄. Lign. Sarsaparill. $\bar{3}$ iv.

— Sassafras

Cort. Chinae ana $\bar{3}$ jj.Rad. Liquirit. $\bar{3}$ j.

Coq. ex Aq. font. Cong. jj.

per $\frac{1}{2}$ horam. Deinde stent clause

super cinere calid. per horas XII.

Postea ebull. ad tertiae partis consumpt.

Cum primum ab igne amoveatur, infunde

Sem. Anisi $\bar{3}$ β.

Post horas II col. et postea depur.

per resid. et liq. clarus reponat. in

lagen. vitr. probe clausis.

S. Theelöffelweise.

(Besonders gegen Podagra gerühmt.)

*Sydenham.*N^o. 803.

Rx. Phosphori gr. IV.

solve in

Ol. Tereb.

— Lini express. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

adde

Camphorae $\bar{\text{ʒ}}\beta$ — $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

M. D. S. Täglich zweimal einzureiben.

(Auch gegen Lähmung empfohlen.)

*Horn.*N^o. 804.Rx. Bals. peruv. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.Spir. Vini $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.

M. D. S. Mehrmals täglich in die leidenden Gelenke einzureiben.

*Hoffmann. (Hufeland.)*N^o. 805.

Rx. Liq. Sal. ammon. caust.

Camphorae ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.Ol. Terebinth. $\bar{\text{ʒ}}\text{iv}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

*Ackermann.*N^o. 806.Rx. Bals. Meccae $\bar{\text{ʒ}}\text{vj}$.Chin. rubr. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.Crocī $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Salviae

Sarsaparill. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.

Macera per horas XXXXVIII Balsamum
cum Spir. Vini $\bar{3}$ l β — et medicamina alia cum altera
Spir. Vini parte. Tum filtra et misce totum.

D. S. Zu Breiumschlägen geschüttet und überzu-
schlagen (zu $\bar{3}$ jj.) *Pradier.*

N^o. 807.

R_x. Tr. Gentianae
— Calami aromat. ana part. aeq.

M. D. S. Auf Brei zu Umschlägen.

Nasse.

N^o. 808.

R_x. Hb. Cicutae
— Hyoscyami ana M. j.
Sap. med. $\bar{3}$ β.

G. M. D. S. Mit Milch gekocht zum Umschlag.
(Auch gegen Herpes.) *Hecker.*

N^o. 809.

R_x. Sal. ammon. dep. $\bar{3}$ l β — jj.
Merc. subl. corrossiv. $\bar{2}$ j — $\bar{3}$ β.
Spir. Sabinæ $\bar{3}$ iv — vj.
Aq. Sabinæ $\bar{3}$ xjj — xvjjj.

M. D. S. Zu einer hinreichenden Menge Regen-
wasser geschüttet, zu Localbädern. *Kopp.*

N^o. 810.

R_x. Summitat. Juniperi
Fol. jun. Quercus
— Rubi nigri
Hb. Salviae sylv. ana M. IV.

Coq. ex Aq. font. Mens. IV.

D. S. Kochend in eine Badewanne geschüttet.

Der nakte mit drei bis vier wollenen Decken umhangene Kranke sitze auf einem Stuhl, so dass er von der Flüssigkeit nicht berührt werde; er trinke zwei bis drei Tassen Fliederthee, und bleibe $1\frac{1}{2}$ Stunden im Dampfe sitzen. Alle drei bis vier Tage zu wiederholen. *Sproegel.*

N^o. 811.

R_x. Merc. praecip. alb. \mathfrak{z} j — \mathfrak{v} iv.
Ungt. Digital. purp. \mathfrak{z} j.

M. exactiss. D. S. Drei bis viermal einzureiben und die Stelle mit Wachstuch (oder Wachstaffet) zu bedecken.

(Diese Salbe erregt einen künstlichen Ausschlag, welcher sehr schnell erscheint und weniger schmerzhaft und zerstörend eingreift als die Autenriethsche Salbe (s. No. 631.), und ist ausser gegen Gicht auch gegen Phthisis trachealis, Dysphagia, Tussis convulsiva, Scropheln und Ophthalmia scrophulosa empfohlen.)
Kopp.

N^o. 812.

R_x. Tart. emet. \mathfrak{z} ijβ.
Axung. porci \mathfrak{z} j.

M. f. Ungt. D. S. Täglich dreimal eine Haselnuss gross einzutreiben.

(Von Autenrieth zwar zuerst gegen Keuchhusten empfohlen, allein auch gegen Arthritis, zurückgetretene chronische Exantheme und Phthisis trachealis sehr hilfreich.)

Autenrieth.

N^o. 813.

R_x. Laud. liq. Sydenham. \mathfrak{v} iv.
Ol. Olivar. \mathfrak{v} xx.

M. D. S. Umgeschüttelt auf Flanell an die leidende Stelle.
Vogler.

K r a m p f k r a n k h e i t e n .

Insofern die Krämpfe von Säure, Würmern u. s. w. herrühren, sind auch jene Rubriken nachzusehen. (S. auch Autenrieth's Salbe No. 812, welche in Krampfkrankheiten von Horn und-Feiler sehr empfohlen wird.)

N^o. 814.

R_x. Rad. Valer. ʒj.
— Irid. flor. ʒiβ.
— Liquirit. ʒjj.
Sem. Anisi ʒβ.
Croci opt. gr. vjjj.
Magnes. Sal. amar. ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich zwei bis dreimal eine Messerspitze voll.

(Gegen die Krämpfe der Kinder von Säure.)

Hufeland.

N^o. 815.

R_x. Extr. Cort. reg.
— Cort. Aurant. ana ʒj.
Aq. Foeniculi
— Cinnamomi ana ʒj.
Tr. Valer. aeth. ʒj.
Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Theelöffel.

(Wie bei No. 814.)

Henke.

N^o. 816.

R_x. Extr. Valer. ʒjj.
— Hyoscyam. gr. v.

solve in

Aq. Meliss.

— Cinnamom. ana $\bar{3}\beta$.

adde

Liq. anodyn. Hoffm. gt. XX.

M. D. S. Alle Stunden ein bis zwei Theelöffel.

(Wie bei No. 814.)

Henke.

N^o. 817.

R_y. Sem. Sinap. $\bar{3}\text{I}\beta$.

Spir. Vin. gall. $\bar{3}\text{jjj}$.

Aq. font. $\bar{3}\text{I}\beta$.

Digere per aliquot horas.

Col. adde

Liq. Ammon. carb. $\bar{3}\text{jjj}$.

M. D. S. Täglich zweimal einen Esslöffel in Wasser zu nehmen.

(Gegen Krämpfe von Schleim im Unterleibe.)

Adair.

N^o. 818.

R_y. Ol. Lini

Syr. Althaeae ana $\bar{3}\text{jj}$.

M. D. S. Umgeschüttelt Esslöffelweise. *Richter.*

N^o. 819.

R_y. Opii puri gr. IV.

Nitri dep.

Sacch. Lact. ana $\bar{3}\text{I}\beta$.

M. f. Pulv. Divide in part. VI aeq.

D. S. Alle zwei bis drei Stunden ein Pulver.

Richter.

N^o. 820.

R_y. Tr. Opii simpl. $\bar{5}\text{j}$.

Acid. sulph. dil. $\bar{3}\text{jjj}$.

Syr. Violar. $\bar{3}$ jj.

M. D. S. Zu 1—2 Theelöffel.

*Richter.*N^o. 821.

Ry. Rad. Ipecacuanhae
 Camphorae ana gr. \bar{ij} .
 Opii puriss.
 Calomel. ana gr. j.
 Sacch. alb. \bar{ij} .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Vor Schlafengehn ein Pulver mit warmem
 Chamillenthee zu nehmen.

*Richter.*N^o. 822.

Ry. Opii puriss. gr. v—x.
 Camphor. ras. \bar{ij} .

Ammon. carb. pyro-ol. \bar{ij} IV.

M. f. Pulv. Divide in part. X aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

(Besonders gegen Krämpfe der Bewegungs-Or-
 gane.)

*Richter.*N^o. 823.

Ry. Ol. Amygdal. $\bar{3}$ jj.
 Mucilag. G. arab. $\bar{3}$ vj.

M. exact. et adde

Decoct. Rad. Salep. $\bar{3}$ x.Opii puriss. gr. \bar{ij} —IV.(Tr. thebaicae \bar{ij} — $\bar{3}\beta$.)

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

(Besonders bei Unterleibskrämpfen.)

*Richter.*N^o. 824.*Ry.* Extr. HyoscyamiFlor. Zinci ana \bar{ij} .

Magnes. carb. $\bar{5}j$.Sacch. Lactis $\bar{5}vj$.M. f. Pulv. D. S. Kindern 2—6 Gran, Erwachsenen 10—30 Gran pro dosi. *Richter.*N^o. 825.R \bar{y} . Extr. Hyoscyami $\bar{5}j$.Aq. Laurocerasi $\bar{3}\beta$.M. D. S. Täglich drei bis viermal 20—50 Tropfen. *Jahn.*N^o. 826.R \bar{y} . G. Asae foet. $\bar{5}jj$.Extr. Cicutae $\bar{5}j$.— Aconit. $\bar{3}\beta$.

Calcmel. gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. \bar{ij} .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Wie bei No. 823.) *Richter.*N^o. 827.R \bar{y} . Hb. Digital. $\bar{3}\beta$.

inf. Aq. fervid. suff. qt.

Col. $\bar{3}vj$. addeAq. Cinnamom. simpl. $\bar{5}j$.M. D. S. Täglich zwei bis dreimal einen Esslöffel. *Richter.*N^o. 828.R \bar{y} . Sem. Datur. Strammon. $\bar{5}jj$.Vini hispan. $\bar{3}vjjj$.Spir. Vini $\bar{5}j$.

Digere leni calore per VIII dies.

Col. D. S. Zu 5 bis 20 Tropfen pro dosi. *Hufeland.*

N^o. 829.

- R. Moschi opt. $\mathfrak{D}\beta$ — $\mathfrak{J}\beta$.
 Elaeosacch. Cinnamom. $\mathfrak{J}\text{jj}$.
 M. f. Pulv. subtiliss.
 terendo adde sensim
 Ag. Cinnamom. (vel Menthae) $\mathfrak{J}\text{v}\text{jjj}$.
 Syr. Cort. Aurant. $\mathfrak{J}\text{j}$.
 M. D. S. Ungeschüttelt alle 1 — 2 Stunden zwei
 Esslöffel. *Richter.*

N^o. 830.

- R. Moschi opt. gr. XII — XXIV.
 tere cum
 Amygdal. dulc. excort. q. s.
 ut f. l. a. Emuls. add.
 Aq. Cinnam. s. v. $\mathfrak{J}\text{IV}$.
 Syr. Amygdal. $\mathfrak{J}\beta$.
 M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.
Richter.

N^o. 831.

- R. Castor. gr. jjj — vj .
 Rad. Valer. min.
 Sacch. alb. ana $\mathfrak{D}\text{j}$.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.
 D. S. Ein Pulver pro dosi.
 (Besonders auf die Sphäre der Genitalien wirkend.)
Richter.

N^o. 832.

- R. G. Galb.
 — Asae foet.
 Extr. Myrrhae aq. ana $\mathfrak{J}\text{j}$.
 Castor.
 Camphorae

Ammon. carb. pyro-oleos. ana gr. V.

Ol. Cajeput. gtt. jiiij.

M. f. c. s. qt. Bals. peruv. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 10 — 20 Pillen.

Richter.

N^o. 833.

R_x. Opii gr. v.

Camphorae ℥j.

Ammon. pyro-oleos. ℥iv.

M. f. Pulv. Divide in partes X aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

Hecker.

N^o. 834.

R_x. Camphorae rasae gr. jj.

Kali nitrici

Sacch. alb. ana ℥j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.

(Besonders bei gleichzeitig gestörter Hautfunction.)

Richter.

N^o. 835.

R_x. Camphorae rasae ℥β — j.

terendo misce c.

Aq. flor. Sambuci ℥iv.

Aceti Vini acerrimi ℥j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 834.)

Richter.

N^o. 836.

R_x. Camphorae rasae ℥jj.

Succi Citri unius rec. express.

Vini alb. generos. ℥j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 834.)

Richter.

N^o. 837.

Ry. Camphorae gr. v.
Ammon. carb. pyro-ol. gr. vjij.
Mucilag. G. arab.
Syr. Althaeae ana ʒβ.
Aq. flor. Sambuci ʒijj.

M. f. l. a Emulsio.

D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.

Richter.

N^o. 838.

Ry. Moschi c. Sacch. alb. trit. ʒij.
Ammon. carb. pyro-ol. ʒβ—j.
Aq. Meliss. ʒvj.
Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 1—2 Stunden einen
Esslöffel.

Richter.

N^o. 839.

Ry. Aether. vitriol. (vel acet.) ʒj.
Aq. Cinnamom. ʒij.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Besonders bei grosser Schwäche.)

Hecker.

N^o. 840.

Ry. Aether. vitriol.
Tr. Valer. ana ʒij.
— thebaicae ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden 15—20 Tropfen.
(Wie bei No. 839.)

Hecker.

N^o. 841.

- R_y. Liq. anodyn. Hoffm.
Tr. Valer. ana ʒj.
M. D. S. Stündlich 30 — 40 Tropfen auf Zucker.
(Wie bei No. 839.) *Hecker.*
-

N^o. 842.

- R_y. Ol. Chamomill. ʒβ.
Spir. muriat. aeth. ʒj.
M. D. S. Täglich dreimal 10 Tropfen.
Heim.
-

N^o. 843.

- R_y. Extr. Valer. ʒvj.
Ol. Valer. s. q. Sacch. alb. trit. gtt. VI.
Aq. flor. Aurant. ʒvj.
Syr. opiat. ʒj.
M. D. S. Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen
Esslöffel. *Richter.*
-

N^o. 844.

- R_y. Asae foet. ʒjj.
tere c. vitell. ovi,
adde
Aq. Meliss. ʒv.
Syr. Croci ʒj.
M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 823.) *Richter.*
-

N^o. 845.

- R_y. Asae foet. ʒjj.
solve in
Liq. Ammon. acet. ʒj.
adde

Aq. Hyssopi ʒijj.

Syr. Croci ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 846.

Ry. Asae foet. ʒj.

Ammon. carb. pyro-ol. ʒβ.

Opii puriss. gr. XV.

solve in

Tr. Castor. ʒijj.

M. D. S. Zu 30—40 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 847.

Ry. Stip. sulph. nigr.

Asae foet. ana ʒβ.

Extr. Cicutae ʒj.

— Aconiti ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ij. Consp.

D. S. Zu 8—10 Pillen dreimal täglich (steigend).

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 848.

Ry. Tr. Asae foet. ʒβ.

— Castor.

Aether. sulph. ana ʒij.

Tr. Opii crocat. ʒj.

M. D. S. Zu 60 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 823.)

*Richter.*N^o. 849.

Ry. G. Ammoniaci

Extr. Tarax.

Sap. med. ana ʒj.

Asae foet.

Aloës lucid. ana ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen.

(Wie bei No. 823.)

Richter.

N^o. 850.

Ry. Rad. Valer. ʒβ.

Castor.

Ammon. carb. pyro-ol. ana ʒβ.

M. f. Pulv. Divide in part. XV aeq.

D. S. Täglich zwei bis dreimal ein Pulver.

Richter.

N^o. 851.

Ry. Pulv. Cort. Chinae ʒj.

— Rad. Valer. ʒjj — ʒjj.

— Cort. Cinnamom. ʒβ.

Syr. Croci ʒiv.

M. f. l. a. Elect.

D. S. Alle zwei Stunden einen starken Theelöffel.

Richter.

N^o. 852.

Ry. Extr. Valer.

Asae foet. ana ʒjj.

Ol. Valer. gtt. jj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.

D. S. Täglich dreimal 12 Pillen.

Richter.

N^o. 853.

Ry. Rad. Valer.

— Liquirit.

Hb. Menthae crisp.

— Meliss.

— Chamomill, ana part. aeq.

C. D. S. Zu einem Theelöffel auf drei Tassen Thee.

Dürr.

No. 854.

Rx. Rad. Valer.

Fol. Aurant.

Summitat. Millefol. ana ʒj.

Fol. Salviae

Hb. Menthae ana ʒiβ.

— Chamomill, vulg.

— — roman.

Sem. Foeniculi ana ʒjj.

G. C. M. f. Spec. D. S. Zum Thee. *Kämpf.*

No. 855.

Rx. Fol. Aurant. virid.

Rad. Caryophyll.

— Valer. minor.

Summitat. Millefol. ana p. aeq.

G. M. D. S. Abends 1—3 Esslöffel mit einem Pfund Regenwasser zu übergiessen, und nachdem es die Nacht zugedeckt gestanden, am andern Morgen durch Leinwand zu seihen. Dann Morgens, Nachmittags und Abends jedesmal den dritten Theil davon trinken zu lassen.

Hufeland.

No. 856.

Rx. Flor. Zinci

Extr. Hyoscyami ana ʒj.

Magnes. Sal. amar. ʒj.

Sacch. Lact. ʒviβ.

M. f. Pulv. D. Alle vier Stunden 5—30 Gran mit
Milch oder Wasser.

(Besonders gegen Epilepsie, Chorea, Tetanus,
Trismus.) *Vogler.*

N^o. 857.

R_x. Zinci sulph. gr. j̄j.
Mucilag. G. arab. ʒj.

solve in

Aq. Cinnamom. s. v.
adde

Syr. Cinnamom. ʒβ.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
Richter.

N^o. 858.

R_x. Plumbi acet. gr. vj.
(Opii puriss. gr. j̄j̄j.)
Sacch. alb. ʒj̄j.

M. f. Pulv. Divide in part. XII aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

Richter.

N^o. 859.

R_x. Plumbi acet.
(Opii puriss.) ana gr. v.
Extr. Lign. Quass.
Rad. Liquirit. ana ʒj.

M. f. Pil. No. LX. Consp.

D. S. Morgens und Abends 3—6 Pillen.

Richter.

N^o. 860.

R_x. Cupri sulphurico-ammon. gr. IV.
Micae panis alb.
Sacch. alb. ana gr. Xj̄j.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp.

D. S. Morgens und Abends eine Pille mit einer Tasse (Gersten-)Schleim, steigend zu 2—4 Pillen. (In jeder Pille ist $\frac{1}{4}$ Gran Cupr. sulph. amm.)
Richter.

N^o. 861.

Ry. Cupr. sulph. ammon. $\bar{3}j$.
solve in

Liq. Ammon. carb. $\bar{3}j$.

M. D. S. Zu 30 Tropfen pro dosi, steigend.
Boerhaave.

N^o. 862.

Ry. Argent. nitr. fusi
Opii puriss. ana gr. v.
Extr. Lign. Quass.
Pulv. Rad. Liquirit. ana $\bar{3}j$.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends drei Pillen.

Richter.

N^o. 863.

Ry. Sem. Lini contus. $\bar{3}j$.
Micae panis alb. duriuscul. $\bar{3}jj$.
Hb. Hyoscyami concis. $\bar{3}\beta$.
Coq. c. s. q. lactis ad consist.
Cataplasmat. adde
Ol. Lini $\bar{3}l\beta$.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.
(Besonders bei Unterleibs-Krämpfen.)

Richter.

N^o. 864.

Ry. Flor. Malvae
— Verbasci

Hb. Hyoscyami ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Farin. Sem. Lini $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

Concis. coq. c. s. q. Lactis

ad consist. Cataplasmat.

adde

Butyr. recent. insuls. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.

(Wie bei No. 863.)

Richter.

N^o. 865.

R \mathfrak{x} . Extr. Hyoscyami $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Opii puriss. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Liq. Ammon. acet. q. s.

ad consist. Liniment. tenuior.

M. D. S. Zum Einreiben.

Richter.

N^o. 866.

R \mathfrak{x} . Liq. Ammon. caust. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

Ol. Hyoscyami infus. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Tr. Opii crocat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

Richter.

N^o. 867.

R \mathfrak{x} . Ungt. Althaeae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Liq. Ammon. caust.

Tr. Opii crocat. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Selle nimmt statt des Liq. Ammon. caust.
eine Drachme Camphora.)

Richter.

N^o. 868.

R \mathfrak{x} . Ol. Olivar. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

— destill. Menth. pip.

— Carvi ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Laud. liq. Sydenh. \mathfrak{z} j — \mathfrak{z} j.M. D. S. Warm auf den Unterleib einzureiben.
*Henke.*N^o. 869.R_x. Bals. peruv.
Tr. Opii
Naphthae Vitrioli ana \mathfrak{z} j.
Alcohol. Vini \mathfrak{z} j.M. D. S. Wie bei No. 863. *Henke.*N^o. 870.R_x. Spir. Angel. comp. \mathfrak{z} jj.
Mixt. oleoso-balsam. $\mathfrak{z}\beta$.M. D. S. Zum Einreiben.
(Auch gegen Paralysen.) *Wendt.*N^o. 871.R_x. Ol. Hyoscyami
— Papav. alb. ana $\mathfrak{z}\beta$.
Spir. Sal. ammon.
Liq. C. C. succ.
Laud. liq. Sydenh. ana \mathfrak{z} jj.M. f. Liniment. D. S. Alle zwei Stunden einen
Kaffeelöffel einzureiben.(Besonders gegen Colica, Hysterie, falsche
Wehen, und Strangurie.) *Stark.*

Hypochondrie und Hysterie.

N^o. 872.R_x. G. ammoniaci
Sap. venet.

II. Chronische Krankheiten.

Pulv. Rad. Rhei

Fell. Tauri inspiss. ana ʒj.

Tart. stib. in s. q. Aq. f. sol. Gr. VI.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.

D. S. Täglich dreimal 10—20 Pillen.

(Gegen Hypochondrie.)

*Richter.*N^o. 873.

R̄. Tart. stib. gr. vj.

Tart. natronat. ʒij.

Fell. Taur. inspiss. ʒβ.

solve in

Aq. Menthae pip. ʒvjjj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 872.)

*Richter.*N^o. 874.

R̄. Sap. venet.

Asae foet.

Extr. Tarax. ana p. aeq.

M. f. Pil. pd. gr. ʒijj.

D S. Täglich dreimal 10 Pillen.

(Wie bei No. 872.)

*Richter.*N^o. 875.

R̄. Sal. ammon. dep. ʒijj.

Extr. Centaur. minor. ʒβ.

solve in

Aq. Menth. pip. ʒvj.

adde

Oxymell. squill. ʒvj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

(Wie bei No. 872.)

Richter.

N^o. 876.

- Ry. Magnes. carb.
 Tart. dep.
 Sulph. dep.
 Rad. Rhei
 Flor. Chamomill.
 Elaeosacch. Foeniculi ana $\bar{3}\beta$.
- M. f. Pulv. D. S. Täglich einigemal einen Theelöffel voll.
 (Wie bei No. 872. — Pulv. ephracticus Selli.
 S. No. 391.) *Selle.*
-

N^o. 877.

- Ry. Crem. Tart.
 Rad. Rhei
 Cort. Aurant. ana $\bar{3}j$.
 Ol. Cajeput. *gtt.* vj .
- M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.
 (Wie bei No. 872. Vorher ein Abführmittel.)
Tissot.
-

N^o. 878.

- Ry. Tr. Asae foet.
 — Castor.
 Aether. sulph. ana $\bar{3}j$.
- M. D. S. Täglich drei bis viermal 30 — 40 Tropfen.
 (Wie bei No. 872.) *Richter.*
-

N^o. 879.

- Ry. Extr. Millefol.
 — Valer. ana $\bar{3}jj$.
 solve in
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}iv$.
 adde
 Spir. sulph. aeth. $\bar{3}j$.

(Liq. Ammon. succin. ʒj.)

M. D. S. Täglich 4 — 6 Esslöffel.

*Richter.*N^o. 880.R_x. Asae foet. ʒjij.

Extr. Tarax.

— Chamomill.

— Millefol. ana ʒβ.

Acidi succinici gr. XXX.

Syr. Chamomill. q. s.

ut f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Abends 12 — 14 Pillen.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 881.R_x. Extr. Marrubii alb.

— Centaur. min. ana ʒj.

Aq. Cinnamom. vinos. ʒiβ.

M. D. S. Täglich fünfmal 40 Tropfen.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 882.R_x. Rad. Valer. ʒiβ.

Cort. Chinae ʒiβ.

— Winteran. ʒβ.

Ol. Cajeput. gtt. X.

M. f. Pulv. Divide in partes IX aeq.

D. S. Täglich viermal ein Pulver.

(Wie bei No. 872.)

*Tissot.*N^o. 883.R_x. Tr. Valer. aeth. ʒjj.

— Opii crocat. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden 30 Tropfen.
(Gegen Hypochondrie und Hysterie.)

Hecker.

N^o. 884.

Ry. Rad. Rhei
Magnes. carb. ana gr. XXIV.
Castor. gr. vj.

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal.
(Bei hysterischen Anfällen von Magensäure.)

Richter.

N^o. 885.

Ry. Elect. e Senna ʒvj — x.
Acid. tartar. ʒjj.
Sacch. alb. ʒβ.
Aq. flor. Aurant. ʒij.
Aether. sulph. ʒβ.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel bis zur Wirkung.

(Gegen Hysterie mit Verstopfung.) *Richter.*

N^o. 886.

Ry. Tr. Rhei aq. ʒijj.
— Castor. simpl. ʒjj.
Syr. Mannae ʒj.
Spir. sulph. aeth. ʒβ.

M. D. S. Esslöffelweise.
(Wie bei No. 885.)

Richter.

N^o. 887.

Ry. Asae foet. ʒj.
Galbani
Myrrhae ana ʒβ.
Castor. gr. xx.

M. f. c. Tr. Valer. q. s.
 Pil. pd. gr. jj . D.
 S. Täglich dreimal 3—6 Pillen.
 (Gegen Hysterie S. No. 871.) *Sydenham.*

N^o. 888.

Ry. Spir. nitr. dulcis
 Tr. thebaicae ana ʒj .
 M. D. S. Alle zwei Stunden 20—25 Tropfen.
 (Wie bei No. 887.) *Stark.*

N^o. 889.

Ry. Croci ʒj .
 Flor. Aurant. ʒj .
 Chamomill. ʒijj .
 C. M. f. Spec. D. S. Zu einem Theelöffel auf
 drei Tassen Thee.
 (Wie bei No. 887.) *Berends.*

N^o. 890.

Ry. Aloës succotr. ʒβ .
 Croci opt.
 Rad. Rhei
 Agarici
 Myrrhae
 Rad. Zedoar.
 — Gentianae ana ʒβ .
 C. C. M. inf. c.
 Spir. Vini gall. ʒxj . (vel Cong. β .)
 (aut cum Spir. frument. opt. Cong. j.)
 Digere per XIV dies loco calido, Col.
 D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 887.) *Sprögel.*

N^o. 891.

R. Asae foet. ʒj.
 Castor. ʒβ.
 Extr. Chamomill. q. s.

ut f. pil. No. CXX. Dent. ad
 vitrum bene obturatum.

8. Alle drei Stunden zehn Pillen.
 (Wie bei No. 887.)

*Schubarth.*N^o. 892.

R. Tr. Castor. simpl.
 Spir. sulph. aeth. ana ʒj.
 M. D. S. Im Anfall zu 60 Tropfen.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 893.

R. Liq. C. C. succ. ʒjj.
 Ol. Cajeput. gtt. Xjj.
 Spir. sulph. aeth. ʒjj.

M. D. S. Zu 15 — 30 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 894.

R. Tr. Opii simpl.
 Sp. nitrico-aeth. ana ʒβ.
 Liq. Ammon. succ. ʒj.

M. D. S. Zu 20 Tropfen pro dosi.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 895.

R. Asae foet. ʒβ.
 Liq. Ammon. acet.
 Syr. Croci ana ʒjj.
 Aq. Menth. pip. ʒβ.

M. D. S. In zwei Hälften (die zweite eine Viertelstunde nach der ersten) zu nehmen.
(Wie bei No. 887.) **Richter.**

No. 896.

Rx. G. Galb.
— Asae foet.
Extr. Angelicae ana ʒj.
Pulv. Castor.
Crocī oriental. ana ʒβ.
Opii puriss. gr. xv.
M. f. Pil. pd. gr. jj.
Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zu sechs Pillen pro dosi (steigend).
(Wie bei No. 887.) **Richter.**

No. 897.

Rx. Extr. Hyoscyami ʒj.
solve in
Liq. Ammon. succin. ʒj.

M. D. S. Zu 16 Tropfen pro dosi (steigend).
(Wie bei No. 887.) **Richter.**

No. 898.

Rx. Pulv. Castor gr. x.
Tr. Opii crocat. gtt. xx.
Aq. Menth. pip. ʒjij.
Syr. flor. Chamomill. ʒjij.

M. D. S. Alle viertel Stunden einen Esslöffel.
(Wie bei No. 887.) **Richter.**

No. 899.

Rx. Spir. matrical. ʒjij.
Tr. Asae foet.

Tr. Opii simpl. ana $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Auf die Herzgrube einzureiben.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 900.R_x. Ol. Hyoscyami— Chamomill. coct. ana $\bar{3}\beta$.

Liq. Ammon. carb.

— C. C. succ.

Tr. Opii crocat. ana $\bar{3}j$.Ol. Succini $\bar{3}j$.— Menthae pip. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Einen Esslöffel in den Bauch oder die Herzgrube einzureiben.

(Wie bei No. 887.)

*Richter.*N^o. 901.R_x. G. Myrrhae

Rad. Columbo

Ferri sulph. crystall. ana $\bar{3}j$.

Castor.

Aloës succotr. ana $\bar{3}\beta$.

M. f. c. suff. q. Extr. Absynth.

Pil. pd. gr. $\bar{j}j$. Consperg.

D. S. Abends und Morgens 10 Pillen.

(Zur Nach-Cur gegen Hysterie. S. No. 551.
569, 578, 579, 593.)*Richter.*N^o. 902.R_x. Rad. Valer. pulv. $\bar{3}j$.Cort. peruv. pulv. $\bar{3}j$.Sal. C. C. $\bar{3}j$.

Syr. Croci q. s. ut f. l. a. Elect.

D. S. Theelöffelweise.

(Gegen hysterisches Kopfweh. Migräne.)

Grent.

N^o. 903.R_x. Tr. Valer. aeth. (vel martial.) ℥j.

Extr. Hyoscyami ℥j.

M. D. S. Alle Stunden 15 Tropfen mit Pfeffermünzthee.

(Wie bei No. 902.)

*Jahn.*N^o. 904.R_x. Asae foet. in vit. ovi solut ℥β—j.

Infus. flor. Chamomill. ℥vj.

M. D. S. Zum Clystir.

(Gegen Hysterie, und besonders gegen Globus und Nodus hystericus.)

Richter.

Epilepsie. — Chorea. Raphanie.

N^o. 905.R_x. Rad. Valer. ℥j.

Limat. Ferri ℥jjj.

Myrrhae

Olibani

Extr. Tormentill. ana ℥β.

M. f. Pil. pd. gr. jjj.

D. S. Täglich drei bis viermal 10 Pillen.

(Gegen Epilepsie von Onanie.)

*Quarin.*N^o. 906.R_x. Rad. Valer. min. ℥β.

Magnes. carb.

Sal. Ammon. dep. ana gr. XXIV.

Ol. Cajeput. gtt. XXXjj.

M. f. Pulv. D. in vitro.

- S. Täglich dreimal einen Theelöffel. (S. No. 856.)
(Gegen Epilepsie.) *Berends.*

N^o. 907.

- Ry. Magnes. alb. $\bar{3}\beta$.
Visci querni
Sacch. alb. ana $\bar{3}jj$.
Crocī $\bar{3}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Alle 2—3 Stunden eine Messer-
spitze voll in Wasser oder Thee gerührt.

Wie bei No. 906. (Besonders bei Säure.)

(*Pulvis antiepilepticus Marchionis.*)

N^o. 908.

- Ry. Rad. Artemisiae vulg. gr. x— $\bar{3}j$.
Sacch. alb. gr. x.

M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.

- S. Alle 3—4 Stunden ein Pulver. (Zu einer Drachme
Rad. Artemisiae täglich.)

(Wie bei No. 906.)

Giltermann.

N^o. 909.

- Ry. Lap. infernal. $\bar{3}\beta$.
Extr. Gentianae rubr.
Succi Liquirit. inspiss. ana $\bar{3}l\beta$.
Opii puri gr. IV.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Lycopod.

- D. S. Abends und Morgens drei Pillen. (Monate lang.)

(Wie bei No. 906.)

Heim.

N^o. 910.

- Ry. Argenti nitrici fusi gr. x.
solve in
Aq. destill. $\bar{3}jj$.

Sol. filtrat. instilla
 Liq. Natri muriatici q. s.
 ad praecipitandum. Praecipitatum
 sedulo ablutum solve in
 Liq. Ammon. caust. $\text{℥}\beta$.
 adde

Acidi muriat. ($\text{℥}\text{jj}$.) q. s.
 ut praecipitatio evitet, et
 Argent. muriatic. in statu
 solutionis permanent.

Pondus fluidi filtrati aeq. sit $\text{℥}\text{ii}\beta$.

D. S. Vor der Luft zu bewahren, und zehnjährigen Kindern zu drei Tropfen (steigend zu sechs Tropfen) dreimal täglich mit destillirtem Wasser zu geben.

(Gegen Epilepsie mit Scropheln.)

Kopp.

N^o. 911.

R_x. Asae foet.

Castor. moscov. ana $\text{℥}\text{j}$.

Acid. succ. conc. $\text{℥}\beta$.

Ol. animal. Dippel. gtt. xx.

Tr. Myrrhae q. s. ut f. l. a.

Pil. pd. gr. v. Consp.

D. S. Zu 2—5 Pillen.

Wie bei No. 906. (Auch gegen Chorea.)

Diderit.

N^o. 912.

R_x. Argenti nitrici gr. j— jj .

Succi Liquirit. $\text{℥}\text{j}$.

M. f. Pil. pd. gr. jj . Consp. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 1—3 Pillen.

(Wie bei No. 906.)

Schäffer.

No. 913.

R̄. Argent. nitr. fusi ʒβ.

Extr. Valer. ʒj.

M. f. c. Pulv. Rad. Valer.

Pil. opd. gr. j. Obduc. fol. argent.

D. S. Morgens zwei und Abends drei Pillen.

(Wie bei No. 906.) *Richter.*

No. 914.

R̄. Camphorae ʒβ.

Sacch. alb.

Mucilag. G. arab ana ʒβ.

solve in

Acet. vini calid. ʒvj.

adde

Aq. flor. Sambuci ʒvj.

Syr. Papav. Rhoad. ʒj.

M. D. S. Alle 1—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 906.) *Locher.*

No. 915.

R̄. Phosphori gr. IV.

Aeth. sulph. ʒjjj.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden zehn Tropfen in

Wasser.

(Wie bei No. 906.) *van Hoven.*

No. 916.

R̄. Phosphori gr. jj.

Aeth. sulph. ʒβ.

Ol. Valerianae ʒj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden 20—30 Tropfen auf

Zucker.

(Wie bei No. 906.) *Löbenstein — Löbel.*

No. 917.

Ry. Phosphori gr. j.
Ol. animal, Dippel. \mathfrak{J} j.
Ol. Valer. \mathfrak{J} j.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 10 Tropfen.
Bei gleichzeitiger Lähmung einzelner Glieder,
in diese eine Einreibung von

b) Ry. Phosphori gr. IV.

solve in

Ol. Sabinae \mathfrak{J} j.

adde

Ol. Caryophyllor. \mathfrak{J} j.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal damit einzu-
reiben.

(Wie bei No. 906.) *Löbenstein — Löbel.*

No. 918.

Ry. Ol. Tereb. rectific. $\mathfrak{J}\beta$.

— Olivar. puriss. \mathfrak{J} jjj.

D. ad vitr. capacit. $\mathfrak{J}\beta$.

adde

Phosphori gr. jj.

tunc digere in Aq. fervid. saep. agitand.

usque omnes Phosphori globul. disparuer.

adde

G. arab. in Aq. ft. \mathfrak{J} IV. subact. $\mathfrak{J}\beta$.

Syr. Cinnamom. $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden einen kleinen Ess-
löffel.

(Wie bei No. 906.)

Schulz.

No. 919.

Ry. Liq. anodyn. mineral. Hoffm.

(vel Spir. Nitri. dulc.)

Spir. Sal. ammon. aromat. ana \mathfrak{J} jj.

M. D. S. Täglich zwei bis dreimal 20 — 30 Tropfen.
(Wie bei No. 906.) *Hirschel.*

N^o. 920.

Ry. Sem. Sinap. alb. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.
— Piperis alb. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

G. Asae foet. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Sem. Levistici $\mathfrak{J}\mathfrak{b}$.

M. f. Pulv. Divide in part. VI aeq.

D. S. Alle Monate beim ersten Viertel des Mondes,
um den andern Tag zwei Pulver. (Ein Jahr lang
zu gebrauchen.)

(Wie bei No. 906.)

Sprögel.

N^o. 921.

Ry. Rad. Valer. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Fol. Aurant. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Sal. ammoniac. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Ol. Cajeput. gtt. IV.

M. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 906.)

Ragoloi. (nach Knopf.)

N^o. 922.

Ry. Rad. Valer. $\mathfrak{J}\mathfrak{b}$.

Magnes. alb.

Sal. ammoniaci ana gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Ol. Cajeput. gtt. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Wie bei No. 921. (S. No. 906.)

Ragoloi. (nach Gmelin und Feuerstein.)

N^o. 923.

Ry. Fol. Aurant. $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$.

Coq. in Aq. ft. $\mathfrak{J}\mathfrak{x}\mathfrak{x}$.

per horas $\text{jj} - \text{jjj}$ vase clauso.

Col. adde

Vini rubri ℥x .

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Täglich zwei bis viermal 6 — 8 Loth.
(Wie bei No. 906.) *de Haen.*

N^o. 924.

R_y. Fol. Aurant. virid. ℥vj .

Rad. Valer. ℥jj .

Inf. c. s. qt. Aq. f.

Col. ℥vj , adde

Syr. Aurant. ℥j .

M. D. S. So viel als möglich davon zu nehmen.
(Wie bei No. 906.) *Locher.*

N^o. 925.

R_y. Pulv. Cort. Chinae ℥vj .

— Rad. Serpentar. virg. ℥jj .

Syr. Paeoniae q. s. ut f. Elect.

D. S. Morgens und Abends eine Drachme, 3 — 4
Monate lang, dann blos 3 — 4 Tage vor dem Neu-
und Vollmond.

(Wie bei No. 906.)

Fuller.

N^o. 926.

R_y. Flor. Sulph.

Rad. Paeoniae pulv.

— Valer. sylv. pulv. ana ℥jjj .

Cinnabaris Antimon. ℥jj .

Moschi

Castor. ana ℥j .

Syr. simpl. q. s. ut. f. Elect.

D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 906)

Bisset (Burserius.)

N^o. 927.R_x. Lign. Visci contus $\mathfrak{z}\text{ij}$.Rad. Paeoniae cont. $\mathfrak{z}\text{j}$.Aq. comm. $\mathfrak{z}\text{ijj}$.Coq. ad rem. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

in finem coct. adde

Rad. Valer. sylv. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$.

Lilior. Convall.

Flor. Tiliae

Hb. Galei lutei ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$.Syr. Paeoniae $\mathfrak{z}\text{ijj}$.

M. D. S. Täglich 3—4 Gläser lauwarm zu trinken.

(Wie bei No. 906.)

*Geoffroy.*N^o. 928.R_x. Cupri sulphurico-ammoniat. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$.

solve in

Aq. destillat. $\mathfrak{z}\text{j}$

M. D. S. Täglich 3 mal 5 Tropfen (steigend).

(Gegen Chorea St. Viti. S. No. 106. 856. 911.)

*Niemann.*N^o. 929.R_x. Asae foet. $\mathfrak{z}\text{v}$.Extr. Nucis vom. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Lycopod.

D. S. Zu 6—10 Pillen pro dosi,

(Wie bei No. 928.)

*Niemann.*N^o. 930.R_x. Spir. Vini

Butyr rec.

Ol. Tereb. coct. ana. pt. aeq.

Q 1

M. D. S. Zum Einreiben in die tauben Fingerspitzen.
(Gegen Raphanie.) *Taube.*

Angina. Asthma. Tussis. (Tussis
convulsiva.)

N^o. 931.

R_x. G. Ammoniaci ʒj.

solve in

Oxymell. squill. ʒj.

adde

Vini emetici ʒj.

Syr. Althaeae ʒiv.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Angina.)

Selle.

N^o. 932.

R_x. Extr. Lactucae virosae gr. XVI.

solve in

Aq. Cinnamomi ʒj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 15 Tropfen.

(Wie bei No. 930.)

(*Hufeland's Journal. — Scudamore.*)

N^o. 933.

R_x. Flor. Sulph.

Extr. Inulae

— Glycyrrhizae ana ʒj.

G. Ammoniaci ʒj.

Rad. Irid. Flor. ʒβ.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp. Lycopod.

D. S. Zu 8 — 10 Pillen pro dosi.

(Gegen Asthma; besonders von Erschlaffung
und Schleim-Anhäufung in den Lungen.)

Quarin.

N^o. 934.

- R_x. Asae foet. ʒj.
 solve in
 Liq. Ammon. acet. ʒj.
 Aq. Hyssopi ʒj.
 M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Asthma Millari.)

*Millar. (Schäffer.)*N^o. 935.

- R_x. Asae foet. ʒβ.
 Moschi genuini gr. vjij.
 Mucilag. G. arab. ʒβ.
 Misce terendo et adde
 Aq. Flor. Tiliae ʒiβ.
 Sacch. alb. ʒj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 934.)

*Wendt.*N^o. 936.

- R_x. Rad. Valer. min. ʒijij.
 inf. Aq. f. suff. qt. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Col. refrigerat. adde
 Moschi genuini gr. vjij.
 Liq. Ammon. pyro-oleosi ʒj.
 Tr. Ambrae ʒj.
 Syr. Flor. Aurant. ʒβ.
 M. D. S. Alle halbe Stunden 2 Theelöffel.
 (Wie bei No. 934.)

*Wendt.*N^o. 937.

- R_x. Moschi genuini gr. XXIV.
 Sacch. alb. ʒj.

Contr. exactiss. adde

Syr. Flor. Aurant. $\bar{3}j$.

Aq. Foeniculi $\bar{3}i\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 934.)

Sundelin.

No. 938.

Rx. Camphorae $\bar{3}j$.

solve in

Aeth. sulph. $\bar{3}jj$.

adde

Tr. Opii croc.

Mixt. oleoso - bals. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Alle 2 Stunden 20 Tropfen.

(Gegen Asthma überhaupt. S. No. 301.)

Hufeland.

No. 939.

Rx. Rad. Helen.

— Irid. Flor.

— Squill, ana $\bar{3}j$.

Benzoës

Myrrhae

Sem. Anisi

Succ. Liquirit.

G. Ammon. pur. ana $\bar{3}\beta$.

Croci $\bar{3}jjj$.

M. f. c. Spir. Vin. rectific. \mathcal{Q} . j.

l. a. Elix.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 938.)

Hufeland.

N^o. 940.

- R. Sap. venet.
 G. Asae foet. ana ʒj.
 Pulv. Cort. Aurant. gr. X.
 M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Zu 10—15 Pillen pro dosi.
 (Gegen Asthma vom Genuss saurer Dinge.)
Richter.
-

N^o. 941.

- R. G. Ammon. ʒj.
 solve in
 Oxymell. Squillae ʒj.
 adde
 Aq. Petrosel. ʒjjj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Asthma urinosum.) *Fordyce.*
-

N^o. 942.

- R. Nitri dep.
 Milleped. ppt.
 Baccar. Juniperi ana ʒj.
 Rad. Squill. gr. IX.
 M. f. Pulv. Divide in part. IX. aeq.
 D. S. Dreimal täglich ein Pulver.
 (Wie bei No. 941.) *Richter.*
-

N^o. 943.

- R. Kali carb. dep. gr. X.
 Tr. Cardamom. comp. ʒjjj.
 Syr. simpl. ʒβ.
 Aq. Ment. pip.

M. D. S. Abends vor Schlafengehn zu nehmen.
(Gegen Asthma nocturnum. Incubus.)

Waller.

N^o. 944.

R_x. Ammon. carb. sicc. gr. X.
Tr. Capsici ʒβ.
Syr. Croci ʒβ.
Aq. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 943.

Waller.

N^o. 945.

R_x. Extr. Myrrhae aq.
— Marrub. alb.
G. ammon. dep. ana ʒjj.
Sulph. aurat. antim. ʒj.
Succi Liquirit. ʒjjj.
M. f. Pil. pd. gr. j. Consp.
D. S. Täglich 3—4 mal 4—6 Pillen.
(Gegen Asthma ex debilitate.)

Richter.

N^o. 946.

R_x. G. Asae foet.
— Galbani
Extr. Myrrhae aq. ana ʒjj.
Vitriol. Mart. ʒj.
Tr. Cort. Aurant. q. s.
ut f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
D. S. Täglich 2—3 mal 12—15 Pillen.
(Wie bei No. 945.)

Richter.

N^o. 947.

- R_y. Pulv. Rad. Squill.
 Extr. Cascarill. ana ʒj.
 Sulph. stib. aurant.
 Ammon. carb. pyro-ol. ana ʒβ.
 Ol. Anisi gtt. VI.
 Succi Liq. dep. q. s.
 ut f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp.
 D. S. Zu 7 Pillen pro dosi.
 (Wie bei No. 945.)

*Richter.*N^o. 948.

- R_y. Aq. Ment. pip.
 — Raphan. rust. ana ʒijj.
 Liq. Ammon. acet. ʒij.
 Sacch. alb. ʒβ.
 Sal. succ. ʒj.
 M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.
 (Wie bei No. 945.)

*Cullen.*N^o. 949.

- R_y. Kali carb. ʒj.
 Aq. Ment. pip. ʒiv.
 Spir. Sulph. aeth. ʒj.
 M. D. S. Esslöffelweise.
 (Gegen Asthma convulsivum.)

*Wolf.*N^o. 950.

- R_y. G. Asae foet. ʒβ.
 Extr. Valer. ʒj.
 — Aconiti
 — Squillae ana gr. vj.
 Castor. ʒβ.
 Sal. volat. C. G. gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
 D. S. Täglich 3 mal 10 Pillen.
 (Wie bei No. 949. Zur Nach-Cur.)

Richter.

N^o. 951.

Ry. Mannae ʒj.
 Aq. Cerasor. nigr. ʒijj.
 Spir. Sal. ammon. anisat. ʒβ.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Brustbeschwerden und Husten.)

Hecker.

N^o. 952.

Ry. Spec. diaireos ʒvj.
 Rad. Paeoniae ʒjj.
 — Glycyrrhizae
 Flor. Sulph. ana ʒβ.
 Magnes. Nitri ʒj.
 Croci opt. ʒβ.
 Sacch. alb. ʒiiβ.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 3 — 4 Stunden eine halbe
 Drachme bis ʒjj. mit Wasser.
 (Gegen Husten. S. No. 246. 247. 248. 249.)

Vogler.

N^o. 953.

Ry. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) ʒβ
 Flor. Zinci
 Extr. Hyoscyami ana ʒβ.
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952.
 (Auch gegen Tussis convulsiva empfohlen.)

Vogler.

N^o. 954.

- R_y. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) ʒv.
 Nitri dep. ʒj.
 Rad. Ipecacuanhae gr. ʒij.
 (vel Sulph. aurat. antim. gr. Vj.)
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952. *Vogler.*

N^o. 955.

- R_y. Pulv. pectoral. Vogler. (No. 952.) ʒjjj.
 (Sal. ammon. pur.)
 Sem. Anisi stellati ana ʒβ.
 M. f. Pulv. D. S. Wie bei No. 952. *Vogler.*

N^o. 956.

- R_y. Flor. Sulph. lot. ʒjj — v.
 Succu Liquirit.
 Sacch. Lactis
 Rad. Liquirit. ana ʒjjj.
 — Irid. Flor. ʒj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 952.) *Kopp.*

N^o. 957.

- R_y. Flor. Arnicae
 Nitri. antim. ana ʒj
 Camphorae gr. X.
 Opii gr. ʒij.
 M. f. Pulv. D. S. Einigemal täglich einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 952. Besonders gegen trocknen
 Reizhusten.) *Selle.*

N^o. 958.

- R_y. Rad. Liquirit.
 — Irid. flor. ana ʒjj.
 Sulph. depurat. ʒβ.

II. Chronische Krankheiten.

Flor. Benzoës ℥j.

Sacch. alb. ʒij.

Ol. Anisi aeth.

— Foeniculi aeth. ana gtt. X.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 2 mal einen Theelöffel.
(Wie bei No. 952. Besonders bei Atonie der
Lungen.) *Wedel.*

No. 959.

R̄. Rad. Althaeae

— Graminis ana ʒj.

— Taraxaci

— Liquiritiae ana ʒβ.

Stipit. Dulcamar. ʒvj.

Fol. Sennae ʒj.

Sem. Foeniculi ʒj.

C. C. M. D. S. Brustthee.

(Wie bei No. 952.)

Stark.

No. 960.

R̄. Infus. Rad. Liquirit.

Decoct. Sem. Lini ana ʒiβ.

Extr. Dulcamar. gr. X.

Oxymell. simpl. ʒjjj.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 952. Besonders für Kinder.)

Gölis.

No. 961.

R̄. Mucilag. Salep. ʒij.

Spirit. Minderer. ʒj.

Massae pil. de Cynogloss. ℥j.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 952.) *Stark.*

N^o. 962.

- R^x. Hb. Nasturtii aq.
 — Cichorei
 — Veronicæ Beccabung.
 — Cerefolii ana M. j.

C. M. D. S. Mit $\frac{1}{2}$ ℥ Kalbfleisch und $\frac{1}{2}$ Maass Wasser zu einem Schoppen eingekocht, Morgens zu nehmen.

(Wie bei No. 952, Besonders bei gleichzeitiger grosser Schwäche.) *Best.*

N^o. 963.

- R^x. G. Ammoniaci ʒj.
 Sulph. aurat. antim. gr. vj.
 Syr. Althæeae ʒijj.

M. f. l. a. Linctus.

D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einige Kaffeelöffel.

(Wie bei No. 952, Auswurf-befördernd.)

J. A. Schmidt.

N^o. 964.

- R^x. Ol. Amygdal. dulc. rec. express. ʒj.
 Syr. Diacodii ʒijj.
 Opii puri pulv. gr. j.

M. f. l. a. Linctus.

D. S. Alle Stunden 1—2 Theelöffel.

(Wie bei No. 952.)

J. A. Schmidt.

N^o. 965.

- R^x. Moschi gr. jj.
 Laud. liq. Sydenh. gtt. jiiiij.
 Liq. C. C. succ. ʒj
 Syr. Diacod. ʒiβ.

M. D. S. Theelöffelweise.
(Wie bei No. 952.)

Kämpf.

N^o. 966.

R_x. Ol. Olivar. alb. rec. express. ℥β.
Spec. diatragacanth. ℥j — ℥β
Syr. Papav. alb. ℥vj.
Aq. Flor. Sambuci ℥jj.

M. f. l. a. Linctus. D. S. Theelöffelweise.
(Wie bei No. 952.)

Kämpf.

N^o. 967.

R_x. Extr. Enulae ℥j.
Pulv. Hb. Digital. purp.
— Rad. Ipecacuanhae ana gr. X.
Opii puri gr. v — vj.
M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.
Consp. pulv. Lycopodii.

D. S. Alle 3 Stunden eine Pille.

(Wie bei No. 952. Besonders in veralteten
Fällen.)

Heim.

N^o. 968.

R_x. Sulph. Antim. gr. jj.
Opii puri gr. j.
Sacch. alb. ℥j.

M. f. Pul. D. S. Abends vor Schlafengehn zu nehmen.
(Wie bei No. 952. Besonders gegen nächtli-
chen Husten.)

Weikard.

N^o. 969.

R_x. Opii puri
Rad. Ipecacuanhae ana gr. Xv.
Syrupi simpl. q. s.

ut f. Pil. No. XXX. Consp.

D. S. Morgens eine, Abends zwei Pillen. (Auch alle 4—6 Stunden eine Pille.)

(Wie bei No. 952 und 968.) *Weikard.*

N^o. 970.

R_x. Rad. Belladonnae gr. j.

Laud. puri gr. β.

Sacch. alb. ℥IV.

M. f. Pulv. Divide in part. vjij. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver, bis das Gesicht roth wird.

(Gegen Keichhusten. Zugleich No. 971. und 972.) *Gölis.*

N^o. 971.

R_x. Hb. Althaeae ℥j.

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit. ana ℥β.

C. C. M. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 970.)

Gölis.

N^o. 972.

R_x. Elect. anodyn.

Pulv. Rad. Belladonnae

Laud. liquid. ana ℥j.

G. arab. ℥jjj.

M. f. l. a. Ungt. D.

S. Auf Leder gestrichen in die Magengegend zu legen.

(Gegen Keichhusten.)

Gölis.

N^o. 973.

- Ry. Rad. Belladonnae gr. jj.
 — Ipecacuanhae gr. 1ß. — jj.
 Flor. Sulph. lot. gr. XXXII.
 Sacch. Lact. gr. vjjj.
 M. f. Pulv. Divide in part. vjjj. aeq.
 D. S. Täglich 3 mal ein Pulver (mit der Bella-
 donna in der Gabe steigend).
 (Gegen Keichhusten. S. auch No. 471. 631.
 632. 953.) Kopp.
-

N^o. 974.

- Ry. Rad. Belladonnae gr. jiiij — v.
 — Liquirit.
 Sacch. alb. ana 5jjj.
 Pulv. Ipecacuanhae comp. gr. Xjj.
 Sulph. dep. gr. XX — XXV.
 Ol. Anisi aeth.
 — Succini ana gtt. jj — jjj.
 M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden eine Messer-
 spitze voll.
 (Wie bei No. 973.)
 (*Horn's Archiv, 1817. — Nasse.*)
-

N^o. 975.

- Ry. Hb. Belladonnae 5jj.
 Rad. Belladonnae 5j.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 Col. ℞ j. adde
 Sacch. alb. q. s. ut f. Syrupus.
 D. S. Zu einem oder mehreren Theelöffeln voll.
 (Wie bei No. 973.) Schäffer.
-

N^o. 976.

R_x. Extr. Cicutae gr. j.
Hb. Cicutae gr. V.

M. D. S. Zu $\frac{1}{2}$ —2 Gran in 2 Unzen Wasser gelöst und in zwei Tagen Theelöffelweise zu verbrauchen.

(Wie bei No. 973.)

Butter.

N^o. 977.

R_x. Extr. Cicutae gr. XV.
solve in

Aq. Menth. pip.
— font. ana $\bar{\text{I}}\text{V}$
adde

Syr. (Papav.) $\bar{\text{I}}\text{jjj}$.

M. D. S. Alle 4 Stunden von einem Theelöffel zu einem Esslöffel (dem Alter nach) zu geben.

(Wie bei No. 973.)

Armstrong.

N^o. 978.

R_x. Extr. Cicutae
solve in

Aq. Foeniculi $\bar{\text{I}}\text{jj}$.
adde

Tr. Opii benzoicae $\bar{\text{I}}\text{j}$.

Syr. Opii $\bar{\text{I}}\bar{\beta}$.

M. D. S. Theelöffelweise.

(Wie bei No. 973.)

Hecker.

N^o. 979.

R_x. Extr. Lactucaae viros. gr. IV—VI.

Sacch. Lactis $\bar{\text{I}}\text{jj}$.

M. f. Pulv. Divide in partes xjj. aeq.

D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 973.)

Gumprecht.

N^o. 980.R_x. Extr. Hyoscyami ꝑ̄ß.

solve in

Vini Antimonii Huxh. ꝑ̄jj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 5—15 Tropfen, so dass ein Kind von einem Jahre täglich 2 Gran Extr. Hyoscyami bekommt.

(Wie bei No. 973.)

*Hufeland.*N^o. 981.R_x. Aq. Amygdal. amar. ꝑ̄jj.

— Flor. Tiliae ꝑ̄iv.

Syr. Althaeae ꝑ̄j.

M. D. S. Stündlich einen Esslöffel.

(Wie bei No. 973.)

*Wendt.*N^o. 982.R_x. Ol. Olivar. alb. ꝑ̄ß.

Syr. Diacodii ꝑ̄ß.

M. D. S. Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 973. Auch gegen Cardialgie und Colik.)

*Vogler.*N^o. 983.R_x. Infus. Rad. Liquirit.

Decoct. Sem. Lini ana ꝑ̄ß.

Kali nitrici gr. X.

Pulv. Doweri gr. j—jj.

Laud. liq. Sydenh. gtt. jj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No 973.)

Gölis.

N^o. 984.

- R_x. Liq. C. C. succ.
 Elix. pectoral. Reg. Dan. ana pt. jj.
 Laud. liq. Sydenh.
 Vin. antim. Huxh. ana pt. j.
 M. D. S. Alle Stunden 20—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 973.) *Jahn.*
-

N^o. 985.

- R_x. Elix. pect. reg. Dan. ʒvj.
 Spirit. Nitri dulc. ʒjj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒβ.
 M. D. S. Täglich 4 mal 10—40 Tropfen.
 (Wie bei No. 973.) *Kühling.*
-

N^o. 986.

- R_x. Tr. Opii gtt. vj—vjjj.
 Aq. Foeniculi ʒj.
 Syr. Cinnamom. ʒβ.
 M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Für 1—3 Jahr alte Kinder.)
Henke.
-

N^o. 987.

- R_x. Tr. Opii gtt. XV—XX.
 Aq. Foeniculi ʒj.
 Liq. anodyn. Hoffm. ʒβ.
 Syr. Cort. Aurant. ʒβ.
 M. D. S. Für ein 4—10 Jahr altes Kind, in zwei
 Tagen zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 973.) *Henke.*
-

N^o. 988.

- R_x. Extr. Cort. reg. ʒβ.
 Aq. Foeniculi ʒiβ.
 Liq. anodyn. Hoffm. ʒj.
 Tr. thebaicae gtt. xv.
 Syr. Cort. Aurant. ʒj.
- M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Besonders bei gleichzeitiger grosser Schwäche.) *Henke.*

N^o. 989.

- R_x. Rad. Ipecacuanhae gr. jiiij.
 G. arab.
 Magnes. carb. ana ʒβ.
 Sacch. alb. ʒj.
- M. f. Pulv. Divide in partes xij. aeq.
 D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.) *Vogler.*

N^o. 990.

- R_x. Asae foet. ʒj.
 Mucilag. G. arab.
 Syr. Althaeae ana ʒj.
- M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973. Für ein 3 — 4 Jahr altes Kind.) *Kopp.*

N^o. 991.

- R_x. Asae foet. ʒiβ.
 Mucilag. G. arab. q. s.
 ut f. Pil. No. XXX.
 Consp. pulv. Rad. Irid. Flor.
- D. ad vitr. S. Täglich sechsmal eine Pille in Obstmus.
 (Wie bei No. 973.) *Kopp.*

N^o. 992.

- R_x. Moschi opt. gr. ijij .
 Laud. puri gr. β .
 G. arab. ʒj .
 Sacch. alb. ʒij .
 M. f. Pulv. Divide in part. vj. aeq.
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

*Gölis.*N^o. 993.

- R_x. Moschi opt. gr. $\text{ij}\beta$.
 Sulph. stib. aurant. gr. β .
 Zinci oxydati albi gr. β .
 Sacch. alb. gr. V.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. q. l.
 D. S. Alle 2 Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

*Hintze.*N^o. 994.

- R_x. Moschi gen. gr. ijij — vj.
 Liq. Ammon. succ. ʒj .
 Aq. Foeniculi $\text{ʒ}\beta$.
 Syr. Althaeae ʒj .
 M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einen
 Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.)

*Tortual.*N^o. 995.

- R_x. Flor. Sulph. lot. gr. IV — X.
 Sacch. alb. gr. X.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 973.)

Horst.

N^o. 996.

- R_x. Hep. Sulph. salin. gr. vj.
 Mellis ʒj.
 Aq. Rosur. ʒj.
- M. D. S. Morgens und Abends eine solche Portion.
 (Wie bei No. 973.) *Hinze.*
-

N^o. 997.

- R_x Tart. tart. ʒiβ.
 solve in
 Aq. Foeniculi ʒjj.
 adde
 Vini stibiati ʒj.
 Syr. mannat. ʒβ.
- M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.) *Osann.*
-

N^o. 998.

- R_x. Extr. Stipit. Dulcamar. ʒβ — ʒjj.
 Kali tart. ʒiβ.
 solve in
 Aq. Foeniculi ʒjjj.
 adde
 Vini emet. ʒj.
 Syr. Althaeae ʒvj.
- M. D. S. Alle 2 Stunden einen Theelöffel.
 (Wie bei No 973.) *Osann. (Göbel.)*
-

N^o. 999.

- R_x. Acid. muriat. pur. ʒjj — jjj.
 Aq. font.
 Sacch. alb. ana q. s. ad dil. et gr. sup.
- M. D. S. In einem Tage zu verbrauchen.
 (Wie bei No. 973.) *Thiel.*
-

N^o. 1000.

Ry. Spir. Sal. dulcis ʒj.
Syr. Corall ʒvjjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Theelöffel.

(Wie bei No. 973.)

Werlhof.

N^o. 1001.

Ry. Acid. tart. gr. IV.
Rad. Ipecacuanhae
Opii elect. ana gr. jj.
Amyli opt. ʒj.
Sacch. alb. ʒjjj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 4 mal 8 Gran bis ʒj,
trocken oder mit Wasser zu nehmen.

(Wie bei No. 973.)

Vogler.

N^o. 1002.

Ry. Cantharidum
Camphorae ana ʒj.
Extr. Chinae ʒjjj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden 8—10 Gran in ei-
nem Julep.

(Wie bei No. 973.).

Burton.

N^o. 1003.

Ry. Tr. Cantharid. ʒjj.
Laud. liq. Sydenh. ʒjjj.
Elix. pectoral. Wedel. ʒjj.
Oxymell. squil. ʒj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden einen Theelöffel.

(Wie bei No. 973.)

Burton.

N^o. 1004.

- R_x. Tr. Cort. peruv. spirit. ℥j.
 Elix. sudorif. (paregor. Lond.) ℥j
 Tr. Cantharid. ℥j.
 M. D. S. Täglich einigemal 20 — 40 Tropfen, bis
 gelindes Harnbrennen erfolgt.
 (Wie bei No. 973.) *Lettsom.*
-

N^o. 1005.

- R_x. Decoct. Cort. Chin. ℥vj.
 Elix. sudorif. ℥jij.
 Tr. Cantharid. ℥j.
 M. D. S. Einem 3 jährigen Kinde täglich eine
 halbe Unze,
 (Wie bei No. 973.) *Lettsom.*
-

N^o. 1006.

- R_x. Cort. Chin. ℥β.
 Coq. ex Aq. font. ℥v.
 Col. ℥j. adde
 Tr. Cantharid.
 — Opii Sydenh. ana gr. XV.
 Syr. pectoral. ℥j.
 M. D. S. Täglich 4 mal $\frac{1}{2}$ bis 1 Theelöffel.
 (Wie bei No. 973.) *Bucholz.*
-

N^o. 1007.

- R_x. Cantharid. ℥j.
 Amygdal. dulc. excort. ℥iβ.
 Sacch. alb. ℥β.
 in mort. marm. prob. cont. f.
 lenta affus. Aq. Cal. ℥x.
 Emuls. Col. sine express.

- D. S. Alle 3—4 Stunden $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel (dem Alter nach).
(Wie bei No. 973.) *Bicker. (Richter.)*
-

N^o. 1008.

- R̄. Extr. Cort. peruv. frig. parat. ʒj.
Aq. Foeniculi ʒiβ.
Liq. anodyn. Hoffm. ʒj.
Tr. thebaicae gtt. xv.
Syr. Cort. Aurant. ʒj.
M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.
(Wie bei No. 973.) *Richter.*
-

N^o. 1009.

- R̄. Sem. Sinap. alb. ʒj.
Oxymell. squill. ʒj.
M. D. S. Alle Stunden 1—2 Theelöffel.
(Wie bei No. 973.) *Thilow.*
-

N^o. 1010.

- R̄. Camphorae gr. xjj.
Phosphori gr. jjj.
Ol. dest. Carvi ʒjjj.
M. D. S. Täglich 3 mal etwas in die Magengegend, die Brust und die Schultern einzureiben.
(Wie bei No. 973.) *Löbenstein - Löbel.*
-

Cardialgie. Colica.

N^o. 1011.

- R̄. Bismuth. oxydat. alb. gr. j—jjj.
Sacch. alb. ʒβ.

- Ol. Cinnamom. gtt. jj .
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3—4 mal ein Pulver.
 (Gegen Cardialgie. S. No. 973.) *Hecker.*
-

N^o. 1012.

- R_x. Magister. Bismuth. gr. $\text{jj} - \text{jjj}$.
 Extr. Lactucae virosae gr. $\text{I}\beta - \text{jj}$.
 Magnes. alb. gr. IV.
 Rad. Ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4} - \beta$.
 Elaeosacch. Chamomill. (v. Menth. pip.) gr. $\frac{\text{R}}{2} \text{X}$.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
 D. S. Täglich 3—4 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.) *Kopp.*
-

N^o. 1013.

- R_x. Bismuth. nitrici praecip. gr. jj .
 Magnes. ust. gr. X.
 Ol. Cajeputi gtt. jj .
 Sacch. alb. gr. vj .
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.
 D. ad chartam ceratam.
 S. Täglich 2 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.) *Schubarth.*
-

N^o. 1014.

- R_x. Bismuth. nitrici praecip. $\text{D}\beta$.
 Extr. Valer. 5j .
 Ol. Valer. aeth. gtt. X.
 Pulv. Rad. Valer. q. s.
 ut. f. Pil. No. LX. D. ad vitr. bene claus.
 S. Täglich 3 mal 6 Pillen.
 (Wie bei No. 1011.) *Schubarth.*
-

N^o. 1015.

- Ry. Rad. Ipecacuanhae
 Opii thebaic. ana gr. IV.
 Alum. crud. gr. xvj.
 Elaeosacch. de Cedro gr. XXXjj.
 M. f. Pulv. Divide in partes VIII. aeq.
 D. S. Alle Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 1011.)

*Hecker.*N^o. 1016.

- Ry. Magnes. alb. ʒj.
 Lign. Quass. gr. V.
 M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Morgens und Abends ein Pulver.
 (Gegen Magenkrampf von Säure, S. früher
 unter Magenfehler.)

*Tode.*N^o. 1017.

- Ry. Liq. Ammon. carb, ʒvj.
 solve in
 Aq. flor. Chamomill. ʒijj.
 adde
 Syr. flor. Chamom. ʒvj.
 M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Cardialgie von Erkältung.)

*Richter.*N^o. 1018.

- Ry. Asae foet. ʒj.
 solve in
 Syr. Menth. pip. ʒj.
 adde
 Aq. Menth. pip. ʒijj.
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel, bis Lin-
 derung erfolgt.
 (Gegen Cardialgie von Flatulenz.)

Richter.

N^o. 1019.

R_x. Extr. Trifol. fibr. ʒij.
 Fell. Tauri inspissat. ʒj.
 Extr. Aloës gr. xjj.
 Castor. gr. X.
 Sap. venet. ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Täglich 4 mal 5 Pillen.

(Gegen Cardialgie aus Magenschwäche. Zugleich
 Hb. Millefolii als Thee.) *Schmitz.*

N^o. 1020.

R_x. Ol. Nucis moschat. express. ʒj.
 — destill. Ment. pip.
 — Lavandul. ana gtt. XV.
 — Succini rectific. ʒβ.
 Sal. vol. C. C. gr. X.

M. D. S. In die Herzgrube einzureiben.
 (Gegen Cardialgie.) *Richter.*

N^o. 1021.

R_x. Aq. Regin. Hungar.
 Spir. Serpylli ana ʒij.
 Tr. thebaicae ʒjjj.

M. D. S. Mit Löschpapier auf die Herzgrube zu
 legen.

(Wie bei No. 1020.) *Richter.*

N^o. 1022.

R_x Elect. theriac.
 Ol. Nucist. express. ana ʒj.
 Castor.
 Croci oriental.

Bals. peruv. ana $\bar{3}j$.
 Ol. de Cedro gtt. XX.
 Camphorae $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Auf die Magengegend zu legen.
 (Wie bei No. 1020.) *Richter.*

N^o. 1023.

Ry. Aven. excort.
 Flor. Chamomill. ana $\bar{3}j$.
 Coq. c.
 Aq. ft. q. s. ad Col. $\bar{5}vjjj$.
 adde

Ol. Lini
 Mell. crud. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Gegen Kolik. S. No. 406. 407. 463. 469. 560.
 871. 973.) *Richter.*

N^o. 1024.

Ry. Decoct. Flor. Chamomill. $\bar{3}x$.
 Spir. Nitri dulc. $\bar{3}jj$.
 in quo solut. Ol. Cajeput. gtt. IV.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Wie bei No. 1023.) *Vogler.*

N^o. 1025.

Ry. Salis Friderici contriti $\bar{3}j$.
 Sap. venet. rasi $\bar{3}\beta$.
 Sem. Lini contusi $\bar{3}i\beta$.

M. D. S. Mit 12 Unzen Semmelkrumen und kochendem Wasser zu Brei gemacht, welcher auf den Bauch zu legen ist.
 (Wie bei No. 1023.) *Vogler.*

No. 1026.

Ry. Aq. Cinnam. s. v. $\bar{\text{v}}\text{ij}$.
 Tr. Rhei aquos. $\bar{\text{v}}\text{j}$.
 Extr. Columb. $\bar{\text{v}}\text{ij}$.
 Spir. Sulph. aeth. $\bar{\text{v}}\text{j}$.

M. D. S. Täglich 3 mal einen Esslöffel.
 (Zur Nach - Cur gegen Kolik.) *Richter.*

No. 1027.

Ry. Tr. Castor.
 Liq. anodyn. Hoffm. ana $\bar{\text{v}}\text{j}$.

M. D. S. Zu 30 Tropfen in lauwarmem Chamillenthee.
 (Gegen Colica flatulenta.) *Richter.*

No. 1028.

Ry. Spir. Nitri dulcis $\bar{\text{v}}\text{j}$.
 Tr. Cort. Aurant. $\bar{\text{v}}\text{ij}$.

M. D. S. Zu 30 Tropfen in warmem Chamillenthee.
 (Wie bei No 1027.) *Richter.*

No. 1029.

Ry. Rad. Columb. $\bar{\text{v}}\text{j}$.
 Opii puri gr. $\frac{1}{4}$ — β .

M. D. S. In einem halben Glas Wein zu nehmen.
 (Wie bei No. 1027.) *Schneider.*

No. 1030.

Ry. Magnes. carb. $\bar{\text{v}}\text{j}$.
 Rad. Rhei $\bar{\text{v}}\text{ij}$.
 — Valer. $\bar{\text{v}}\beta$.
 Elaeosacch. Foeniculi $\bar{\text{v}}\beta$.

M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Colica infantum; auch gegen verschiedene andere krankhafte Erscheinungen, wie Unruhe, Schlaflosigkeit, Durchfall, Verstopfung u. s. w. bei kleinen Kindern empfohlen.)

Hufeland.

N^o. 1031.

Ry. Pil. e res. Jalapp. pharm. boruss. ʒiv.

Opii gr. xjj—Xvj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Alle 2 Stunden 5 Pillen.

(Gegen Colica saturnina.)

Gebel.

N^o. 1032.

Ry. Alum. crud. ʒiβ.

solve in

Aq. font. destill. ʒvj.

adde

Syr. Althaeae ʒvj.

M. D. S. Alle 2 Stunden eine halbe Theetasse.

(Wie bei No. 1031.)

Grashuis.

N^o. 1033.

Ry. Ol. Ricini in

Vitell. ovar. subact. ʒβ.

Aq. Menth. pip. ʒj.

Tr. thebaicae gtt. vjjj.

Syr. e mecon. ʒj.

M. D. S. Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 1031.)

Percival.

N^o. 1034.

- R_x. Boracis ʒiβ.
 Aq. Menth. crisp. ʒv.
 Tr. Opii crocat. ʒβ.
 Syr. Althaeae ʒiβ.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No 1031.) *Sundelin.*
-

N^o. 1035.

- R_x. Magnes. sulph. ʒj.
 solve in
 Aq. font. destill. ʒvjjj.
 adde
 Ol. Lini ʒj.
 Syr. Papap. ʒj.
 Extr. Opii gr. v.
 M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden einen Esslöffel.
 (Gegen Ileus.) *Sydenham. (Pringle.)*
-

N^o. 1036.

- R_x. Cryst. Tart. ʒjj.
 Sacch. alb. ʒvj.
 Rad. Ipecacuanhae gr. jjj.
 M. D. S. Alle Stunden eine Messerspitze.
 (Wie bei No. 1035.) *Vogler.*
-

N^o. 1037.

- R_x. Crem. Tart. ʒβ.
 Cort. Chin. reg. alcohol. ʒj.
 M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Alle Stunden ein Pulver.
 (Wie bei No. 1035.) *Vogler.*
-

N^o. 1038.

R̄. Res. Jalapp. gr. IX.

Sap. venet. gr. jiiij.

tere. Dein affunde

Ol. Olivar. Cochlear. jj.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle Stunden den
vierten Theil zu nehmen.

(Wie bei No. 1035.)

Gruner.

N^o. 1039.

R̄. Calomel.

Extr. Colocynth. ana ℥j — jiiij.

M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Zehn Pillen auf einmal, und nachher alle
Stunden 5 Pillen, bis Stuhlgang erfolgt.

(Wie bei No. 1035.)

Donald Monro.

N^o. 1040.

R̄. Rad. Ipecacuanhae ℥jiiij.

Coq. ex. Aq. ft. suff. qt.

ad Col. ℥vj.

adde

(Ol. Olivar. vel Ricini ℥β.)

M. D. S. Zum Clystier.

(Wie bei No. 1035.)

Michel. (M. J. Schmidt.)

N^o. 1041.

R̄. Tart. stib. gr. vjiiij.

solve in

Aq. font.

Aceti Vini ana ℥jiiij.

M. D. S. Zum Clystier.

(Wie bei No. 1035.)

(Hufeland's Journal.)

N^o. 1042.

R_x. Asae foet. ʒj.
 Infus. flor. Chamomil.
 ex ʒj. parat. ʒvj.

M. D. S. Zum Clystier.
 (Wie bei No. 1035.)

Joerdens.

Eclampsie. Hydrophobie. u. s. w.

N^o. 1043.

R_x. Zinci oxydati albi
 Extr. Hyoscyami ana ʒj.
 Magnes. subcarb. ʒj.
 Sacch. Lactis ʒvj.

M. f. Pulv. D. S. Zu 10—30 Gran pro dosi.
 (Gegen Eclampsie.)

Vogler.

N^o. 1044.

R_x. Crem. Tart.
 Nitri dep. ana ʒj.
 Opii pulv. gr. ʒj.
 Aq. font. ʒjij.
 Syr. Papav. alb. ʒjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1043. — Auch gegen falsche
 Wehen.)

Vogler.

N^o. 1045.

R_x. Castorei gr. xvjjj.
 Nitri dep. ʒβ—j.
 Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Divide in partes vj. aeq.
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 1043. Auch gegen Congestionen zum Uterus und Neigung zum Abortus.)

Berends.

N^o. 1046.

Rx. Rad. Ipecacuanhae gr. ꝑꝑ—IV.

Sacch. alb. gr. x.

M. f. Pulv. Divide in part. IV. aeq.

D. S. Alle Stunden ein Pulver. (Bei gastrischer Complication setze man vor der Theilung einen Scrupel Kali sulphurici hinzu.)

(Wie bei No. 1043. Besonders gegen falsche Wehen.)

Ribke.

N^o. 1047.

Rx. Tr. Opii simpl. gutt. XX.

Spir. nitrico-aeth. ʒj.

Aq. flor. Aurant. ʒvj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel, bis die Wehen nachlassen, und erst bei ihrem allenfallsigen Wiedereintritt fortzufahren. —

(Gegen Nachwehen.)

Formey.

N^o. 1048.

Rx. Verm. majal. No. X.

Rad. Valer.

— Pimpinell.

— Agrimon.

Visci querni ana ʒβ.

M. f. c. Roob Sambuci Electuarium.

D. S. Alle zwei Stunden einen vollen Theelöffel.

(Gegen Hydrophobie. S. No. 105)

Kemme. (Schwartz.)

N^o. 1049.

- R_x. Calomel. gr. VIß.
 Camphorae gr. vj.
 Cantharid. gr. j.
 M. f. c. Mucilag. G. arab. pil. pd. gr. j.
 D. S. Eine Pille pro dosi.
 (Wie bei No. 1048.)

*Werlhof.*N^o. 1050.

- R_x. Cantharid. gr. j.
 Calomel.
 Pulv. fol. Belladonnae ana gr. jj.
 Camphorae gr. IV.
 M. f. c. Mucilag. G. arab. Pil. No. VI.
 D. S. Morgens und Abends 1—2 Pillen.
 (Wie bei No. 1048.)

*Berends.*N^o. 1051.

- R_x. Lichen. einer. ʒj.
 Piper. nigr. ʒij.
 C. M. Divide in part. IV. aeq.
 D. S. Jeden Morgen nüchtern eine Portion in einem Schoppen warmer Milch, und einen Monat lang warme Bäder.
 (Wie bei No. 1048.)

*Mead.*N^o. 1052.

- R_x. Pulv. Rad. Cynosbati ʒjj.
 Vitell. ovor. No. jjj.
 M. D. S. Zu einem Kuchen gebacken, und Morgens nüchtern im Bett zu nehmen.
 (Wie bei No. 1048.)

Andry.

N^o. 1053.

Ry. Rad. Valer. ʒj.

Aq. font. ʒj.

Vini alb. ʒijj.

M. D. S. Morgens nüchtern im Bette zu trinken,
und nachher Thee von Flor. Aurant. —

(Wie bei No. 1048.)

*Bouteille.*N^o. 1054.

Ry. Pulv. Scarabaeor. majal. gr. j.

Camphorae gr. jj.

Nitri dep. gr. vj.

Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.

D. S. Alle 2—4 Stunden ein Pulver in Milch.

(Wie bei No. 1048.)

*Schäffer.*N^o. 1055.

Ry. Scarab. maj. No. VIII.

Theriac. andromed. ʒβ.

Sal. C. C. ʒjj.

Camphorae ʒj.

Spir. Minderer. ʒvjjj.

M. D. S. Zu einem halben bis ganzen Esslöffel.

(Wie bei No. 1048.)

*Selle.*N^o. 1056.

Ry. Scarab. majal. melle suffocat. No. XXIV.

Pulv. Rad. Serpentar. virg. ʒj.

— Lign. Ebeni ʒjj.

Spong. Sorbi aucupar. ʒj.

Plumbi rasi ʒj.

Theriaci ʒijj.

M. f. Elect.

D. S. Fünf — zehn jährige Kinder erhalten 20 — 40 Gran; — 20 jährige Subjecte 60 Gran; — 30 jährige 70 — 90 Gran.

(Wie bei No. 1048.)

(*Preussische Lattwerge. Heim. Schönwald.*)

N^o. 1057.

Ry. Hb. Rutae graveol.
— Dipsaci fullon. ana ℥vjjjβ.
Sedi acris ʒj et ʒβ.
Zibeti gr. j.

M. D. S. Auf ein Butterbrod.

(Wie bei No. 1048.)

(*Consbruch.*)

N^o. 1058.

Ry. Sal. Tart. dep. ʒjjj.
solve in
Aq. flor. Chamomill.
— Cinnamom. ana ʒjjj.
adde

Syr. Papav. alb. ʒj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunden (abwechselnd mit einer Dosis von 5 — 15 Tropfen Tr. thebaicae) einen Esslöffel. Zugleich öftere Clystiere von Seifenwasser, und Bäder, in welchen Lapis causticus chirurgorum (in jedem Bad ʒj) aufgelöst werden.

(Gegen Tetanus. s. No. 856.)

Stütz.

N^o. 1059.

Ry. Spirit. Lavandulae ʒjj.
Liq. Ammon. anisat. ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben in die regio epigastrica.
(Gegen Singultus der Kinder.) *Siebold.*

N^o. 1060.

Ry. Tr. Arnicae ʒij.
— Colocynth.
— Capsici ana ʒj.
Ol. Sabinae ʒβ.

M. D. S. Täglich 4 mal 15—20 Tropfen.
(Gegen Paralysis (rheumatica) ohne gleichzeitige entzündliche Affectionen. — S. No. 623.
870. 917. b.) *Horn.*

N^o. 1061.

Ry. Phosphori ʒjj.

solve in

Ol. Sabinae ʒβ.

adde

Liq. Ammon. caust. ʒij.

M. f. l. a. Liniment. D. S. Täglich 2—3 mal das
gelähmte Glied damit einzureiben. *Görden.*

N^o. 1062.

Ry. Phosphori gr. IV.

solve in

Ol. Terebinth.

— Lini express. ana ʒj.

adde

Camphorae ʒβ—ʒj.

M. D. S. (Wie bei No. 1061.)

Horn.

N^o. 1063.

Ry. Phosphori gr. X.

Camphorae ʒjj.

Axung. porci ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben,
(Wie bei No. 1061.)

Hufeland.

N^o. 1064.

R_x. Tr. Cantharid. ℥j — ʒj.

Aq. Petrosel. ʒvjjj.

Tart. boraxat. ʒj.

Tyr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel. Zugleich *b*.

R_x. Phosphori gr. XXIV.

Ol. Olivar. ʒj.

M. D. S. Zum Einreiben.

(Wie bei No. 1061.)

Autenrieth.

N^o. 1065.

R_x. Rasur. Lign. Guajaci ℥jjj.

— — Sassafras ℥iβ.

pon. in sacculo, et coq. c. Aq. ft. Modiis vj — vjj.
per horae fere quadrantem. Ante finem adde saccu-
lum cum

R_x. Bacc. Lauri ℥jjj.

Cort. Winteran. ℥β.

Rad. Irid, flor.

— Cyperi

— Calami aromat.

— Angelicae ana ʒxjj.

M. D. S. Der Kranke sitze Morgens eine Stunde
in diesem (warmen) Bade, werde dann in eine
wollene Decke eingeschlagen, trinke einen Schluck
Wein, und warte im Bett die eintretende Haut-
ausdünstung ab.

(Wie bei No 1061.)

Fuller.

N^o. 1066.R_x. Camphorae ℥j.

G. arab. ℥iv.

Aq. flor. Sambuci ℥iv.

Syr. Diacod. ℥j.

M. f. l. a. Emuls. D. S. Täglich 3—4 mal 1—2

Esslöffel.

(Gegen Satyriasis.)

*Auenbrugger. (Berends.)*N^o. 1067.R_x. Extr. Gratiolae

Sem. Foeniculi ana ℥j.

Sacch. alb. ℥vj.

M. f. Pulv. D. S. Täglich 3 mal einen halben

Scrupel (steigend zu ℥β).

(Gegen Melancholie und Manie. Besonders von

Stockungen in den Abdominal-Eingeweiden.)

*Kostrzewsky.*N^o. 1068.R_x. Extr. Gratiolae ℥β.

— Belladonnae gr. v.

Aq. Laurocerasi ℥β.

M. D. S. Alle Stunden 20—30 Tropfen.

(Wie bei No. 1067.)

*Hufeland.*N^o. 1069.R_x. Extr. Gratiolae ℥j — j̄j.

solve in

Aq. Cerasorum ℥j̄j.

adde

Aq. Laurocerasi ℥j — j̄j.

Mellis puri ℥vj. — ℥j.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2—4 Stunden einen
Esslöffel.

(Wie bei No. 1067.) *Lentin. (Jahn.)*

Syphilis. Mercurialkrankheit.

N^o. 1070.

R_x. Lign. Guajaci ʒij.

— Sassafras

Stipit. Dulcamar.

Rad. Liquirit.

— Graminis ana ʒj.

Sem. Foeniculi ʒj.

C. M. Zwei Esslöffel mit einem Maass Wasser
zur Hälfte eingekocht, als Ptisane zu trinken.

(Auch gegen Flechten empfohlen.) *Murray.*

N^o. 1071.

R_x. Rad. Bardanae

— Saponar.

— Sarsaparill. ana ʒj.

Cort. Mezerei

Stipit. Dulcamar. ana ʒiβ.

Lign. Quassiae ʒijj.

M. f. Spec. D. S. Mit 3—4 ℥ Wasser gekocht,
zur Ptisane. *Weikard.*

N^o. 1072.

R_x. Res. Guajac. nativ. ʒj.

Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Emuls. c.

Aq. font. ʒvj.

adde

Spir. Nitr. aeth. $\mathfrak{3}\beta$ Syr. Amygdal. $\mathfrak{3}\beta$.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

*Richter.*N^o. 1073.

Ry. Ras. Lign. Guajaci

Cort. Guajaci ana $\mathfrak{3}j$.Lign. Sassafras $\mathfrak{3}\beta$.Rad. Liquirit. $\mathfrak{3}j$.

Coq. c. Aq. ft. suff. qt.

per hor. $\mathfrak{3}jj$. In fin. coct. addeSpir. Vin. rectific. $\mathfrak{3}j$.(vel Aq. Cinnamom. s. v. $\mathfrak{3}jjj$.)Col. $\mathfrak{6}$ II. D. S. Für 2 Tage.*Hecker.*N^o. 1074.Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{3}j$.Coq. c. Aq. ft. $\mathfrak{6}$. \mathfrak{jj} . ad $\mathfrak{6}$. \mathfrak{j} .

adde

Kali carb. $\mathfrak{3}j$.M. D. S. Täglich zu verbrauchen. *Neumann.*N^o. 1075.Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{3}jjj$.Ichthyocollae $\mathfrak{3}\beta$.G. arab. $\mathfrak{3}j$.

Stibii sulphurat. nigr.

in saccul. ligat. $\mathfrak{3}IV$.Coq. c. Aq. ft. $\mathfrak{6}$. VI.ad rem. $\mathfrak{6}$. \mathfrak{jjj} .

D. S. Die Hälfte den Tag über in 3 Portionen zu verbrauchen.

(Decoctum Felsii)

Fels.

N^o. 1076.

- Ry. Cort. Nuc. jugland.
 rudit. tus. \mathfrak{X} .
 macer. nocte in Aq. bull.
 dein mane adde
 Rad. Sarsaparill.
 — Chinae nodosae ana \mathfrak{J} .
 Antim. crud.
 Lap. Pumicis petia lig. ana $\mathfrak{J}\beta$.
 Coq. c. \mathfrak{L} X Aq. in olla bene clausa per aliquot
 horas; dein abjice petiam, et coque residuum ad
 \mathfrak{L} $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$. usque. *Decantatum* (non filtratum) deco-
 ctum exhib. D.
- S. Morgens und Abends ein Pfund zu verbrauchen.
 (*Decoctum Pollini.*) Auch gegen atonische
 Gicht und Mercurialkrankheit empfohlen.
Pollin.

N^o. 1077.

- Ry. Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{X}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 coq. c. Aq. ft. \mathfrak{L} XXIV.
 per $\frac{1}{4}$ hor. adde
 Alum. saccharat. $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\beta$.
 Merc. dulcis $\mathfrak{J}\beta$.
 Cinnab. antimon. \mathfrak{J} .
 in nodul. lig. sub finem coct.
 admisce
 Fol. Sennae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.
 Rad. Liquirit. $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\beta$.
 Sem. Anisi vulg. $\mathfrak{J}\beta$.
 Col. \mathfrak{L} xvj. Sign. *Decoctum Zittmanni forte.*
 tunc
 Ry. Resid. Decoct. fort.
 Rad. Sarsaparill. $\mathfrak{J}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Coq. c. Aq. ft. \mathfrak{L} XXIV.

sub finem coct. adde

Cort. Citri

Cort. Cinnamom.

Cardanom. min. ana ʒijj.

Bad. Liquirit. ʒvj.

Col. ℞ XIV. Sign. *Decoctum Zittmanni tenue.*

Morgens eine Flasche Decoct. fort. Abends eine
Flasche Decoct. tenue. *Zittmann.*

N^o. 1078.

℞. Fol. Sennae ʒiβ.

Rad. Sarsaparill. ʒijj.

Rad. lign. Guajaci

— — Sassafras

Rad. Chinae nodos.

— Irid. flor.

— Aristoloch. rotund. ver.

— — long. ver.

Sem. Anisi vulg.

Rad. Jalappae.

— Polypod. vulg.

Tart. dep. ana ʒvj.

Antim. crud. in sacc. lig. ʒvj.

Nuc. jugland. una cum putam.

contus. No. VI.

Mixturim concis. et contus. affunde

Vini alb. generos. ℞ ij.

Tunc omnia loco calido digere

per horas XXIV. Digest. parata

adde

Aq. font. ℞. vj.

Coq. vase clauso usque ad

Consumt. tert. liq. part.

Col. serv. in lagen. D.

S. *Decoctum Vigaroux.*

In 24 Stunden 3 Gläser, jedes von etwa fünf Unzen, zu nehmen. Das erste Morgens nüchtern, das zweite eine Stunde vor dem Mittagessen, das dritte vor dem Schlafengehn.

Zugleich *b.*

Rx. Residua adhuc calida
leni igne denuo coque *c.*
Aq. font. ℥ vj.
Vini alb. ℥ jj.
usque ad consumpt. tert. part.
Col. et serva in lagen.

D. S. Bochetum Vigaroux.

Zum gewöhnlichen Getränk.

Vigaroux.

N^o. 1079.

Rx. Acidi phosphorici ʒj.

Tr. Cinnamom. ʒjj.

M. D. S. Stündlich 30 Tropfen in Wasser.

(Besonders gegen secundäre Syphilis und Knochenschmerzen.)

Burdach.

N^o. 1080.

Rx. Acid. phosphor. puri ʒj.

Aq. font. destil. ʒβ.

Syr. Cerasor. ʒjj.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 10 — 20 Tropfen
in Wasser zu nehmen.

(Wie bei No. 1079.)

Hufeland.

N^o. 1081.

Rx. Acid. nitr. fum. ʒβ.

Decoct. Avenae ʒjj.

Syr. Sacchari ʒj.

M. D. S. Alle 1—2 Stunden einen Esslöffel.
 (Auch als Gargarisma bei syphilitischen Hals-
 Affectionen.) *Fricke.*

Nº. 1082.

Rx. Sal. Tart. dep.
 Aq. Cinnam. simpl. ana ℥j.
 Opii puriss. ℥ij.
 Aq. Cinnamom. c. v. ℥iv.
 separatim solvantur. Dein
 misceant. invicem et stent
 in balneo Mariae per ℥ij. hebdom.
 saepius agitando. Col admisc.
 G. arab. ℥ij.
 Sal. alcal. volat. ℥j.
 in
 Aq. Cinnamom. simpl. ℥vj.
 solut. Omnia in se mixta stent per aliquot
 dies in quiete, dein filtr. et serv. D.
 S. Täglich 3 mal 24 Tropfen in einer Tasse Infus.
 Althaeae.

(Tr. antisiphilitica Besnardi.) *Besnard.*

Nº. 1083.

Rx. Tart. puriss. ℥ij.
 solve in
 Aq. Meliss. ℥iv.
 adde
 Liq. Ammon. carb. ℥ij.
 Tr. terrae Catechu ℥β.
 M. D. S. Esslöffelweise. *Eichheimer.*

N^o. 1084.

Ry. Stibii sulphurat. nigr. ℥ijj.
Hydrarg. oxydat. rubri gr. ij.
Sacch. alb. ℥jj.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver mit schleimigem Vehikel. *Berg.*

N^o. 1085.

Ry. Hydrargyri oxydati rubri gr. ij — iijj.
Pulv. Opii puri gr. iv — vj.
Sacch. Lactis ℥ijj.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.

(Besonders bei syphilitischen Haut- und Knochen-Affectionen empfohlen.) *Wendt.*

N^o. 1086.

Ry. Hydrarg. oxydat. rubr. gr. iv — vjjj.
Antim. crudi

Extr. Chaerophylli ana q. s. ut. f.

l. a. Pil. No. CLX. Consp. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 10 Pillen. Zugleich ein Decoctum Lign. Guajaci oder Sarsaparillae. *Ritter.*

N^o. 1087.

Ry. Hydrarg. oxydat. rubr.
Opii puri ana gr. j.
Extr. Liquirit. q. s. ut f. Bolus.

D. S. Auf einmal zu nehmen. *Swediaur.*

N^o. 1088.

Ry. Hydrarg. puriss.
Mellis ana ℥j.
Succi Liquirit. ℥ijj.

terant. simul, donec Hydrarg. pen.

disp. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Morgens und Abends 4—6 Pillen.

Swediaur.

N^o. 1089.

R_x. Hydrarg. purif. ʒj.

G. arab. ʒjjj.

affunde sensim

Aq. font. ʒjj.

tere, donec glob. Hydrarg. disp.

adde

Aq. Foeniculi ʒiv.

Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Täglich 2 mal einen Esslöffel.

Plenk.

N^o. 1090.

R_x. Hydrarg. purif. ʒj.

Pulv. G. arab. ʒjjj.

Syr. de Cichor. c. Rheo ʒjj.

tere in mort. marin. donec

Hydrarg. dispar. adde

Micæ panis albi durisc. ʒβ.

subige in massam, ex qua form.

Pil. pd. gr. jj. Consp. sem. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 9 Pillen.

Richter.

N^o. 1091.

R_x. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. jjj.

Sacch. alb. ʒjj.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Morgens einige Stunden nach dem Frühstück ein Pulver, und Abends eins zwischen 5—6 Uhr; 3 Tage lang, dann einen Tag Nichts, und so fort mit der Dosis zu 2 Pulvern steigend, und

wieder auf eins zurückgehend. Zugleich örtlich
auf Geschwüre. No. 1280. *Schönemann.*

N^o. 1092.

R_x. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. j.
Rad. Liquirit. ℥β.
M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.
D. S. Morgens und Abends ein Pulver. *Hecker.*

N^o. 1093.

R_x. Hydrarg. nitrici ʒ℥β.
Aeth. nitrici ʒβ.
Syr simpl. ʒxvj.
M. D. S. Täglich 2 mal einen Theelöffel,
Bouillon Lagrange.

N^o. 1094.

R_x. Extr. Liquirit. ℥jj.
Calomel.
Sulph. aurat. antim. ana ʒj.
M. f. c. Mucilag. G. arab. q. s. Pil. pd. gr. jj.
Consp. Lycopod.
D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. *Plummer.*

N^o. 1095.

R_x. Extr. Chinae ʒjj.
— Cicutae ℥jj.
Calomel. gr. xv.
Sulph. stib. rubr. gr. x.
M. f. Pil. pd. gr. jj. Consp.
D. S. Täglich 2 mal 8 Pillen. *Weikard.*

N^o. 1096.

R_x. Hydrarg. phosphor. gr. IV.
Cort. Cinnamom. gr. XIV.
Sacch. alb. ʒβ.

M. f. Pulv. Divide in part. VIII. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver. *Hecker.*

N^o. 1097.

R_x. Merc. subl. corros. ʒβ.
Succi Liquirit. ʒj.
Spec. Diatragacanth. ʒjj.

M. f. Pil. No. C.

D. S. Täglich 1 — 4 Pillen.

(Auch gegen Lippenkrebs empfohlen)

Vogler.

N^o. 1098.

R_x. Merc. subl. corros. gr. IV.
solve in

Aq. Cinnamom. vinos. ʒjj.
adde

Tr. Opii simpl. ʒjj.

M. D. S. Täglich 3 — 4 mal 40 Tropfen in einer
Tasse Schleim. *Marcus.*

N^o. 1099.

R_x. Hydrarg. mur. corrosiv.
Opii puri ana gr. X.
Succi Liquirit. dep. ʒIV.
Aq. destill. simpl. q. s.

ut f. l. a. Pil. No. C.

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends eine Pille (steigend zu
3 — 4 Pillen). *Wendt.*

N^o. 1100.

R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. X.
Aq. destill. gutt. pauc.

adde

Opii puri

Camphorae ana gr. X.

Pulv. Rad. Liquirit.

Extr. Liquirit. ana ʒj.

M. f. l. a. Pil. No. LX.

D. S. Morgens und Abends eine Pille. (In jeder
Pille ist $\frac{1}{6}$ Gran Sublimat.) *v. Gräfe.*

N^o. 1101.

R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. IV.
solve exactiss. in

Aq. Cinnamom. vinos. ʒj.

adde

Tr. Opii simpl. ʒβ.

M. D. S. Morgens und Abends 30 Tropfen.
Richter.

N^o. 1102.

R_x. Merc. subl. corros. gr. XV.
solve in

Aq. destill. ʒvj.

adde

Micae panis tritici ʒiiβ.

M. f. Pil. pd. gr. j. Consp. Liquirit.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen. *Hoffmann.*

N^o. 1103.

R_x. Merc. subl. corros. gr. vj.
solve in

Aq. destill. ferv. q. s.

adde

Micae panis albi

Sacch. alb. ana q. s.

ut f. l. subig. Pil. No. CLXXX.

D. S. Morgens und Abends 1—3 Pillen. (Dreissig Pillen enthalten einen Gran Sublimat.)

*Hufeland.*N^o. 1104.R_x. Merc. subl. corros. gr. xjj.

solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Micae panis albi

Sacch. alb. q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. j. No. CCXL.

D. S. Um den andern Tag in einer Dosis gleich nach dem Mittagessen 4 Pillen; allmählig zu 30 Pillen steigend.

*Dzondi.*N^o. 1105.R_x. Merc. subl. corros. ʒj.

Axung. porci ʒj.

Tere exact. per horas II.

D. S. Alle Abende ʒβ. in die Fußsohlen einzureiben.

*Cirillo.*N^o. 1106.R_x. Merc. subl. corros.

Sal. ammon. pur. ana ʒβ.

solve in

Aq. Rosar. ʒiv.

Filtrat. adde

Axung. porci ʒiv.

Tere in mortar. vitr. in

balneo Mariae ad Aq. Rosar.

perf. evaporat.

Post refrigerat. adde

Ol. de Cedro gtt. XXX.

M. D. S. (Wie bei No. 1105.)

Hufeland.

N^o. 1107.

R̄. G. Guajaci

Sacch. alb. ana ʒjj.

Flor. Sulph.

Sem. Foeniculi

Rad. Irid. flor. ana ʒj.

Calomel. gr. X.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Alle drei Stunden einen Scrupel. Zugleich

Thee von Spec. Lignorum mit Lign. Guajaci.

(Gegen Syphilis mit Gicht.) *Stark.*

N^o. 1108.

R̄. Cort. Mezerei

Rad. Althaeae ana ʒjj.

C. M. S. Mit einer Kanne Wasser gekocht, täglich zu trinken.

(Gegen syphilitische Knochenschmerzen.)

Hufeland.

N^o. 1109.

Cort. Mezerei ʒj—jj.

Rad. Althaeae

— Liquirit. ana ʒiβ.

Coq. ex Aq. ft. ℥v.

ad Col. ℥jj.

D. S. Täglich $\frac{1}{2}$ ℥ in 3 Portionen zu verbrauchen.

(Wie bei No. 1108.)

Hufeland.

N^o. 1110.

R_x. Strychnini nitrici gr. ℞.
solve in

Alcohol. perf. ʒβ.

M. D. S. Abends vor Schlafengehn 3—30 Tropfen.
(Wie bei No. 1103.) *Fricke.*

N^o. 1111.

R_x. Aluminis
Camphorae

Cerussae ana ʒβ.

Merc. subl. corros. ʒj.

Acet. concentr.

Spir. Vini rectific. ana ʒβ.

M. D. S. Aeusserlich anzuwenden.

(Gegen syphilitische Hautauswüchse.)

Swediaur.

N^o. 1112.

R_x. Merc. subl. corros.
Vitrioli coerulei ana ʒj.

Lap. infernal. gr. vj.

M. D. S. Aeusserlich aufzustreuen, und nachher
etwas Wasser darauf zu tröpfeln.

(Wie bei No. 1111.)

Masius.

N^o. 1113.

R_x. Tr. kalinae ʒjj.

Aq. Laurocerasi ʒβ.

M. D. S. Alle 2 Stunden 35—40 Tropfen mit
Haferschleim.

(Gegen Tripper.)

Fricke.

N^o. 1114.R_y. Fol. Malvae $\bar{\text{I}}\text{V}$.Rad. Althaeae $\bar{\text{I}}\text{j}$.Sem. Cannabis $\bar{\text{I}}\text{I}\text{I}\text{j}$.C. C. M. D. S. Einen Esslöffel voll mit 4—6
Tassen Wasser gekocht, täglich zu verbrauchen.
(Wie bei No. 1113.) *Tode.*N^o. 1115.R_y. Sem. Papav. $\bar{\text{I}}\beta$.

Cont. c.

Aq. font. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{j}$.

ut f. l. a. Emuls.

adde

Aq. Laurocerasi $\bar{\text{I}}\text{j}$.M. D. S. Erwärmt 3—4 mal täglich einzuspritzen.
(Wie bei No. 1113.) *Schlegel. (Wendt.)*N^o. 1116.R_y. Lap. caustic. gr. vj.

solve in

Aq. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}$.

adde

Mucilag. Sem. Cydon. $\bar{\text{I}}\text{j}$.

M. D. S. (Wie bei No. 1115.)

*Walch.*N^o. 1117.R_y. Kali carb. sicc. $\bar{\text{I}}\beta$.

solve in

Aq. font. destill. $\bar{\text{I}}\text{V}\text{j}$.

Cola per chart.

D. S. Mit Wasser vermischt und erwärmt einzu-
spritzen.

(Wie bei No. 1113.)

Richter.

N^o. 1118.

Rj. Extr. Opii aquos. ℥β—℥j.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

Acet. saturn. ℥β.

Mucilag. Sem. Cydon. ℥β.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1113.)

*Richter.*N^o. 1119.

Rj. Hydrarg. mur. corros. gr. jj—jjj.

solve in

Aq. font. destill. ℥v.

Extr. Opii aq. ℥jj.

Mucilag. Sem. Cydonior. ℥j.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1113.)

*Richter.*N^o. 1120.

Rj. Aluminis gr. xv.

Aq. Rosar. ℥iv.

Opii puri gr. X.

Mucilag. G. arab. ℥β.

M. D. S. Zum Einspritzen.

(Gegen Tripper; besonders in chronischen Fällen.)

*Rust.*N^o. 1121.

Rj. Zinci sulphurici gr. iijj.

solve in

Aq. destill. ℥jj.

adde

Aq. Laurocerasi ℥j.

Tr. Opii simpl. ℥jj.

M. D. S. Wie bei No. 1120.

Rust.

N^o. 1122. -

- R_x. Terebinth.
 Extr. Gentianae ana ʒijj.
 Kino
 Ferri sulphurici ana ʒiβ.
 M. f. l. a. Pil. pd. gr. ʒj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Täglich 4 mal 10 Pillen.
 (Gegen Nachtripper. — Besonders aus Atonie.
 S. No. 471.) *Blankard. (Walch. Wendt.)*

N^o. 1123.

- R_x. Bals. Copaivae ʒijj.
 Vitell. ovor. No. III.
 tere cum
 Aq. font. ʒv.
 — Cinnamom. vincts. ʒj.
 Syr. Cinnamom. ʒβ.
 M. D. S. Alle 3 Stunden 2 Esslöffel.
 (Wie bei No. 1122.) *Walch.*

N^o. 1124.

- R_x. Bals. Copaivae ʒβ.
 Extr. Stipit. Dulcamarae ʒjj.
 Pulv. Rad. Rhei ʒj.
 Pulv. G. arab. q. s.
 ut f. l. a. Pil. pd. gr. ʒj.
 Consp. pulv. Cinnamom.
 D. S. Täglich 4 mal 7—8 Pillen.
 (Wie bei No. 1122.) *Clossius. (Wendt.)*

N^o. 1125.

- R_x. Bals. Copaivae ʒj.
 Spir. aeth. nitr. ʒiβ.
 Syr. Ononidis spinosae ʒiβ.

M. f. l. a. Linctus. D.
S. Wohl umgeschüttelt täglich 4 mal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 1122.) *J. A. Schmidt.*

N^o. 1126.

Ry. Bals. Copaivae ʒj.
Spir sulph. aeth. mart. ʒvj.
Tr. Cantharid. ʒβ.

M. D. S. Täglich 2—3 mal 25—30 Tropfen in einem Löffel starken Liqueurs. —

(Wie bei No. 1122.) *Richter.*

N^o. 1127.

Ry. Bals. Canad. ʒβ.
G. Guajaci ʒj.
Spir. Vini rectific. ℞β.
Digere leni calore, dein faecibus subsidentibus tincturam limpida[m] cola. Colaturae adde
Ol. destill. Menth. pip. ʒj.

M. D. S. Täglich 2—3 mal 40 Tropfen.

(Wie bei No. 1122.) *Falk.*

N^o. 1128.

Ry. Bals. peruv. ʒvj.
Vitell. ovor. No. ʒj.
Ol. Olivar.
Aceti Vini ana ʒjjj.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1122.) *Fricke.*

N^o. 1129.

Ry. Myrrhae elect. ʒiβ.
Ferri sulph. ʒjjj.
Pulv. Rad. Tormentill. ʒjj.
Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. jj .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 4 mal 7 Pillen.

(Wie bei No. 1122.)

Richter.

N^o. 1130.

R_x. G. Olibani

— Mastichis

Terrae japon.

Sang. Dracon. ana ʒj .

Tereb. venet q. s.

ut f. l. a. Pil. pd. gr. jj .

Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 2—3 mal 10—12 Pillen.

(Wie bei No. 1122.)

Richter.

N^o. 1131.

R_x. Catechu

Myrrhae ana ʒj .

solve in

Aq. Calc. ust. ʒiv .

M. D. S. Täglich 3 mal zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1122, S. No. 581, 582, 583, 584.)

Augustin.

N^o. 1132.

R_x. Extr. Opii gr. jjj .

Acet. saturn. gtt. vjjj .

Aq. destill. ʒiv .

Mucilag. G. arab. ʒβ .

M. D. S. Täglich 2 mal damit einzuspritzen.

(Wie bei No. 1122.) *Girtanner. (Wendt.)*

N^o. 1133.

- R_x. Bals. Copaivae ʒj.
 Vitell. ovor. No. I.
 (vel G. arab. ʒβ—j.)
 tere cum
 Aq. flor. Chamomill.
 (vel Aq. Rosar.) ʒiv.
 adde
 Tr. Opii simpl. ʒj—ʒβ—ʒj.
- M. D. S. Täglich 3—4 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Stark.*
-

N^o. 1134.

- R_x. Cort. Chinae opt. ʒj.
 Coq. c. Aq. ft. s. qt.
 per ½ hor. Col. refrig.
 adde
 Vini rubri ʒij.
 Aluminis crudi ʒj.
- M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Becker.*
-

N^o. 1135.

- R_x. Cort. Salicis laureae ʒj.
 Coq. c. Aq. ft. q. s. per
 ½ hor. in Col. ʒvjij.
 solve
 Aluminis crudi ʒj.
- M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.
 (Wie bei No. 1122.) *Cappel.*
-

N^o. 1136.

- R_x. Gallar. in pulv. redact. ʒβ.
 Coq. c. Aq. ft. q. s.
 in Col. ʒvjij. solve

Aluminis crudi ʒj.

Zinci sulphurici gr. jʒ.

M. D. S. Täglich 2—3 mal zum Einspritzen.

(Wie bei No. 1122.)

*Kortum.*N^o. 1137.

℞. Cupri acet ʒiβ.

Spir. Sal. ammon. caust. ʒβ.

M. D. S. Zu 6 Tropfen mit einer Unze Aq. destill.
vermisch't zum Einspritzen.(Wie bei No. 1122. Besonders in hartnäckigen
Fällen.)*Girtanner.*N^o. 1138.

℞. Calomel. ʒβ.

Aq. destill. ʒvjjj.

M. D. S. Zum Einspritzen (3—4 mal täglich).

(Wie bei No. 1122.)

*Tode.*N^o. 1139.℞. Hydrarg. borussici gr. jʒ.
solve in

Aq. destill. ʒXIV.

Aq. Laurocerasi ʒjʒ.

M. D. S. Wie bei No. 1138.

(Auch gegen Milch-Abscesse.)

*Horn.*N^o. 1140.

℞. Lap. divini gr. vjjj.

Aq. saturnin. ʒvjjj.

M. D. S. Zum Einspritzen (täglich 3—4 mal).

(Gegen Nachtripper.)

Attenhofer.

N^o. 1141.

R_y. Acet. saturn. ʒj.
 Camphorae ʒβ.
 Ol. Tereb. ʒv.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *F. Hoffmann.*

N^o. 1142.

R_y. Acet. saturn. ʒj.
 solve in
 Aq. font. destill. ʒvj.
 adde
 Liq. Myrrhae ʒjjj.
 Tr. Opii simpl. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *Althof.*

N^o. 1143.

R_y. Acid. sulph. dilut. ʒj — 1β.
 Acet. saturnin. ʒjj.
 Aq. destill. ʒvjijj.

M. D. S. Wie bei No. 1140. *Kessler.*

N^o. 1144.

R_y. Empl. diachyl. comp. ʒjj.
 — mercurial. ʒj.
 Antim. crud. praep.
 subtilissime pulverisat. ʒβ.

M. D. S. Zu Bougies.
 (Gegen Nachtripper von Verengerungen in
 der Harnröhre, und torpidem Zustand.)

Dease.

N^o. 1145.

R_y. Hydrarg. muriat. corros. gr. jj.
 (vel Lapid. divini gr. IV.)
 solve in
 Aq. font. destill. ʒjj.

S 2

adde

G. arab. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zu Bougies.

(Wie bei No. 1144. Bei mehr reizbarem Zustande passend, und selbst mit Extr. Opii $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$. oder Extr. Hyoseyami zu verbinden.)

*Richter.*N^o. 1146.R. Cerae \mathfrak{G} j.

Minii

Ol. Olivar. ana \mathfrak{G} $\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.

M. D. S. Zu Bougies.

(Wie bei No. 1145.)

*Hunter.*N^o. 1147.R. Lapid. Cancror. praep. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Vini albi rhenan. q. s.

ad saturat. D.

S. Morgens und Abends eine halbe Thectasse voll.
(Gegen Verhärtung der Epididymis oder des Hodens, vom Tripper herrührend.)

*v. Swieten. (Swediaur.)*N^o. 1148.

R. Extr. Myrrhae aq.

— Cort. peruv.

— Trifol. fibr. ana $\mathfrak{J}\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.Sulph. antim. $\mathfrak{D}\mathfrak{I}\mathfrak{b}$.Calomel. $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$.Bals. Copaivae $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$.

Pulv. Rad. Liquirit.

— Hb. Cicutae ana $\mathfrak{D}\mathfrak{I}\mathfrak{V}$.M. f. Pil. pd. gr. $\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Consp. pulv. Liquirit.

D. S. Täglich 2—3 mal 7—12 Pillen. Zugleich
Spec. Lignorum zum Thee.

(Gegen die Ueberreste des Trippers.)

Weikard.

N^o. 1149.

R. Calomel. ʒj.
Pulv. Opii ʒβ.
Adipis Suillae ʒj.

M. D. S. Auf Charpie gestrichen anzuwenden.

(Gegen Chanker.)

Rust.

N^o. 1150.

R. Liq. Hydrarg. nitr. gtt. X—XX.
Aq. destill. ʒjij.

M. D. S. Zum Betupfen.

(Wie bei No. 1149.)

Fritze.

N^o. 1151.

R. Hydrarg. mur. corros. gr. xjjj.

Aloës opt. ʒjjj.

Opii puriss. gr. X.

Aq. Calcis ʒvj.

Mell. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen schmerzhaftes Chanker.)

Vogel.

N^o. 1152.

R. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. vj.

Aq. destill. ʒv.

Tr. Opii ʒjj.

Mell. rosat. ʒvj.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Gegen Chanker im Halse.)

Richter.

N^o. 1153.

- R. Zinci sulph.
 Spir. Vini camph. ana $\bar{3}\beta$.
 Aq. ft. fervid. $\bar{2}$ jj.
 M. et cola per chartam.
- D. S. Waschwasser.
 (Zur Heilung der Chanker.)

*Richter.*N^o. 1154.

- R. Spec. ad Cataplastm. $\bar{5}$ jj.
 coq. c. aq. ft. q. s.
 ad consist. Cataplastm.
 adde
 Pulv. Sem. Sinap.
 Cepar. tostar. ana $\bar{3}$ j.
- M. f. Cataplastm. D. S. Warm aufzulegen.
 (Zur Zeitigung von Bubonen.)

*Horn.*N^o. 1155.

- R. Cepar. sub cinere assat. et contus.
 Farin. Sem. Lini ana $\bar{5}$ jj.
 Sap. nigr. $\bar{3}\beta$.
 C. c. aq. ft. suff. qt.
 in formam Cataplastm.
- D. S. Wie bei No. 1154.

*Kernd.*N^o. 1156.

- R. Cepar. sub cinere assat. et us.
 Sap. nigr. ana $\bar{5}$ jj.
 Farin. Sem. Sinap. $\bar{3}\beta$ —jj.
 Aq. font. fervid. q. s.
 ut f. l. calor. Cataplastm.
- D. S. Während die in glühende Asche gelegten

Zwiebeln braten, rührt man die Seife mit Wasser an, erwärmt sie und nimmt sie dann vom Feuer. Dann rührt man zuerst die gequetschten Zwiebeln und dann das Senfmehl darunter, und bringt die Masse nochmals zum Feuer. — Man erwärmt das Cataplasma, indem man es in ein mehrfach zusammengelegtes heisses Tuch einschlägt und erneuert die Masse alle 6 — 8 Stunden. Intercurrent schlägt man lauwarms Wasser und Nachts ein reizendes Pflaster (Empl. Ammoniacum) auf.
(Wie bei No. 1154.) *Baltz.*

No. 1157.

- ℞. Alcal. volat. veget. $\bar{5}\beta$.
Ol. Amygdal. dulc. $\bar{5}\nu$.
M. f. Liniment.
D. S. Zum Einreiben.
(Wie bei No. 1154.)

Peyrilhe.

No. 1158.

- ℞. Hydrarg. oxydulat. nigr. gr. jjj .
Sacch. alb. $\bar{5}\text{jjj}$.
M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.
D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.
(Gegen Lues infantum.)

Wendt.

No. 1159.

- ℞. Calomel. gr. jjj .
Anyli $\bar{5}\beta$.
Sacch. alb. $\bar{5}\text{I}\beta$.
M. f. Pulv. Divide in part. XII. aeq.
D. S. Täglich 3 mal ein Pulver.

(Wie bei No. 1158. Besonders um die purgirende Eigenschaft des Quecksilbers zu vermindern.)

Wendt.

N^o. 1160.

- R_x. Calomel. gr. j.
 Magnes. alb. gr. vj.
 Sacch. alb. gr. xjj.
 (Flor. Sulph. gr. vj—IX.)
 M. f. Pulv. Divide in part. VI. aeq.
 D. S. Täglich 2—4 mal ein Pulver.
 (Wie bei No. 1158.)

*Kopp.*N^o. 1161.

- R_x. Hydrarg. puri ʒvj.
 Sevi ovilli ʒβ.
 Tere in mortar. lapid. ad
 perf. Hydrarg. extinct.
 admisce
 Ol. Cacao ʒj.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 1158. Zu einer Mercurial-Cur
 anwendbar.)

*Wendt.*N^o. 1162.

- R_x. Vitrioli coerulei gr. xv—ʒβ.
 Tr. Myrrhae
 — Catechu
 — Kino ana ʒj.
 — Pimpinellae ʒv.
 Infus. Salviae ʒvj.
 Mell. crud. ʒvj.
 M. D. S. Stündlich den Mund auszuspülen und
 dann auszuspeien.
 (Gegen den Speichelfluss.)

*Kopp.*N^o. 1163.

- R_x. Acid. muriat. ʒjjj.
 Syr. Moror. ʒiiβ.
 M. D. S. Unter soviel Salbei-Thee gemischt, dass

eine starke Säure vorherrschend ist, und damit den Mund stündlich auszuspülen. Zugleich Thee aus Rad. Enulae; und ein Empl. Meliloti um den Hals.

(Wie bei No. 1162.)

Kopp.

N^o. 1164.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Tr. Opii simpl. gtt. XX.

Aq. destill. ʒiv.

M. D. S. Umgerüttelt täglich 3 mal einen Esslöffel.

(Gegen Mercurialkrankheit.)

Dzondi.

N^o. 1165.

R_x. Hep. Sulph. kal. gr. XX.

Aq. destill. comm. ʒj.

Syr. Cinnamom. ʒj.

M. D. S. Täglich in drei Portionen zu verbrauchen.

(Wie bei No. 1164.)

Dzondi.

N^o. 1166.

R_x. Calcis antimon. sulph. Ph. boruss. ʒiʒ.

Coq. c. aq. ft. ℞. V.

vase clauso ad rem. ℞ IV.

M. D. S. Täglich Tassenweise zu 2—3 ℞ zu nehmen.

(Wie bei No. 1164. Auch gegen atonische Gicht.)

Hufeland.

N^o. 1167.

R_x. Kali sulphurat. ʒj.

solve in

Aq. flor. Aurant. ʒvj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 1164.)

Hecker.

N^o. 1168.

- R_x. Kali sulphurati
 Res. Guajaci
 Extr. Taraxaci ana ʒij.
 M. f. Pil. pd. gr. j.
 D. S. Täglich 3 mal 5 — 6 Pillen.
 (Wie bei No. 1164. — S. No. 1076.)

*Waltz.*N^o. 1169.

- R_x. Vitrioli coerul. gr. jij.
 solve in
 Aq. destill. ʒj.
 adde
 Tr. Myrrhae ʒj.
 Mell. rosat. ʒjjj.
 M. D. S. Mit einem Pinsel 3 mal täglich die Ge-
 schwüre zu betupfen.
 (Gegen Mercurial-Geschwüre.)

*Hahnemann.*N^o. 1170.

- R_x. Lap. infernal. gr. jijj.
 solve in
 Aq. Rosar. ʒjjj.
 M. D. S. Wie bei No. 1169.

Walch.

Chronische Hautausschläge.
 S. No. 105. 183. 597. 632. 705. 1085. 1111.

N^o. 1171.

- R_x: Stib. sulph. nigri ʒβ.
 G. Guajaci
 Extr. Fumariae ana ʒj.

M. f. c. Tr. Rhei q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Täglich 4 mal 5 Pillen.

Richter.

N^o. 1172.

Ry. Stib. sulph. nigr. ℥β — j.

Magnes. carb. gr. v.

Cort. Cinnamom. gr. jjj.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. XII.

D. S. Dreimal täglich ein Pulver.

Richter.

N^o. 1173.

Ry. Hydrarg. sulph. nigr. gr. j — x.

Magnes. carb. gr. IV.

Elaeosacch. Foeniculi ʒβ.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. No. VI.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

Richter.

N^o. 1174.

Ry. Hydrarg. stib. sulph.

Res. Guajaci ana ʒβ.

Extr. Dulcamar. ʒj.

M. f. c. Syr. Cort. Aurant. q. s.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends 8 Pillen.

Richter.

N^o. 1175.

Ry. Calomel

Sulph. stib. aurant. ana ℥j.

Res. Guajaci

Succi Liquirit. ana ʒβ.

G. arab. q. s. ut f.

Pil. pd. gr. jj. Consp.

D. S. Morgens und Abends 2 — 6 Pillen.

Richter.

N^o. 1176.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. ij.

solve exact. in

Aq. font. destill. q. s.

adde

Opii puriss. gr. IV.

Camphorae gr. vjij.

Sacch. alb. ʒβ.

Mic. pan. alb. q. s. ut f.

Pil. No. XL. Consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Morgens und Abends 3 — 5 Pillen.

*Hufeland.*N^o. 1177.R_x. Graphitis

Flor. Sulph.

Antim. crud. praep. ana ʒβ.

Extr. Pulsatill. nigr.

Pulv. Hb. Jaceae ana ʒj.

Camphorae ʒj.

Syr. Fumar. q. s. ut f. Elect.

D. S. In 8 — 10 Tagen zu verbrauchen.

(Auch gegen Scrofuln.)

*Weinhold.*N^o. 1178.R_x. Graphitis ʒj.

Mellis despumat. ʒIV.

M. f. Elect. D.

S. Morgens und Abends einen Theelöffel.

*Weinhold.*N^o. 1179.R_x. Res. Lign. Guajaci ʒj.

Sulph. dep.

Tart. dep. ana ʒβ.

Ol. Anisi gtt. vj.

M. f. Pulv. Det. ad scatul.

S. Täglich 4 mal einen Theelöffel. *Richter.*

N^o. 1180.

Ry. Res. Lign. Guajaci ʒj.

Aq. Foeniculi ʒvj.

Mucilag. G. arab. q. s.

ut f. l. a. Emuls. adde

Syr. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Dreimal täglich 2 Esslöffel. *Richter.*

N^o. 1181.

Ry. Rad. Tarax.

— Graminis

— Saponar. ana ʒj.

— Sarsaparill. ʒiβ.

Stipit. Dulcamar. ʒlv.

Cort. Ulmi ʒjj.

Coq. c. aq. ft. q. s.

Col ʒiv. D.

S. Zum Getränk.

Best.

N^o. 1182.

Ry. Cort. Ulmi campestr. ʒjj.

Coq. c. aq. ft. ʒjjj.

Col. ʒj. adde

Syr. Cort. Aurant. ʒjj.

M. D. S. Täglich zu verbrauchen. *Lettsom.*

N^o. 1183.

Ry. Fol. Sennae ʒv.

Rad. Polygod. ʒvj.

- Rad. Rhei
 — Oxylapathi ana $\bar{\text{3}}\text{x}$.
 Uvar. Corinth. $\bar{\text{6}}\text{j}$.
 Rad. Liquirit.
 Sem. Foeniculi ana $\bar{\text{3}}\text{1}\beta$.
 Rasur. Sassafras $\bar{\text{3}}\text{ij}$.
 Fol. Salviae
 — Agrimoniae
 Hb. Nasturt. aq.
 — Cochleariae ana M. $\bar{\text{ij}}$.
 M. f. Sacculus pro cerevis. Cong. V.
 D. S. Zum Frühlingstranke. *Bale.*
-

N^o. 1184.

- Rx. Rad. Graminis
 (— Saponar)
 — Tarax. ana $\bar{\text{3}}\text{ijj}$.
 Lapathi acuti $\bar{\text{3}}\text{ij}$.
 C. M. D. S. Den vierten Theil mit 3 Pfund Wasser
 auf 2 $\bar{\text{6}}$ einzukochen und täglich zu trinken.
Haase.
-

N^o. 1185.

- Rx. Rad. Graminis
 Lign. Guajaci ana $\bar{\text{3}}\text{vjij}$.
 Turion. Pini $\bar{\text{3}}\text{ij}$.
 Cort. Ulmi inter. $\bar{\text{3}}\text{ijj}$.
 M. f. Spec. D. S. In 2 $\bar{\text{6}}$ Wasser gekocht zu 1 $\bar{\text{6}}$
 Colatur, und täglich zu verbrauchen. *Weikard.*
-

N^o. 1186.

- Rx. Pulv. Rad. Helenii
 — — Imperator.
 — Cort. et Lign. Sassafr.
 — Lign. Guajaci

Pulv. Fol. Sennae

— Bacc. Juniperi ana $\bar{3}\beta$.— Sem Anisi $\bar{3}j$.

M. f. c. Mell. desp. s. q. Elect.

D. S. Täglich 3—4 mal einen Theelöffel. *Himly.*N^o. 1187.Rx. Cort. Ulmi camp. $\bar{5}j$.Coq. ex Aq. ft. $\bar{8}j$.Col. $\bar{5}vjjj$. addePlumbi acet. $\bar{5}j$.

M. D. S. Waschwasser.

*v. Gräfe.*N^o. 1188.Rx. Ol. Tart. per. deliq. $\bar{3}jjj$.Aq. Rosar. $\bar{5}vj$.

M. D. S. Waschwasser.

*Conradi.*N^o. 1189.

Rx. Kali sulphurat.

(vel Calcar. sulph.

— Calcar. sulph. stib.) $\bar{5}jj$.Coq. c. Aq. ft. $\bar{8}vjj$ ad $\bar{8}IV$.

D. S. Waschwasser.

*Haase.*N^o. 1190.Rx. Zinci sulph. $\bar{5}j$.

solve in

Aq. destill. ferv. $\bar{5}vj$.

M. D. S. Waschwasser.

Haase.

N^o. 1191.

- R_x. Ol. Tart. per. deliq.
 Ol. Amygdal. dulc. rec. ana $\bar{3}\beta$ — j.
 M. D. S. Zum Einreiben. *Conradi.*
-

N^o. 1192.

- R_x. Ol. Tereb. $\bar{3}j$.
 G. arab. $\bar{3}\beta$.
 terendo admisce
 Aq. Menth. pip. $\bar{3}vj$.
 M. D. S. Zum Einreiben. (In die Nieren- und
 Lendengegend, an Armen und Schenkeln u. s. w.
 zur Einsaugung durch die lymphatischen Gefäße.)
Eggers.
-

N^o. 1193.

- R_x. Aq. Calcis vivae
 Ol. Amygdal. dulc. rec. ana $\bar{3}j$.
 M. D. S. Zum Einreiben.
 (Besonders bei juckenden Ausschlägen und auch
 gegen Verbrennungen.) *Hufeland.*
-

N^o. 1194.

- R_x. Adipis suill. $\bar{3}vj$.
 supra len. ign. in vase terreo
 liquatis sensim agitando admisce
 Acid. nitrici Ph. boruss. $\bar{3}j$.
 M. D. S. Zum Einreiben. *Alyon.*
-

N^o. 1195.

- R_x. Magnes. oxydat. nigr. $\bar{3}vj$.
 Axung. porci $\bar{3}\beta$.
 M. f. Ungt. D.
 S. Zum Einreiben. *Villard.*
-

N^o. 1196.

Ry. Graphitis \mathfrak{v} j.
Axung. porci \mathfrak{v} x.

M. f. Ungt. D.

S. Zum Einreiben.

Weinhold.

N^o. 1197.

Ry. Graphitis \mathfrak{v} j.
Empl. saponat. \mathfrak{v} jj.

M. f. Empl. D. S. Auf die leidende Stelle.

(Bei empfindlichen Personen und geringer Ausdehnung des Uebels.)

Weinhold.

N^o. 1198.

Ry. Pulv. carb. lign. \mathfrak{v} \beta.

Axung. porci

(vel Ol. Amygdal. dulc

vel Mell. despunat.) \mathfrak{v} jjj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben.

(Besonders gegen Scabies, Herpes und Tinea capitis.)

Sorg. (Thomann.)

N^o. 1199.

Ry. Sulphuret. Stibii laevigat. \mathfrak{v} \beta.

Conserv. Hb. Cochleariae \mathfrak{v} j.

Syr. simpl. q. s. ut f. Bolus.

Disp. tal. q. l.

D. S. Täglich 2 mal einen Bolus.

(Gegen syphilitische Hautleiden besonders empfohlen.)

Swediaur.

N^o. 1200.

Ry. Acidi muriatici \mathfrak{v} \beta.

Axung. porci \mathfrak{v} ii\beta.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben.

Plenk.

N^o. 1201.

- R_x. Sap. domest. ʒijj.
 Kali sulphurat. ʒβ.
 Ol. Papav. ʒvj.
 — Thymi aeth. ʒβ.

Liquef. sap. in balneo Mariae,
 et cum Kali in Ol. Pap. sol. misc.
 sub fin. add. Ol. Thymi. D. S. Zum Einreiben.
 (Besonders gegen Scabies empfohlen.)

Jadelot.

N^o. 1202.

- R_x. Hb. Cicutae ʒij.
 Mellis puri ʒij.
 M. f. Elect.
 D. S. Theelöffelweise.

(Gegen Krätze. S. No. 1198. 1201.)

Baldinger.

N^o. 1203.

- R_x. Lign. Juniperi
 Rad. Tarax.
 — Graminis
 — Cichor. ana ʒiv.
 Rad. Polygal. Senegae
 Sem. Foeniculi
 — Petrosel.
 Bacc. Juniperi ana ʒβ.
 C. M. D. S. Zum Thee.
 (Wie bei No. 1202.)

Selle.

N^o. 1204.

- R_x. Aq. Calcis ʒijj.
 Flor. Sulph. ʒj.

M. coq. ad. dissolut. Col.

D. ad lag. vitream.

S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1202.)

Leidenfrost.

N^o. 1205.

R_x. Axung. porci ʒiijß.

Flor. Sulph.

Vitriol. alb. pulv. ana ʒjj.

Ol. Bergamott. gtt. XX.

M. D. S. Krätzsalbe, zum Einreiben in die Kniegelenke und Handfläche.

(Auch gegen Herpes und Tinea capitis empfohlen.)

Vogler.

N^o. 1206.

R_x. Flor. Sulph.

Vitriol. alb.

Pulv. Baccar. Lauri ana pt. aeq.

M. f. c. Ol. laurin. express. q. s.

Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Jasser.

N^o. 1207.

R_x. Sap. alb. ʒj.

solve in

Aq. destill. q. s. ut f. c.

Flor. Sulph. ʒj.

Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Vogt.

N^o. 1208.

R_x. Axung. porci ʒjj.

Flor. Sulph. ʒj.

Sal. ammon. dep. ʒiijß.

M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe zum Einreiben auf allen krätzigen Stellen.

(Zugleich lauwarmer Bäder und häufiges Abwaschen mit Seifenwasser. Soll in 14 Tagen bis 3 Wochen heilen.) *Fritze.*

N^o. 1209.

R_x. Flor. Sulph. $\bar{\text{z}}$ jj.

Sal. ammon. dep. $\bar{\text{z}}$ jj.

Axung. porci q. s. ut f. Ungt.
adde

Essent. Cinnamom. gtt. XXX.

M. D. S. In 8 Tagen zu verbrauchen, indem man den 1sten Tag einen Arm, dann den 2ten Tag ein Bein, hierauf den 3ten Tag den andern Arm u. s. w. einreiben lässt. *Pringle.*

N^o. 1210.

R_x. Flor. Sulph.

Sap. mollis ana $\bar{\text{z}}$ j.

Axung. porci $\bar{\text{z}}$ jii.

Rad. Helleb. alb. $\bar{\text{z}}$ lv.

Nitri dep. $\bar{\text{z}}$ jj.

M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

(Der Kranke wird nacht zwischen wollene Decken gelegt, und am ersten Tage werden ihm alle 6 Stunden 2 Loth der Salbe, später 1 Loth eingerieben. Bald brechen Pusteln hervor, welche schnell trocknen; hierauf, und wenn das Jucken aufhört, verlässt der Kranke die Decken und wäscht sich mit Seifenwasser ein. Die Decken selbst brauchen nicht für jeden Kranken erneuert zu werden, im Gegentheil erfolgt die Heilung durch gebrauchte Decken schneller,

und wohl in 24 bis 36 Stunden, längstens in
3 Tagen.)

(*Ungt. sulphuratum comp. Ph. Londin.*)

N^o. 1211.

Ry. Picis fluid. $\overline{5}$ jjj.
Flor. Sulph. $\overline{5}$ β.
Cerae flavae $\overline{5}$ jj.

M. f. Ungt.

D. S. Morgens und Abends eine solche Portion in
die Krätz-Pusteln einzureiben. *Wylie.*

N^o. 1212.

Ry. Axung. porci $\overline{5}$ jjj.
Flor. Sulph. $\overline{5}$ β.
Pulv. Hellebori nigri $\overline{5}$ jj.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1211.

(Zugleich innerlich Acid. sulph. dilut.) *Wylie.*

N^o. 1213.

Ry. Flor. Sulph. $\overline{5}$ j.
Sap. domest. $\overline{5}$ jj.

M. f. c. aq. f. s. g. Linimentum.

D. S. Hievon täglich 4 mal 4—6 Drachmen in
alle Krätzstellen einzureiben.

(Diese Salbe scheint die vorzüglichste zu seyn,
wenigstens hat sie auch dem Verf. dieses Werks
in sehr vielen Fällen treffliche Dienste geleistet.)

Horn.

N^o. 1214.

Ry. Sap. dom.
Flor. Sulph.
Axung. porci ana pt. aeq.

D. S. Krätzsalbe. *van der Haar.*

N^o. 1215.

Ry. Flor. Sulph. $\bar{3}$ ij.
 Kali subcarbonici $\bar{3}$ j.
 Axung. porci $\bar{3}$ vjjj.
 M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

*Helmerich.*N^o. 1216.

Ry. Kali sulphurat. $\bar{3}$ iv.
 solve in
 Aq. font. \mathcal{R} 1 β .
 adde

Acidi sulphurici dil. $\bar{3}$ iv.
 M. D. S. Morgens und Abends die krätzigigen Stellen damit zu waschen und zu reiben. *Dupuytren.*

N^o. 1217.

Ry. Flor. Sulph. $\bar{3}$ β .
 Merc. praec. alb. $\bar{3}$ j.
 Axung. porci $\bar{3}$ 1 β .
 Ol. laurin. $\bar{3}$ j.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Haselnuss gross in die Handfläche, die Ellbogen, Fusssohlen, das Kniegelenk (und selbst in die krätzigigen Stellen) am warmen Ofen einzureiben. *Hecker.*

N^o. 1218.

Ry. Kali carb. $\bar{3}$ β .
 Aq. Rosar. $\bar{3}$ j.
 Hydrarg. sulph. rubr. $\bar{3}$ j.
 Ol. essent. Bergamott. $\bar{3}$ β .
 Flor. Sulph.
 Adip. suillae $\bar{3}$ ix.

M. D. S. Krätzsalbe.

Bateman..

N^o. 1219.

- R_x. Flor. Sulph. ʒijj.
 Sal. ammon. dep. ʒj.
 Coq. c. Aq. Calcis viv. ℥v.
 ad ℥jjj. adde
 Hydrarg. mur. corros. ʒβ.

in suff. qt. Aq. Calcis sol.

- M. D. S. Krätzsalbe. Jeden Abend die Krätzstellen zu waschen. *Richter.*
-

N^o. 1220.

- R_x. Hydrarg. mur. praecip. ʒβ—j.
 Axung. porci ʒj—jj.

- M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Werlhof. (Weikard.)

N^o. 1221.

- R_x. Hydrarg. praecip. rubr. ʒj.
 Axung. porci ʒx.

- M. f. Ungt. D. S. Krätzsalbe.

Richter.

N^o. 1222.

- R_x. Merc. subl. corros. ʒβ.
 Aq. destill. ℥j.

- M. D. S. Waschwasser gegen Krätze.

Weikard. (Horn.)

N^o. 1223.

- R_x. Merc. subl. corros. ʒβ—j.
 Opii puri gr. vjjj.
 Axung. porci ʒj.

- M. D. S. Täglich 2 mal eine Erbse gross in die Fusssohlen, und selbst in die stärksten Krätzstellen einzureiben. (S. No. 1106.)

Jahn.

N^o. 1224.

Ry. Hydrarg. mur. corros. ʒj.
 — praecip. rubr. gr. x.
 Spir. Angelicae
 — Anthos ana ʒj.
 Vitrioli albi ʒiv.

M. D. S. In einer Flasche Regenwasser zu lösen, und einen Theil der Mischung wieder mit 4 Theilen Regenwasser vermischt zum Abwaschen und Einreiben der Krätzstellen (nach vorhergegangener Reinigung mit warmem Seifenwasser), ein bis zweimal täglich zu brauchen. Jeden Tag nimmt man $\frac{1}{5}$ der Mischung mehr und des Wassers weniger, so dass die Mischung am 6sten Tage unverdünnt gebraucht wird; nach 5 Tagen setzt man allmählig wieder Wasser zu. Eiternde Krätz-Pusteln werden vor dem jedesmaligen Einreiben geöffnet. Diese Methode soll auch in veralteten Fällen sehr dienlich seyn und niemals schaden. *Reis.*

N^o. 1225.

Ry. Rad. Helenii ʒijj.
 coq. c. Aq. f. q. s.
 ad Mucilag. Col. et adde
 Adipis suill. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Krätzsalbe. (Besonders für Kinder anwendbar.)
Hufeland.

N^o. 1226.

Ry. Hydrarg. mur. corros.
 Butyr. Antimon. ana ʒj.
 Ungt. cantharid. ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Erbsengross einzureiben.
 (Zur Hervorrufung eines krätzähnlichen Ausschlags, bei Scabies suppressa retrograda.)
Autenrieth.

N^o. 1227.R_y. Rad. Caric. arenar. $\bar{5}\beta$.— Liquirit. $\bar{5}\beta$.Cort. Ulmi $\bar{5}jj$.

Coq. c. aq. ft. s. q.

Col. M. j. adde

Sal. Carolin. $\bar{5}j$.— alcal. min. $\bar{5}\beta$.

M. D. S. Täglich zu verbrauchen, und 3—4 Wochen lang fortzusetzen.

(Gegen Herpes. S. No. 183, 595, 759, 1070, 1198, 1205. *Heim.*)N^o. 1228.R_y. Liq. sap. stib. $\bar{5}vj$.Tr. Colocynth. $\bar{5}jj$.M. D. S. Alle 3 Stunden 20 Tropfen mit Wasser.
(Wie bei No 1227.) *Heim.*N^o. 1229.R_y. Hb. Jaceae

Rad. Saponar.

— Lapathi acut.

— Sarsaparill.

Stipit. Dulcamar. ana $\bar{5}jj$.

M. f. Spec. D. S. Zum Thee.

(Wie bei No. 1227. Auch gegen Serpigo.)

*Hufeland.*N^o. 1230.R_y. Lip. Kali oxymuriat. $\bar{5}jjj$ — v.Ol. Olivar. $\bar{5}vjj$.M. D. S. Umgeschüttelt täglich 3 mal mit einem Pinsel auf die Flechten zu tragen. *Kopp.*

N^o. 1231.

- Ry. Cerae flavae
 Succī fol. Nicotianae ana ʒjij.
 Res. Pini ʒiij.
 Terebinthinae ʒj.
 M. f. l. a. Ceratum.
 D. S. Täglich 4 mal eine Haselnuss gross einzureiben.
 (Wie bei No. 1227.) *Consbruch.*
-

N^o. 1232.

- Ry. Axung. porci ʒj.
 Merc. nitrosi ʒij.
 M. exactiss. f. Ungt.
 D. S. Täglich 2 mal eine Haselnuss einzureiben.
 (Wie bei No. 1227. Auch gegen veraltete Ge-
 schwüre.) *Vogler.*
-

N^o. 1233.

- Ry. Acid. hydrocyan. ʒiij—jj.
 Spir. Vini rectific. ʒvj.
 M. D. S. Zum Betupfen.
 (Wie bei No. 1227.) *Schneider.*
-

N^o. 1234.

- Ry. Ungt. Cerussae ʒj.
 Lact. Sulphuris ʒij.
 Merc. subl. corros. gr. X.
 M. f. Ungt. D. S. Am Rande der Flechten ein-
 zureiben. *Rust.*
-

N^o. 1235.

- Ry. Arsenici albi
 Flor. Sulph. ana ʒj.
 Aceti destill.
 Ungt. saturnin. ana ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1234. (Mit Vorsicht anzuwenden, und nur bei reizlosem Zustande allenfalls passend.) *Arnemann.*

No. 1236.

R̄. Arsenici albi gr. IV.
Opii puri gr X.
Cerati simpl. ʒI.

M. D. S. Dünn auf Leinen gestrichen und auf die Flechten zu legen. (S. No. 1235.) *Justamond.*

No. 1237.

R̄. Lact. Sulph. ʒj.
Acet. saturn. ʒj.
Aq. Rosar. ʒvjjj.

M. D. S. Die Flechten Morgens und Abends damit zu benetzen. *Bell.*

No. 1238.

R̄. Hydrarg. muriat. corros. gr. jij.
Lact. Sulph. ʒjj.
Acet. saturn. ʒβ.
Aq. Rosar. ʒvj — vjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt die Flechten mehrmals täglich damit zu benetzen, oder damit befeuchtete Leinwand-Compressen darüber zu legen. *Rust.*

No. 1239.

R̄. Merc. subl. corros. ʒj.
Empl. diachylon.
Empl. graphital. ana ʒj.

M. D. S. Auf die Flechten zu legen. (Empl. graphital. s. No. 1197.) *Rust.*

N^o. 1240.

- R_x. Merc. subl. corros. gr. IV.
 Acet. saturn. ℥β.
 Vitrioli albi ℥j.
 Aq. destill. ℥IV.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Prurigo pubis. S. No. 408. 409.)

Wendt.

N^o. 1241.

- R_x. Merc. praecip. rubri gr. XX—XXX.
 Axung. porci ℥j.

M. D. S. Zum Aufstreichen.

(Wie bei No. 1240. Besonders wo kleine Knötchen und Geschwürchen sind.)

Sims.

N^o. 1242.

- R_x. Flor. Zinci ℥j — jj.
 Ungt. pomat. ℥j.

M. f. Ungt. D. S. Auf die leidenden Stellen.

(Gegen Intertrigo.)

Henke.

N^o. 1243.

- R_x. Hb. Jaceae
 Sacch. Lact. ana ℥jjj.
 Sulph. praecip.
 Magnes. carb. ana ℥β.

M. f. Pulv. D. ad. scatul.

S. Alle 2 Stunden eine Messerspitze voll zu geben.

(Gegen Crusta lactea. S. No. 700. 1229.)

Jahn.

N^o. 1244.

- R_x. Lact. Sulph. ℥β.
 Hb. Jaceae
 Mellis puri ana ℥β.

M. f. l. a. Elect.

D. S. Täglich 4 mal einen Theelöffel.

(Wie bei No. 1243.)

*Jahn.*N^o. 1245.R_x. Opii pulv. gr. vj.Flor. Zinci $\overline{3}\beta$.Butyr. rec. insuls. $\overline{3}j$

M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle.

(Wie bei No. 1243.)

*Henke.*N^o. 1246.R_x. Hb. Jaceae $\overline{3}jj$.

inf. c. aq. f. suff. qt.

per $\frac{1}{2}$ hor. Col. refriger. $\overline{3}vj$.

adde

Vini stibiati $\overline{2}j$.Syr. Althaeae $\overline{3}\beta$.M. D. S. Alle 2 Stunden $\overline{2}$ volle Theelöffel.(Gegen Tinea capitis. S. No. 700. 1198.) *Jahn.*N^o. 1247.R_x. Ungt. Althaeae $\overline{3}\beta$.— Juniperi ph. austriac. $\overline{3}j$.Acid. muriat. pur. $\overline{3}\beta$.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 2—3 mal den Grind damit einzureiben,

(Wie bei No. 1246. Soll nach 6 Wochen gründliche Heilung bewirken.) *Stoll. (Plenk.)*N^o. 1248.R_x. Acid. sulph. $\overline{3}j$.Axung. porci $\overline{3}vj$.M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1247. *Crampton.*

N^o. 1249.

R_y. Bacc. Cocculi ind. ʒj.
Axung. porci ʒj.

M. f. Ungt. D.

S. Täglich den ganzen Kopf damit einzureiben.
(Wie bei No. 1246. In 8—14 Tagen soll
Heilung eintreten.) *Hamilton. (Bateman)*

N^o. 1250.

R_y. Picrotoxini gr. X.

Axung. porci ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1249. *Jäger.*

N^o. 1251.

R_y. Kali sulphurici ʒjjj.

Sap. hisp. ʒj.

Aq. Calcis ʒvjjj.

Spir. Vini rectific. ʒjj.

M. D. S. Morgens und Abends die Grindstellen da-
mit zu waschen, *Barlow.*

N^o. 1252.

R_y. Virid. aeris

Calomel. ana ʒj.

Ungt. pomat. rec. X.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends den Rand
des Grinds damit einzureiben. *Bicker.*

N^o. 1253.

R_y. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. j.

Aq. font. ʒiv.

M. D. S. Mit Brodkrumen auf die Grindstellen
zu legen. *Duncan.*

N^o. 1254.

Ry. Hydrarg. mur. corrosiv.
Virid. aeris ana gr. vj.
Aq. font. ℞jj.

M. D. S. Die Grindstellen damit zu waschen.

Desault.

N^o. 1255.

Ry. Acet. saturnin. gtt. XL.
Extr. Myrrhae ʒβ.
Mell. rosat. ʒβ.
Aq. font. Cong. j.

M. D. S. Leinene Compressen hiemit zu befeuchten, und nach vorheriger Abwaschung der Grindstellen (mit einem Decoct aus Feigen und darin aufgelöster Mandelseife,) und Erweichung derselben (mit einem Brei von gelben Rüben oder Mangold-Blättern,) über dieselben zu legen. —

Grigg.

N^o. 1256.

Ry. Merc. praecip. rubr. gr. XV—XX.
Myrrhae pulv. ʒβ.
Mell. puri ʒjj.

M. f. Ungt. Zum Bestreichen der grindigen Stellen. (Besonders Nachts und am Tage No. 1255 anzuwenden.)

Grigg.

N^o. 1257.

Ry. Cep. assat.
Cerae flav.
Picis ana ʒIIβ.
Sap. ʒvj.
Sem. Foenu graeci pulv. ʒjjj.
Ol. Olivar. ʒj.

M. f. Ceratum. D. S. Auf Leinwand oder Leder dick gestrichen aufzulegen, und dann mit einem Cataplasma emolliens zu bedecken.

(Gegen offenen Carbunculus, mit gleichzeitig zerstörten Stellen im Zellgewebe.) *Bücking.*

N^o. 1258.

R̄. Cinnabar. artef. ʒj.

Ciner. e calc. antiq. combust. gr. vjij.

Sang. Dracon. gr. xj.

Arsenici albi ʒj.

M. f. Pulv. D. S. Mit Wasser zu einem Brei angemengt, dann mit einem Pinsel $\frac{1}{4}$ Linie dick auf die Stellen aufgetragen und mit Feuerschwamm bedeckt. Nachdem etwa nach 8 Tagen sich ein Schorf ablöst, wird die eiternde Fläche mit Bals.

Locatelli (R̄. Ol. Olivar. ʒiv. Cer. flav. ʒiβ.

Tereb. comm. ʒijj. Bals. Copaiv. ʒβ. G. Kino ʒijj.

M. f. l. a. Ungt.) zur Heilung gebracht.

(Gegen Muttermäler. Doch nur mit grosser Vorsicht anwendbar.) *Bernard.*

N^o. 1259.

R̄. Boracis ʒβ.

solve in

Aq. Rosar.

— flor. Aurant. ana ʒβ.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Leberflecke, rothe Nasen, u. s. w. besonders während der Menstruation.)

Hufeland.

N^o. 1260.

R̄. Furfur. Amygdal. ʒj.

Aq. Rosar. ʒvjj.

M. f. Emulsio,

adde

Tr. Benzoës ʒjjj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Rauheit der Haut, Abschuppung derselben u. s. w.)
Conradi.

N^o. 1261.

R̄. Boracis venet. ʒj.

solve in

Aq. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1260.)

Conradi.

N^o. 1262.

R̄. Vitriol. alb. ʒjj.

Acet. saturn. ʒj.

Tr. Benzoës ʒβ.

Aq. Rosar. (non salit.) ʒvj.

M. D. S. Waschwasser.

(Wie bei No. 1260. Auch gegen Acne punctata.)
v. Walther.

N^o. 1263.

R̄. Rad. Hellebor. alb. ʒjj.

coq. c. aq. ft. ℥ jiiij.

in Col. ℥ jj. solve

Sal. Ammon. dep. ʒjjj.

M. D. S. Waschwasser.

(Gegen Lepra.)

Reece.

N^o. 1264.

R̄. Picis liq.

Sevi ovilli ana pt. aeq.

M. f. Ungt. D. S. Zum Bestreichen.

(Wie bei No. 1263.)

Willan.

N^o. 1265.

Ry. Bals. peruv. $\bar{5}j$.
 Liq. Kali carb. $\bar{5}j$.
 Flor. Sulph. $\bar{5}i\beta$.
 Ungt. pomat. $\bar{5}j$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No 1264. *Scultet.*

N^o. 1266.

Ry. Butyr. rec. $\bar{5}i\beta$.
 Tereb. venet. $\bar{5}iV$.
 Cerae alb. $\bar{5}vj$.
 Leni igne calef. adde
 Hydrarg. oxydat. rubr. $\bar{5}j$.
 — muriat. corros.
 Natri muriat. ana $\bar{5}j$.
 Aceti Vini q. s.

ut f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1264. *Golotti.*

N^o. 1267.

Ry. Hb. Vincae pervincae $\bar{5}ijj$.
 inf. aq. fervid. $\bar{2}jjj$. et
 digere per noct. tunc coque
 per $\frac{1}{4}$ hor. Col.

D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.
 (Gegen Weichselzopf.)

J. Frank.

N^o. 1268.

Ry. Empl. Cicutae
 — Asae foet. ana $\bar{5}j$.
 Empl. Cantharid. $\bar{5}j$.

M. f. Empl.

D. S. Den Rückgrat entlang zu legen.
 (Wie bei No. 1267.)

J. Frank.
