

# I. Acute Krankheiten.

## Fieber überhaupt.

Fast in allen fieberhaften Krankheiten ist der Durst eine für die Kranken höchst lästige Erscheinung, und der Arzt muss mit Rücksicht auf die Behandlung des Fiebers besonders Getränke verordnen. Wirklich ist auch, wie Berends (Vorlesungen Bd. II, S. 262.) sehr richtig bemerkt, reichliches Trinken ein fieberwidriges und fieberstillendes Mittel. Man lasse in der Fieberhitze oft und jedesmal in kleinen Quantitäten trinken, und sorge überhaupt dafür, dass das Getränk lauwarm ist. Man nimmt nun wohl Chamillen-, Melissen-, Schlüsselblumen-, Malven-, Wollkraut- oder grünen Thee; allein die Kranken werden des Getränktes selbst schnell müde, wie viel sie auch der Durst zum Trinken zwingt, und es ist daher zweckmässig, einige Fiebertränke zu kennen.

### Nº. 1.

Rv. Rad. Scorzonerae  
Passular. minor. ana  $\frac{3}{4}$ jjj.

Hord. decorticat.

Rad. Liquirit. ana  $\frac{3}{4}\beta$ .

Concis. contus. coq. c.

Aq. font.  $\frac{2}{3}$  IV.

Cola. Refrig. adde

Syr. succi Citri q. s. ad gratum saporem ( $\frac{3}{4}$ jj.)

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

---

E 1

## Nº. 2.

Rx. Hordei decorticat. (Hordei perlat. Avenae decorticat.)  $\frac{5}{3}jj.$

Coque cum

Aq. font.  $\frac{2}{3}V.$  per  $\frac{1}{4}$  horae.

Colat. adde

Succi Citri recent. express.  $\frac{5}{3}\beta.$

Sacch. Hordei q. s. ad gr. sap. ( $\frac{5}{3}j.$ )

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

## Nº. 3.

Rx. Succi Citri (Aceti)  $\frac{5}{3}jjj.$

Syr. Rubi Idaeii  $\frac{5}{3}jj.$

Aq. font.  $\frac{2}{3}IV.$

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

## Nº. 4.

Rx. Rad. Chinae concis.  $\frac{5}{3}\beta.$

Passular. minor. concis.  $\frac{5}{3}\beta.$

Coque cum

Aq. font.  $\frac{2}{3}IV.$

Colat. adde

Syr. Cerasor. nigr.  $\frac{5}{3}\beta.$

Aceti Vini opt.  $\frac{5}{3}j.$

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

## Nº. 5.

Rx. Roob Ribium (Cerasorum, Berberum, Mororum)  $\frac{5}{3}j.$

Infunde cum

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}jj - jjj.$   
stent ad solut. Adde

Succi Citri q. s. ad grat. sap.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. (Für Damen.)  
*Richter.*

## Nº. 6.

Rv. Sacch. Lactis  $\frac{5}{3}\beta$ .

Infunde cum

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}$  II.

stent ad solut. Adde

Succi Citri q. s. ad gratum saporem.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

## Nº. 7.

Rv. Pastae Althaeae (Liquiritiae)  $\frac{5}{3}\beta$ .

inf. Aq. ferv.  $\frac{2}{3}$  III.

stent in loco calido ad solut. Adde

Succi Citri q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

## Nº. 8.

Rv. Cerasor. nigr. sicc. et contus.

Rad. Scorzonerae ana  $\frac{5}{3}j$ .

infunde cum

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}$  IV.

ebull. paulisper.

Colat. adde

Succi Citri q. s. ad. gr. sap.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

## Nº. 9.

Rv. Rasur. Pan. alb. duriusc.  $\frac{5}{3}j$ .

infunde cum

Aq. font. fervid. ♀ III — IV.

ebull. paulisp. Cola. Adde

Syrupi Rubi Idaeи ʒjj.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

Nº. 10.

Ry. Sem. Mili decort.

Oryzae sativae ana ʒj.

Coq. c.

Aq. font. ♀ V. per  $\frac{1}{4}$  horae.

Colat. adde

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

Nº. 11.

Ry. Amygdal. dulc. exorcitat. ʒvj.

Sem. Pap. alb. ʒjj.

tere cum

Aq. font. ♀ j.

adde

Sacch. Althaeae (Lactis) ʒβ.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

Nº. 12.

Ry. Rasurae Cornu Cervi ʒβ.

Gummi arab. ʒjj.

Coque cum

Aq. font. ♀ III. ad Col. ♀ II.

adde

Syr. Althaeae ʒjj.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Richter.

## Nº. 13.

Rx. Tart. dep.  $\frac{5}{3}jj.$

inf. cum

Aq. font.  $\frac{2}{3}$  II.

stent ad solut. Sub finem adde

Pulv. Rad. Liquiritiae  $\frac{5}{3}\beta.$

Colat. adde

Conserv. Rosar.  $\frac{5}{3}vj.$

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

---

## Nº. 14.

Rx. Tart. dep.  $\frac{5}{3}jj.$

Passular. major. contus.  $\frac{5}{3}jj.$

inf. cum

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}$  IV.

Ebulliant paulisp. Col.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

---

## Nº. 15.

Rx. Pulp. Tamarindor.  $\frac{5}{3}\beta.$

Past. Althaeae  $\frac{5}{3}jj.$

infunde cum

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}$  II.

Stent ad solut. Cola.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

*Richter.*

---

## Nº. 16.

Rx. Pulv. Cort. Cinnamomi

— Caryophyll.

— Macis ana  $\frac{5}{3}\beta.$

Coque cum

Vini boni albi gall.  $\frac{2}{3}$  II.

Col. adde

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap. ( $\frac{5}{3}$  IV.)

M. D. S. Halbe Theetassenweise zu trinken.

*Richter.*

Nº. 17.

Rv. Rasurae panis nigr. duriusc.  $\frac{5}{3}$  β. —  $\frac{5}{3}$  jj.  
inf. c.

Aq. font. fervid.  $\frac{2}{3}$  III — IV.  
ebull. paulisp. Col. adde

Vini albi gall.  $\frac{5}{3}$  vj.

Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. ( $\frac{5}{3}$  vj.)

M. D. S. Tassenweise.

*M. J. Schmidt.*

Nº. 18.

Rv. Vitell. ovor. No. II — IV.  
coq. c.

Aq. font.  $\frac{5}{3}$  xjj. —  $\frac{2}{3}$  II.  
subrefrig. adde

Vini albi  $\frac{5}{3}$  vj.

Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. ( $\frac{5}{3}$  IV.)

M. D. S. Tassenweise.

*Sproegel.*

Nº. 19.

Rv. Infusi Hb. Althaeae ex  $\frac{5}{3}$ .  
parati  $\frac{5}{3}$  xjj.  
admisce

Vitell. ovi unius

Sacch. alb.  $\frac{5}{3}$  vj.

M. D. S. Tassenweise.

*Best.*

## Nº. 20.

- Rv. Fol. Theae ♂j. — ♂β.  
 Cort. Cinnamom. ♂β. — ♂j.  
 infunde Aq. fervid. ᷑vjjj.  
 adde  
 Amygdal. dulc. excort,  
 in Lactis vaccin. rec. ♀ II.  
 contus. ᷑jjj.  
 Sacch. alb. q. s. ad grat. sap. (᷑vj.)  
 M. D. S. Tassenweise.

*Wedel.*

## Nº. 21.

- Rv. Emulsionis amygdalin. ♀ II.  
 D. S. Tassenweise.

*Reil.*

## Nº. 22.

- Rv. Acidi tartarici ᷑j.  
 Ol. Cort. Citri gtt. I.  
 Sacch. alb. ᷑IV.  
 M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise unter Wasser  
 zum gewöhnlichen Getränk.

*Hecker.*

## Entzündliches Fieber.

Vorzüglich antiphlogistische Mittel, und solche Getränke.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 19. 21. 22.

## Nº. 23.

- Ry. Aceti Vini destill. ʒIV.  
 Syr. Rhoeados (Papav. Moror.)  
 Syr. Althaeae ʒjj.  
 M. D. S. Unter's Getränk zu mischen.

Hecker.

## Nº. 24. a).

- Ry. Decoct. Althaeae ʒ I.  
 Aceti Vini ʒIV.  
 Syr. Althaeae ʒjj.  
 M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse.

Hecker.

## Nº. 24. b).

- Ry. Gummi arab. ʒjj.  
 solve in  
 Aq. font. ʒvjjj.  
 adde  
 Oxymell. simpl. ʒjj.  
 M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse.

Hecker.

## Nº. 25.

- Ry. Kali nitrici dep. ʒjj.  
 solve in  
 Aq. destill. ʒvjjj.  
 adde  
 Syr. Althaeae ʒjj.  
 M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.

Berends.

## Nº. 26.

- Ry. Kali nitrici ʒjjj.  
 Mucilag. G. arab. ʒj.  
 solve in

Aq. destill.  $\frac{5}{3}$ IV.

adde

Syr. Rubi Idaeи  $\frac{5}{3}$ vj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

Richter.

Nº. 27.

Rv. Pulpae Tamarindor.  $\frac{5}{3}$ jj.

Coq. c. Aq. font. suff. qt.

per  $\frac{1}{4}$  horae ad Col.  $\frac{5}{3}$ X.

solve

Magnesiae sulph.  $\frac{5}{3}$ j.

Syr. Rubi Idaeи  $\frac{5}{3}$  $\beta$ .

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse zu  
nehmen.

Wendt.

Nº. 28.

Rv. Liq. Ammonii acet.  $\frac{5}{3}$ j.

Vini stib.  $\frac{5}{3}$ j.

Aq. flor. Sambuci  $\frac{5}{3}$ IV.

Syr. Rubi Idaeи  $\frac{5}{3}$ j.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

(Besonders beim Eintritt einer Haut-Crise passend.

Richter.

Complicationen mit gastrischen Zuständen, s. beim-  
gastrischen Fieber.

N e r v e n f i e b e r .

No. 10. 16. 17. 18. 19. 20.

Nº. 29.

Rv. Rád. Valer. min.  $\frac{5}{3}\beta$ . —  $\frac{5}{3}$ vj.

inf. Aq. ferv. q. s. ad Col.  $\frac{5}{3}$ vj.

adde

Aceti concentr. 5jj.

Aeth. Aceti 5β.

Syr. Cort. Aurantior. 5β.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

Berends.

Nº. 30.

Rv. Asae foet. 5β.

Vitell. ov. q. s.

Aq. Menth. pip. 5vj.

Cort. Chin. reg. pulv. 5β.

Aeth. sulph. 5j.

Solve terendo.

M. D. S. Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen  
Esslöffel.

Berends.

Nº. 31.

Rv. Emuls. comm. 5IV.

Camphorae cum

Gummi arab. s. q. subact. 5j.

Spir. Sal. ammon. aq. 5jj.

Syr. Papav. 5β.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

Nº. 32.

Rv. Emuls. comm. 5IV.

Moschi oriental.

c. Sacch. trit. 5β.

Spir. Cornu C. 5jj.

Syr. Cinnamom. 5β.

M. D. S. Allé halbe Stunden einen Esslöffel.

Hecker.

## Nº. 33.

- R. Aeth. sulph.  
 Tr. Opii simpl. ana 5j.  
 Spir. C. C. succ. 5jj.  
 M. D. S. Alle Stunden 20 Tropfen auf Zucker,  
*Hecker.*
- 

## Nº. 34.

- R. Rad. Valer. 5β.  
 Digere c. Aq. fervid. 5vj.  
     per  $\frac{1}{4}$  horae in vase clauso.  
     Colat. refrig. adde  
 Liq. Ammon. acet. 5j.  
 Spir. Sulph. aeth. 5j.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hufeland.*

## Nº. 35.

- R. Camphorae 9jj.  
     solve in  
     Spir. sulph. aeth. 5IV.  
 M. D. S. Alle Stunden 15 — 20 Tropfen.

*Richter.*

## Nº. 36.

- R. Extr. Hyoscyami  
 Croci orient. ana gr. jjj.  
 Sacch. albi 9j.  
 M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. vj.  
 D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver,  
     (Besonders bei Nervosa versatilis.)     *Richter.*
- 

## Nº. 37.

- R. Rad. Valer. (Angelicae)  
 Flor. Chamomill. ana 5β.  
     inf. vas. claus. cum  
 Aq. font. fervid. 5vj.

- Col. adde  
 Ol. Chamomill. coct.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 — dest. Foenicul.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 M. D. S. Zum Clystir. Hecker.
- 

## Nº. 38.

Bei gesunkenen Kräften:

- Rx. Emuls. comm.  $\frac{5}{3}IV$ .  
 Gumm. arab.  $\frac{5}{3}jj$ .  
 Tr. Cantharid.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Syr. Papav. alb.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel. Hecker.
- 

## Nº. 39.

- Rx. Aether. sulph.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Camphor.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Tr. Cantharid.  $\frac{5}{3}j$ .  
 M. D. S. Alle Stunden 15 — 20 Tropfen.  
 (Wie No. 38.) Hecker.
- 

## Nº. 40.

- Rx. Gummi Asae foet.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Camphor.  $\frac{3}{2}j$ .  
 Vitell. ovor. q. s.  
 solve in  
 Decoct. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}vj$ .  
 adde  
 Laud. liq. Sydenh.  $\frac{5}{3}\beta$   
 M. D. S. Zum Clystir.  
 (Wie No. 38.) Hecker.
- 

## Nº. 41.

- Rx. Rad. Serpentari. virg.  $\frac{5}{3}vj$ .  
 — Valer.  $\frac{5}{3}IV$ .  
 inf. Aq. f.  $\frac{5}{3}vjjj$ .

Col. refrig. adde

Aeth. sulph. ʒjj.

Syr. Cort. Aurant. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Besonders bei Nervosa cum torpore.)

*Richter.*

---

Nº. 42.

Rv. Sacch. alb. ʒjj.

Ol. Menth. pip. gtt. X.

tere in mortar. vitr.

adde

Aq. Menth. pip. ʒv.

Spir. sulph. aeth. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie No. 41.)

*Richter.*

---

Nº. 43.

Rv. Hb. Menthae pip.

Elaeosacch. Menth. pip. ana ʒβ.

M. f. Pulv. Divide in partes VIII. aeq.

D. S. Viermal täglich ein Pulver.

(Wie No. 41.)

*Wendt.*

---

Nº. 44.

Rv. Phosphor. gr. jjj.

solve digerendo in

Aeth. sulph. ʒj.

Ol. Lini ʒj.

Gumm. arab. ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.

(Beim höchsten Grade torpider Schwäche.)

*Richter.*

---

## Nº. 45.

Rv. Cort. Chinae reg.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
coq. ex Aq. font. suff. qt.  
in finem Coct. immisce

Rad. Valerianae

— Angelicae

— Calami aromat. ana  $\frac{5}{3}jj$ .  
in Col  $\frac{5}{3}vj$ . solve

Natri sulph.  $\frac{5}{3}jj$ .  
adde

Naphthae Vitrioli  $\frac{5}{3}\beta$ .

Syr. Cort. Aurantior.  $\frac{5}{3}j$ .

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel.  
(Bei hohen Graden torpider Schwäche mit  
gleichzeitigem gastrischen Zustand.)

*M. J. Schmidt.*

## Nº. 46.

Rv. Ferment. panis atri  $\frac{5}{3}jj$ .  
Sem. Sinap. contus.  $\frac{5}{3}jj$ .

Rasur. Raphani rust.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Cepar. sub cinere tostar. et contus.  $\frac{5}{3}j$ .

Ammon. muriat. dep.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Capsici indici concis.  $\frac{5}{3}jj$ .

M. f. c. Acet. Vin. acerr. q. s.

Cataplasma mediae consist.

D. S. Auf Leder gestrichen auf die Waden zu legen.

*Richter.*

## Nº. 47.

Rv. Moschi genuini gr. vj — xjj.  
Castor. sib. gr. xjj — XXIV.

Asae foet.  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. f. c. Tr. Valer. simpl q. s.

Pil. No. XXIV.

D. S. Abends, Nachts und Morgens jedesmal vier Pillen.

(Gegen die Schlaflosigkeit im schleichenden Nervenfeuer.) *Berends.*

## Nº. 48.

Ry. Pulv. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}$ jj.

— — Aurant.

Ferri pulverat, ana  $\frac{5}{3}$ j.  
inf. c.

Vini rhenani opt.  $\frac{2}{3}$  IV.

Digere loco calido, saepius agitando.  
Cola.

D. S. Alle zwei Stunden ein Spitzglas voll.

(In der Reconvalescenz.)

*Richter.*

## F a u l f i e b e r.

No. 10. 16. 17. 18. 19. 20. 30. 32. 33. 40. 44.

45. 47. 48.

## Nº. 49.

Ry. Pulv. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}\beta$  — jj.

Coque cum

Aq. font.  $\frac{2}{3}$  II. ad rem  $\frac{2}{3}$  I.

Col. adde

Pulv. Cort. Chinae reg.  $\frac{5}{3}$ jj. —  $\frac{5}{3}\beta$ .

Extr. Cort. Chinae frig. parat.  $\frac{5}{3}$ jjj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Vogel.*

## Nº. 50.

Ry. Aq. Cinnamom. s. v.  $\frac{5}{3}v$ jjj.

Extr. Cort. reg.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Aluminis 3jj — IV.

Syr. simpl. 3j.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.

*Schröder. (Vogel. Richter.)*

Nº. 51.

R. Liq. C. C.

Tr. Castor. ana gtt. XX.

Aq. fl. Naphae 3β.

Syr. Cort. Aurant. 3β.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.

*Quarin.*

Nº. 52.

R. Castor.

Pulv. Rad. Valer.

Sacch. alb. ana 3β.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle Stunden ein Pulver.

*Hecker.*

Nº. 53.

R. Castor. opt.

Sacch. alb. ana 3β.

Ol. Cajeput. gtt. jj.

M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. No. XII.

S. Alle Stunden ein Pulver.

*Hecker.*

Nº. 54.

R. Aq. Cinnamomi 3IV.

Camphor. in Spir. Vini solut. 3β.

Aether. sulph. 3j.

Syr. Cinnamomi 3jj.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

---

Nº. 55.

Rx. Rad. Val.  $\frac{5}{3}\beta$ .

inf. Aq. fervid.

vase bene clauso q. s.

Col.  $\frac{5}{3}vjjj$ . adde

Aq. Cinnamomi  $\frac{5}{3}j$ .

Aeth. sulph.  $\frac{5}{3}j$ .

Syr. Cort. Aurant.  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

*Hecker.*

---

Nº. 56.

Rx. Phosphori gr. IV.

solve digerendo in

Ol. Amygdal. dulc.  $\frac{5}{3}\beta$ .

adde

Mucilag. Gummi arab. q. s.

Aq. Cerasor. nigr.  $\frac{5}{3}jj$ .

et fiat l. à. Emulsio,

adde

Syr. Cinnamomi  $\frac{5}{3}j$ .

M. D. S. Alle  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  Stunden einen Theelöffel.

*Hecker.*

---

Nº. 57.

Rx. Acidi phosphorici p. deliq.  $\frac{5}{3}\beta$ . —  $\frac{5}{3}j$ .

Aq. Menth. pip.  $\frac{5}{3}V$ .

Syr. Cort. Aurant.  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. D. S. Alle  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

---

## Nº. 58.

R. Rad. Valer. (Serpentar. virg.)  $\frac{5}{3}\beta$ .  
inf. in vase bene clauso cum  
Decoct. Cort. Chin. reg. fervid.  $\frac{5}{3}vj$ .  
Col. adde

Aether. sulphur. 5jj.

Aq. Cinnam. s. v.  $\frac{5}{3}jj$ .

Syr. Cinnamom.  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.  
(Febris putrida cum torpore.)

Hecker.

## Nº. 59.

R. Aq. Menth. pip. s. v.  $\frac{5}{3}vj$ jj.  
Vin. rhen.  $\frac{5}{3}IV$ .  
Gummi Tragacanth.  
Succi Catech. ana 5j.  
Alum. crud. 5jj.

M. D. S. Alle Stunden einen bis zwei Esslöffel.  
(Bei gleichzeitigen colliquativen Erscheinungen,  
besonders colliquativem Durchfall.)

Vogel.

## Nº. 60.

R. Cort. Cascarill.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
Digere cum Aq. font. et  
Aq. Menth. pip. ana  $\frac{5}{3}vj$ .  
in Col. solve  
Extr. Cort. Angusturae  $\frac{5}{3}\beta$ .  
adde

Tr. Valerianae simpl.

Liq. anodyn. Hoffm. ana 5jj.

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse.  
(Wie bei No. 59.)

Hecker.

## Nº. 61.

- R. Decoct. Cort. Chin. reg.  $\frac{3}{4}$ V.  
 Alum. crud. 5jj.  
 Camphor. in Aeth. sulph.  
 q. s. subact.  $\frac{3}{4}\beta$ .  
 adde  
 Syr. Cort. Aurant.  $\frac{3}{4}\beta$ .  
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.  
 (Wie bei No. 59.)

*Hecker.*

## Nº. 62.

- R. Alum. crud.  
 Gummi arab. ana 5jj.  
 Aq. Menth. pip.  $\frac{3}{4}$ V.  
 Tr. Opii simpl. 5j.  
 Tr. Cinnamomi 5jj.  
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.  
 (Wie bei No. 59.)

*Hecker.*

## Nº. 63.

- R. Aeth. sulph. 5jj.  
 Ol. Cajeput. 5j.  
 M. D. S. Zum Einreiben.  
 (Bei grosser Schwäche.)

*Hecker.*

## Nº. 64.

- R. Spir. Vini camphorat.  
 — Lavandulae ana 5jj.  
 Liq. Ammon. caust.  
 Ol. destill. Menth. pip. ana 5jj.  
 M. D. S. Zum Einreiben.  
 (Wie bei No. 63.)

*Hecker.*

## Nº. 65.

- R. Kali subcarbonici ʒj.  
Acet. bezoard. q. s.  
ad saturat.  
Aq. Cinnamomi ʒj.  
Vini albi Gall. generos. ʒIV.  
M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.  
(Bei eintretender Haut - Crise.)

Hecker.

## Nº. 66.

- Gegen den Decubitus:  
a.) R. Album. ovor. No. II.  
Conquass. et dein  
leni igne calef. perpet.  
agitand. admisce sensim  
Spir. Vini rectificat. ʒvj.  
M. D. S. Zum Betupfen der kranken Stellen.

De Haen.

- b.) R. Decoct. Cort. Quercus  
Aq. saturnin. ana ʒvj.  
Album. Ovor. No. II.  
Liq. Myrrhae ʒjj.  
M. D. S. Die Stellen kalt zu waschen.

Hecker.

- c.) R. Alum. crud. ʒβ.  
Album. Ovor. No. IV.  
Spir. Vini camphorat. ʒjj.  
M. f. Liniment. D. S.  
Auf Leder gestrichen, auf die kranken Stellen  
zu legen.

Hecker.

d.) Ry. Cort. Quercus 5jj.

Coq. c. Aq. font. 5xjj.

Col. 5vj. instill. Aq. saturn.

q. s. ad deposit. cui adde

Spir. Vini 5jjj.

M. D. S. Auf die kranken Stellen.

*Autenrieth.*

### Nº. 67.

Gegen die Aphthen:

Ry. Mell. rosat. 5j.

Boracis venet. 5j — jjj.

M. D. S. Zum Bepinseln.

*Vogel.*

Zur Verhütung der Ansteckung s. die salzsäuren und salpetersäuren Dämpfe, deren Bereitung am Schluss des Formulare's angegeben worden ist.

### Gastrisches Fieber.

#### No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 22.

Zuvörderst sind es Brech- und Abführmittel, deren Anwendung zur Entfernung der schadhaften Stoffe bei'm gastrischen Fieber nothwendig wird. Formeln dazu finden sich im Anfang. — Bei scharfer caustischer Galle ist das Emeticum mit einer vegetabilischen Säure zu verbinden;

### Nº. 68.

Ry. Kali carb. dep. 5β.

Succi Citri q. s. ad sat.

Aq. font. 5jj.

Tart. stib. gr. IV.

M. D. S. Sogleich die Hälfte zu nehmen.

*Richter.*

## Nº. 69.

Bei schleimigtem Zustand:

Rv. Ammonii muriat dep. 5jj.

Aq. flor. Chamomill. 5xj.

Tart. stib. gr. jj.

Oxymell. simpl. 5j.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden drei Esslöffel.

Berends.

## Nº. 70.

Rv. Tart. stib. gr. j.

Ammon. muriat. dep. 5jj.

Natri sulph. cryst. 5vj.

solve in

Aq. destill. 5v.

adde

Syr. Amygdal. 5vj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei starke Esslöffel.

(Wie No. 69.) Richter.

## Nº. 71.

Rv. Pulv. Rad. Rhei gr. xvj.

Calomel. gr. jj — jjj.

M. f. c. Syr. Cort. Aurant.

Bolus. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

(Wie bei No. 69.)

Richter.

## Nº. 72.

Rv. Sulph. stib. rubr. gr. j.

Kali tart.

Pulv. Rad. Pimpinell. ana 3j.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. vj.

D. S. Täglich zwei Pulver.

(Febris pituitosa.)

Richter.

## Nº. 73.

- R. Res. Jalapp.  
 Camphor. rasaee  
 Calomel. ana gr. V.  
 M. f. c. Mucilag. Gummi arab.  
 q. s. Pil. No. XX. D. S.  
 Morgens und Abends drei Pillen.  
 (Wie bei Nº. 72.)

*Richter.*

## Nº. 74.

- R. Gummi ammoniaci  
 Sap. med.  
 Pulv. Rad. Rhei  
 Fell. Tauri inspiss.  
 Extr. Aloës aq. ana ʒj.  
 Tart. stib. in aq. solut. gr. IV.  
 M. f. Pil. pd. gr. jj. D. S.  
 Dreimal täglich zehn Pillen.  
 (Wie bei Nº. 72.)

*Richter.*

## Nº. 75.

- R. Pulv. Rad. Jalapp.  
 — Sem. Santonici ana Gr. XXIV.  
 Calomel gr. IV.  
 M. f. Pulv. D. S. Auf einmal zu nehmen.  
 (Bei Febris verminosa.)

*Richter.*

## Nº. 76.

- R. Camphorae gr. xjj.  
 Gummi arab. q. s.  
 adde  
 Aq. Menth. crisp. ʒvj.  
 Aceti Vini opt. ʒβ.  
 Sacch. alb. ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.  
 (Wie bei No. 75. mit gleichzeitiger grosser  
 Schwäche.)

Berends.

Nº. 77.

Rv. Pulv. Cort. Chin. reg. 5vj.  
 Coq. c.  
 Aq. font. 5xvj. ad Col. 5vjjj.  
 sub finem Coct. adde  
 Pulv. Rad. Serpentar. virg. 5jjj.  
 — — Rhei 5Iβ.  
 Col. adde  
 Liq. Ammon. acet.  
 Syr. Cort. Aurant. ana 5j.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden zwei starke Esslöffel.  
 (Bei eintretender Haut-Crise.)

Richter.

Nº. 78.

Rv. Aq. Menth. pip.  
 Tr. Rhei vinos.  
 — Aurant. comp. ana 5j.  
 M. D. S. Dreimal täglich einen Esslöffel.  
 (Zur Nach-Gur; besonders bei Schlaflosigkeit  
 aus Schwäche.)

Richter.

K i n d b e t t f i e b e r.

Je nach dem Fieberzustande, die beim entzündlichen,  
 nervösen, fauligten und gastrischen Fieber angegebenen  
 Getränke.)

Nº. 79.

Rv. Rad. Ipecacuanhae gr. XV.  
 f. Pulv. Divide in partes jj. aeq.

D. S. Ein Pulver zu nehmen, und nach anderthalb Stunden das andere Pulver,

Hierauf:

Rv. Ol. Amygdal. dulc.  $\frac{5}{3}$ jj.

Syr. Althaeae  $\frac{5}{3}$ j.

Kerm. mineral. gr. jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Zugleich:

Rv. Sem. Lini (vel Scorzonera.) M. j.

Coq. in Aq. font. Cong. j.

adde

Syr. Althaeae q. s. ad gr. sap.

D. S. Zum gewöhnlichen Getränk. —

Den 7ten — 8ten Tag eine Abführung aus zwei Unzen Manna und zwei Drachmen Arcanum duplicatum; welche drei bis viermal wiederholt wird.

### *Doulcet.*

### Nº. 80.

Rv. Sem. Papav. alb.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Aq. comm.  $\frac{5}{3}vj$ .

f. l. a Emulsio,

adde

Ol. Amygdal. dulc.  $\frac{5}{3}j$ .

Pulv. Gummi arab.  $\frac{5}{3}jj$ .

Extr. Hyoscyami gr. vj — vjjj.

Tart. stib. gr. j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

### *Busch.*

### Nº. 81.

Rv. Calomel.

Extr. Hyoscyami ana gr. xjj.

Opii thebaici gr. vjjj — xjj.

F 1

M. f. l. a. massa Pil, e. q. f.

Pil. No. xjj. Consp. Pulv. Lycopod.

D. S. Alle vier Stunden eine Pille zu nehmen.

*Schweighäuser.*

Nº. 82.

Ry. Aq. oxymuriat. rec. parat.  $\tilde{\beta}$ I $\beta$ .

Aq. destill. simpl.  $\tilde{\beta}$ IV.

Syr. Alth.  $\tilde{\beta}$ II $\beta$ .

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Zugleich:

Ry. Acid. nitrici diluti

— muriat. ana  $\tilde{\beta}$  $\beta$ .

Aq. font. tep.  $\mathcal{E}$  vjjj.

M. D. S. Mit einem hiemit befeuchteten flanellnen Lappen Brust, Arme und Schenkel zu waschen.

*Sundelin.*

W e c h s e l f i e b e r.

No. 10. 11. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 48. 49.

Nº. 83.

Ry. Extr. Trifol. aq.

— Absynthii ana  $\tilde{\beta}$ jj.

solve in

Aq. Menth. pip.  $\tilde{\beta}$ IV.

Elix. Aurant. comp.  $\tilde{\beta}$  $\beta$ .

M. D. S. Viermal täglich einen kleinen Esslöffel voll.

(Bei Atonie und gleichzeitigem, doch unbedeutendem Diätfehler.)

*Richter.*

Nº. 84.

Bei gastrischer Complication: (No. 84. 85. 86. 87.)

Ry. Cort. Chin. reg.  $\tilde{\beta}$ j.

coq. ex Aq. fount. suff. qt.

- in Col.  $\frac{5}{3}$ vj. solve  
 Natri sulph.  $\frac{3}{3}$ jj.  
 adde  
 Succi Liq. dep. 5j.  
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*M. J. Schmidt.*

Nº. 85.

- Ry. Ammon. mur. dep. 5jj.  
 Tartari stib. granum  
 Succi Liq. dep. 5l $\beta$ .  
 solve in  
 Aq. flor. Chamomill.  $\frac{5}{3}$ vj.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.  
 (Wie bei No. 84. Besonders vorbereitend zu  
 den eigentlichen Febrifugis.)

*Richter.*

Nº. 86. a.)

- Ry. Aq. Chamomill.  $\frac{5}{3}$ vjjj.  
 Sal. Ammon. dep.  
 Extr. Gentianae ana  $\frac{3}{3}$ jj.  
 Syr. Cort. Aurant.  $\frac{3}{3}\beta$ .  
 M. D. S. In der fieberfreien Zeit alle zwei bis drei  
 Stunden einen bis drei Esslöffel.  
 (Wie bei No. 84 und 85.)

*Vogel.*

b.) Wohlschmeckender:

- Ry. Amygd. dulc.  $\frac{3}{3}$ j.  
 Mucilag. Gummi arab. q. s.  
 f. c.  
 Aq. Rubi Idaei  $\frac{5}{3}$ X.  
 Mucilago,

solve

Sal. Ammon. dep. 5jj.

Sacch. alb. q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse.

*Vogel.*

Nº. 87.

Rv. Pulv. Rad. Rhei

Sap. med. ana 5j.

Extr. Aloës aq. 5β.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Dreimal täglich sechs Pillen.

(Wie bei No. 84.)

*Richter.*

Als eigentliche Febrifuga werden gerühmt (No. 88 bis 102):

Nº. 88.

Rv. Rad. Gentianae rubr. 2j.

— Ari 2β.

Sulph. Antim. aurat. gr. j — jj.

Sal. Absynth.

Sacch. alb. ana gr. V.

M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.

D. S. Täglich 3 — 4 Pulver mit vielem Getränk.

*Vogel.*

Nº. 89.

Rv. Fulv. Cort. Chin. reg. 5vj. — 5j.

Pulv. Rad. Serpentari. virg.

— Summitat. Arnicae

— Flor. Chamomill. ana 5jj.

Elect. theriac. 5β.

Syr. Croci 5V.

M. f. Elect.

D. S. In 5 — 6 Portionen zu verbrauchen.

*Richter.*

## Nº. 90.

- Rv. Cort. Chin. reg.  
 Rad. Arnicae ana  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Cort. Hippocastani  $\frac{5}{3}j$ .  
 M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.  
 (Besonders in der Armenpraxis anwendbar.)

*M. J. Schmidt.*

## Nº. 91.

- Rv. Cort. Chin. reg. contus.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 coq. ex Aq. ft.  $\frac{5}{3}xvjjj$ .  
 Col.  $\frac{5}{3}xjj$ . adde  
 Pulv. Cort. reg.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Tr. Cort. peruv.  $\frac{5}{3}\beta$ . —  $\frac{5}{3}jj$ .  
 Syr. Cort. Aurantior.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 M. D. S. In der Apyrexie wohl umgeschüttelt alle  
 Stunden  $\frac{1}{2}$  bis 1 Esslöffel.  
 (Bei grosser Gefahr, als concentrirteste Form  
 der China - Anwendung.)

*Berends.*

## Nº. 92.

- Rv. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Extr. Gent. rubr.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Opii puri gr. j.  
 Syr. Cort. Aurant. q. s.  
 ut f. Pil. pd. gr. jj.  
 D. S. Viermal täglich 15 Pillen.

*Hecker.*

## Nº. 93.

- Rv. Chinin. sulph. gr. xvjjjj.  
 Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}jj$ .  
 M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.  
 D. S. Alle Stunden ein Pulver mit schwarzem Caffe.

(Diese Form ist die sicherste zur Anwendung des Chinins, und vielfacher Erfahrung zu Folge sind bei ihr die sonst so gefürchteten Recidive nur höchst selten. Das Chinin nimmt sich überhaupt nicht leichter als in schwarzem Caffe.)

*M. J. Schmidt.*

---

Nº. 94.

Rx. Coffeae tostae 5vj.  
coq. ex Aq. ft. suff. qt.  
Col. 5IIIβ. adde

Succi Citri rec. express. 5Iβ.

M. D. S. Am fieberfreien Tage Morgens nüchtern auf einmal warm zu trinken; dann etwas Suppe zu nehmen, und den Tag über im Bett zu bleiben.

*Audon.*

---

Nº. 95.

Rx. Sem. Coff. tost. pulv. 5IV.  
coq. c.  
Vini rubri 5Xjj. ad Col. 5Vjjj.

D. S. Eine Stunde vor dem Anfall die Hälfte, und die andere Hälfte  $\frac{1}{2}$  Stunde vor dem Anfall.

*Neumann.*

---

Nº. 96.

Rx. Opii puri  
Sulph. stib. aurant. ana gr. jj.  
Sacch. alb. 9j.

M. f. Pulv. Divide in partes II aeq.

D. S. Ein Pulver eine Stunde, das andere  $\frac{1}{2}$  Stunde vor dem Anfall.

*Hecker.*

## Nº. 97.

- R. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}$ j.  
 Tr. Opii simpl.  $\frac{3}{3}$ j.  
 Syr. Cort. Aurant. q. s.  
 ut f. Elect. D.  
 S. In der Apyrexie alle 2 Stunden den sechsten Theil zu nehmen.

*Hecker.*

## Nº. 98.

- R. Pulv. Flor. Chamomill.  $\frac{5}{3}$ j.  
 — Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Elaeosach. Chamomillae  $\frac{5}{3}$ j.  
 M. f. Pulv. D. S. Alle Stunden einen Theelöffel.

*Hecker.*

## Nº. 99.

- R. Extr. Nucis vomicae  $\frac{9}{3}\beta$ . — gr. XV.  
 Gummi arab.  $\frac{5}{3}$ j.  
 Aq. Foeniculi  $\frac{5}{3}$ IV.  
 Syr. Cort. Aurant.  $\frac{5}{3}\beta$ . —  
 M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

## Nº. 100.

- R. Pulv. Fol. Belladonnae gr. j — jjj.  
 Moschi oriental.  
 Camphorae ana gr. V.  
 Sacch. alb.  $\frac{9}{3}\beta$ .  
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VIII.  
 D. S. Täglich drei Pulver.

*Hecker.*

## Nº. 101.

- R. Cort. Chin. reg.  $\frac{5}{3}$ j.  
 Ol. Cajeput. gtt. XXXII.

M. f. Pulv. Divide in partes XVI aeq.  
 D. S. In der Apyrexie stündlich ein Pulver mit  
 Thee oder Wein.

*Hecker.*

Nº. 102.

Ry. Extr. Cort. Chin. frig. parat.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 solve in  
 Aq. Melissae  $\frac{5}{3}jj$ .  
 adde  
 Syr. Cort. Aurantior.  $\frac{5}{3}j$ .  
 M. D. S. Theelöffelweise.  
 (Für Kinder.)

*Berends.*

Nº. 103.

Bei gleichzeitiger Obstipation bei schwachen Subjecten :

Ry. Kali tart.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Magnes. carb.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Rad. Rhei opt.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Elaeosacch. Foeniculi  $\frac{5}{3}vj$ .  
 M. f. Pulv. D. in vitro.  
 S. Dreimal täglich einen Theelöffel.  
 Oder:  
 Ry. Extr. Aloës aq. gr.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Ferri pulverati gr.  $\frac{5}{3}jj$ .  
 Ammoniaci dep.  $\frac{5}{3}j$ .  
 M. f. c. Extr. Gentianae q. s.  
 Pil. pd. gr.  $\frac{5}{3}j$ . D. S.  
 Dreimal täglich 3 — 5 Pillen.

*Berends.*

Nº. 104.

In den hartnäckigsten Fällen (No. 104. 105. 106. 107. 108.):

Ry. Arsenici alb. pulv.  
 Kali carb. ana  $\frac{5}{3}j$ .

Aq. font. destill.  $\frac{2}{3}$  β.

M. coque in balneo arenae ad  
perf. Arsenici solut. — Frigef. adde

Spir. Angelicae comp.  $\frac{3}{5}$ j.

Aq. font. destill. q. s. ut tota  
solutio constituat  $\frac{2}{3}$  I.

M. D. S. In der fieberfreien Zeit alle 2 Stunden  
5 — 10 Tropfen unter Wasser (steigend zu 16  
Tropfen).

Für Kinder:

Rv. Solut. arsenical. Heimii 9j.

Aq. font. destill.  $\frac{3}{5}\beta$ .

Syr. balsam.  $\frac{3}{5}\beta$ .

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.

*Heim.*

### Nº. 105.

Rv. Arsenici albi

Natri carb. ana  $\frac{3}{5}\beta$ .

Coq. c. Aq. destill.  $\frac{3}{5}$ vj.

Solut. filtratae adde

Aq. Cinnamomi s. v. q. s. ut

pondus totius solutionis sit  $\frac{3}{5}$ vjjj.

M. D. S. Alle 3 Stunden 6 — 12 Tropfen unter  
Wasser.

(Auch gegen Chorea, Hydrophobie, Wasser-  
sucht, chronische Hautkrankheiten, und Haut-  
krebs.)

*Harless.*

### Nº. 106.

Rv. Arsenici albi gr. j.

Aq. Cort. Aurant.  $\frac{3}{5}$ X.

Syr. Cort. Aurant.  $\frac{3}{5}$ j.

M. D. S. In der Apyrexie stündlich 1 — 2 Esslöffel.

*Hecker.*

## Nº. 107.

- Rx. Arsenici sulphurati gr.  $\beta$ . — gr. j.  
 Sacch. alb.  $\eth\beta$ .  
 Ol. Anisi gtt. I.  
 M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.  
 D. S. In der Apyrexie stündlich ein Pulver.  
 (Man soll selten mehr als diese 12 Pulver nöthig haben.)

*Hecker.*

## Nº. 108.

- Rx. Cupri sulphurici  
 Opii puriss. ana gr.  $\beta$ . — gr. j.  
 Canellae alb. gr. j.  
 Gummi arab.  $\eth\beta$ .  
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.  
 D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

*Richter.*

Bei Uebergang in Chlorosis.

## Nº. 109.

- Rx. Extr. Cort. Angustur.  
 — Chamomill. ana 5jj.  
 Ferri pulverati 5j. — 5 $\beta$ .  
 Pulv. Rad. Columb. q. s. ut f.  
 Pil. pd. gr. jj. Consip. Magnes. carb.  
 D. S. Dreimal täglich 8 — 10 Pillen.

*Hecker.*

## Nº. 110.

In der Hitze des Fiebers, als ungemein angenehm und erquickend:

- Rx. Aq. Cerasor. nigr. 5IV.  
 Tr. flor. Papav. 5 $\beta$ . — 5vj.  
 Syr. flor. Papav. 5vj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Vogel.*

Zur Abkürzung des Frostes, und Beförderung der ein-tretenden Haut - Crise:

Nº. 111.

Rv. Lapid. Cancror. pulv. 5jj.  
Aceti Vini 5jj.

M. D. S. Im Aufbrausen (während des Frostes) zu nehmen.

(Soll sich in vielen hundert Fällen wirksam bewiesen haben.)

*Lind.*

Als Ptisanen werden empfohlen No 112. 113. 114.

Nº. 112.

Rv. Hb. Cent. min.  
— Card. bened.  
— Absynth. vulg.  
— Trifol. fibr. ana M. jj.  
Flor. Chamomill. vulg. P. jj.  
Fol. Sennae  
Rad. Hellebori nigri ana 5β.  
Cort. peruv. 5j.  
Tart. tart. 5v).  
Conc. inf. in Vini albi 8 II — III.  
Aq. comm. 8 I.  
St. per aliquot dies.

Col. D. S. An den fieberfreien Tagen drei Tassen täglich zu trinken.

*Vogel.*

Nº. 113.

Rv. Rad. Sarsaparill. 5jj.  
Stipit. Dulcamar. 5jj.

Coq. vas. claus. c. Aq. f. q. s.  
per hor. jjj. Col. & I. admisce

Syr. Fumariae 5jj.

M. D. S. Drei bis viermal täglich eine Tasse.

*Vogel.*

Nº. 114.

- Ry. Rad. Taraxaci  
— Cichor.  
— Juniperi  
— Graminis  
— Saponar. ana 5β.  
Sem. Foeniculi  
— Anisi ana 5j.

Concis. Contus. M. D. S. Einen Esslöffel in 3 Schoppen Wasser  $\frac{1}{4}$  Stunde lang zu kochen, und collirt täglich zu trinken.

*Vogel.*

Zur Nach - Cur, und in der Convalescenz:

Nº. 115.

- Ry. Pulv. Rad. Gentianae rubr. 5β.  
— Cort. Aurant. 5jj.  
— — Chinae 5j.  
Ferri pulverati 5β.  
inf. c.

Vini rhen. opt. & IV.

Stent per XXIV. hor. in vase bene clauso, saepius agitando. Col.

D. S. Täglich 3 — 4 mal ein Weinglas voll.

*Richter.*

## H e k t i s c h e s F i e b e r .

No. 1. 2. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 17. 18. 19. 21.  
Nº. 116.

Ry. Rad. Graminis.

— Althaeae ana  $\frac{5}{3}jj$ .

— Taraxaci  $\frac{5}{3}j$ .

— Salep.  $\frac{5}{3}jj$ .

Rasurae Cornu Cervi  $\frac{5}{3}\beta$ .

Sem. Foeniculi  $\frac{5}{3}jj$ .

C. G. D. S. Drei Esslöffel voll in 3 Nöseln Wasser zu kochen, und täglich zu trinken.

*Stark.*

## Nº. 117.

Ry. Pulv. Cort. Chin. reg.

Hb. Lichen. island. ana  $\frac{5}{3}\beta$ .

Stipit. Dulcamar.  $\frac{5}{3}jj$ .

Coq. c.

Aq. font.  $\frac{5}{3}XX$ , ad Col.  $\frac{5}{3}X$ .  
adde

Syr. Cort. Aurant.  $\frac{5}{3}j$ .

M. D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen.

*Richter.*

## Nº. 118.

Ry. Tr. Opii simpl.  $\frac{5}{3}j$ .

Acid. sulph. dil.  $\frac{5}{3}jjj$ .

Syr. Violar.  $\frac{5}{3}jjj$ .

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

*Fournier.*

## Nº. 119.

Ry. Gummi Myrrhae  $\frac{5}{3}j$ .

solve terendo in mortario vitreo in

F 2

Aq. alexiph. simpl.  $\frac{5}{3}$  VI $\beta$ .  
 — — spirit.  $\frac{5}{3}$  vj.

adde

Kali. carb.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Ferri sulphur. gr. xjj.

Syr. simpl.  $\frac{5}{3}$  jj.

M. D. S. In 4 Portionen den Tag über zu verbrauchen.

*Griffith.*

Nº. 120.

Ry. Plumbi acet.

Opii puriss. ana gr.  $\beta$  — jj.

Sacch. alb. gr. xjj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Täglich ein bis zwei Pulver.

*Richter.*

Nº. 121.

Ry. Vitell. ovor. No. XI.

tere c. Aq. Plantag. q. s.  
admisce

Corall. praep.  $\frac{5}{3}$ j.

Gummi arab.  $\frac{5}{3}$ jj.

Syr. Farfar.  $\frac{5}{3}$ jj.

M. D. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel, und  
ein Gläschen Hühner - oder Kalbsbrühe mit ara-  
bischen Gummi nachzutrinken.

(Besonders bei febris hectica a causa metallica,

z. B. Blei, Arsenik, Sublimat.)

*Fournier.*

Gegen die colliquativen Nachschweisse:

Nº. 122.

Ry. Tereb. puriss. c. Vitell. ovi intim. subact.  $\frac{5}{3}$ j.

Elect. theriac.  $\frac{5}{3}\beta$ .

Lact. vacc. rec.  $\frac{3}{5}$  IV.

M. D. S. Zum Clystir, welches der Kranke, auf der linken Seite liegend, so lange als möglich bei sich behalten soll. — Zugleich einen kalt gewordenen Thee von Hb. Salviae;  $\frac{3}{5}$  j. auf 3 Tassen Thee.

*van Swieten.*

Zur Nach-Cur.

N<sup>o</sup>. 123.

R. Ferri pulv.  $\frac{3}{5}$  j.

Pulv. Cort. Chin. reg.  $\frac{3}{5}$  jj.

— — — Aurant.  $\frac{3}{5}$  β.

inf. c.

Vini rhen. gen.  $\frac{2}{3}$  IV.

Stent in digest. frig. saep. agit. decant.

M. D. S. Viermal täglich ein kleines Weinglas voll.

*Richter.*

### Entzündungen.

Im Allgemeinen passen für die verschiedenen Arten der Entzündung sämmtliche beim entzündlichen Fieber angegebene Mittel. Also No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. und die für gastrische Complication beim gastrischen Fieber angegebenen Formeln. Die wahren Entzündungen werden gleichmässig behandelt, und es giebt daher wohl keine besonders passenden Vorschriften; doch mögen einige gerühmte Formeln hier zur Auswahl folgen.

N<sup>o</sup>. 124.

Bei Encephalitis:

R. Vin. Antimon.  $\frac{3}{5}$  jjj.

Tr. thebaic.  $\frac{3}{5}$  j.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden 25 Tropfen.

*Bell.*

## Nº. 125.

Gegen Entzündung im Halse und Schlunde.

Rv. Pulv. Fol. Sabinae 3vj. — 3j.

Ebull. Aq. font. q. s.

Col. 3vj. adde

Merc. sublim. corros. gr. j.

M. D. S. Gurgelwasser zu einem Löffel voll.

*Kopp.*

Oder:

## Nº. 126.

Rv. Cupri ammon. gr. vjjj.

solve in

Aq. Sabinae 3vj.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Besonders in chronisch gewordenen Fällen.)

*Kopp.*

## Nº. 127.

Bei Angina:

Rv. Infus. Flor. Sambuci 3IX.

Oxymell. squill.

— simpl. ana 3Iβ.

M. D. S. Zum Gurgeln.

*Hecker.*

## Nº. 128.

Rv. Hb. Salviae

Sem. Sinapios ana 3β.

inf. c. Aq. fervid. 3IX.

Col. adde

Spir. Cochleariae 3jj.

M. D. S. Zum Gurgeln.

*Hecker.*

## Nº. 129.

Bei Angina suppuratoria:

- R. Panis tritici sicc. contrit. ʒv.  
 Sem. Lini contus. ʒj.  
 Sal. ammon. pulv. ʒj.  
 Opii puri gr. XX.  
 Aq. fervid. q. s.  
 ut f. Cataplasma.

D. S. Oftmals erwärmt um den Hals zu legen.

*Vogler.*

## Nº. 130.

Bei Angina aphthosa maligna cum scarlatina: (s. No. 254.)

- R. Calomel. gr. V — X.  
 Rad. Rhei ʒj.  
 M. f. Pulv. D. S. Zwei bis drei Tage lang alle Morgen und Abende ein solches Pulver.

*Wedekind.*

## Nº. 131.

Bei Bronchitis chronica:

- R. Extr. Hyoscyami gr. XXXjj.  
 Syr. simpl. ȝ II.  
 M. S. Bilsenkraut - Syrup; theelöffelweise zu gebrauchen.

*Gilbert.*

## Nº. 132.

Gegen Croup:

- R. Kali sulphurati  
 Guajaci ana ʒj.  
 Extr. Card. bened. q. s.  
 ut f. Pil. pd. gr. jj.  
 D. S. Dreimal täglich 5 Pillen.

*Senff.*

## Nº. 133.

Oder:

Rv. Kali sulphurat. 3j.

Butyr. Cacao 3jj.

Sacch. alb. 3jjj.

Ol. Amygdal. dulc. 3β.

M. D. S. Alle 2 — 4 Stunden 2 — 3 Theelöffel.

*Senff.*

## Nº. 134.

Rv. Ungt. Hydrarg. ciner. 5j.

— Ceruss. camphor. 5jjj.

M. D. S. In die Gegend des Kehlkopfs soviel einzureiben, dass die Hälfte in 24 Stunden verbraucht ist.

*Richter.*

Bei Pleuritis, Pneumonie und Peripneumonie:

## Nº. 135.

Rv. Mell. opt. 3vj.

Gummi arab. 3j.

Aq. Rosar. 3jj.

terendo adde

Ol. Amygdal. dulc. 3Iβ.

Aq. font. 3vj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll.

(Besänftigt vorzüglich den Husten, und ist mit einem rein entzündlichen Zustande verträglich.)

*Pringle.*

## Nº. 136.

Rv. Flor. Papav. Rhoeados

— Malvae ana 3β.

Sem. Lini contus. 3vj.

Coq. c.

Aq. font. & IV. per  $\frac{1}{4}$  horae.

Col. adde

Syr. Althaeae ʒjj.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk,  
(Wie bei No. 135.)*Richter.*

## Nº. 137.

Rx. Sem. Cannab. contus.

Capit. Papav. alb. c. sem. contus.

Flor. Malvae ana ʒj.

Coq. c.

Aq. font. & III. per  $\frac{1}{4}$  horae.

Col. adde

Syr. Capill. Ven. ʒjjj.

M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.  
(Wie bei No. 135.)*Richter.*

## Nº. 138.

Rx. Rasur. Pan. alb. duriusc. ʒjjj.

Hb. Conii maculat. concis. ʒjj.

Hb. Hyoscyami ʒj.

Coq. c.

Aq. ft. q. s. ad consist. Catapl.

temuioris, cui adde

Ol. Hyoscyami ʒj.

M. D. S. Lauwarm aufzulegen.

*Huxham.*

## Nº. 139.

Rx. Rad. Althaeae

Hb. Meliss.

— Menth. pip.

Flor. Sambuci

— Arnicae ana ʒj.

Sem. Anisi ʒβ.

C. M. D. S. Zum Thee.

(Auch bei Angina catarrhalis von grossem Nutzen. In pleuritischen Affectionen, besonders bei eingetreterener nervöser Complication.)

*Hecker.*

Nº. 140.

Rx. Ammoniaci dep. ʒjj.

Aq. Foeniculi ʒvj.

Vini stibiati ʒjj.

Oxymell. simpl. ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(In Peripneumonia notha.)

*Brunner.*

Nº. 141.

Rx. Rad. Polygalae Seneg. concis ʒj.

Coq. c.

Aq. font. ʒxvj. ad Col. ʒvjij.  
solve

Ammon. muriat. dep. ʒjj.

Pulpa Tamarindor. ʒj.

Tart. stib. gr. j.

Syr. Althaeae ʒj.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.

(Die Expectoration befördernd, und vorzüglich anwendbar, wo nur geringes Fieber ist.)

*Richter.*

Nº. 142.

Rx. Rad. Polyg. Seneg.

Sacch. alb. gr. XV.

Camphor. rasa gr. j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Alle drei Stunden ein Pulver.  
(Wie bei No. 141.)

*Richter.*

Nº. 143.

Rx. Ammon. muriat. dep. 5jj.  
Camphorae  
Extr. Opii ana gr. jjj.  
Flor. Arnicae 5β.  
Sacch. alb. 5vj.

M. f. Pulv. D. ad vitr.

S. Drei bis viermal täglich einen Theelöffel.  
(Die Expectoration befördernd.)

*Berends.*

Nº. 144.

Rx. Kerm. mineral. gr. jj — IV.  
Flor. Sulph. 5j.  
Gummi arab.

— Tragacanth. ana 5lβ.

Extr. Liquirit.

Sacch. alb. ana 5jj.

M. f. Pulv. D. S. Zwei bis dreimal täglich ein Kaffeeöffelchen in Wasser gerührt zu nehmen.

(Wie bei No. 143.)

*Quarin.*

Nº. 145.

Rx. Tart. stib. gr. j.  
Kali tart. 5vj.  
solve in  
Aq. destill. simpl. 5lβ.  
adde  
Mellis opt. 5lβ.

M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Esslöffel.  
(Bei schon vorhandener Expectoration zur Unterhaltung derselben.)

*Richter.*

## Nº. 146.

Ry. Gummi Ammoniaci 5j.  
Sulph. aurat. Antim. gr. vj.  
Syr. Althaeae 5jjj.

M. f. l. a. Linctus. D. S. Umgeschüttelt alle 2  
Stunden ein Paar Kaffeelöffel.  
(Wo kein Fieber mehr ist. Wie bei No. 145.)

*A. Schmidt.*

## Nº. 147.

Ry. Gummi Ammoniaci 5j.  
solve in  
Oxymell. squill. 5j.  
Aq. flor. Sambuci 5IV.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.  
(Wie bei No. 146.)

*Richter.*

## Nº. 148.

Ry. Flor. Benzoës gr. vj.  
Camphor. gr. jj.  
Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. IV.

M. D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

(Wenn der Auswurf bei sich verschlimmerndem  
Zustande stockt, um denselben wieder hervorzu-  
rufen.)

*Hoffmann.*

## Nº. 149.

Ry. Sulph. stib. aurant.  
Rad. Ipecacuanhae ana gr. j.  
Camphor. rasaæ gr. jjj.  
Sacch. alb. 3β.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

(Wie bei No. 148.)

*Mursinna.*

## Nº. 150.

- Rv. Sal. volat. C. C. gr. V.  
 Calomel. gr. jj.  
 Opii puri  
 Kerm. mineral. ana gr.  $\beta$ .  
 Rad. Liquirit. gr. X.

M. f. Pulv. Dent. tal. Dos. q. l.

S. Alle 3 — 4 Stunden ein Pulver.

(In den letzten Stadien pleuritischer und pneumonischer Affection, bei schon eingetretener seröser Ausschwitzung zur Resorption derselben. Auch bei Pericarditis und eingetretener Exsudation.)

*Kraft.*

## Nº. 151.

## Bei Hepatitis:

- Rv. Calomel.  
 Sulph. stib. aurant. ana gr. j.  
 Hb. Cicutae gr. vj.  
 Sacch. alb.  $\frac{2}{3}$ j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VIII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Zugleich, wenn nicht schon offener Leib eintritt, den 5ten oder 6ten Tag ein Purgans aus Res. Jalapp., Calomel. ana gr. IV. und nachher wieder die Pulver.

*Richter.*

## Bei Enteritis No. 136, 137.

und bei gleichzeitiger Verstopfung:

## Nº. 152.

- Rv. Magnes. sulph.  $\frac{2}{3}$ j.  
 solve in  
 Aq. font.  $\frac{2}{3}$ vjj.  
 Ol. Lini  $\frac{3}{3}$ jj.

Tr. Opii simpl. gtt. XVIII.

Syr. Papav. ʒj.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt alle halbe Stunden  
einen Esslöffel.

*Richter.*

Nº. 153.

Rv. Ol. Ricini ʒj.

Gummi arab. ʒj.

Aq. Sambuci ʒIV.

Syr. Alth. ʒβ. — ʒj.

Spir. nitrico - aeth. ʒj. — ʒj.

Tr. Opii croc. ʒβ. — ʒj.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 152.)

*Jahn.*

Gegen Verhärtungen nach Entzündungen:

Nº. 154.

Rv. Extr. Gonii maculat. ʒβ.

Ungt. saturnin. ʒj.

M. f. Ungt. S. Theils einzureiben, theils als Pfla-  
ster auf die Stelle des verhärteten Eingeweides  
zu legen.

*Berends.*

An die Entzündungen reihen sich der Rheumatismus,  
die Prosopalgie, Ischias, Lumbago, — der Katarrh und  
die Dysenterie. —

R h e u m a t i s m u s.

Nº. 155.

Rv. Amygdal. dulc. dec. ʒβ.

Sem. Papav. alb.

— Cannab. ana ʒjj.

Camphorae  $\frac{3}{2}$ j. —  $\frac{5}{3}\beta$ .

cum Amygdal. trit. adde

Aq. Rubi Idaeii  $\frac{5}{3}X$ .

Emulsioni adde

Nitri dep.  $\frac{5}{3}jj$ .

Syr. mannati  $\frac{5}{3}jj$ .

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel bis  
 $\frac{1}{2}$  Tasse.

(Bei gleichzeitigem Fieber.)

*Vogel.*

Nº. 156.

R. Aq. Menth. pip.  $\frac{5}{3}IV$ .

Spir. Minderer.  $\frac{5}{3}jj$ .

Syr. Ribium  $\frac{5}{3}v$ .

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 155.)

*Vogel.*

Nº. 157.

R. Nitri puri  $\frac{5}{3}jj$ . —  $\frac{5}{3}\beta$ .

Tart. stib. gr.  $I\beta$ . — gr.  $jjj$ .

solve in

Aq. flor. Sambuci  $\frac{5}{3}V$ .

adde

Syr. commi.  $\frac{5}{3}j$ .

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 155.)

*Thilenius.*

Nº. 158.

R. Calomel.

Opii puriss. ana gr. j.

Camphor. rasaee

Rad. Ipecacuanhae ana gr. jj.

Sacch. alb.  $\frac{3}{2}j$ .

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal Abends kurz vor dem

G 1

Schlafengehen mit ein Paar Tassen warmem Flie-  
derblüthenthee.

(Wie bei No. 155.)

*Richter.*

---

Nº. 159.

Ry. Elect. theriac. gr. xjj.

Sulph. stib. rub. gr. j.

Extr. Card. bened. 3j.

M. f. Bolus. D. S. Abends vor dem Schlafengehn  
zu nehmen, und ein Paar Tassen Thee von Card.  
bened. zu trinken.

(Wie bei No. 155.)

*Tissot.*

---

Nº. 160.

Ry. Calomel.

Extr. Aconit. ana gr. j.

Camphorae gr. jj — jjj.

Extr. Card. bened. 3j.

M. f. Bolus. D. S. Abends vor Schlafengehen zu  
nehmen.

(Wie bei No. 155.)

*Tissot.*

---

Nº. 161.

Ry. Liq. Ammon. acet. 5jj — jjj.

Laud. liq. Sydenh. gtt. vjjj.

Aq. flor. Sambuci 3j.

M. D. S. Abends vor Schlafengehen zu nehmen.

(Wie bei No. 155.)

*Richter.*

---

Nº. 162.

Ry. Ammon. carb. pyro - oleosi gr. IV.

Extr. Aconiti gr. j.

Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. III.

D. S. Alle 4 Stunden ein Pulver.  
(In hartnäckigeren Fällen.)

*Richter.*

Bei mehr chronischem Zustand:

**Nº. 163.**

- R. Res. Guajac. nat. 3jj.  
Gummi arab. 3jjj.  
Aq. destill. simpl. 3vj.  
Extr. Dulcamar. liq. 3jj.  
Syr. Althaeae 3j.

M. D. S. Alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

*Berends.***Nº. 164.**

- R. Res. Guajac. nat. 3jj.  
Sap. med. 3β.  
Mellis puri q. s.  
ut f. Pil. pd. gr. jj.  
Consp. pulv. Cinnam. D.  
S. Dreimal täglich 10 — 15 Stück.

*Berends.***Nº. 165.**

- R. Sulph. stib. aurant. 3j.  
Calomel. 3β.  
Sap. med.  
Res. Guajac. nat. ana 3IV.  
Extr. Aconit. gr. vj.  
M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj.  
D. S. Zwei bis dreimal täglich 8 — 12 Pillen.

*Selle.***Nº. 166.**

- R. Gummi Guajac. nat. 3β.  
Sap. med. 3jj.

Calomel.

Sulph. stib. aurant.

Rad. Senegae

Camphorae ana ʒβ.

M. f. c. Acet. squill. q. s.

Pil. pd. gr. jj. consp. pulv. Cinnamom.

D. S. Zwei bis dreimal täglich 8 Pillen.

*Hecker.*

Nº. 167.

R. Gummi Guajaci nat.

— Ammoniaci

— arab. ana ʒjj.

Aq. Foeniculi ʒvj.

Vini stib. ʒβ.

Syr. Althaeae ʒvj.

M. D. S. Alle Stunden 1 — 2 Esslöffel.

*Hecker.*

Nº. 168.

R. Pulv. Gummi Guajac. nat. ʒβ. — gr. XV.

— Cort. Cinnamom. gr. xj.

Sulph. stib. aurant.

Camphorae ana gr. jj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Täglich dreimal ein Pulver.

*Hecker.*

Nº. 169.

R. Gummi Guajac. nat. ʒi.

Mucilag. Gummi arab. ʒjj.

terant. aff. sensim

Aq. Hyssopi ʒX.

M. D. S. Drei bis viermal täglich einen Esslöffel.

*Richter.*

## Nº. 170.

- R. Sap. med.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 G. Guajaci  $\frac{3}{4}$ IV.  
 M. f. c. Syr. simpl. Pil. pd. gr. jj.  
 Consperg. Pulv. Cinnam.  
 D. S. Dreimal täglich 10 — 15 Pillen.

*Richter.*

## Nº. 171.

- R. Tr. Guajaci ammoniat.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Mucilag. G. arab.  
 Syr. Althaeae ana  $\frac{5}{3}j$ .  
 M. D. S. Abends vor dem Schlafengehn einen starken Esslöffel voll zu nehmen.

*Richter.*

## Nº. 172.

- R. G. Guajaci nat.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 solve in  
 Vitell. ov. No. j.  
 adde  
 Aq. Cinnamomi  $\frac{5}{3}jj$ .  
 Syr. Foeniculi  $\frac{5}{3}jj$ .  
 M. D. S. Abends vor Schlafengehn einen Esslöffel.  
 (Nacher Cort. Chinae.)

*Pringle. (Vogler.)*

## Nº. 173.

- R. Gummi Asae foet.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Aq. Cinnamom. s. v.  $\frac{5}{3}$ IV.  
 Syr. Cinnamom.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

## Nº. 174.

- Rv. Tart. stib. gr. vjjj.  
 Sap. med. 5jjj.  
 Pulv. Rad. Rhei 5j.  
 Extr. Aloës aq. 5β.  
 M. f. Pil. pd. gr. jj.  
 D. S. Dreimal täglich 8 — 10 Pillen.

*Richter.*

## Nº. 175.

- Rv. Sap. hisp.  
 Extr. Cicutae ana 5β.  
 M. f. Pil. pd. gr. jjj.  
 D. S. Dreimal täglich 3 Pillen.

*Stoerk.*

## Nº. 176.

- Rv. Sap. hisp. 5vj.  
 Extr. Tarax. 5!β.  
 G. ammon. 5β.  
 Syr. Cap. Ven. q. s.  
 ut. f. Pil. pd. gr. jjj.  
 D. S. Morgens und Abends zehn Pillen.

*Tissot.*

## Nº. 177.

- Rv. Extr. Aconiti 5β — 5j.  
 Liq. C. C. succ. 5β.  
 M. D. S. Einigemal täglich 15 — 20 Tropfen.  
 (Besonders schmerzstillend.)

*Thilenius.*

## Nº. 178.

- Rv. Liq. anodyn. min. Hoffm.  
 Spir. C. C. succ. ana 5jj.

M. D. S. Alle zwei Stunden 30 — 80 Tropfen.

(Wie bei No. 177)

*Hecker.*

Nº. 179.

Rv. Hydrarg. mur. corros. gr. jj.

solve in

Aq. destill. ʒvj.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

*Lentin.*

Nº. 180.

Rv. Calomel.

Sulph. stib. aurant.

Extr. Aconit. ana gr. j.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos No. xjj.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

*Richter.*

Nº. 181.

Rv. Sulph. stib. rub. gr. j.

Castor.

Tart. ammon.

Sacch. alb. ana ʒj.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Drei bis viermal täglich ein Pulver.

*Richter.*

Nº. 182.

Rv. Pulv. Opii gr. xvij.

Antimonii gr. xjj — XXIV.

Conserv. Rosar. q. s. ut f. massa Pil.

ex qua form. Pil. No. XXIV.

D. S. Bei heftigem Schmerz eine bis zwei Pillen.

*Scudamore.*

## Nº. 183.

Rv. Sulph. stib. anrant.  $\frac{5}{3}$ j.  
solve digerendo in s. q.

Liq. Kali caust.

admisce

Sap. med.  $\frac{5}{3}jjj$ .

Spir. Vini rectificatiss.

Aq. destill. ana  $\frac{5}{3}vj$ .

Diger.

M. D. S. Täglich einigermal 20 — 50 Tropfen.  
(In hartnäckigen Fällen, auch gegen Flechten  
und andere Hautkrankheiten.)

*Hufeland.*

## Nº. 184.

Rv. Pulv. Stipit. Dulcamar.  
Stibii sulph. nigr. ana  $\frac{5}{3}$ j.  
Extr. Card. bened.  $\frac{5}{3}jj$ .

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Dreimal täglich 10 — 20 Pillen.

*Richter.*

## Nº. 185.

Rv. Spir. sulph. aeth.  
Liq. Ammon. succ. ana  $\frac{5}{3}\beta$ .  
Extr. Hyoscyami  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich 30 Tropfen.

*Richter.*

## Nº. 186.

Rv. Stipit. et fol. Rhododendri  $\frac{5}{3}jj$ .  
inf. c.

Aq. font.  $\frac{5}{3}vjjj$ .

Stent in digest. vase bene clauso per hor. XXIV.  
Dein coque ad rem.  $\frac{5}{3}jjj$ . Cola

D. S. Jeden Morgen  $\frac{1}{2}$  Theetasse voll.

*Richter.*

Nº. 187.

Rv. Pulv. Rad. Valerianae 3vj.

inf. c. Aq. fervid. 3vj.

stent in loc. cal. vas. bene claus.

per  $\frac{1}{2}$  hor. Col. adde

Liq. Ammon. acet. 3j.

Extr. Aconiti gr. vijj.

M. D. S. Viermal täglich einen starken Esslöffel voll.

(Besonders gegen zurückbleibende stumpfe Schmerzen.)

*v. Stoerk.*

Nº. 188.

Rv. Ol. Tereb. 3j — jj.

Mell. despumat. 3j.

M. D. S. Morgens und Abends einen Theelöffel.

*Cheyne. (Herz.)*

Nº. 189.

Rv. Hydrarg. muriat. corrosiv. gr. j.

Extr. Hyoscyami gr. IV.

Aq. Cinnamom. s. v. 3jj.

M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.

*Brand.*

Nº. 190.

Rv. Succ. rec. express. Nasturt. aq.

— — — Cochlear.

— — — Acetosell.

— — — Taraxaci ana 3j.

Syr. Acetos. Citri 5jj.

M. D. S. In zwei Portionen während einigen Stunden mit Molkken zu verbrauchen.

(Bei Complication von Rheumatismus und Scorb.  
but.)

v. Stoerk.

Nº. 191.

- R. Sal. polychrest. S. 5jjj.  
Pulv. Rad. Jalapp. 5Iβ.  
Conserv. Fumar.  
Conserv. Nasturt. ana 5Iβ.  
Syr. quinq. rad. ap. q. s. ut f. Conserv.  
D. S. Alle drei Stunden zwei Theelöffel.  
Zugleich:

Nº. 192.

- R. Summitat. Cent. min.  
Fol. Card. bened.  
Flor. Chainomill. ana M. j.  
Rad. Liquirit. 5j.  
C. D. S. Zum Thee.  
(Wie bei No. 190.)

v. Stoerk.

Aeußerliche Mittel beim Rheumatismus:

Nº. 193.

- R. Liq. Ammon. caust. 5j.  
Ol. Olivar. 5jjj.  
Camphorae rasaæ 5β.  
Tr. Opii simpl. 3j.  
M. D. S. Einzureiben, und mit Flanell warm  
aufzulegen.  
(Bei noch vorhandenem entzündlichen Zustande.)

Richter.

Nº. 194.

- R. Fol. Daturaæ Stramm. 5jj.  
Axung. porci 5IV.  
Gerae 5j.  
M. f. c. Aq. f. Ungt. D. S.

Zum Einreiben.

(Wie bei No. 193.)

*Read. (Zollikofer.)*

Nº. 195.

- Ry. Fol. Salv. rec. concis.  
Bacc. Lauri pulv. ana ʒIV.  
inf. c. Ol. Napi & II.  
Col. adde  
Camphorae ras. ʒvj.  
Ol. Tereb. ʒjjj.  
— Petrae ʒjj.  
M. D. S. Zum Einreiben.  
(Bei mehr torpidem Zustande. Auch gegen Frostbeulen empfohlen.)

*Piepenbring.*

Nº. 196.

- Ry. Alcohol. ʒvjjj.  
Mixt. camphorat. ʒxvj.  
Aq. calid. 75°. q. s. ut f. Lin.  
S. Mit einer Leinwand - Compresse auf den leiden-  
den Theil.  
(Wie bei No. 195.)

*Scudamore.*

Nº. 197.

- Ry. Tr. Cantharid.  
Liq. Ammon. caust. ana ʒvj.  
Spir. Serpyll. ʒj.  
M. D. S. Zum Einreiben.  
(Wie bei No. 195.)

*Richter.*

Nº. 198.

- Ry. Extr. Hyoscyami ʒjjj.  
— Conii maculat. ʒvj.

Liq. Ammon. acet. q. s. ad  
Consist. Ungt. D. S.

Lauwarm auf Leder gestrichen, auf den leiden-  
den Theil.  
(Besonders schmerzstillend.)

Richter.

Nº. 199.

Ry. Pic. alb.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
Camphor.  $\frac{5}{3}j$ .  
Opii pur.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
Ol. Petrae q. s.

M. f. Empl. D. S.

Auf den leidenden Theil zu legen.

Richter.

Nº. 200.

Ry. Gamphorae  $\frac{5}{3}j$ .  
solve in  
Spir. sulph. aeth.  $\frac{5}{3}j$ .  
(Ol. Cajeput.  $\frac{5}{3}\beta$ . —  $\frac{5}{3}j$ .)

M. D. S. Zwei bis dreimal täglich in den leidenden  
Theil einzureiben.

(Besonders bei hartnäckigem rheumatischem  
Kopfschmerz empfohlen.)

v. Tourtuel.

---

P r o s o p a l g i e.

Nº. 201.

Ry. Asae foet.  
Extr. Conii maculat. ana  $\frac{5}{3}jj$ .  
Ammon. carb. pyro - ol.  
Pulv. Rad. Valer. ana  $\frac{5}{3}j$ .

M. f. c. Tr. Succini q. s.

Pil. pd. gr. jj.

D. S. Morgens und Abends zehn Pillen.

*Jahn.*

Nº. 202.

R. Gummi Guajaci

Asae foet.

Extr. Cicutae ana 5j.

Extr. Aconiti 5β.

Calomel. gr. XV.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnam.

D. S. Morgens und Abends 5 — 10 Pillen.

*Jahn.*

Nº. 203.

R. Moschi gen. gr. vj.

Calomel.

Sulph. stib. aurant. ana gr. jjj.

Sacch. alb. 5j.

M. f. Pulv. Divide in partes VI. aeq.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

*P. Frank.*

Nº. 204.

R. Sem. Datur: Stramonii 5jj.

Vini hispanici 5vjjj.

Spir. Vini 5j.

Digere per aliquot dies leni calore  
et filtra.

D. S. Sechs Tropfen auf einmal zu nehmen.

(Zugleich Schwefelbäder.)

*Lentin.*

G 2

## Nº. 205.

- R. Coccionell. septempunct. No. LX — LXXX.  
 contus. in mortar. lapid. sensim adde  
 Spir. Vini rectificatiss. ʒj.  
 Digere per aliquot dies.  
 Col. serva vas. vitr. ben. claus.  
 D. S. Morgens und Abends 20 — 30 Tropfen.  
 (Soll meistens gründliche Heilung, wenigstens  
 Erleichterung verschaffen.)

*Sauter.*

## Nº. 206.

- R. Cort. peruv. ʒβ — j.  
 Coq. c. Aq. f. q. s.  
 Col. refrig. ʒvjjj. adde  
 Tr. Guajaci ammon. ʒj. — ʒβ.  
 Tr. Opii simpl. ʒj. — ʒlβ.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.  
 (Besonders bei periodischer Prosopalgie.)

*Samel.*

## Nº. 207.

- R. Ol. Amygdal. amar. gtt. XX.  
 Alcohol. Vini ʒjj.  
 M. D. S. Täglich viermal 10 — 20 Tropfen.  
 (Gegen die Paroxysmen zuweilen hülfreich.)

*Horn.*

## Nº. 208.

- R. Calomel. ʒj.  
 Cretae ʒjj.  
 Ungt. Althaeae ʒj.  
 Ol. Lini ʒj.  
 M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle einzureiben.

*Löbenstein - Löbel.*

## Nº. 209.

Rv. Calomel. 3j.

Adipis suill. 3β.

Ol. Galbani

— Succini ana 3β.

M. f. Ungt. D. S. Auf die leidende Stelle einzureiben.

*Stark.*

## I s c h i a s.

s. Rheumatismus, Prosopalgie, Lumbago und Arthritis.

## L u m b a g o.

s. Rheumatismus, Prosopalgie und Arthritis.

## Nº. 210.

Rv. Camphorae 3j.

solve in

Ol. Tereb. 3jj.

adde

Sal. C. C. gr. XV.

Pulv. Cumini 3jj.

Ungt nervin. Disp. Eding. 3β.

Sap. nigr. 3j.

M. f. Ungt. D. S.

Auf Leder gestrichen, in die Lendengegend zu legen.

*Home.*

## C a t a r r h u s.

No. 125. 128. 129. 130. 132. 135. 136. 137. 138.

139. 141. 142. 143. 144. 145. 146.

## Nº. 211.

- R. Calomel. gr. j.  
 Extr. Hyoscyami gr. jj.  
 Gummi arab.  
 Sacch. alb. ana gr. XV.  
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. IV.  
 D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver.

*Richter.*

## Nº. 212.

- R. Liq. Ammon. succ. 5j.  
 Tr. Opii simpl. gtt. vjjj.  
 Syr. opiat. 5j.  
 M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel.

*Richter.*

## Nº. 213.

- R. Liq. Ammon. acet. 5vj.  
 Extr. Card. bened. 5j.  
 Tr. Opii simpl. gtt. vjjj.  
 Aq. flor. Sambuci 5IV.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.  
 (Bei trocknem Husten, zur Lösung.)

*Richter.*

## Nº. 214.

- R. Ol. Amygdal. dulc.  
 Syr. Papav. ana 5jj.  
 Tr. Opii simpl. gtt. xjj.  
 M. D. S. theelöffelweise.  
 (Besonders bei heftigem Husten.)

*Richter.*

## Nº. 215.

- R. Spir. nitrico - aeth. 5j.  
 Syr. Papav. Rhoead. 5jj.

M. D. S. theelöffelweise.  
(Wie bei No. 214.)

*Werlhoff.*

Nº. 216.

- Rv. Rad. Rub. tinct. 3jj.  
— Eryngii camp. 3vj.  
Concис. coq. c. Aq. f. s. q.  
per  $\frac{1}{2}$  hor. sub fin. coct. adde  
Rad. Salep. 3j.  
Col. express. 3xjj.  
adde  
Syr. Althaeae 3j.

M. D. S. Alle 2 Stunden zwei Esslöffel.

(In chronischen Fällen sehr wirksam.)

*Richter.*

Nº. 217.

- Rv. Rasur lign. Guajaci 3j.  
Stipit. Dulcamar.  
Flor. Arnicae  
Rad. Galami aromat.  
— Liquirit. ana 3β.  
Sem. Foeniculi 3jj.  
C. C. D. S. Als Abkochung zum Thee.  
(Wie bei No. 216.)

*Hecker.*

Nº. 218.

- Rv. Gummi Ammon. dep.  
Extr. Marrubii alb.  
Pulv. Rad. Senegae ana 3 $\beta$ .  
Sulph. aurat. antim.  
Calomel. ana 3j.  
M. f. l. a. Pil. pd. gr. jj.  
Consp. pulv. Lycopod. D.  
S. Zwei bis dreimal täglich 6 Pillen.

(Bei Catarrhus habitualis.)

v. Wedekind.

## D y s e n t e r i e.

Die Getränke richten sich nach dem Fieberzustande, und sind daher die bei den einzelnen Fieberarten angegebenen nachzusehen.

Nº. 219.

Ry. Natri nitrici ʒβ. — ʒj.

solve in

Aq. font. ʒvjjj.

adde

Gummi Tragacanth. ʒβ.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 — 3 Stunden einen Esslöffel.

(Besonders bei vorherrschend entzündlichem Zustande.)

Mayer. (v. Versen. Rademacher.)

Nº. 220.

Ry. Cerae flavae ʒjj.

Vitell. ov. No. III.

Aq. Menth. crisp. ʒvjjj.

Syr. Croci ʒβ.

Vitell. ov. c. cer. in mort. cal.

tunc adde Aq. et Syr. D.

S. Esslöffelweise.

Vogel.

Nº. 221.

Ry. Pulv. Gummi arab. ʒjj.

solve in

Aq. fervid. suff. qt.

adde

Cerae flav. calef. 3j.

admisce

Bals. peruv. gtt. XV.

Sacch. alb. 3β.

Syr. Papav. alb. 3β.

M. D. S. In drei Theilen mit Decoctum Althaeae  
(Chamomillae, Millefolii) zu nehmen.*Kämpf. (Vogel.)*

## Nº. 222.

Rx. Gummi arab. pulv. 3jj.

solve in mort. lap. in

Aq. ebull. q. s. admisce

Cerae flavae 3jj.

tere usque ad perf. mixt.

deinde adde

Syr. Papav. Rhoead. 3j.

Elix. acid. Dippelii q. s. ad gr. sap.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hoffmann. (Wedekind.)*

## Nº. 223.

Rx. Gummi arab. 3β.

Tr. Rhei aq.

Spir. Minderer. ana 3jj.

Syr. Papav. 3jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Bei Dysenteria catarrhalis.)

*Hecker.*

## Nº. 224.

Rx. Tr. Rhei aq.

— aurant. comp. ana 3jj.

— Valer. simpl. 3jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

Nº. 225.

- Ry. Aq. Chamomill.  $\frac{5}{3}$ V.  
Extr. Chamomill.  
Gummi arab. ana  $\frac{5}{3}$ jj.  
Syr. opiatii  $\frac{5}{3}\beta$ .

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

Nº. 226.

- Ry. Aq. flor. Acaciae (font.)  $\frac{5}{3}$ IV.  
Pulv. rad. Rhei elect.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
— — Ipecacuanhae gr. jj.  
Spec. Diatragacanth.  $\frac{3}{2}$ jj.  
Spir. Vitrioli acid. gtt. XX.  
Syr. Alth. (Papav.)  $\frac{5}{3}$ jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Vogler.*

Nº. 227.

- Ry. Ol. Amygdal. dulc.  $\frac{5}{3}$ jj.  
Mucilag. Gummi arab.  $\frac{5}{3}$ vj.  
Decoc. rad. Salep.  $\frac{5}{3}$ X.  
Opii puri gr. jj.

M. D. S. Alle Stunden zwei Esslöffel.

*Hecker.*

Nº. 228.

- Ry. Rad. Ipecacuanhae  
Opii thebaic. ana gr.  $\beta$ .  
Calomel.  
Sulph. stib. aurant. ana gr. j.  
Conch. praep.  $\frac{3}{2}\beta$ .

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

*Hecker.*

Nº. 229.

Rv. Opii puri

Calomel.

Rad. Ipecacuanh. ana gr. j.

Sacch. alb. gr. xjj.

M. f. Pulv. D. S. Auf einmal mit einer Tasse  
warmem Fliederblüthenthee Abends vor dem Schla-  
fengehn zu nehmen.

(Bei Neigung zum Nervösen mit Gr. j. Camphor.)

*Richter.*

Nº. 230.

Rv. Liq. Ammon. succ. 5jjj.

Opii puriss. gr. IV.

Extr. Hyoscyami gr. vjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich 30 Tropfen  
unter Wasser zu nehmen.

(Bei Neigung zum Nervösen.)

*Richter.*

Nº. 231.

Rv. Vini stib. 5jjj.

Tr. Opii simpl. 5j.

M. D. S. Viermal täglich 20 Tropfen.

(Wie bei No. 230.)

*Richter.*

Nº. 232.

Rv. Extr. Hyoscyami gr. X.

Liq. Ammon. succ. 5!β.

Aq. flor. Sambuci 5jj.

Syr. flor. Chamomill. 5β.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(In gelinden Fällen, bei gallicher Complication.)  
*Richter.*

## Nº. 233.

Ry. Aq. flor. Sambuci  $\frac{3}{2}$ vj.  
Mucilag. Gummi arab.  $\frac{3}{2}$ j.  
Extr. Nucis vomicae  $\frac{3}{2}\beta$ .  
Syr. Althaeae  $\frac{3}{2}$ j.

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel.

*Hufeland. (Berends.)*

## Nº. 234.

Ry. Emuls. communis  $\frac{3}{2}$ V.  
Gummi arab.  $\frac{3}{2}$ jj.  
Extr. Nucis vomicae  $\frac{3}{2}\beta$ .  
Syr. Papav. alb.  $\frac{3}{2}$ jj.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

*Hecker.*

## Nº. 235.

Ry. Extr. Nucis vomicae  $\frac{3}{2}$ j.  
Aq. Menth. pip.  $\frac{3}{2}$ V.

M. D. S. Alle 2 Stunden 1 — 2 Esslöffel.

*Horn.*

## Nº. 236.

Ry. Ol. Olivar. opt.  $\frac{3}{2}$ vj.  
Liq. Ammon. caust.  $\frac{3}{2}$ j.  
Tr. Opii simpl.  $\frac{3}{2}\beta$ .  
Camphor.  $\frac{3}{2}$ j.

M. D. S. Mit der flachen Hand auf den Unterleib einzureiben, oder mit einem Stück Flanell aufzulegen.

*Richter.*

## Nº. 237.

- R. Sevi cervin. (vel bovin.) rec.  $\frac{5}{3}\beta$ .  
 Butyr. rec. non salit.  $\frac{5}{3}jjj$ .  
 Apyli contriti  $\frac{5}{3}j$ .  
 Opii puri pulv.  $\frac{9}{3}\beta$ .  
 Leni calore liq. misc.  
 D. S. Eine Haselnuss gross in den After zu bringen.  
 (Gegen den Tenesmus.)

*Vogler.*

## Nº. 238.

- R. Lin. sap. camph.  $\frac{5}{3}jj$ .  
 Tr. thebaic.  $\frac{5}{3}jj$ .  
 M. D. S. Auf den Unterleib einzureiben.

*Vogel.*

## Nº. 239.

- R. Merc. subl. corros. gr.  $\frac{1}{6}$  —  $\frac{1}{3}$ .  
 Aq. destill.  $\frac{5}{3}j$ .  
 Mucilag. Gummi arab.  $\frac{5}{3}I\beta$ .  
 Opii puri pulv. gr. j.  
 M. D. ad vitrum. S. Ein Glas voll erwärmt als  
 Clystir zu gebrauchen.  
 (Bei heftigen, den gewöhnlichen Mitteln trotzenden Dysenterien und chronischen Diarrhoen.  
 — Die Mischung muss wegen Zersetzung des Sublimats und Veränderung desselben zu Calomel jedesmal frisch bereitet werden.)

*Kopp.*

## Acute Hautausschläge.

## Nº. 240.

- R. Stipit. Dulcamar.  
 Ligni Juniperi

Ligni Sassafras ana  $\tilde{\beta}j$ .

Rad. Liquirit.  $\tilde{\beta}\beta$ .

Fol. Sennae  $\tilde{\beta}jj$ .

C. C. D. S. Zwei Esslöffel in 3 Nöseln Wasser zu einer Ptisane zu kochen.

(In der Desquamatations - Periode.)

*Stark.*

Nº. 241.

Rv. Camphorae  $\tilde{\beta}j$  — jj.

Vitell. ov. No. II.

M. f. Lin. D. S. Zum Bestreichen der kranken Stellen, oder auch mit Aq. Rosarum oder Decocum Ghinae verdünnt, in Tüchern überzuschlagen.

(Gegen bösartige Blätter.)

*Hecker.*

Nº. 242.

Rv. Liq. Ammon. succ. gtt. XXX.

Moschi opt. gr. jjj.

Tr. Opii croc. gtt. XXI.

Syr. opiat.  $\tilde{\beta}I\beta$ .

M. D. S. Umgeschiüttelt zu einem kleinen Theelöffel.

(Bei einsinkenden Blättern zur Zeit der Eiterung.)

*Richter.*

Nº. 243.

Rv. Hydrarg. mur. corros. gr. jj.

Aq. Rosar.  $\tilde{\beta}IV$ .

M. D. S. Mit einem Pinsel zu bestreichen.

(Bei Blättern auf der Sclerotica oder Cornea ad locum affectum.)

*Hecker.*

## Nº. 244.

- R. Aq. flor. Sambuci  $\frac{2}{3}$  I $\beta$ .  
 Mel. rosat.  
 Syr. Moror. ana  $\frac{3}{4}$  I $\beta$ .  
 Succi Sempervivi maj. rec. express.  $\frac{3}{4}$  IV.  
 M. D. S. Mundwasser.  
 (Bei Blattern im Munde.)

*v. Stoerk.*

## Nº. 245.

- R. Moschi opt. gr. vj.  
 tere c.  
 Sacch. alb.  $\frac{3}{4}$ j.  
 Liq. Ammon. succ. gtt. XXX.  
 Tr. Opii crocat. gtt. XX.  
 Aq. flor. Sambuci  $\frac{3}{4}$ V.  
 Syr. Amygdal.  $\frac{3}{4}$ j.  
 M. D. S. Alle halbe bis ganze Stunden einen Esslöffel.

*Hufeland.*

## Nº. 246.

- R. Amygdal. dulc.  $\frac{3}{4}\beta$ .  
 f. c. Aq. fl. Sambuci  
 suff. qt. Emulsio.  
 adde  
 Extr. Hyoscyami gr. IV.  
 — Opii aq. gr. j.  
 M. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel.  
 (Gegen den Husten bei Masern.)

*Henke.*

## Nº. 247.

- R. Extr. Conii maculat.  
 Sulph. dep. ana gr. vjjj.

H 1

- Extr. Hyoscyami gr. jj.  
 Sacch. alb. gr. xjj.  
 M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.  
 D. S. Dreimal täglich ein Pulver.  
 (Wie bei No. 226.)

Richter.

## Nº. 248.

- Rx. Stibii sulphurati nigri  
 Lapid. Cancror. praep. ana ʒj.  
 Pulv. Rad. Jalappae ʒβ.  
 Sacch. alb. ʒIβ.  
 M. f. Pulv. Divide in partes XII. aeq.  
 D. S. Dreimal täglich ein Pulver.  
 (Wie bei No. 226.)

Wendt.

## Nº. 249.

- Rx. Flor. Benzoës gr. IV.  
 Camphorae gr. jj.  
 M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. VI.  
 D. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.  
 (Bei stockendem Auswurf, und Gefahr der Erstickung bei Masern.)

Hoffmann.

## Nº. 250.

- Rx. Theriac. ʒjj.  
 Ol. Rorismarini express. ʒβ.  
 — Cumini destill. gtt.  
 M. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.  
 (Bei eintretenden Kolikschmerzen mit Durchfall, bei Masern. Zugleich Umschläge mit Chamillenblumen.)

v. Rosenstein.

## Nº. 251.

- R. Aq. destill.  $\frac{3}{2}jj.$   
 Merc. subl. corros. gr.  $\beta.$   
 Mucilag. G. arab.  $\frac{3}{2}j.$

M. D. S. Augenwasser.  
 (Gegen Ophthalmie und Photophobie bei Masern.)  
*Henke.*

## Nº. 252.

- R. Extr. Belladonnae  
 e succo rec. et leni igne parat. gr. jjj.  
 Aq. Cinnamomi  $\frac{3}{2}j.$   
 M. D. S. Kinder von 1 Jahr dreimal täglich 3 Tropfen, mit jedem Jahr des Alters um einen Tropfen steigend. In höchster Dosis zu 12 Tropfen.  
 (Als Praeservativ gegen Scharlach.)  
*Hufeland.*

## Nº. 253.

- R. Rad. Ipecacuanhae contus.  $\frac{3}{2}\beta.$   
 inf. Aq. ferv. q. s.  
 Col.  $\frac{3}{2}\beta.$  adde  
 Syr. Rubi Idaeи  $\frac{3}{2}j.$   
 M. D. S. Zarten Kindern stündlich einen Theelöffel, grössern zu 2 Theelöffeln.  
 (Im Anfange des Scharlachs. Soll der Krankheit einen gutartigen Charakter verleihen.)  
*Schlesinger.*

## Nº. 254.

- R. Acid. mur. oxygenat.  $\frac{3}{2}jj.$   
 Aq. Rubi Idaeи  $\frac{3}{2}\beta.$   
 Muc. Sem. Cydon.  
 Syr. Althaeae ana  $\frac{3}{2}vj.$   
 M. D. S. Alle halbe bis ganze Stunden 1 —  $1\frac{1}{2}$  Thee-

löffel für Kinder von 3 — 5 Jahren. Bei ältern Kindern in stärkerer Dosis.  
(Gegen Scharlachfieber.)

*Kopp.*

Nº. 255.

Rv. Pulv. Fol. Sabinae 3vj. — 3j.

Ebull. c. Aq. ft. q. s.

Col. refrig. 3vj. adde

Merc. subl. corros. gr. j.

M. D. S. Alle Stunden damit zu gurgeln und nachher auszuspeien.

(Gegen Angina gangraenosa beim Scharlach.)

(s. auch No. 232.)

*Kopp.*

Nº. 256.

Rv. Pulv. Cort. Chinae 3β.

Coq. c.

Aq. font. 3xjj. ad rem. 3vj.

in fin. coct. adde

Rad. Polygal. Seneg. 3jj.

Hb. Digital. purp. 3j.

Col. adde

Spir. Nitr. aeth. 3jj.

Roob Juniperi

Syr. Cort. Aurant. ana 3β.

M. D. S. Alle 1 — 2 Stunden einen Theelöffel bis Esslöffel voll.

(Gegen hydropische Affectionen nach Scarlatina.)

*Richter.*

Nº. 257.

Rv. Hb. Digital. 3jj — IV.

inf. Aq. ferv. suff. qt.

Col. 3vj. adde

Spir. Minderer.  $\frac{3}{2}\beta$ .

Syr. Cort. Aurant.  $\frac{3}{2}j$ .

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

(Wie bei No. 255. und besonders empfehlenswerth.)

*Bluff.*

---

Nº. 258.

Rx. Sulph. praecip. gr. vj.

Rad. Squill. gr. jj.

Cort. Winter. gr. vjj.

Sacch. alb.  $\frac{3}{2}j$ .

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. VI.

D. S. Drei Pulver täglich.

(Wie bei No. 256)

*Richter.*

---

Nº. 259.

Rx. Ol. Tereb.  $\frac{3}{2}j$ .

Tr. Opii simpl. gtt. XV.

M. D. S. Umgeschüttelt dreimal täglich nach dem Alter 1 — 3 Tropfen auf Brod.

(Wie bei No. 256.)

*Richter.*

---

Nº. 260.

Rx. Vini stib.  $\frac{3}{2}jj$ .

Tr. Cantharid.  $\frac{3}{2}\beta$ .

M. D. S. Viermal täglich 15 — 20 Tropfen.

(Wie bei No. 256.)

*Hufeland. (Bucholz.)*

---

Nº. 261.

Rx. Cantharid.  $\frac{3}{2}j$ .

Amygdal. dulc. exort.  $\frac{3}{2}\beta$ .

contund. exactiss. adde sensim

Aq. Calcis  $\frac{3}{2}X$ .

Sacch. alb.  $\frac{3}{2}\beta$ .

Col. sine express. D.

S. Alle 2 — 3 Stunden einen halben bis einen Esslöffel.  
(Wie bei No. 256.)

Berends.

Nº. 262.

Ry. Syr. de Cichor. c. Rheo ᷂vjjβ.

Tr. Rhei aquos. ᷂β.

Aq. Foeniculi ᷂j.

Lap. Cancr. praep. ᷃jj.

Croci oriental. gr. IV.

M. D. S. Umgeschüttelt alle halbe bis ganze Stunden einen Thzelöffel voll, bis das Kind ruhig wird.

(Gegen Aphthen von Magensäure.)

Richter.

Nº. 263.

Ry. Extr. Chinae frig. parat. ᷃jj.

solve in

Aq. flor. Tiliae ᷃jjj.

adde

Spir. muriat. aeth. ᷂β.

Syr. Cort. Citri ᷂j.

M. D. S. Alle Stunden zwei Theelöffel.

(Gegen bösartige brandige Aphthen.)

Lentin. (Wendt.)

Nº. 264.

Ry. Zinci sulph. crystall. ᷃β.

Aq. Rosar. ᷂V.

Syr. Moror. ᷂lβ.

M. D. S. Zum Pinseln.

(Gegen Aphthen.)

Berends.

## Nº. 265.

Rv. Boracis venet. 3jj. — 3j.

solve in

Aq. Rosarum 3jj.

adde

Mellis rosati 3Iβ.

M. D. S. Zum Pinseln.

(Wie bei No. 264.)

Vogel.

## Nº. 266.

Rv. Hb. Salviae 3jj.

inf. c.

Aq. font. q. s. ad

Col. 3jj. adde

Syr. nigri domest. 3j.

M. D. S. Zum Bepinseln, und um ein Leinwand-Läppchen damit zu befeuchten und aufzulegen,

(Wie bei No. 264. Auch gegen wunde Brustwarzen.)

Kluge.

## Nº. 267.

Rv. Cort. Ulmi inter. 3IV.

Coq. ex Aq. ft. q. s.

Col. & Iβ. adde

Syr. Rubi Idaeи

— Moror. ana 3Iβ.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Wie bei No. 264. und 266.)

Fuller.

## Nº. 268.

Rv. Vitrioli albi 3β.

solve in

Aq. font. 3vj.

adde

Mellis Rosar. 3j.

M. D. S. Gurgelwasser.  
(Wie bei No. 264.)

*Sproegel.*

Nº. 269.

Rx. Merc. subl. corros. gr. IV.  
Aq. destill.  $\frac{2}{3}$  j.

M. D. S. Zum Ausspülen und Gurgeln.  
(Wie bei No. 264.)

*v. Wedekind.*

Nº. 270.

Rx. Aq. Calcis vivae  $\frac{5}{3}\beta$ .  
Syr. bals.

Gummi arab. ana  $\frac{5}{3}jj$ .  
M. D. S. Zum Bepinseln.  
(Wie bei No. 264.)

*Weikard.*

Nº. 271.

Rx. Terrae Catechu  $\frac{5}{3}jj$ .  
Coq. in Aq. Calcis vivae  $\frac{2}{3}$  j.

Col.  $\frac{5}{3}X$ . adde

Sacch. Saturn.  $\frac{2}{3}j$ .

Mell. rosat.  $\frac{5}{3}jj$ .

M. D. S. Gurgelwasser.

(Wie bei No. 264. Doch nur bei Erwachsenen,  
wo keine Gefahr ist, dass beim Gurgeln etwas  
heruntergeschlungen wird, anwendbar.)

*Weikard.*

Nº. 272.

Rx. Pulv. Cort. Chin.  $\frac{5}{3}j$ .

Coq. cum

Aq. font.  $\frac{2}{3}$  j. ad Col.  $\frac{5}{3}vj$ .  
adde

Acid. sulph. (muriat.) dilut. 3jj.

Mell. Rosar.

Liq. Myrrhae ana 3j.

M. D. S. Gurgelwasser.

(Wie bei No. 264. Besonders bei Gefahr von Uebergang in Brand.)

*Richter.*

Nº. 273.

Rv. Extr. Digital. purp. gr. jj — vj.

Calomel. gr. j.

Opii puriss. gr. β.

Sacch. alb. gr. XV.

M. f. Pulv. Dispens. tal. Dos. No. XII.

D. S. Alle drei Tage ein Pulver zu nehmen.

(Gegen Pemphigus.)

*Richter.*

Nº. 274.

Rv. Stib. sulph. nigr.

Pulv. Stipit. Dulcamar. ana 3j.

Extr. Trifol. aquat. 3jj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

D. S. Dreimal täglich zehn Pillen.

(Wie bei No. 273.)

*Richter.*

Nº. 275.

Rv. Calomel.

Sulph. stib. aurant. ana gr. jj.

Stipit. Dulcamar.

Sacch. alb. ana gr. XV.

M. f. Pulv. Disp. tal. Dos. No. XII.

D. S. Morgens und Abends ein Pulver.

(Wie bei No. 273.)

*Richter.*