

Pulverformeln.

Zum innerlichen Gebrauch.

Schwächende und temperirende
Mittel.

Rec. Kali nitrici depurati, ℥j — ℥ij.

Gummi mimosae,

Sacchari albi. singul. ℥℞.

*Misce, fiat pulv. Divide in sex partes
aequales. Signa. Zweystündlich ein
Pulver zu nehmen. (Berends.)*

Rec. Kali sulphurici,

Tartari depurati, singul. ℥ij.

Magnesiae carbonicae, ℥j.

Sacchari albi, ℥iij.

*M. f. pulv. Detur in scatula. S. Drey-
stündlich einen Theelöffel voll.*

Rec. Kali nitrici depurati,
Kali sulphurici,
Concharum praeparatarum, singu-
lor. ℥iij.

M. f. pulv. S. Zu halben und ganzen
 Theelöffeln zwey, oder dreystündlich.
 (Unzer.)

Rec. Magnesiae carbonicae, ℥ij.
Tartari depurati, ℥j.

M. f. pulv. S. Theelöffelweise, zwey-,
 dreystündlich.

Rec. Acidi tartarici, ℥iβ.
Gummi mimosae, ℥ij.
Sacchari albi, ℥j.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Thee-
 löffel voll in Wasser.

Rec. Acidi tartarici, ℥ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥iij.
Sacchari albi, ℥iij.

M. f. pulvis. S. Limonadenpulver, im
 Trinkwasser bis zur angenehmen Säure.
 (Berends.)

Anflösende und Digestivmittel.

Rec. Natri acetici, ℥ij — ℥β.
Magnesiae carbonicae, ℥j.
Sacchari albi, ℥vj.

M. f. pulv. S. Täglich drey- bis vier-
 mal einen Theelöffel voll.

Rec. Magnesiae carbonicae, ℥ij.
Elaeosacchari foeniculi, ℥iij.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll.

Rec. Natri carbonici sicci, ʒiʒ.
Elaeosacchari flavedinis citri, ʒij.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll. (Berends.)

Rec. Natri carbonici sicci, ʒij.
Tartari depurati, ʒvj.
Sacchari albi, ʒiij.

M. f. pulv. S. Theelöffelweise in Wasser. (Vogler.)

Rec. Natri carbonici aciduli, gr. viij.
Acidi tartari, gr. v.
Sacchari albi, gr. x.

M. f. pulv.; dent. tal. dos. vj. Signa.
 Stündlich oder zweystündlich ein Pulver unter dem Aufbrausen zu nehmen.
 (Berends.)

Rec. Magnësiæ carbonici,
Acidi tartarici, singul. ʒj.
Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv.; divide in sex partes æquales; s. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver mit Wasser zu nehmen.
 (Hufeland's Brausepulver.)

Rec. Saponis medicati, ʒj.
Magnësiæ carbonicæ, ʒiʒ.
Radicis rhei optimi, ʒʒ.
Elaeosacchari foeniculi, ʒiij.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
mal täglich einen Theelöffel voll.
(Berends.)

Rec. Kali tartarici, ℥iij.
Radicis rhei, ℥j.
Sulphuris praecipitati, ℥ij.
Corticum aurantiorum,
Magnesiae carbonicae, singul. ℥i℔.
Elaeosacchari foeniculi, ℥iij.

M. f. pulv. S. Drey- bis dreymal täg-
lich einen Theelöffel voll.
(Klein's *Solamen hypochondriac.*)

Rec. Magnesiae carbonicae,
Tartari depurati,
Radicis rhei,
Florum chamomillae,
Elaeosacchari foeniculi,
Sulphuris depurati, singul. ℥ij.

M. f. pulv. S. Zwey- bis dreymal täg-
lich einen Theelöffel voll.
(Selle's *pulvis ephracticus.*)

Rec. Magnesiae carbonicae, ℥iij.
Corticum aurantiorum, ℥℔.
Seminis foeniculi,
Sacchari albi, singulor. ℥j.

M. f. pulv. S. Drey- bis dreymal täg-
lich einen Theelöffel voll.
(Hufeland's milchvermehrendes Pulv.)

Rec. Ammonii muriatici depurati,
Pulveris radicis glycyrrhizae, sin-
gul. ℥iij.

M. f. pulv. Divide in ix part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Drey-
 stündlich ein Pulver mit Haferschleim.
 (Büttner's Pulver gegen chronische
 Schleimflüsse, gegen Verdickungen der
 Schleimhäute, besonders in den Harn-
 werkzeugen.)

Rec. Ammonii muriatici depurati, ʒij.
Camphorae, gr. vj.
Florum arnicae, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
 bis viermal täglich einen Theelöffel voll
 zu nehmen. (Von Berends als *expe-*
ctorans u. *emmenagogum* empfohlen.)

Rec. Sulphuris depurati, ʒij.
Tartari depurati, ʒvj.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
 Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris depurati, ʒij.
Seminis foeniculi,
Sacchari albi, singulor. ʒiij.

M. f. pulv. S. Viermal täglich einen
 Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris praecipitati, ʒj — ʒiß.
Magnesiae carbonicae, ʒij.
Elaeosacchari menthae crispae, ʒiij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
 halben bis ganzen Theelöffel voll.

(Berends.)

Rec. Magnesiae sulphuratae, ℥j.
Acidi tartarici, ℥ij.
Sacchari albi, ℥iv.
M. f. pulv. Divid. in xij part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Alle 3
 Stunden ein Pulver unter dem Aufbrausen
 zu nehmen. (Diese Hydrothionbrause-
 pulver werden gegen übermäßige Mer-
 kurialsalivation gerühmt.)

Alterirend-auflösende Mittel.

Rec. Hydrargyri puri, ℥ij.
Sacchari albi, ℥℔.
Terantur exactissime usque ad mercu-
rii perfectam extinctionem. Divide
in xviii part. aequal. S. Ein halbes
 Pulver zwey- bis dreymal täglich.
 (Lagneau.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr.
 vj — xxiv.

Sacchari albi, ℥j.
M. f. pulv.; divid. in xij part. aequal.
S. Zwey- oder dreystündlich; auch
 Morgens und Abends ein Pulver.

Rec. Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci, sin-
gul. gr. vj.
Sacchari albi, ℥℔.

Conterantur sedulo per tres circiter
horas. Divid. in sex part. aequal.
S. Drey- bis vierstündlich ein Pulver.
 (Plummer.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,
grana duo (gr. ij).

Stibii sulphurati nigri, ℥viij.

Sacchari albi, ℥ij.

Conterantur exactissime. Divid. in se-
decim (xvj) part. aequal. S. Mor-
 gens und Abends ein Pulver. (Bey der
 jedesmaligen Wiederholung werden der
 ganzen Formel zwey Gran rothes Queck-
 silberoxyd hinzugesetzt, bis die ganze
 Formel zehn Gran desselben enthält.
 Alsdann wird die Gabe wiederum in der-
 selben Art vermindert. Von Berg gegen
 hartnäckige eingewurzelte Syphilis.)

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri, ℥℥
 — *℥i℥.*

Magnesiae carbonicae,
Sacchari albi, singul. ℥v.

M. f. pulv.; divid. in x part. aequal.
 S. Dreymal täglich ein Pulver.

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati,
℥i℥.

Lapidum cancrorum praeparato-
rum, ℥ij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥vj.

M. f. pulv. S. Zwey- bis dreymal täg-
 lich einen Theelöffel voll.

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati,
gr. xxiv.

Natri carbonici sicci, gr. xviiij.

Corticis ligni sassafras,

Sacchari albi, singulor. ℥j.

- M. f. pulv.; divid. in vj part. aequal.*
S. Zweymal täglich ein Pulver. (Ich habe dieses Mittel oft in chronischen Hautkrankheiten mit Nutzen gebraucht.)
- Rec. Stibii sulphurati nigri,*
Magnesiae carbonicae, singul. ʒij.
Sulphuris depurati, ʒvj.
- M. f. pulv. Divid. in xxx part. aequal.*
S. Dreymal täglich ein Pulver.
 (Quarin.)
- Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒʒ.*
Magnesiae carbonicae, ʒj.
Cinnamomi, ʒʒ.
Sacchari albi, ʒv.
- M. f. pulv. S.* Ein- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Vogler.)
- Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,*
gr. iij — xij.
Sacchari albi,
Magnesiae carbonicae, singul. ʒʒ.
- M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.*
S. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver zu nehmen.
- Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,*
Kali sulphurici,
Concharum praeparatarum, sing.
ʒʒ.
- M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.*
S. In der fieberfreyen Zeit dreystündlich ein Pulver.
 (Unzer, gegen das Wechselfieber.)

*Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, gr. vj.
Ammonii muriatici depurati,*

*Pulveris radices glycyrrhizae, sin-
gul. ℥℥.*

M. f. pulv. Digid. in tres part. aequal.

S. Vierstündlich ein Pulver zu nehmen.

(Burdach.)

Pulver gegen den Kropf (*struma*).

Anmerkung. Diese Pulver dürfen nicht zu anhaltend angewendet werden; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß sich unter solchen Umständen, m. großem Nachtheil, beträchtliche Massen der Schwammkohle in den ersten Wegen anhäufen.

Rec. Carbonis spongiae marinae, ℥℥.

Magnesiae carbonicae,

Kali nitrici depurati,

Sacchari albi, singul. ℥ij.

*M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
Theelöffel voll.*

(Clarus.)

*Rec. Herbae digitalis purpureae, gra-
na quatuor — octo (gr. iv
— viij).*

Carbonis spongiae, ℥℥.

Elaeosacchari foeniculi, ℥ij.

M. f. pulv. Divide in xij part. aequal.

S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

(Rust.)

Rec. Carbonis spongiae,

Kali tartarici,

Sacchari albi, singul. ℥℥.

1.

Ammonii muriatici depurati,
Radicis imperatoriae,
Corticis cinnamomi, singul. ʒij.
Sulphuris stibiati aurantiaci, ʒj.
Piperis longi, ʒj.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich einen
 Theelöffel voll. (Hedenus.)

Rec. Carbonis spongiae,
Stibii sulphurati nigri,
Sulphuris depurati,
Herbae conii maculati,
Concharum praeparatarum, sing.

M. f. pulv. S. Früh und Abends einen
 mälsigen Theelöffel voll. (Kortum.)

* * *

Rec. Herbae jaceae s. violae tricoloris,
Sacchari lactis, singul. ʒijj.
Sulphuris praecipitati,
Magnesia carbonicae, singul. ʒß.

M. f. pulv. Signa. Zweystündlich einen
 Theelöffel voll,
 (Jahn, gegen Hautausschläge.)

Erregend-reizend auflösende
 Mittel.

Rec. Resinae guajaci nativae, ʒij.
Tartari depurati, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täglich
 einen Theelöffel. (Berends.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. ij.

Resinae guajaci nativae, ℥j.

Radicis glycyrrhizae, ℥iij.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

(Burdach.)

Rec. Resinae guajaci nativae, ℥ij.

Sulphuris depurati,

Tartari depurati, singul. ℥ß.

Olei foeniculi, gtt. vj.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll.

(Burdach.)

Rec. Resinae guajaci nativae,

Ferri pulverati, singul. ℥ß.

Concharum praeparatarum, ℥ß.

Sacchari albi, ℥iij.

M. f. pulv. Signa. Zweymal täglich eine Messerspitze oder einen Theelöffel voll.

(Goelis, gegen die Skrofelkrankheit.)

Rec. Radicum senegae, ℥ß.

Kali tartarici, ℥vj.

Magnesiae carbonicae, ℥ij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll.

(Von Schmalz in Pirna

gegen *pannus oculi* empfohlen, aber

auch sonst ein treffliches, reizend-auflö-

sendes Mittel.)

Rec. Radicum senegae,

Ammonii muriatici depurati, singul.

℥ij.

Gummi mimosae, ℥iij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥ß.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
mal täglich einen Theelöffel voll. (Diese
Verbindung habe ich oft mit grossem
Nutzen gegen sogenannte Verschleimun-
gen, besonders der Brust; auch als Em-
menagogum angewendet.)

Brechererregende Mittel.

Rec. Radicum ipecacuanhae,
Elaeosacchari foeniculi, sing. ℥ij.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Alle 10 — 12 Minuten ein Pulver
bis zur Wirkung. (Erregt leicht und si-
cher Erbrechen.)

Rec. Radicis ipecacuanhae,
Sacchari albi, singul. gr. xv.
Sulphuris stibiati aurantiaci, gr. v.

M. f. pulv. Divide in iv part. aequal.
S. Alle Viertelstunden ein Pulver.
(Reil.)

Rec. Radicum ipecacuanhae, ℥j.
Tartari stibiati, gr. ij.
Sacchari albi, ℥ij.

M. f. pulv. Divid. in iiij part. aequal.
S. Alle Viertelstunden ein Pulver bis
zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Radicis ipecacuanhae, ℥ß.
Zinci oxydati albi, gr. xij.
Elaeosacchari flavedinis citri, ℥j.

M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.
S. Alle zehn Minuten ein Pulver, bis

Erbrechen erfolgt. (Bey sensiblen, zu Krämpfen geneigten Individuen.)

Abführende und purgirende Mittel.

Rec. Natri sulphurici siccati, ℥j.

Tartari depurati, ℥℞.

Sacchari albi, ℥vj.

M. f. pulv. S. Einen bis zwey Theelöffel zweyständlich. (Berends.)

Rec. Magnesia sulphuricae, ℥i℞.

— *carbonicae, ℥iij.*

M. f. pulv. S. Wie das Vorige. (Berends.)

Rec. Tartari natronati, ℥j.

Natri carbonici aciduli, ℥ij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥℞.

M. f. pulv. S. Stündlich einen reichlichen Theelöffel voll bis zur Wirkung. (Ein mildes und sicheres Abführmittel.)

Rec. Radicis rhei optimi, ℥℞.

Natri sulphurici sicci, ℥ij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥j.

M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen, und Kamillenthee nachzutrinken.

(Burdach.)

Rec. Tartari natronati, ℥iij.

Foliorum sennae, ℥i℞.

Radicum rhei, ℥℞.

Elaeosacchari foeniculi, ℥ij.

M. f. pulv. S. Zweyständlich einen Theelöffel. (Burdach.)

- Rec. Radicis jalappae pulveratae, ℥j.*
Natri sulphurici siccati, ℥i℥.
Olei foeniculi, gtt. j.
M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen
 und Fleischbrühe nachzutrinken.
- Rec. Natri phosphorici, ℥j.*
Elaeosacchari macidis, ℥ij.
M. f. pulv. S. Auf zweymal in Fleisch-
 brühe. (Ein, dem Geschmacke sehr an-
 genehmes, nicht schwächendes Abführ-
 mittel.)
- Rec. Radicis jalappae,*
Tartari depurati,
Elaeosacchari flavedinis citri, sin-
gul. ℥j.
M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen.
 (Burdach.)
- Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. iij.*
Radicis jalappae, ℥j.
M. f. pulv. S. Auf einmal.
 (Gonsbruch.)
- Rec. Tartari depurati, ℥℥.*
Corticis peruviani regii, ℥ij.
Radicis rhei, ℥℥.
Elaeosacchari menthae crispae, ℥iij.
M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
 mal täglich einen Theelöffel.
 (Berends.)
- Rec. Radicis rhei,*
 — *calami aromatici, singul.*
℥i℥.

Corticis peruviani regii, ℥iij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥ij.

M. f. pulv. Det. in vitro. S. Wie das
Vorige. (Berends.)

Anmerk. Wenn abführende Mittel
mit erregenden oder tonischen verbunden
werden, so wirken sie schon in kleinen Gaben
und schwächen nicht.

Rec. Radicis rhei,

Scammonei, singul. ℥j.

Elaeosacchari anisi, ℥℔.

M. f. pulv.: divid. in tres part. aequal.

S. Ein Pulver auf einmal.

(Burdach.)

Rec. Resinae jalappae, gr. iij — vj.

*Amygdalarum dulcium, cortice
liberatarum,*

Sacchari albi, singul. ℥j.

Olei de cedro, gtt. j.

Conterantur exactissime. S. Auf einmal
in warmem Wasser. (Nicolai.)

Diuretische Mittel.

Rec. Herbae digitalis purpureae, gr. vj.

Radicis calami aromatici,

Sacchari albi,

Gummi mimosae, singul. ℥℔.

M. f. pulv.; divid. in sex part. aequal.

S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

(Consbruch.)

Rec. Radicum squillae, gr. vj.

— *zingiberis, gr. xij.*

Kali nitrici,
Tartari vitriolati, singul. ʒj.
M. f. pulv.; divid. in sex part, aequal.
S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

Diaphoretische Mittel.

Rec. Radicum ipecacuanhae,
Opüi crudi, singulor. gr. iij.
Kali sulphurici,
Sacchari albi, singul. ʒß.

M. f. pulv.; divid. in sex part. aequal.
S. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver.
 (Dover.)

Rec. Opüi crudi, gr. iij.
Camphorae, gr. vj.
Kali nitrici, ʒß.

M. f. pulv.; divide in sex part. aequal.
S. Abends ein Pulver mit Fliederthee.
 (v. Gräfe.)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Florum tanaceti,
Seminis santonici, singul. ʒj.
Ferri sulphurici crystallini, ʒij.
Olei valerianae, gtt. x.

M. f. pulv. Divid. in x part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Mor-
gens und Abends ein Pulver.
 (Rosenstein.)

Rec. Seminis santonici, ʒj.
Stanni limati, ʒij.
Sacchari, ʒj.

M. f. pulvis. Divide in quatuor part. aequal. S. Früh und Abends ein Pulver zu nehmen. (Fordyce.)

Rec. Ferri sulphurici crystallin., gr. xxiv. Seminis santonici, ℥j.

Radicis jalappae,

Sacchari albi, singul. ℥ij.

M. f. pulv.; div. in xij part. aequ. S. Früh und Abends ein Pulver.

(Consbruch.)

Besänftigende und krampfstillende Mittel.

Rec. Extracti opii aquosi, gr. ij.

Acidi succinici, gr. xxv.

Sacchari albi, ℥j.

M. f. pulv.; divide in sex part. aequal. Dentur in charta cerata. S. Alle 3 Stunden ein Pulver. (Ungnad.)

Rec. Extracti hyoscyami,

Zinci oxydati albi, singular. ℥ß.

Magnesia carbonicae, ℥ß.

Sacchari lactis, ℥iß.

M. f. pulv. Divid. in decem part. aequal. S. Dreystündlich ein Pulver zu nehmen. (Vogler.)

Rec. Secalis cornuti, ℥ij.

Opium crudi, gr. ij.

M. f. pulvis; divid. in duodecim part. aequal. S. Zweystündlich ein Pulver, bis kräftige Wehen eintreten.

(Atlee.)

- Rec. Radicis belladonnae*, gr. iij.
 — *ipecacuanh.*, gr. ij.
Zinci oxydati albi, gr. vj.
Sacchari albi, ʒj.
- M. f. pulvis; divid. in vj part. aequal.*
S. Zweystündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Gegen nervöse Epilepsie v. Berends.)
- Rec. Bismuthi nitrici praecipitati*,
 gr. xxiv.
Extracti lactucae virosae, gr. xvijj.
Radicis ipecacuanhae, gr. vj.
Magnesia carbonicae, ʒß.
Elaeosacchari menthae crispae, ʒij.
- M. f. pulv. Divid. in duodecim part. aequales.* *S.* Drey- bis viermal täglich ein Pulver in Wasser oder Kümmelthee zu nehmen. (Burdach, gegen Magenkrampf nervösen Charakters.)
- Rec. Radicis valerianae minoris*, ʒj.
Zinci oxydati albi, gr. vj.
Cupri sulphurico-ammoniati,
 gr. iß — gr. vj.
Sacchari albi, ʒj.
- M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.*
S. Dreystündlich ein Pulver.
- Rec. Opii crudi*, gr. iij.
Ammonii carbonici sicci, ʒß.
Elaeosacchari menthae crispae, ʒj.
- M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.*
S. Dreystündlich ein Pulver.
 (Formey.)

Erregende Mittel.

- Rec. Moschi genuini*, gr. viij.
Ammonii carbonici pyro-oleosi, ℥℞.
Elaeosacchari valerianae, ℥j.
- M. f. pulv. Digid. in vj part. aequal.*
Dentur in charta cerata. S. Zwey-
 stündlich ein Pulver. (Berends.)
- Rec. Radicis valerianae minoris*, ℥℞.
Magnesiae carbonicae,
Ammonii muriatici depurati,
sing. gr. xxiv.
Olei cajeput, gtt. xxxij.
- M. f. pulv.; detur in vitro, subere clau-*
so. S. Drey mal täglich einen Theelöf-
 fel voll. (Nachahmung des Ragolo-
 schen Mittels gegen Epilepsie.)
- Rec. Camphorae*, gr. xvj.
Sulphuris depurati, ℥℞.
Elaeosacchari anisi, ℥ij.
- M. f. pulv. Digid. in octo part. aequal.*
Dentur in charta cerata. S. Drey-
 mal täglich ein Pulver.
 (S. G. Vogel.)
- Rec. Seminis phellandrii aquatici*,
Sacchari lactis, singul. ℥ij.
- M. f. pulv.; divide in vj part. aequal.*
S. Drey stündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Hufeland.)
- Rec. Castorei sibirici*, gr. xvij.
Natri carbonici depurati, ℥℞.
Elaeosacchari menthae crispae, ℥j.

M. f. pulv. Divide in vj part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Drey-
 stündlich ein Pulver. (In asthenischen
 Krämpfen.)

Rec. Ammonii carbonici pyro-oleosi,
 ʒß.

Hydrargyri muriatici mitis,
 gr. xij.

Sibii sulphurati rubri,
Opii crudi, singul. gr. iij.
Sacchari, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Drey- bis vierstündlich ein Pulver.
 (Kraft, gegen Lungenlähmung.)

Rec. Opii crudi,
Radicis ipecacuanhae, sing. gr. vj.
Natri carbonici sicci, ʒj.

M. f. pulv.; divid. in sex part. aequal.
S. Achtstündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Thompson gegen Asthma krampfhaft-
 en Charakters.)

Rec. Acidi benzoici, ʒß.
Camphorae,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
singul. gr. vj.

Elacosacchari foeniculi, ʒj.
M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Berend
 gegen Lungenlähmung.)

Rec. Radicum pyrethri, ʒß — ʒ ij.
Elacosacchari menthae, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

(Burdach.)

Stärkende Mittel.

Rec. Corticis ligni quassiae, ʒj.

Magnesiae carbonicae, ʒiij.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.

S. Zweymal täglich ein Pulver. (Tode gegen Magenkrampf.)

Rec. Lupulini, ʒj.

Sacchari albi, ʒiij.

Tere exactissime, saccharum sensim addendo. Signa. Dreymal täglich eine reichliche Messerspitze voll. (Magenstärkend. Magendie.)

Rec. Radicis rhei,

Magnesiae carbonicae,

Boli armenae, singul. ʒj.

M. f. pulv. Divide in xij part. aequal.

S. Dreymal täglich ein Pulver. (v. Hildenbrand in Pisa, gegen atonische Metrorrhagie.)

Rec. Radicis rhei, ʒj.

Boli armenae,

Magnesiae carbonicae,

Elaeosacchari macidis, sing. ʒiij.

M. f. pulv. Det. in vitro. S. Zweymal

täglich einen Theelöffel voll. (Rust, gegen habituelle Metrorrhagie.)

Rec. Pulveris radicis columbo, ʒiij.

Elaeosacchari macidis, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Vierstündlich ein Pulver. (P. Frank,
 gegen atonische Diarrhöe.)

Rec. Radicum valerianae minoris, ʒij.
Foliorum aurantii, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal einen
 Theelöffel in Wein. (Berends.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒij.
Sacchari lactis, ʒj.
Natri acetici,

Elaeosacchari foeniculi, sing. ʒij.

M. f. pulv. S. Drey mal täglich einen
 Theelöffel voll. (Diese Verbindung ha-
 be ich oft mit Nutzen bey Atonie der
 Abdominalorgane gebraucht.)

Rec. Corticis peruciani regii, ʒvj.
Elaeosacchari flavedinis aurantio-
rum, ʒiij.

Tincturae opii crocatae, gtt. xxiv.

M. f. pulv. Divid. in duodecim part.
aequal. S. In der Apyrexie zwey-
 stündlich ein Pulver. (Berends, gegen
 einfach nervöse Wechselfieber.)

Rec. Chininii s. cinchonii sulphurici,
gr. xij — xxx.

Natri acetici,
Sacchari albi, singul. ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. In der Apyrexie alle zwey Stunden
 ein Pulver.

Rec. Ferri pulverati, ʒj.
Lapidum cancrorum, ʒß.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täglich
 einen Theelöffel voll. (Goelis, gegen
 Rhachitis.)

Rec. Ferri pulverati, ʒj.
Corticis cinnamomi,
Sacchari albi, singul. ʒv.

M. f. pulv. Divid. in x part. aequal.
S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

Adstringirende Mittel.

Rec. Aluminis crudi, ʒj.
Gummi arabici, ʒß.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Dreystündlich ein Pulver. (P. Frank,
 gegen atonische Blutflüsse.)

Rec. Opü crudi, gr. iv.
Corticis cinnamomi, ʒj.
Aluminis, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Vierstündlich ein Pulver. (Jahn,
 gegen atonische Metrorrhagien.)

Rec. Kino, ʒß.
Opü crudi, gr. ij.
Elaeosacchari cinnamomi, ʒj.

M. f. pulvis; divid. in vj part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Gegen
 asthenische Blutflüsse habe ich dieses
 Pulver oft mit Erfolg angewendet.)

Rec. Plumbi acetici, gr. iij — xij.
Extracti opii aquosi, gr. iß.
Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Zwey - bis dreymal täglich ein Pulver. (Berends.)

Rec. Plumbi acetici, gr. j.
Extracti opii aquosi, gr. ij.
 — *myrrhae, gr. iv.*

Gummi mimosae,
Sacchari lactis, singul. ʒij.
M. f. pulv. Divid. in viij part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Marcus, gegen Lungenschwindsucht.)

Pulver zum äußerlichen Gebrauch.

Rec. Zinci oxydati albi, ʒj.
Seminis lycopodii, ʒj

M. f. pulv. S. Zum Einstreuen. (Berends, gegen das Wundseyn der Kinder.)

Rec. Boracis, ʒj.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich in die Brustwarze einzustreuen, und dann alsbald das Kind anzulegen. (Kluge, gegen Schwämmchen.)

Rec. Gummi mimosae,
Colophonii, singul. ʒß.

M. f.

M. f. pulv. subtilissimus. S. Streupulver gegen den Vorfall des Mastdarms.
(Klein.)

Rec. Kino, ʒß.

Gunni mimosae, ʒj.

M. f. pulv. S. Zum Einstreuen. (Lentin's styptisches Pulver, in Blatgewunden.)

Rec. Extracti, aëre exsiccati belladonnae,

Extracti, aëre exsiccati hyoscyami,

Opii crudi, singul. ʒj.

M. f. pulv. subtilissimus. S. Mit Speichel in die Umgegend des Auges einzureiben, zur Erweiterung der Pupille.
(v. Graefe.)

Rec. Natri muriatici,

Concharum praeparatarum,

singul. q. p.

M. fiat pulvis subtilissim. S. Täglich zwey- bis dreymal ein wenig davon vermittelst eines Pinsels ins Auge zu bringen. (Kranz, gegen leukomatöse Verdunkelung der Hornhaut.)

Rec. Hydrargyri puri, ʒj.

Sacchari albi, ʒiij.

Conterantur usque dum hydrargyrum sit extinctum; adde

Pulveris florum liliorum alborum,

— radice valerianae minoris,

singul. ʒj.

M. f. pulv. S. Schnupftabak. (Richter, gegen Amaurose.)

Rec. Herbae majoranae,

Flor. lavandulae,

Sacchari albi, singul. ℥j.

Florum convallariae majalis,

Saponis medicati, singul. ℥℞.

Olei caryophyllorum,

— *bergamottae, singul. gtt. ij.*

M. f. pulv. S. Niesepulver.

(Hufeland.)

Rec. Corticis peruviani rubri, ℥℞.

Radiciis iridis florentinae, ℥ij.

Ammonii muriatici, ℥j.

Sanguinis draconis, ℥i℞.

Myrrhae, ℥ij.

M. f. pulv. S. Zahnpulver.

(Consbruch.)

Rec. Corticis peruviani,

Sacchari albi, singul. ℥℞.

Camphorae, ℥j.

M. f. pulv. S. Einstreupulver in schlaffe Geschwüre.

Rec. Carbonis vegetabilis,

Corticis peruviani, singul. ℥℞.

Corticis salicis laureae,

Radiciis calami, singul. ℥ij.

M. f. pulv. S. Mit Wein zum Breyumschlag auf brandige Stellen oder Geschwüre. (Berends.)

Rec. Cinnabaris factitii, ℥ij.

Cinerum solcarum, gr. viij.

Sanguinis draconis, gr. xij.

Arsenici albi, grana quadragint. (gr. XL.)

M. f. pulv. subtilissimus. S. Mit Speichel gemischt, anzuwenden. (Frère Côme's Krebsmittel.)

Species, Kräuter.

Erweichende Mittel.

Rec. Radicum althaeae, ʒß.

— *graminis*, ʒiß.

— *glycyrrhizae*, ʒvj.

Concisae misce, fiant species. S. Zwey gehäufte Elslöffel voll mit anderthalb Quart Wasser eine Viertelstunde lang zu kochen; zum gewöhnlichen Getränk.

(Berends.)

Rec. Seminis lini recentis, ʒß.

Specierum ad infusum pectorale.

ʒij.

Misce, fiant spec. S. Brustthee.

(Berends.)

Auflösende Mittel.

Rec. Taraxaci totius, ʒj,

Herbae trifolii,