

Concisa misce. Fiant species. S. Einen reichlichen Eßlöffel mit drey Tassen Wassers anzubrühn, und davon kalt dreymal täglich einen Tassenkopf voll zu trinken. (Diesen Thee habe ich oft mit Nutzen gegen leichtere, atonische Metrorrhagien und gegen ähnliche Leukorrhöen angewendet.)

Morsellen, Zeltchen und Küchelchen.

Temperirende Mittel.

Rec. Sacchari albi, ℥ij.

Aquae, q. s.

Succi citri recens expressi, ℥ij.

Elacosacchari flavedinis citri, ℥j.

Fiant l. a. rotulae, dentur in scatula.

S. Stückweise zu nehmen.

(Nach Schubarth.)

Absorbirende Mittel.

Rec. Magnesiae ustae, ℥j.

Pastae fabarum cacao (Chokolade), ℥ij.

Sacchari albi, ℥v.

Misce. Fiant cum mucilagine tragacanthae morsulae ponderis granor. xxiv. S. Zwey- bis viermal täglich ein Stück zu nehmen. (Chevalier.)

*Rec. Magnesiae carbonicae, ʒj.
Lapidum cancrorum, ʒß.
Cinnamomi acuti, ʒj.
Sacchari, ʒvj.*

Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci ponderis gr. x. S. Drey- bis viermal täglich ein Stück. (J. A. Schmidt.)

Auflösende Mittel.

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.
Elaeosacchari flavedinis citri, ʒj.
Corticis cinnamomi, ʒß.*

Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci numer. xlviij (gr. v stibii cont.). S. Zweymal täglich eins zu nehmen. (Fleisch.)

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒvj.
Resinae guajaci nativae, ʒiij.
Extracti aconiti, ʒj.
Mucilaginis tragacanthae, q. s.
ut fiant rotulae numero xx (für Kinder müssen es 40 Stück werden). S.* Viermal täglich ein Stück. (Weikard.)

*Rec. Carbonis spongiae,
Pastae fabarum cacao, sing. ʒß.
Mucilaginis tragacanthae, q. s.*

ut fiant trochisci numer. xx. S. Drey-
mal täglich ein Stück zu nehmen.

*Rec. Emetini, grana sedec. (gr.xvj).
Sacchari albi, ℥ij.*

*Fiant cum mucilagine tragacanthae tro-
chisci pond. granor. novem (gr.ix).*

S. Zwey- bis dreystündlich ein Stück.
(Magendie.)

Die Gabe des Emetins ist in dieser For-
mel so klein, daß das Mittel nur auflösend,
expektorirend, krampfstillend wirken kann.
Magendie schreibt aber auch brechener-
regende Trochisken aus Emetin vor, welche
in jedem Falle unzweckmäfsig sind.

Abführende Mittel.

*Rec. Olei crotonis, guttulas duas
(gutt. ij).*

Sacchari albi,

Gummi arabici, singul. ℥j.

*Misce exacte, fiant cum syrupo sim-
plici trochisci numero octo (viii). S.*

Zweystündlich ein Stück bis zur Wirkung.
(Seiler.)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Seminis santonici,

Florum tanaceti, singul. ℥ij.

Hydrargyri sulphurati nigri,

Radicis jalappae, singul. ℥iſs.

Corticis cinnamomi, ℥j.

Sacchari albi, in aqua rosarum soluti, et ad consistentiam tabulandi cocti, ℥iiß.

Fiant morsuli ponder. ℥j.

S. Für Erwachsene ein bis zwey Stück täglich. (J. A. Schmidt.)

Stärkende Mittel.

Rec. Extracti chinae frigide parati, ℥ij.

Sacchari, ad consistentiam rotulandi cocti, ℥ij.

Olei cinnamomi, gtt.vj.

Fiant l. a. rotulae, dentur in vitro. S.

Dreymal täglich fünf bis zehn Stück zu nehmen. (Ich habe sie einst einer verwöhnten Dame gegen Atonie der Gebärmutter gebrauchen lassen.)

Rec. Pulveris corticis cinnamomi, — seminum cardamomi minoris,

Pulveris nucum moschatarum, singul. ℥j.

Sacchari, ad consistentiam tabulandi cocti, ℥iiß.

Fiant. l. a. mortuli numer. xij. S. Eine Stunde vor dem Essen ein Stück mit einem Glase Rheinwein.

(Brückner.)

Rec. Radicum ipecacuanhae, ℥j.

Catechu, ℥ij.

Ambrae, gr. iij.

Sacchari albi, ℥j.

Misce. Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci numer. lx. S. Ein bis zwey Stück zweymal täglich. (Daubenton, gegen Atonie des Nahrungskanals und habituelle, atonische Diarrhöen.)

Pillenformeln.

Auflösende Mittel.

Rec. Saponis medicati,
Natri carbonici sicci, singul. ℥ij,

Misce, fiant cum extracti trifolii q. s. pilul. ponderis gr. ij; conspergantur pulv. rad. glycyrrhiz. S. Drey mal täglich drey bis zehn Stück zu nehmen. (Berends, als auflösendes, absorbirendes und lithontriptisches Mittel.)

Rec. Hyrargyri puri, ℥j.
Gummi mimosae, ℥ij.

Tere ad extinctionem hydrargyri, cum pauxillo aquae destillatae;
adde

Extracti conii maculati, ℥j.

Pulveris radices glycyrrhizae, q. s.