

Rec. Herbae menthae piperitae,
Florum lavandulae, singul. ℥ij.
Radici calami aromatici,
Corticis salicis laureae, sing. ℥i℔.
Seminis carvi, ℥j.

C. C. M. S. Wie das Vorige.
 (Berends.)

Rec. Florum lavandulae,
Herbae rorismarini, singul. ℥ij.
Radici calami aromatici,
Corticis hippocastami, sing. ℥i℔.

Conc. M. S. Wie das Vorige.

Vorschriften zu Arzneyformeln für Kinder unter 10 Jahren.

Pulverformeln.

Abführende Mittel.

Rec. Radici rhei optimi, gr. v — xv.
Magnesia carbonicae, gr. v.
Elaeosacchari foeniculi, gr. x.

M. f. pulv. S. Des Morgens auf einmal zu nehmen. (Berends, für Kinder v. 1 bis 8 Jahren.)

Rec.

Rec. Radicis jalappae, gr. vj — x.

Hydrargyri muriatici mitis,
gr. j — iij.

Elaeosacchari foeniculi, gr. x.

M. f. pulv. S. Des Morgens auf einmal zu nehmen. (Für Kinder von 4 bis 8 Jahren.)

Rec. Resinae jalappae, gr. iß — gr. iij.

Amygdalarum dulcium excortica-
tarum,

Sacchari albi, singulor. gr. x.

Conterantur exactissime. S. In lauwärmer Milch auf einmal zu nehmen. (Vogler.)

Auflösende und absorbirende Mittel.

Rec. Radicis rhei optimi,

— *iridis florentinae, singul.*
ʒj.

Magnesiae carbonicae, ʒj.

Olei foeniculi, gtt. j.

Misce f. pulv. S. Messerspitzenweise. (Ribke, für Säuglinge.)

Rec. Natri carbonici depurati, ʒß.

Radicis rhei optimi, ʒj.

Elaeosacchari foeniculi, ʒij.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täglich eine Messerspitze voll.

Rec. Radicis ipecacuanhae, gr. iij.

Lapidum cancrorum, ʒiß.

Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulc., div. in xij part. aegu. S.
Dreystündlich ein Pulver. (Wendt, bey
gastrischen Fiebern.)

Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati,
3ß — 3iß.

Lapidum cancrorum praeparato-
rum, 3j.

Elaeosacchari foeniculi, 3ij.

M. f. pulc. S. Drey mal täglich eine
Messerspitze voll. (Berends, gegen
Skrofeln und skrofulöse Exantheme.)

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri, gr.ij.
Sacchari albi,

Magnesiae carbonicae, sing. gr.xv.

M. f. pulc., divid. in sex part. aequal.
S. Zwey- oder drey mal täglich ein Pul-
ver. (Gegen Syphilis der Neugeborenen.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr.ijj.
Herbae digitalis purpureae, gr.iv.
Sacchari albi, 3j.

M. f. pulc., divid. in duodecim part.
aequal. S. Zweymal täglich ein Pul-
ver. (Berends, gegen chronischen
Wasserkopf.)

Krampfstillende Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris, 3j.
— *iridis florentinae, 3iß.*

— *glycyrrhizae, 3ij.*

Seminis anisi, 3ß.

Croci, gr.vij.

Magnesiae carbonicae, 3j.

M. f. pulv. S. Eine bis zwey Messerspitzen voll einigemal täglich. (Hufeland's Kinderpulver.)

Rec. Radicis valerianae minoris,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi praeparati,
Visci querni, singul. ʒj.

M. f. pulv. S. Messerspitzenweise.
 (Hufeland.)

Rec. Zinci oxydati albi, gr. iij — vj.
Radicis valerianae minoris,
Sacchari albi, singul. ʒʒ.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.
S. Dreystündlich ein Pulver. (Berennd's, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Moschi genuini, gr. ix.
Sulphuris stibiati aurantiaci,
Zinci oxydati albi, singul. gr. iij.
Sacchari albi, ʒʒ.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Hinze, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Radicis belladonnae, grana duo
 (gr. ij).

— *ipeacacuanhae, gr. iʒ — ij.*

Sulphuris depurati, gr. xxxij.

Sacchari lactis, gr. viij.

M. f. pulv., divid. in octo part. aequ.
S. Viermal täglich ein Pulver. (Kopp, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Moschi genuini, grana tria
 (gr. iij).

Opii crudi, granum dimidium
(gr. β).

Gummi mimosae, ℥j.

Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal. *Signa.* Dreystündlich ein Pulver.
(Gölis, gegen den Keuchhusten.)

Anmerk. Die Gabe des Opiums, dessen Gebrauch doch bey Kindern die allergrößte Vorsicht erheischt, ist in obiger Formel nicht gering, und muß daher, wenn Kinder unter 3 bis 4 Jahren davon Gebrauch machen sollen, um die Hälfte, ja auf den vierten Theil verringert werden,

Rec. Extracti lactucae virosae, granula tria ad sex (gr. iij — xj).

Sacchari lactis, ʒij.

M. f. pulv., divid. in duodecim part. aequal. *S.* Zweystündlich ein Pulver zu geben. (Gumprecht, gegen den Keuchhusten.)

Stärkende Mittel.

Rec. Ferri pulverati, gr. iij — xij.

— *Concharum praeparatarum,*

Elaeosacchari flavedinis citri, singul. ʒß.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.

S. Zweymal täglich ein Pulver. (Berends, gegen Rhachitis.)

Rec. Ferri pulverati,

Resinae guajaci naticae, sing. ʒß.

Concharum praeparatarum, ʒß.

Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich eine reichliche Messerspitze voll.

(Gölis.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, gr. xij.

Lapidum cancerorum praeparatorum, ʒß.

Sacchari albi, ʒiß.

M. f. pulv., *digid.* in xij part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver. (Wendt, im asthenischen Schleimfluß nach dem Keuchhusten.)

Rec. Ferri oxydulati nigri, gr. xij.

Elaeosacchari macidis, ʒij.

M. f. pulv., *digid.* in xij part. aequal.

S. Dreymal täglich ein Pulver zu geben. (Wendt, gegen asthenische Skrofelkrankheit und Rhachitis.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. vj.

Pulveris herbae majoranae, ʒij.

M. f. pulv. S. Niesepulver, beym chronischen Wasserkopf anzuwenden.

(Wendt.)

Lecksäfte.

Brechenerregende.

Rec. Radicis ipecacuanhae, gr. xvijj.

Syrupi althaeae, ʒiß.

M. S. Gut umgeschüttelt, stündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.

(Wendt.)

Abführende.

Rec. Olei amygdalarum recens expressi, ℥℔.

Mellis, q. s. ad subactionem.

Syrupi mannati, ℥℔.

M. f. linct. S. Zu einem bis zwey Theelöffeln voll, gut umgeschüttelt, zu geben.

(Kämpf.)

Rec. Tincturae rhei aquosae,

Sacchari albi, singul. ℥vj.

Aquae foeniculi, ℥j.

M. S. Theelöffelweise. (Ribke's Kindersäftchen, auch zur Ausleerung des Mekoniums.)

Rec. Saponis medicati, ℥j.

Syrupi rhei, ℥j.

Solv. Sign. Theelöffelweise zu geben.

(Fuller.)

Rec. Kali tartarici, gr. vj — viij.

Syrupi mannati, ℥℔.

Olei amygdalarum recens expressi, ℥j.

M. f. linct. S. Zwey- oder vierstündlich einen Theelöffel voll. (Kämpf's Abführsaft für Neugeborne.)

Rec. Tartari natronati, ℥℔.

Sacchari lactis, ℥ij.

Syrupi simplicis,

Aquae foeniculi, singul. ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, einen Theelöffel voll. (Berends Abführmittel für Neugeborne.)

Demulzirende Mittel.

Rec. Lycopodii, ℥j — ℥iiij.

Syrupi althaeae, ℥i℔.

M. S. Drey- bis viermal einen Theelöffel voll. (Berends, gegen Harnverhaltung oder Harnstrenge.)

Erregende Mittel.

Rec. Aquae petroselini,

Syrupi rhei, singul. ℥j.

Spiritus muriatico-aetherei, ℥℔.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wendts diuretisches Säftchen.)

Rec. Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.

Syrupi rhoeados, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen bis zwey Theelöffel. (Werlhoff, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Acidi benzoici, gr. viij.

Liquoris ammonii anisati, ℥℔.

Vini stibiati, ℥ij.

Syrupi senegae,

Oxymellis scillitici,

Syrupi althaeae, singul. ℥iiij.

M. S. Stündlich oder zweystündlich einen Theelöffel. (Ich habe diese Mi-

schung gegen steckflufsähnliche Zufälle
kleiner Kinder mit Erfolg gebraucht.)

Aufgüsse.

Abführende Mittel.

Rec. Foliorum sennae, ʒß — ʒiß.
Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒij.
Adde

Tartari natronati, ʒij.

Mannae, ʒß.

Elaeosacchari foeniculi, ʒiij.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
bis zur Wirkung. (Abführmittel für Kin-
der von 4 bis 6 Jahren.)

Rec. Radicis rhei optimi, ʒß — ʒiß.
Natri carbonici, ʒj.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiij.
Adde

Elaeosacchari anisi, ʒiij.

Solv. S. Eßlöffelweise bis zur Wirkung.
(Stärkendes Abführmittel.)

Auflösende Mittel.

Rec. Radicis ipecacuanhae, ʒß.
Infunde aqu. fervid. q. s. ad col. ʒiß.
Adde

Syrupi rubi idaei, ʒj.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll.
(Schlesinger, gegen das Scharlach-
fieber.)

Rec. Radicis senegae, ℥i℔.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Vini stibiati, ℥ij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen kleinen Es-
löffel voll. (Wendt, im zweiten Sta-
dium des Kroup.)

Rec. Radicis senegae, ℥i℔.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Digere per horam. In colatura solve

Kali carbonici depurati, ℥j—℥℔.

Gummi mimosae, ℥j.

Adde

Syrupi althaeae, ℥i℔.

M. S. Stündlich oder zweystündlich ei-
nen Eszlöffel voll. (Mit großem Nutzen
habe ich diese Verbindung im zweyten
Stadium des Kroup, wo schon eine läh-
mungsartige Affektion der Lungen be-
ginnt, so wie auch in den späteren Zeit-
räumen des Keuchhustens angewendet.)

Rec. Herbae violae tricoloris, ℥ij.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥ij.

Adde

Vini stibiati, ℥j.

Syrupi althaeae, ℥℔.

M. S. Zweystündlich einen halben Es-
löffel. (Jahn, gegen Ansprung, Grind.)

Rec. Herbae digitalis purpureae, grana octo (gr. viij).

Infunde aquae fervid. q. s. ad colatur.

Adde

Liquoris kali acetici,

Syrupi althaeae, singul. ℥ß.

M. S. Dreymal täglich einen Thee- oder halben Eßlöffel. (Wend t, gegen die floride Skrofelkrankheit.)

Diuretische Mittel.

Rec. Ipecacuanhae radice, ℥ß — ℥ß.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j — ℥j.

Succi juniperi inspissati, ℥j.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Wend t, gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.)

Rec. Radicis serpentariae,

Corticis peruviani regii, singul.

℥j — ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Solve

Tartari boraxati, ℥iß — ℥ij.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j.

Syrupi corticum aurantium, ℥v.

Succi juniperi inspissati, ℥ij.

M. S. Zweystündlich einen halben bis ganzen Eßlöffel. (Kopp, gegen asthenische Wassersuchten.)

Rec. Radicis helenii, ʒj.
Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Kali carbonici, aceto scillitico saturati, ʒʒ.

Syrupi florum aurantii, ʒʒ.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
 (Wend t, gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.)

Anthelminthisches Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris,
Seminis santonici, singul. ʒij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Extracti nucum juglandis,

Spiritus sulphurico-aetherei,

Tincturae corticum aurantium,
singul. ʒʒ.

Syrupi corticum aurantium, ʒʒ.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll.
 (Henke.)

Krampfstillende und erregende Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒij.
Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Liquoris ammonii succinici, ʒj.

Syrupi florum aurantii, ʒj.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
 (Wend t, in asthenischen Blattern.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ℥ij.
Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Moschi genuini, gr. viij.

Liquoris ammonii succinici, ℥ij.

Tincturae ambrae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥℞.

M. S. Halbstündlich zwey Theelöffel voll. (Wendt, gegen Millar'sches Asthma.)

Rec. Radicis calami aromatici, ℥℞.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad col. ℥iiij.

Adde

Gummi minosae, ℥j.

Sacchari albi, ℥ij.

Solv. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Wendt, gegen Verdauungsschw. und asthenischen Durchfall.)

Rec. Radicis galangae,

— *rhei optimi, singul.* ℥j.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Ammonii muriatici martiati,

gr. xij.

Elaeosacchari menthae piperitae,
 ℥℞.

Solv. S. Dreystündlich einen mälsigen Elslöffel voll. (Wendt, gegen Verdauungsschwäche u. chronischen Durchfall.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥℞.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iiij.

Adde

Extracti ligni campechiensis, ℥j.

Aquae cinnamomi simplicis,

Syrupi florum aurantii, sing. ℥℞.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel.

(Wendt, gegen asthenisch-chronische Diarrhöe.)

Abkochungen.

Rec. Pulpae tamarindorum, ℥j — ℥ij.

Coque ex aquae fontan. q. s. per dimid. horam ad colat. ℥vj.

Adde

Syrupi mannati, ℥j.

Misce. Signa. Stündlich einen Eßlöffel.

(Wendt's Abführmittel in entzündlichen Blattern.)

Rec. Corticis peruciani regii, ℥℞.

Coque ex aqu. ℥vij ad colat. ℥iv.

Adde

Elaeosacchari foeniculi, ℥℞.

Solv. S. Zweystündlich einen halben Eßlöffel voll.

Rec. Corticis peruciani regii, ℥℞.

Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.

Sub finem coctionis adde

Florum cassiae, ℥i℞.

Colaturae admisce:

Syrupi florum aurantii, ℥℞.

Misce. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
(Kinderlöffel?) voll. (Wend t, in asthe-
nischen Fiebern.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥iij.

Coque ex aqu. ℥vi ad colat. ℥iij.

Addē

*Extracti corticis peruviani frigide
parati, ℥ij.*

Syrupi corticum aurantium, ℥ß.

M. S. In der fieberfreyen Zeit stündlich
oder zweystündlich einen Kinderlöffel.
(Berends, gegen Wechselfieber zarter
Kinder.)

Mixturen, Schütteltränkchen.

Brechmittel.

Rec. Vini stibiati, ℥ß.

Oxymellis scillitici,

Syrupi althaeae, singul. ℥iij.

M. S. Viertelstündlich einen Theelöffel
bis zur Wirkung. (Berends, Brech-
mittel für kleine Kinder.)

Rec. Radicis ipecacuanhae pulveratae,
gr. x — xx.

Vini stibiati, ℥j.

Aquae, ℥ij.

Oxymellis squillitici,

Syrupi rubi idaei, sing. ℥ß.

M. S. Gut umgeschüttelt, viertelstündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.
(Armstrong.)

Abführende Mittel.

Rec. Olei ricini, ℥iij — ℥vj.
Gummi mimosae, q. s.
Aquae foeniculi, ℥iij.
Syrupi mannati, ℥j.
F. l. a. mixtur. S. Kinderlöffelweise
bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Electuarii e senna, ℥ij — ℥℥.
Tartari natronati, ℥i℥.
Aquae foeniculi, ℥i℥.
Syrupi rubi idaei, ℥j.

M. Solc. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen reichlichen Kinderlöffel bis zur Wirkung. (Wirkt sehr sicher.)

Auflösende Mittel.

Rec. Kali carbonici aciduli, ℥℥.
Tincturae rhei aquosae, ℥℥.
Aquae foeniculi, ℥iij.
Syrupi simplicis, ℥j.
M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel.
(Bey gastrischen Affektionen.)

Rec. Aquae foeniculi, ℥j.
Tincturae rhei aquosae,
Syrupi mannati, singul. ℥℥.
Lapidum cancerorum praeparatorum, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Theelöffel voll. (Gegen den Icterus.)

Rec. Magnesiæ carbonicæ, ℥ij.
Pulveris radiceis rhei, ℥j.
Aquæ foeniculi, ℥i℔.
Syrupi simplicis, ℥℔.

M. S. Umgeschüttelt, theelöffelweise. (Berends, gegen Magensäure.)

Rec. Sulphuris depurati, gr. ix — ℥j.
Mucilaginis gummi mimosæ, ℥vij.
Sacchari albi, ℥℔.
Aquæ rosarum, ℥j.

M. S. Stündlich, gut umgeschüttelt, einen Theelöffel voll. (Kopp.)

Diuretische Mittel.

Rec. Liquoris kali aceticæ, ℥℔.
Aquæ petroselini, ℥i℔.
Sacchari albi, ℥ij.

Solv. M. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Wendt.)

Rec. Terebinthinæ laricinae, ℥j.
Mucilaginis gummi mimosæ, ℥℔.
Aquæ petroselini, ℥iv.
Syrupi simplicis, ℥j.

F. l. a. mixtur. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Wendt, gegen asthen. Wassersuchten.)

Diaphoretische Mittel.

Rec. Liquoris ammonii acetici, ℥ij—℥β.
Aquae foeniculi, ℥ij.
Syrupi rubi idaei, ℥j.
Vini stibiati, ℥j.
(Oxymellis scillitici, ℥β.)

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Berends.)

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Asae foetidae, ℥β.
Moschi genuini, gr. viij.
Mucilaginis gummi mimosae, ℥β.
Conterantur exactissime, adde
Aquae destillatae simplicis, ℥iij.
Sacchari albi, ℥ij.

M. S. Stündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Wendt, gegen Millar'sches Asthma.)

Rec. Moschi genuini, gr. vj.
Ammonii carbonici sicci, gr. iv.
Sacchari albi, ℥iij.
Aquae chamomillae, ℥iβ.

M. exacte. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wendt, gegen asthenische Krämpfe.)

Rec. Moschi, gr. iij.
Liquoris ammonii succinici, ℥j.
Aquae foeniculi, ℥β.
Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Tortual, bey Krämpfen ganz junger Kinder.)

Rec. Liquoris ammonii succinici, ℥j.
Aquae florum tiliae, ℥ij.
Syrupi florum aurantii, ℥j.

M. S. Halbstündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Wend t, gegen Krämpfe zarter Kinder.)

Rec. Liquoris ammonii pyro-oleosi,
 ʒß.
Aquae chamomillae, ℥ij.
Syrupi florum aurantii, ʒß.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wend t, gegen Krämpfe der Säuglinge.)

Rec. Camphorae tritae, gr. iv.
Mucilaginis gummi mimosae,
Syrupi althaeae, singul. ʒß.
Syrupi florum aurantii, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Wend t, in asthenischen Fiebern.)

Rec. Ammoniaci, gr. xxiv.
Mucilaginis gummi mimosae, ʒß.
Aquae foeniculi, ℥iv.
Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Drey mal täglich einen Eßlöffel voll. (Wend t, gegen die Lungenschwindsucht nach dem Keuchhusten.)

Rec. Cantharidum, granum unum
 (gr. j).
Sacchari albi,

Gummi mimosae, singul. ℥ij.

Conterantur exactissime; sensim adde:

Emulsionis amygdalarum, ℥v.

M. S. Zweystündlich einen halben bis ganzen Eßlöffel voll. (Wendt, im zweyten Stadium des Keuchhustens.)

Rec. Aquae melissae, ℥ij.

— *cinnamomi simplicis,*

Syrupi florum aurantii, sing. ℥j.

Tincturae opii crocatae, scrupulum dimidium (℥℔).

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Auf diese Weise soll man, nach Wendt's Versicherung, in den Blättern das Opium ganz sicher bey acht- bis zehnjährigen Kindern anwenden können.)

Rec. Aquae melissae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

Aetheris acetici, gtt. xv.

— *Tincturae opii crocatae, guttulas quinque (gtt. v).*

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll.

(Diese Mischung gab ich einst einem, von Zahnkrämpfen tödtlich erschöpften, dreyvierteljährigen zarten Mädchen mit Nutzen.)

Stärkende Mittel.

Rec. Decocti salep tenuioris, ℥ij.

Tincturae rhei aquosae, ℥ij.

Aquae cinnamomi, ℥℞.

Sacchari albi, ℥ij.
Solv. *M. S.* Stündlich zwey Theelöffel voll. (Wendt, gegen chronische Durchfälle.)

Rec. *Extracti nucum juglandis*, ℥ij.

Tincturae ferri pomatae, ℥iij.

Aquae menthae crispae, ℥ij.

Sacchari albi, ℥iij.

Solv. *Misce. S.* Drey mal täglich einen (Kinderlöffel voll. (Berends, nach Warmkrankheiten.)

Auflösungen und Tränkchen.

Schwächende und temperirende Mittel.

Rec. *Kali carbonici depurati*, ℥℞ — ℥j.

Sutura c. succi citri recens expressi, q. s.

Adde

Aquae destillatae simplicis, ℥ij.

Syrupi rubi idaci, ℥j.

(*Vini stibiati*, ℥j.)

M. S. Zwey stündlich einen halben oder ganzen Kinderlöffel voll. (Berends, temperirendes Mittel.)

Rec. *Ammonii carbonici sicci*, ℥j — ℥j.

Acidi nitrici puri, q. s. *ad exactam saturationem*,

Aquae destillatae simplicis,

℥ij — ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll.

(Berend's empfahl das salpetersaure Ammonium als temperirendes Mittel in verschiedenen Reiz- und exanthematischen Fiebern, auch als ein Diuretikum in erethistischen Wassersuchten.)

Rec. Kali tartarici, ℥i℥ — ℥iij.

Decocti hordei, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

Solv. M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Wend t.)

Rec. Aquae oxymuriaticae, ℥iij.

— *rubi idaei,* ℥i℥.

Mucilaginis seminis cydoniorum,

Syrupi althaeae, singul. ℥vj.

M. S. Stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kinderlöffel. (Köpp, in Reizfiebern, besonders im Scharlach-, Zahnfieber, für Kinder von 3 — 5 Jahren.)

Rec. Magnesiae sulphuricae, ℥ij.

Mannae, ℥j.

Emulsionis amygdalarum, ℥iv.

Solv. S. Zweystündlich einen Kinder- oder Eßlöffel voll. (Wend t, antipl. Abführmittel, z. B. bey Hirnentzündung.)

Auflösende Mittel.

- Rec. Ammonii muriatici depurati,*
 ʒß — ʒj.
Gummi mimosae, ʒij.
Aquae foeniculi, ʒiv.
Sacchari albi, ʒß.
Solv. S. Zweystündlich einen Kinderlöf-
 fel voll. (Berends.)
- Rec. Boracis,* ʒj — ʒß — ʒij.
Aquae foeniculi, ʒij.
Syrupi althaeae, ʒj.
Solv. S. Zweystündlich einen Theelöffel
 voll. (Berends, bey Magensäure,
 Schwämmchen.)
- Rec. Extracti conii maculati, gr.*ij—vj.
Aquae melissae, ʒij.
Tincturae rhei aquosae, ʒj.
Solv. S. Drey mal täglich einen halben
 Eßlöffel voll. (Hecker, gegen skrofu-
 löse Atrophie.)
- Rec. Boracis,* ʒß.
Extracti dulcamarae, ʒj — ʒij.
 — *nucum juglandis,* ʒiß.
Aquae menthae crispae, ʒiij.
Syrupi florum aurantii, ʒj.
Solv. S. Drey mal täglich einen Thee-
 oder Kinder-, auch wol einen Eßlöffel.
 (Bey chronisch asthenischen Mesenterial-
 skrofeln und skrofulöser Atrophie habe
 ich diese Verbindung mit Erfolg ange-
 wendet.)

Rec. Kali acetici, ℥iß.
Aquae foeniculi, ℥ij.
Tincturae rhei aquosae, ℥ß.
Sacchari albi, ℥iij.

Solv. S. Drey mal täglich einen Thee-
 oder Kinderlöffel voll. (Berends.)

Erregende Mittel.

Rec. Natri carbonici aciduli, ℥ß.
Aquae destillatae simplicis, ℥iß.
Syrupi rubi idaei, ℥ß.

Solv. S. Einen halben Eßlöffel voll mit
 einem halben Theelöffel Zitronensaft zu
 geben. (Brausemischung für Kinder.)

Rec. Aetheris acetici, gtt. xv.
Aquae florum aurantii, ℥j.
 — *cinnamomi simplicis*, ℥ß.
Syrupi simplicis, ℥iß.

M. Signa. Thee- und kinderlöffelweise.
 (Analeptisches Mittel.)

Rec. Elaeosacchari juniperi, ℥ij.
Aquae petroselini, ℥iv.
Syrupi althaeae, ℥ß.

Solv. S. Zweystündlich einen Kinder-
 oder Eßlöffel. (Wendt, in asthenisch.
 (Wassersuchten.)

Reizende Mittel.

Rec. Ammonii carbonici sicci, gr. x.
Aquae destillatae simplicis,

Aquae menthae piperitae, singul.
 ℥iß.

Syrupi althaeae, ℥iß.

Solv. S. Stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kinderlöffel. (In hoch asthenischen Fiebern.)

Rec. Kali hydriodici, grana quinque
 (gr. v).

Extracti nucum juglandis,

— *rhei aquosi, singul. ℥j.*

Aquae foeniculi, ℥iß.

Syrupi corticum aurantium, ℥ß.

Solv. S. Zwey- bis höchstens dreymal täglich einen Theelöffel voll. (In der eingewurzelten, fieberlosen Skrofelkrankheit mit dem Charakter des Torpors habe ich dieses Mittel mit auffallendem Erfolg angewendet.)

Tonische und stärkende Mittel.

Rec. Acidi sulphurici diluti, ℥ß.

Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

Syrupi rubi idaei, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Wendt.)

Rec. Chininii sulphurici, grana sex
 (gr. vj).

Kali acetici, ℥j.

Aquae foeniculi, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

Solv. S. In der fieberfreyen Zeit stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kin-

Kinderlöffel. (Auf diese Art habe ich stets das schwefelsaure Chinin bey Kindern angewendet. In Pulverform gereicht, verursacht es leicht Erbrechen.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥i℔.

Extracti ligni campechiensis, ℥j.

Boracis, ℥℔.

Decocti salep tenuioris, ℥iv.

Syrupi althaeae, ℥j.

Solv. S. Stündlich oder zweystündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Lentin, gegen asthenische oder brandige Schwämmchen.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥j.

Gummi mimosae, ℥ij.

Aquae florum tiliae, ℥iij.

Spiritus nitrico- s. muriatico-aetherei, ℥℔.

Syrupi corticum citri, ℥j.

Solv. S. Stündlich zwey Theelöffel voll zu nehmen. (Wendt, gegen asthenische Aphthen.)

Rec. Extracti columbo, ℥j.

Decocti salep tenuioris, ℥iij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥ij.

Solv. S. Viermal täglich einen bis zwey Theelöffel. (Wendt, gegen chronische Diarrhöe.)

Tropfenmixturen.

Auflösende Mittel.

*Rec. Extracti hyoscyami, scrupulum
dimidium (℥℥).*

Vini stibiati, ℥ij.

Solv. S. Zwey- bis dreystündlich fünf bis zehn Tropfen. (Kinder unter einem Jahre dürfen nicht mehr als zwey Gran des Bilsenkrautextrakts täglich bekommen, (Hufeland, gegen den Keuchhusten).)

*Rec. Barytae muriaticae, drachmam
dimidiam (℥℥).*

Aquae destillatae simplicis, ℥j.

Solv. S. Einmal täglich 10 — 40 Tropfen. (Hufeland.)

Rec. Calcariae muriaticae, ℥℥.

Extracti dulcamarae,

*— nucis juglandis, singul.
℥j.*

Aquae cinnamomi, ℥j.

Solv. S. Zweymal täglich 10 — 60 Tropfen. (Hat mir in der torpiden Skrofelkrankheit treffliche Dienste geleistet.)

Krampfstillende Mittel.

Rec. Liquoris ammonii pyro-oleosi, ℥j.

Aceti squillitici, ℥℥.

Syrupi mannati, ℥ij.

*Tincturae opii simplicis, guttu-
las duas (gtt. ij).*

M. S. Zwey- oder dreystündlich zehn bis funfzehn Tropfen. (Henke, bey Harnverhaltung. Erheischt aber, obgleich der Gehalt an Opium nur sehr gering ist, dennoch grofse Vorsicht.)

Stärkende Mittel.

Rec. Extracti nucum juglandis, ℥ij.

Aquae cinnamomi, ℥vj.

Solv. S. Viermal täglich 40 — 60 Tropfen. (Rosenstein.)

Rec. Extracti ferri pomati, ℥ij.

Aquae foeniculi, ℥j.

Solv. S. Drey mal täglich 10 — 50 Tropfen in Zuckerwasser. (Berends.)

Rec. Tincturae ferri pomatae,
— *aromaticae*, sing. ℥ß.

M. S. Drey mal täglich 30 Tropfen.

(Wendt.)

Getränke.

Schwächende und temperirende.

Rec. Kali carbonici depurati, ℥iß.

Satura succi citri recens expressi, q. s.

Adde

Decocti hordei, libr.iß.

Syrupi rubi idaei, ℥iß.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Tartari depurati, ℥iβ.

Coque per quart. horae partem cum

Aquae fontanae, libr. ij.

Adde

Syrupi ribium, ℥iβ.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Succi recentis malorum aurantio-

rum Sinensium, ℥ij.

Aquae decoctae, libr. iβ.

Sacchari, ℥j.

M. S. Zum Getränk.

Auflösende.

Rec. Herbae violae tricoloris, ℥β.

Coque ex aqu. ℥xvj ad colat. ℥xij.

Adde

Lactis vaccini, ℥vj.

Sacchari, q. s. ad gratiam.

M. S. Lauwarm tassenweise zu geben.

(Gegen Milchschorf und andre Ausschläge.)

Rec. Radicis graminis, ℥j.

Tartari depurati, ℥j.

Coque ex aquae ℥xxiv ad reman. ℥xvj.

Adde

Sacchari albi, ℥j.

M. S. Zum Getränk.

Erregende und stärkende.

Rec. Panis domestici tostī, ℥j.

Infunde aquae fervidae, ℥xviii.

Colaturæ adde

Syrupi corticum aurantium, ℥i℔.

M. S. Zum Getränk, nicht allzureichlich anzuwenden.

Rec. Aquæ fontanae decoctæ, ℥xviiij.

Acidi sulphurici diluti, ℥℔.

Syrupi rubi idaci, ℥i℔.

M. S. Zum Getränk.

Mundwasser und Injektionen.

Das eigentliche Gurgeln verstehen wol nur die wenigsten Kinder, und selbst diejenigen Mittel, welche zum Ausspülen des Mundes oder zu Injektionen in den hintern Theil des Mundes dienen sollen, dürfen keine heftig wirkende Mittel enthalten, da die Kleinen doch immer mehr oder weniger davon verschlucken. Hier werden eigentlich nur diejenigen Mundwasser und Injektionen angeführt, welche bey böartigen oder brandigen Halsentzündungen oder Aphthen dienlich sind.

Rec. Herbae salviae, ℥℔.

Infunde aquae fervid. q. s. ad col. ℥vj.

Adde

Aquæ oxymuriaticæ, ℥℔.

Mellis rosati, ℥j.

M. S. Zum Ausspülen des Mundes und zu Injektionen bey asthenischen Aphthen und ähnlichen Halsentzündungen.

(Berends.)

Rec. Herbae salviae,
— *scordii, singul. ℥℔.*

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Acidi muriatici puri, ℥i℔.

Syrupi mororum, ℥ij.

M. S. Zu Einspritzungen. (Enthält wol etwas allzuviel der Salzsäure.) (Wendt, gegen asthenische, brandige Bräune.)

Rec. Corticis quercus, ℥j.

Coque ex aquae ℥xvj ad colat. ℥ix.

Adde

Spiritus camphorati,

Mellis rosati, singulor. ℥i℔.

M. S. Zu Einspritzungen. (Wendt, gegen brandige Bräune.)

Rec. Camphorae, gr. vj.

Gummi mimosae, q. s.

Extracti corticis peruviani, ℥iij.

Aquae salviae, ℥viiij.

M. S. Zu Einspritzungen gegen brandige Halsentzündungen.

Rec. Corticis peruviani regii, ℥j.

Coque ex aquae ℥xv ad colat. ℥viiij.

Adde

Spiritus cochleariae, ℥℔.

Tincturae myrrhae, ℥ij.

Mellis rosati, ℥j.

M. S. Bey brandigen Halsentzündungen einzuspritzen. (Wend t.)

Pinselsäfte.

Es sind deren hier nur noch einige anzuführen, da früher (S. 107) mehrere derselben bereits angegeben worden sind.

Rec. Aquæ calcariæ ustæ,
Syrupi simplicis, singul. ʒß.

M. S. Pinselsaft gegen Schwämmchen.
(Sehr wirksam.) (Wend t.)

Rec. Boracis, ʒij.
Aquæ salviæ, ʒij.
Tincturæ myrrhæ, ʒij.
Mellis depurati, ʒi.

M. S. Pinselsaft gegen asthenische Aphthen.
(Wend t.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ʒß.
Aquæ rosarum, ʒiij.
Syrupi mororum, ʒiß.

M. Solv. S. Pinselsaft gegen Aphthen.
(Berends.)

Rec. Extracti chinæ frigide parati, ʒij.
Aquæ rutæ, ʒij.
Spiritus muriatico-aetherei, ʒij.
Mellis rosati, ʒi.

M. S. Pinselsaft gegen die brandige Bräune.
(Wend t.)

Salben und Einreibungen.

Rec. Hydrargyri puri, ʒvj.

Sebi ovilli, ʒß.

Conterantur in mortario lapideo ad extinctionem hydrargyri;

adde

Olei cacao, ʒj.

Formentur inde tabulae. Sign. Graue
Quecksilbersalbe für Kinder.

(Wend t.)

Rec. Unguenti rosati,

Olei nucis moschati expressi, sin-
gul. ʒij.

Mixturae oleoso-balsamicae, ʒj.

Tincturae opii simplicis, ʒß.

M. f. unguent. S. In den Unterleib ein-
zureiben.

(Wend t.)

Rec. Olei olivarum, ʒj.

— menthae piperitae aetherici,

— carvi aetherici, singul. ʒj.

Tincturae opii crocatae, ʒß.

M. S. Gewärmt in den Unterleib einzu-
reiben.

(Henke.)

Rec. Medullae ossium tauri, ʒiß.

Liquatae et depuratae, refrigerataeque
adde:

Mixturae oleoso-balsamicae, ʒvj.

Balsami indici nigri, ʒiß.

M. S. Den Rücken, die Brust und die
Gelenke damit einzureiben. (Wend t,
gegen Rhachitis.)

- Rec. Zinci oxydati albi*, ℥j.
Hydrargyri ammoniato-muriati-
ci, ℥j.
Unguenti rosati, ℥j.
M. exacte. S. Sälbchen, gegen hartnäk-
 kige Ausschläge. (Wend t.)
- Rec. Unguenti juniperi*, ℥ij.
 — *althaeae*,
Acidi muriatici, singul. ℥ß.
M. S. Den Erbgrind zweymal täglich
 damit einzureiben. (Henke.)
- Rec. Unguenti althaeae*, ℥ß.
Fellis tauri recentis,
Saponis medicati, singul. ℥iß.
Petrolei,
Ammonii carbonici pyro-oleosi,
singul. ℥iß.
Camphorae, ℥ß.
M. S. Dreystündlich einen Theelöffel
 voll in den Unterleib einzureiben. (Hu-
 feland, gegen Mesenterialschrofeln.)
- Rec. Kali sulphurati*, ℥iij.
Saponis, ℥j.
Aquae calcariae ustae, ℥viij.
Spiritus vini rectificati, ℥ij.
Solo. S. Die Grindstellen Morgens und
 Abends damit zu waschen.
 (Barlow.)
- Rec. Spiritus lavandulae*, ℥ij.
Liquoris ammonii anisati, ℥j.
M. S. Zum Einreiben des Unterleibes.
 (v. Siebold.)

- Rec. Spiritus lavandulae,*
 — *rorismarini, singul. ℥ij.*
Tincturae aromaticae, ℥ij.
M. S. Stärkender Spiritus, bey Rhachitis in den Rücken und in die Gelenke einzureiben. (Berends.)

B ä d e r.

- Rec. Saponis domestici, ℥i℔.*
Boli albae pulveratae, ℥ij.
Olei citri italici, gtt. ij.
M. f. pulv. S. Dem Badewasser beyzumischen. (Ein sehr angenehmes, erweichendes Bad.)
Rec. Natri carbonici sicci, ℥℔.
 — *muriatici, ℥vj.*
M. S. Zu einem Bade. (Gegen Skrofeln.)
Rec. Calcariae muriaticae, ℥ij.
Liquoris ferri muriatici, ℥ij.
Aquae destillatae simplicis, ℥iv.
Solv. S. Zu zwey Bädern. (Ich habe diese Bäder in der Skrofelkrankheit mit grossem Nutzen angewendet.)
Rec. Herbae serpylli,
 — *absinthii,*
 — *menthae crispae, sing. ℥j.*
Radici calami aromatici, ℥℔.
Concisa misc. S. Mit zwey Quart Wasser angebrüht, zu einem Bade.

Rec. Globulorum tartari martiati, ℥iβ.
Corticis salicis pentandrae, ℥iv.
Coque ex aquae libr. vj ad remanent.
libr. iv.

Colaturae refrigeratae adde
Spiritus lavandulae, ℥iij.

M. S. Zu drey stärkenden Bädern.

Klystiere.

Rec. Sacchari albi, ℥iij.
Vitelli ovi, numer. j.
Aquae chamomillae, ℥iij.

M. S. Gewärmt als Klystier anzuwenden. (Gelind ausleerend.)

Rec. Radicis valerianae,
Florum chamomillae, singul. ℥iij.
Infunde aquae fervidae q. s. ad colat.
℥iij.

Adde

Olei chamomillae infusi, ℥j.

M. S. Gewärmt zu einem Klystier. (Krampfstillend.)

Rec. Asae foetidae, gr. xv — ℥j.

Vitelli ovi, q. s.

Aquae chamomillae, ℥iij.

M. S. Zu einem Klystier. (Bey Darmkrämpfen.)

Rec. Radicis symphyti officinalis, ℥iij.

Seminis lini, ℥vj.

Coque ex aquae ℥vij ad colat. ℥iij.

M. S. Zu einem Klystier, lauwarm.
(Hat mir bey asthenischen, chronisch-
ruhrartigen Durchfällen gute Dienste ge-
leistet.)

Rec. Fellis tauri inspissati, ℥j.

Solve in

Infusi absinthii, ex ℥ij parati,
℥iijß.

Adde

Mellis crudi, ℥iij.

Olei absinthii aetherei, gtt. j.

M. S. Zu einem Klystier. (Gegen Aska-
riden sehr wirksam.)

Rec. Globulorum tartari martiati, ℥iß.

Summitatum millefolii, ℥ß.

Infunde aquae fervidae, q. s. ad colat.
℥v.

Adde

Mellis rosati, ℥j.

M. S. Zu zwey kleinen Klystieren. (Ich
habe sie gegen Erschlaffung und Vorfall
des Mastdarms mit Erfolg gebraucht.)

Rec. Radicis valerianae minoris,

Seminis santonici, singul. ℥ß.

Infunde aqu. fervid., q. s. ad col. ℥vj.

Adde

Asae foetidae, vitello ovi subactae,
℥ij.

M. S. Zu zwey Klystieren. (Gegen
Würmer.) (Henke.)