

ANTIDOTARII,

SIVE

DE COMPONENDORVM, MISCEN-
DORVM, QVE MEDICAMENTO-
RVM EXACTA RATIONE

Liber Secundus.

DE CONDITIS SIVE CONSERVIS,

Sectio prima.

¶ *Diacydonium Galeni.*

Recip. succi malorum cydoniorum struthio-
rum, sunt autem ea tenera, odorata, & medię
magnitudinis,

Mellis ana lib. iij.

Aceti candidi lib. ij.

Coctis supra prunas modicę, & spuma detracta, adde

Zingiberis ꝯ. iij.

Piperis albi ꝯ. ij.

Dein rursus lento igne recoquantur, donec mellis
crassitudinem consequantur.

Fit etiam e succo malorum cydoniorum, cum sci-
licet maior adstrictio requiritur; & etiam sine pipere,
aut zingibere, vel saltem minori quantitate: præterea
& alia aromata immitti possunt, pro rei exigentia.

* Vtile est tum ad excitendam appetentiam ijs qui-
bus decocta est, tum ad ciborum concoctionem, &
ventriculum roborat.

¶ *Miua cydoniorum simplex, Mesuz.*

Recip.

LIBER SECVNDVS

Recip. succi cydoniorum lib. xx.
 Vini candidi aufteri lib. x.
 Coquuntur lento igni, femper despumando, ad ter-
 tia³ partis consumptionem. Postquam refederit, cola,
 & adde Sacchari lib. vi.
 Iterum coquuntur ad iustam consistentiam.
 * Aduersus alui profluuia biliosa valet, ventriculū
 & cætera viscera firmat, & vomitum reprimat.

¶ Miua aromatica, Mesua.

Recip. succi malorum cydoniorum lib. xx.
 Vini albi potentis lib. x.
 Decoque igni lento ad tertias, femper despumando,
 resideat, cola, & adde
 Mellis despumati lib. vi.
 Iterum coque despumando, & impone hæc aromata,
 Cinnamomi Maffiches,
 Cardamomi ana ꝑ. iij. Ligni aloës,
 Caryophyllorum ꝑ. ij. Macis, ana ꝑ. i. s.
 Zingiberis, Croci ꝑ. ij.
 Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo
 ligata suspendantur, identidem eum fricando in ipso
 medicamento donec crassescat. Tolle ab igne & aro-
 matiza

Moschi ꝑ. i.

Trochiscorum è Gallia mosch. ꝑ. ij.

* Ventriculū, hepar, & cætera viscera roborat, ap-
 petentiam excitat, concoctionem iuuat, vomitum
 & lienteriam cohibet.

¶ Diacydonium purgans, Mesua.

Recip. succi cydoniorum lib. iij.
 Mellis albi lib. ij.
 Coque continenter despumando, donec manus non
 inficiat, quæ forma est miuæ simplicis vsitata: deinde
 inijce sequentia,
 Scammonij in malo cydonio correcti ꝑ. i. s.
 Gallia bonæ,

Caryo-

Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Mastiches,
 Piperis longi,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ ana ℥.iij.
 Misce simul omnia.

* Colico dolori, & alijs partium nutritoriarum morbis salubre est. Aut

Recip. Scammonij ℥.v.

Turbith ℥.xij.

* Cholagogum erit simul & phlegmagogum.

Aut

Abiecto scammonio misce turbith ℥.xxv.

Cartami ℥.v.

* Phlegmagogum solum erit.

* Sunt & nonnulli qui cum alijs medicamentis purgantibus cōponant, pro Medici scopo, & necessitate.

DE INFVSIS, ET DE COCTIS,

Sectio secunda.

¶ Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Mesuæ.

Recip. foliorum rosarum recentium, cōpletarum, mundatarum ℥.ij.

Rhabarbari electi ℥.ij. gr. xij.

Nardi indicæ ℥.i.s.

Rhabarbarum, & rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini lib.ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

* Bilem flauâ cleméter educendo, sanguinē purgat.

¶ Infusum succi herbarum, Melux.

Recip. succorum, intybi,

Lupuli,

Lupuli,
 Buglosi, siue boraginis, purgatorum ana ℥. viij.
 Myrobalani flauæ ℥. i. Tamar Indorum ℥. i. s.
 Rhabarbari boni ℥. iij. Pulpæ casisæ solutiue ℥. iij.
 Myrobalanus, & rhabarbarū teruntur, & per noctem
 in succis macerantur, deinde manu compressum co-
 latur, & propinatur.

* Idem quod præcedens præstat.

¶ Infusum Hieræ, Mesuæ.

Recip. Hieræ l.

Aloës ana ℥. v.

Macera decocto eupatorij infra descripto ad lib. i.

In vase vitreo, infola dies decem.

* Ventriculum & caput purgat, proinde amborum
 doloribus assiduis & hemicranis confert, ac febris
 antiquis.

Macerantur etiam decocto epithymi; & thymi.

* Sic purgat humorem crassum & melancholicum;
 & phlegmagogum est.

¶ Infusum rosarum, & violarum, Mesuæ; Iulepis ro-
 lato & violato, syrupis item rosato & violato
 solutiuis conficiendus aptum.

Recip. rosarum completarum, repurgatarū lib. vi.

Aquæ puræ lib. xv.

Ponantur rosæ in vrceo angusti oris, dein infunde a-
 quam calidam, macerentur per horas octo, obstructo
 fictilis orificio, exprime leuiter, & cola infusionem
 abiectis rosis: iterum inde recentes rosas, & infusum
 excolatum calefac & infunde rosis, macerentur &c.
 vt supra: idem fac tertio. Erit vsui in iulep rosato con-
 ficiendo.

Syrupo verò rosato solutiuo componendo, eodem
 modo, septimo, & nono iterabitur infusum: & vrceo
 angusti oris impostum, infolabitur dies quadraginta
 aliquantulo oleo superinfuso.

Similiter fit infusum violarum, ad iulep violatum, &
 syrupum

ſyrupum violatum laxatiuum.

¶ Decoctum adianti, ſeu capillorum Veneris, Meſuę.

Recip. adianti veri recentis ℥.i.s.

ſummitatum fumarix,

ſummitatum lupuli,

Violarum ſiccarum ana. ℥.i.

Pruna hispanica aut damaſcena xl.

Zizypha, x. iuiubas. xx.

coque libris tribus aquę lento igni, ad duarum libra-
rum conſumptionem.

Infunde tandem pulpę caſſię ſolutiuę ℥.iij.

Tamar Indorum ℥.ij.

Mannę ℥.i.

Rhabarbari boni ℥.iij.

Frigidum manibus frica, cola, & propina.

* Sanguinem purgat, clarumq; reddit, ardoremq;ue
ipſius ac flauę bilis compeſcit.

¶ Aqua fructuum, Meſuę.

Recip. pruna xl.

Tamar Indorum ℥.ij.

Sebeſten, ſiue myxa,

Caſſię recęs extractę ℥.iij.

Iuiubas ana. xxx.

Mannę ℥.i.

Macerentur fructus in aquę lib. iij. deinde adde caſ-
ſiam, tamar Indos, & mannam, fiat vt ſuprà.

* Sanguinis & bilis flauę feruorem reprimi, ſan-
guinem clarum reddit, & bilem clementer educit.

¶ Decoctum fumarix, Meſuę.

Recip. ſuccorum cichorij,

Intybi, ſiue endiuix,

Lupuli,

Boraginis, ana ℥.iij.

Succi fumarix ℥.viiij.

Quibus coctis, & purgatis adde

Myrobalanorum flauarum indarum, ana ℥.ij.

Paſſarum purgatarum ℥.i.

Tamar indorum ℥.ij.

Frica, cola, & ſerua.

G

* San-

LIBER SECVNDVS

* Sanguinem bile flaua & adustis humoribus purgat, hepatis obstructiones aperit, ac inde natū icterum sanat.

¶ Decoctum Thymi, Mesuæ.

Recip. thymi. Hyssopi ana ℥.i.
 Cassuthæ, Passarum purgatarum ℥.iiij.
 Myrobalani emblicarum cepularum, ana ℥.i.
 Turbith ℥.iiij. Absinthij,
 Stœchados. Anisi,
 Polypodij ana ℥.v. Dauci ana ℥.iiij.
 Eupatorij Mesuæ

Radicum { apij,
 foeniculi ana ℥.vij.

Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarū duarum consumptionem, cola: colato adde

Turbith,
 Agarici, ana ℥.i.
 Zingiberis ℥.s.

Macerari noctem sine, post die cola, & vtere.

* Phlegmagogum est, ob id senibus, & aliter pituitosis salubre, ventriculum firmat, coctionem iuuat, flatu à visceribus, & hypochondrijs dissoluit.

¶ Decoctum Epithymi, Mesuæ.

Recip. myrobalanorum indarum,

Stœchadis,
 Epithymi,
 Passarum purgatarum ana ℥.i.
 Myrobalanorum cepularum,
 Summitatum fumaricæ an ℥.iiij.
 Folliculorum senæ ℥.viiij.

Polypodij ℥.vi.
 Turbith ℥.iiij.
 Eupatorij ℥.v.

Omnia præter epithimum coquantur in feri caprini libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde epithimum, & semel seruesac, tolle ab igne

igne & adde

Hellebori nigri ℥.i. Salis indi ℥.i.s.

Agarici ℥.s. Frica, cola, vtere.

* Bilem atram vacuat, ob id affectibus melancholicis, vt cancro, elephantiafi, & cæteris confert.

¶ Decoctum Myrobalanorum, Mefuæ.

Recip. Myrobal. flauarú, Comarú fumarix ℥.viij.

Cepularum, Abfynthij ℥.ij.

Indarum ana ℥.i. Pruna xxx.

Tamar indorum ℥.i.s. Passarum purgatarú ℥.i.

Coque in libris tribus aquæ, ad duarum librarú consumptionem: cum imbecillú voles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde pulpæ cafsiæ ℥.ij.

cum autem valentius,

Pulpæ cafsiæ ℥.i. Agarici ana ℥.s.

Turbith, Frica, cola.

Præstantius fiet fi in fero lactis caprini coquantur.

* Bilem vtramque, & pituitam purgat.

¶ Decoctum ſtoechados, Mefuæ.

Recip. ſtoechadis, Schœnanthi,

Origani cretici ana ℥.iiij. Hyſſopi ana ℥.ij.

Seminum, apij, Paſſarú purgatarú ℥.viij.

Fœniculi, Turbith ℥.iiij.

Eupatorij Mefuæ ana ℥.iiij. Coque vt ſuprà, & vtere.

* Confert pituitofis affectibus, vt febris quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori, & frigida intemperiei.

¶ Decoctum Eupatorij, Mefuæ.

Recip. Eupatorij, Comarú fumarix añ. ℥.iiij.

Abfynthij, Bedeguar,

Aſari, Secacul ana ℥.iiij.

Nardi indicæ, Myrobalanorú cepularum

Adiati, hoc eſt capil. ven. Indarum ana ℥.viij.

Ciperi, Paſſarú purgatarum ℥.i.

Rhabarbari, Coque & vtere.

* Hepatis & lienis obſtructionem, & inde naſcen-

G 2 tes

L I B E R S E C V N D V S

tes dolores & febres compositas iuuat.

¶ Decoctum Magistrale commune, ad Medicamenta maceranda.

Recip. pruna xij.

Sebesten x.	Polypodij,
Passarum ʒ.i.	Epithymi,
Hordei decorticati ʒ.s.	Cartami,
Glycyrrhizæ repurgatæ	Anisi,
Violarum,	Dauci,
Folliculorum senæ,	Cinnamomi ana ʒ.ij.

Coque in aquæ communis lib.ij. donec dimidium absumatur, cola, & vt ere.

¶ Decoctum Magistrale refrigerans.

Rec. pruna xij. Hordei mundati ʒ.i.

Tamarindorum, Violarum,
Passarum añ. ʒ.s. Seminũ comuniũ maiorũ añ. ʒ.ij.
Coque in libris duabus aquæ, vt supra.

¶ Decoctum Cordiale.

Recip. pruna xij.	Violarum,
Passarum ʒ.i.	Melissophyli,
Sebesten xvi.	Capillorũ veneris añ. M.s.
Iuiubas x.	Seminis basilici,
Florum	{ boraginis, Glycyrrhizæ,
	{ buglosi, Dauci ana ʒ.ij.

Coque vt supra.

Decoctum verò cordiale refrigerans fit additis seminibus communibus, ijsque seminibus quæ decoctum refrigerans supra descriptum ingrediuntur.

¶ Decoctum Cephalicum calfaciens.

Recip. stœchadis,	Glycyrrhizæ,
Betonicæ,	Anisi,
Saluiæ ana. M.s.	Dauci ana ʒ.ij.
Radicum pœoniæ ʒ.ij.	Nucis moschatæ ʒ.s.
Passarum ʒ.i.	Coque vt supra.

Cùm mitigare voles, addes

Hordei purgati ʒ.i.

Tamar

Tamarindorum ℥.s.
Seminum communium maiorum ana ℥.ij.

¶ Decoctum Pectorale.

Recip. passarum ℥.i. Hordei purgati ℥.i.
Sebesten, Glycyrrhizæ ℥.s.
Iuiubas ana xv. Adianti M.s.
Dactylos vi. Hyssopi ℥.ij.
Coque vt suprâ.

¶ Decoctum flatus pelleus, seu Carminatiuum
vt vocant.

Recip. anisi. Glycyrrhizæ ℥.s.
Dauci, Florum chamæmeli M.s.
Cymini, Passarum ℥.i.s.
Foeniculi ana ℥.ij. Coque vt dictum est.

DE SAPIIS SEV ROB, IVLEPIS,
ET SYRYPIS,

Sectio tertia.

¶ Diamoron, Galeni.

Recip. succi mororum domesticorum lib.v.
Mellis lib.i.

Clarificatur primùm succus, dein vnâ cum melle co-
quiritur ad iustam consistentiam, & seruetur in vsu.
Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter suprâ di-
cta, recipit

Myrrhæ

Croci ana ℥.i.s.

Omphacij, agrestam vocant, ℥.i.

Coquitur omphacium cum succo & melle: myrrhæ
verò & crocum sub finem immittuntur, cum scilicet
ab igne medicamentum tollitur.

* Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affe-

G 3 etus,

LIBER SECVNDVS

ctus, & gingiuarum noxas vitia sunt, atque ad omnia oris vitia.

¶ Diamoron vsitatum Nicolai.

Recip. succi mororum batinorum lib. i.

Succi mororum domesticorum lib. s.

Mellis lib. s.

Sapæ ꝑ. iij.

Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinē, serua.

* Idem quod superiora præstat.

¶ Diarhæon, Galeni.

Recip. succi malorum granatorum, acidorum,

dulcium, &

acidodulcium ana lib. s.

Mellis lib. i.

Coquitur succus ad mellis consistentiam, deinde addito melle iterum coquitur & seruatur.

* Intemperiem calidam tollit, vomitum compescit & alui fluorem, & ventriculum roborat.

¶ Diacaryon Galeni, tale est & Mesuræ.

Recip. succi corticum viridium iuglandium, diebus canicularibus extracti lib. iij.

Mellis lib. ij.

Coque vt supra.

Aliqui sumunt mellis partē vnā, syrapi rosati partem vnā, & balauftiā addunt, aliaque simplicia pro rei necessitate.

* Destillationi tenuium & acrium humorum à capite, & phlegmonem excitantium, confert.

¶ Iulepum rosatum Mesuræ, quod & syrupus rosarum recens.

Recip. aquæ, in qua rosæ tertio sunt maceratæ, ꝑ. v. Sacchari lib. iij.

Coquuntur lento igne vt supra.

* Febricitantiū acutē sitim inexpletam sedat, ventriculi, cordis, & iecoris æstum mitigat.

Eodem modo fit iulepū ex infusionibus violarum;

Com-

Componitur etiam vtrunque ex aqua stillatitia, & succo rosarum & violarum: exempli gratia.

Sumuntur rosarum aut violarum aquæ stillatitiæ, aut succi lib. iij. Sacchari lib. ij.

Coquantur vt suprà.

Eadem ratione compositum est Rhodostacton Pauli è melle & succo rosarum.

¶ Hydromelum Pauli.

Recip. succi malorum cydoniorum lib. iij.
Mellis lib. vi.

Aquæ lib. viij.

Coque in modum iulepi.

* Aduersus alui profluvia biliosa valet, vètriculum firmat, & ventriculum cohibet.

¶ Hydromelon aliud Pauli.

Recip. malorum cydoniorum purgatorum concisorum lib. v. aquæ fontanæ lib. xij.

Coquito donec flaccida fiant, cola, & ad ipsam aquam mellis despumati tantundem admisceto, rursusq; coquito donec octaua pars fuerit consumpta.

* Idem potest quod præcedens.

¶ Hydrorofatum Pauli.

Recip. rosarum ablatis vnguibus, siue purgatarum lib. iij.
Aquæ lib. viij.

Mellis lib. vi.

Coque despumans in iulepi modum, cola, & serua.

* Siticulosis in febre ardente, & exolutis ac stonacho male habentibus conuenit.

¶ Apomeli ex Philagrino, D. Pauli

Recip. fauorum melle plenorum alborum lib. i.
Aquæ fontanæ lib. ij. s.

Mel expressum in fictili coquito, donec spuma & quod velut cerosum supernatat ablatum fuerit, tunc diligenter vasis bene obturatis reponito.

* Sputum educit, mouet vrinas, aluum emollit, & humores attenuat.

G 4

¶ Aqua

LIBER SECVNDVS

¶ Aqua mulsa.

Recip. mellis lib. i.

Aquæ pluuiæ lib. viij.

Coque lento igne, donec amplius nõ spumet, vt ere. Augetur quandoque mellis quantitas, & decoquitur ad iulepi consistentiã, nempe quando à Medico præscribitur, aut quòd ita illi visum est, aut quòd diutius seruanda sit: & aromatizatur cinnamomo, folijs saluiæ, & similibus, prout vsus postulat.

* Affectus frigidus cerebri, neruorum, & iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem promouet, colicis prodest, & calculum in meatibus vrinæ gigni prohibet.

Aqua pectoralis fit his additis quæ decoctum pectorale supra descriptum ingrediuntur.

¶ Oxymeli simplex Galeni.

Recip. mellis despumati lib. ij.

Aceti albi lib. i.

Coquuntur donec qualitates aceti & mellis probè permixtæ sint, hoc est ad quartam partem.

Mesues addit

Aquæ fontanæ lib. i.

Coquitque ad dimidias.

Fit etiam acetosius, aut minus acetosum, pro eius palato cui præscriptum est.

Fit etiam oxymeli imbecillius addita aqua, ab Arabibus secheniabin nuncupatum, hoc modo.

Mellis lib. ij.

Aquæ fontanæ lib. iij.

Coquuntur simul, donec probè despumata sint; deinde addita

Aceti lib. i.

Iterum coquuntur, donec eorum qualitates planè vnitæ fuerint.

Interdum mel, aqua, & acetum eodem momento permiscuntur, decoquunturque ad quartam, aut tertiam partem.

* Humo-

* Humores crassos, lentos, ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, obstructions aufert, sputū educit, & sitim sedat.

¶ Oxymeli compositum.

Recip. corticum radicum eleoselini, (apium vulgare intelligit)

Foeniculi, Seminis apij vulgaris

Petroselini, Foeniculi ana ℥.i.

Asparagi, Aquæ lib.xij.

Rusci ana ℥.ij.

Coque donec dimidium absumatur, Colaturæ adde Mellis despumati lib.iiij.

Aceti lib.i.

Rursus coquito ad tertias.

* Humores crassos & pituitosos incidit, & extergit: ob id iecoris, lienis, & renum obstructions tollit: vrinam mouet, sudoremque euocat.

¶ Oxymeli scilliticum Mesuæ.

Recip. mellis despumati lib.iiij.

Aceti scillitici lib.ij.

Coquantur vt prædicta.

* Humores crassos, lentos, frigidos eradicatu difficiles extenuat, incidit & abstergit, ideoque ad cindum vomitum efficax, ructum acidum sanat, & vrinæ incontinentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, fit vt oxymeli compositum.

¶ Acetum scylliticum Mesuæ, quale est & Galeni.

Recip. scillæ candidæ, mediæ magnitudinis, laminas inter corticem & cor medias, acu lignea filo traiectas tanto interuallo ne se contingant, siccabis in vmbra dies 40. postea concisam cultello ligneo, lib. vnam insolabis in aceti boni lib. viij. in vase vitrato angusti oris, bene obstructo, dies alios 40. canicularum, postea frica, & cola.

Nicolaus scillæ sumit pane inuolutæ, & in cliba-

G 5 no

LIBER SECVNDVS

no coctæ lib.i.s.

Aceti acerrimi lib.vij.

& in vase vitrato per dies 40. in solat.

* Efficacissimum est ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiam & vertiginem: gingiuas laxas, & putrescentes sanat, dentes confirmat, oris odorem comendat foetore illius dissipato: partes respiratorias iuuat & expurgat, & guttur roborat, ob id vocem clariorem efficit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, concoctione enim iuuat, hepar & lienem expurgat eorumque dolore leuat. Intestinorum & vesicæ retentricem vim firmat, vuluarum strangulationibus & iuncturarum affectibus prodest. Admodum imbecillos recreat, corpus sanum reddit, bonumque colorem conciliat.

¶ Syrupus acetatus simplex Mesuæ.

Recip. aceti potentis lib.iiij

Sacchari aqua secundam artem clarificati lib.v.

Coquito in vase lapideo aut figulino bene cocto vitrato & fit Syrupus.

* Affectibus biliosis, febribus maxime auxiliatur, quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit & extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, vrinas mouet ac sudores.

¶ Syrupus acetatus cum radicibus Mesuæ.

Recip. aquæ fontanæ lib.x. Seminum apij.

Radicum apij,

Foeniculi,

Foeniculi,

Anisi ana,

Intybi seu endiuicæ ana ꝑ.iiij. Endiuicæ ana ꝑ.i.

Coquantur lento igne ad dimidias, Calaturæ adde

Sacchari repurgati lib.iiij.

Aceti albi lib.ij.

Coquito in syrapi consistentiam.

Fit etiam sine aceto.

* Bilē crassam & auulsu difficilē ac pituitā incidit, terget, obstructions hepatis, lienis, & renū aperit.

¶ Syru-

¶ Syrupus de quinque radicibus.

Recip. radicum apij, Rusci,
 Fœniculi, Asparagi ana ℥.ij.
 Petroselinî, Aquæ fontanæ lib.vi.
 Coque ad tertiæ partis consumptionem: expressum
 coquitur cum sacchari lib.ij. addendo ad finem aceti
 albi ℥.viij.

* Prædicto efficacior, ad syrups Bizantini vires pro-
 ximè accedens.

¶ Syrupus acetatus diarhodon Mesuræ.

Recip. succorum intybi, Rosarum siccarum ℥.i.
 Apij, Glycyrrhizæ ℥.s.
 Lupuli ana lib.ij.s. Nardi indicæ ℥.ij.s.
 Radicum intybi, Seminum anisi,
 Apij, Fœniculi,
 Fœniculi ana ℥.ij. Apij ana ℥.viij.
 Macerata in aquæ lib. vi. coque ad duarum partium
 consumptionem, deinde cum
 Sacchari lib. ij.
 Aceti lib. ij.
 fiat syrupus.

* Ad febres complexas, & eas quæ formam corpo-
 ris corrumpunt utilis est, obstructiones hepatis &
 lienis aperit.

¶ Oxyfacchara simplex Nicolai.

Recip. sacchari albi lib.i.
 Succu malorum granatorum acidorum ℥.viij.
 Aceti ℥.iiij.
 Coquantur ad iustam consistentiam.
 Nonnulli, aceti loco, vinum malorum granatorum
 sumunt.

* Confert ad febres tertianas, tertianas duplices,
 ardentes & hecticas.

¶ Oxyfacchara composita Nicolai.

Recip. adianti siue capillorum veneris
 Phyllitidis, siue linguæ ceruinæ,

Cete-

LIBER SECVNDVS

Ceterach, id est aspleni, Radicum foeniculi,
 Polytrichi, Rusci,
 Hepaticę, Asparagi,
 Violarum, Graminis ana lib. i.

In vino siue succo malorum granatorum omnia tri-
 duum macerato, deinde percoquito, forti expressio-
 ni addito sacchari quod satis est. Coquito secundum
 artem.

* Concalesceta corpora potum iuuat, longis febr-
 bus quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecoris
 auxilio est, & lienis obstructiones tollit.

¶ Syrupus acetositatis citri Mesuę.

Recip. succi citriorum acidi lib. vi.

Sacchari lib. iiii.

Coquantur secundum artem.

* Aestum ac feruorem bilis flauę, febriumque ar-
 dentium, & pestilentialem mitigat, sitim quoque ve-
 hementem restinguit, ebrietati resistit, vertiginemque
 iuuat.

¶ Syrupus acetositatis limonum.

Recip. succi acidi limonum maturorum transco-
 lati lib. vi.

Sacchari albi lib. iiii.

Coque vt artis est.

* Pręcedente magis refrigerat & penetrat, Cor &
 stomachum roborat, putrefactioni resistit, & spiritus
 resolui prohibet.

¶ Syrupus Bisantinus simplex Mesuę.

Recip. succorum endiuę,

Apij, ana lib. ij.

Boraginis,

Succorum lupuli,

Buglosi ana lib. i.

Feruesiant semel, purgentur

eius succi clarificati lib. iiii.

Sacchari albi lib. ij. s.

Coquito lento igne, & fiat syrupus.

Interdum ad singulas succi clarificati libras, ace-
 ti

ti ꝑ. vi. adduntur.

* Compositus fit hunc in modum.

Adduntur prædictis

Rosarum aridarum ꝑ. ij.

Seminum anisi,

Glycyrrhizæ ꝑ. s.

Apij,

Nardi indicæ ꝑ. ij.

Fœniculi ana ꝑ. iij.

Builiant cum prædictis succis, Colaturæ adde saccharum.

* Humores crassos & lentos incidit atq; extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit. Compositus ad hæc omnia efficacior est.

¶ Syrupus rosatus solutiuis.

Recip. infusionis rosarum secundum artē ^{nonum} iteratæ lib. x.

Sacchari tantundem.

Coquuntur in syrui consistentiam.

Nonnulli cum melle conficiunt.

* Bilem purgat.

¶ Syrupus rosatus è rosis ficcis.

Recip. infusionis rosarum aridarum,

Sacchari albi ana lib. ij.

Percoquuntur secundū artem ad syrui consistentiā.

* In febribus calorem extinguit: ob id sitim quoque sedat, & ventriculum roborat.

¶ Syrupus violatus solutiuis.

Recip. infusionis violarum nonum iteratæ,

Sacchari clarificati ana lib. v.

Coquuntur lento igne ad syrui consistentiam.

* Ad eadem efficac ad quæ rosatus solutiuis.

¶ Syrupus è succo violarum.

Recip. succi violarum in mortario marmoreo con-
tularum depurati lib. iij.

Sacchari clarificati tantundem.

Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

* Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitii calidis confert.

¶ Syru-

LIBER SECVNDVS

¶ Syrupus violatus Mefuæ.

Recip. violarum ꝑ.ij.

Seminum cydoniorum, &

Maluæ ana ꝑ.i. Iuiubas,

Sebesten ana xx. cum aquæ cucurbitæ lib.vi.

Coque ad tertiam partem, & addita

Sacchari lib.i.s. Fiat syrup. secundum artem.

* Pleuritidi & tussi à causa calida prodest.

¶ Syrupus Endiuiaæ simplex.

Recip. succi endiuiaæ clarificati & depurati lib.vij.

Sacchari optimi libras totidem.

Coque lento igne in formam syrupi.

* Valet ad immodicum calorem hepatis, aliorumq; membrorum nutritiuorum: in morbo laterali maxime conuenit.

Syrupus è cichorio eodem modo fit quo endiuia, similiter & syrupus è fumaria, reliquique syrupi simplices ex succis herbarum compositi, vt superiori libro dictum est cap. de Syrupis.

¶ Syrupus Endiuiaæ compositus.

Recip. endiuiaæ recentis,

Boraginis, Melissæ,

Scariolæ, Eupatorij ana. M.i.

Hepaticæ, Seminum frigid. maiorum ana ꝑ.i.

Buglossæ, Sandalorum albi, rubri ana ꝑ.i.

Florum cordialium ana ꝑ.ij.

Coquatur secundum artem in aqua, cola, & colatura adde

Succi endiuiaæ depurati lib.v.

Vini granatorum ꝑ.ij.

Sacchari albi lib.iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Alia exēplaria habent succi endiuiaæ depurati ꝑ.i.

¶ Alius syrupus Endiuiaæ compositus, Gentilis;

qui in vsu est.

Recip. succi endiuiaæ,

Succi

Succi hepaticæ ana lib.ij.

Clarificatis ad ignem, adduntur

Violarum, Florum nymphææ,
Rosarum rubrarum, Lenticulæ aquaticæ,

Trichomanis, vulgò polytrichi ana ℥.s.

Capill. Veneris, hoc est adianti,

Hordei mundati,

Seminum frigidorum maiorum ana ℥.i.

Contusa & horas xij. in dictis succis macerata co-
quuntur, & colaturæ adduntur

Sacchari albi lib.ij.

Fiat syrupus: & aromatizetur cum

Santalorum { rubrorum,
 { alborum,

Berberis, Ligni aloës,

Seminum cydoniorum, Cinnamomi,

Corticum citri ana ℥.i.

Tunde & aromatiza secundum artem.

* Valet uterq; syrupus compositus endiuia ad im-
modicum iecoris, cordis & aliorum nutritioni ser-
uientium instrumentorum calorem, in summa ad
omnem calidam intemperiem. Soluit obstructions
& partes à calore debilitatas roborat.

¶ Syrupus de Cichorio compositus Ni-
colai Florétini.

Recip. intybi seu endiuia domestica & syluestris.

Cichorij, Glycyrrhizæ,
Taraxacon ana M.ij. Capillorum Veneris,

Cicerbitæ, Ceterach. i. aspleni,

Hepaticæ, Adianthi,

Lactucæ, Polytrichi,

Scariolæ, Cuscutæ ana ℥.vi.

Fumariæ, Radicum foeniculi,

Lupili ana M.i. Apij,

Hordei ℥.ij. Alparagi ana ℥.ij.

Vesicariæ. i. alkekangi,

Co-

LIBER SECVNDVS

Coquantur in sufficiēti aqua & percolentur, & cum saccharo albo fiat syrupus : pro singulis libris inter coquendum adde

Rhabarbari electi ℥.iiij.

Spicæ nardi ℥.iiij.

Tunduntur & in nodulo ligata suspenduntur in vase in quo syrupus iam coctus referuatur, ac ibi relinquuntur.

* Confert aduersus omnem materiam venenatam, & in febre pestilentiali. Corroborat cor, & instrumenta nutritioni famulantia, expurgat per vrinas & aluum, excitat appetentiam, & somnum inducit.

¶ Syrupus è fumarìa compositus Mesuæ.

Recip. myrobalanorum flauarum,

Cepularum ana ℥.ij.s. Epithymi,

Florum boraginis, Polypodij ana ℥.vij.

Buglossæ, Pruna C.

Violarum, Vuarú passarú purgatarú ℥.s.

Absinthij, Tamarindorum,

Cassuthæ ana ℥.i. Pulpæ cassiæ ana ℥.ij.

Glycyrrhizæ, Aquæ communis lib.x.

Rosarú rubrarú ana ℥.s.

Omnia præter cassiâ & tamarindos lento igne percoquantur secundum artem, & colatur: in colatura dissoluuntur ipsa cassia & tamarindi; deinde additis Succi fumarizæ depurati,

Sacchari albi ana lib.iiij.

Rursus coquantur in formam syrupi.

* Ventriculú & hepar roborat, obstructions aperit, cutis morbos, præcipuè ab humore falso vel vsto natos, vt psoram, lepram impetiginè, serpiginè curat.

¶ Syrupes de Lupulo.

Recip. succi lupuli depurati lib.iiij.

Succi fumarizæ depurati lib.ij.

Sacchari lib.vi.

Fit syrupus secundum artem.

* Re-

* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem ictero laborantibus detrahit, pituitam in hydrope per aluum exigit.

¶ Syrupus myrtinus simplex Mesuæ.

Recip. succi baccarum myrti depurati lib. viij.
Sacchari clarificati lib. iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Ventriculū & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & sitim mitigat.

¶ Syrupus myrtinus compositus.

Recip. baccarum myrti ℥. xx.

Sanrali albi, Berberis ana ℥. xv.

Sumach. i. Rhois, Mespilorum ℥. l.

Balauftiorum, Aquæ fontis lib. viij.

Omnia coque ad medietatem, cola, colato adde

Succi granatorum,

Succi cydoniorum ana lib. s.

Sacchari lib. iij. & confice syrupum.

* Profluuium ventris etiam diurnum sistit, & sanguinis excreationem cohibet.

¶ Syrupus è Iuiubis Mesuæ.

Recip. iuiubas nu. lx. Seminum cydoniorum,

Violarum, Papaueris albi,

Seminis maluæ ana ℥. v. Melonis,

Capillorum Veneris, Lactuce,

Hordei mundati, Tragacanthi ana ℥. iij.

Glycyrrhizæ ana ℥. i.

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate,

& cum sacchari lib. duabus fiat syrupus.

* Confert raucitati, tussi & pleuritidi.

¶ Syrupus è Glycyrrhiza Mesuæ.

Recip. glycyrrhizæ ℥. ij. Hyssopi ℥. s.

Capillorum Veneris ℥. i. Aquæ pluuiæ lib. iij.

Macerentur horis xxij. coque ad dimidias, colaturæ adde

Mellis despumati,

H

Sac-

LIBER SECVNDVS

Sacchari clarificati,
Penidiorum alborum ana ℥.viij.

Aquæ rosarum ℥.vi. Fiat syrupus secundum artem.

* Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque diu-
turnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.

¶ Syrupus Capillorum Veneris simplex.

Recip. infusionis capillorum Veneris recentiu ter
factæ secundum artem lib.iiij.

Sacchari albi lib.ij. Coque, fiat syrupus.

¶ Syrupus Capill. Ven. compositus Magistralis.

Recip. capill. Veneris ℥.v.

Glycyrrhizæ rasa ℥.ij.

Macerentur in aqua horas xxiiij. deinde coque ad di-
midij consumptionem: colaturæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum,

Aquæ capillorum Ven. ana ℥.viij.

Coque, fiat syrupus.

* Valent ad thoracis affectus calidos, & viscerum
obstructiones.

¶ Syrupus è corticibus Citri. *mas*

Recip. corticum citri recentium lib.i.

Chermes ℥.ij.

Aquæ fontanæ lib.x.

Coquantur ad duarum tertiarum consumptionem,
& percolantur: colaturæ adduntur

Sacchari clarificati lib.ij.s.

Fiat syrupus secundum artem, & aromatizetur cum
moschi Orientalis ℥.iiij.

* Cerebrum, cor, stomachum roborat, & oris gra-
tiam commendat.

¶ Syrupus de Mentha maior Mesuæ.

Recip. succi pirorum cydoniorum,

Sruthiorum,

Granatorum dulcium,

Granatorum acidorum,

Granatorum mezorum ana lib.i.s.

In

In quibus, horas 24. macera

Menthæ siccæ lib.i.s.

Rosarum rubrarum ℥.ij.

Coque igni lento ad dimidias, & cola, colaturę adde Mellis, siue Sacchari lib.ij.

Fiat syrupus vt artis est, & cum seponitur, aromatiza Galliæ moschatae ℥.iij. nodulo ligatis & ex orificio vasis suspensis.

* Ventriculū frigidū roborat, ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

¶ Syrupus de Mentha minor Mefuæ.

Recip. succi menthæ depurati,

Granatorum dulcium,

Granatorum acidorum ana lib.i.

Sacchari, aut Mellis lib.i.

Fiat syrupus secundum artem.

* Eandem ferè cum superiore facultatem habet.

¶ Syrupus de Absinthio M.

Recip. absinthij Romani lib.s.

Rosarum rubrarum ℥.ij.

Spicæ nardi ℥.iij.

Vini albi, veteris, boni, odori,

Succi cydoniorum ana lib.ij.s.

Maceratur in vase vitratō per noctem vnam, deinde decoquantur vt artis est, colaturę adde

Mellis lib.ij. Fiat syrupus.

* Ventriculū & hepar roborat, ob id appetētiā excitat, retentricem vim firmat: contra regium morbum prodest, flatus discutit, humoresque per vrinam pellit.

¶ Syrupus de Calamintha eiusdem.

Recip. calaminthæ montanæ,

Calaminthæ domesticæ ana ℥.ij.

Seminum leuistici,

Dauci,

Schoenanthi ana ℥.v.

H z

Passa-

LIBER SECVNDVS

Passarū purgatarum lib.s. Aquæ quantum satis est,
Mellis lib.ij. Fiat syrupus.

* Asthma, tussim antiquam, intemperiem viscerum
frigidam, & splenicos iuuat.

¶ Alius eiusdem.

Recip. fucci calaminthæ,
Granatorum acidorum

Vini albi odori ana lib.iiij.

Coque ad dimidias, & clarificato adde

Sacchari albi lib.iiij.

Fiat syrupus vt artis est, & aromatiza

Gallæ moschatæ ℥.ij.

* Singultum, & vomitum à pituita vel bile flaua
crassa sedat.

¶ Syrupus de Epithymo Mesuæ.

Recip. epithymi ℥.xx.

Myrobalan. flauarum,

indarum ana ℥.xv.

Cassuthæ,

Agarici.

Fumaræ ana ℥.x.

Stœchadis, ana ℥.vi.

Thymi,

Rosarum rubrarum,

Buglossæ,

Fœniculi,

Calaminthæ,

Anisi ana ℥.ij.s.

Myrobal. emblicarum,

Pruna nu.xx.

bellericarum, Passarū purgatarum ℥.iiij.

Glycyrrhizæ,

Tamar indorum ℥.ij.s.

Polypodij,

Aquæ quod satis est,

Bulliant secundum artem: colaturæ adde

Sacchari lib.iiij.

Sapæ lib.ij.

Fiat syrupus.

* Atram bilem, & alios humores vstos vacuat, ob
id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum,
vlcera maligna, fistulosa, lepram psoriam, præcauet,
curatque.

¶ Syrupus de Prasio Mesuæ.

Recip. marrubij, hoc est, prasi ℥.ij.

Capil-

Capillorum Veneris, Lini,
 Hyssopi, Iridis ana ꝑ.iiij.
 Calaminthæ, Seminum cydoniorum ꝑ.ij.
 Anisi ana ꝑ.vi. Vuarú passarú purgatarú ꝑ.ij.
 Radicum apij, Ficus passas pingues nu.xvi.
 Fœniculi ana ꝑ.v. Penidiorum,
 Seminum malux, Mellis ana lib.ij.
 Fœnigræci, Aquæ quod sufficit,
 Fiat syrupus.

* Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa,
 lenta, putri; hinc asthmatis, & antiquæ tussis prodest,
 quales affectus senibus & natura frigidis sunt fre-
 quentes.

¶ Syrupus de Hyssopo Mefux.

Recip. hyssopi ficci, Capillorum Ven. ꝑ.vi.
 Radicum apij, Iuiubas,
 Fœniculi, Sebesten ana nu.xxx.
 Petrofelini, Passarú purgatarú ꝑ.i.s.
 Glycyrrhizæ ana ꝑ.x. Ficus passas pingues,
 Hordei mundati ꝑ.iiij. Dactylos pingues añ.nu.x.
 Seminum malux, Penidiorum alború lib.ij.
 Cydoniorum ana ꝑ.iiij. fiat syrupus.

* Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, humo-
 resque excreatu contumaces extenuat & educit.

Syrupus de Stœchade simplex.

Recipit florum stœchadis ꝑ.xxx.

Thymi, Anisi ꝑ.vij.
 Calaminthæ, Passarum purgatarum ꝑ.iiij.
 Origani añ. ꝑ.x. Aquæ quod satis est.
 Coquantur secundum artem, & colaturæ adde
 Mellis lib.iiij.s.

Condiatur cum

Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Zingiberis ana ꝑ.i.s.

Ligenrur in sindone, & in syrupo suspendantur.

H 3 *Iuuat

LIBER SECVNDVS

* Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruotum, vt paralyfin, epilepsiam, conuulsionē, spasmus cynicum, tremorem.

¶ Syrupus de Stœchade compositus Mesuæ.

Recip. florum stœchadis ℥.xxx.

Thymi, Piperis longi ℥.iij.

Calaminthæ, Zingiberis ℥.ij.

Origani ana ℥.x. Passarum ℥.iiij.

Anisi, Aquæ quod satis est,

Pyrethri ana ℥.vij. Mellis lib.v.

Fiat syrupus lento igni, deinde aromata subsequētia leuiter contusa, panno raro ligata in eo suspendes;

Cinnamomi, Croci,

Calami aromatici, Zingiberis,

Spicæ nardi, Piperis longi, & nigri, añ. ℥.i.s.

* Idem quod præcedens efficit.

¶ Syrupus de Nymphaea simplex Nicolai.

Flores nymphaeæ, quot uoles macerato, ac ter flores mutato, horum infusionis accipies lib.iiij.

Sacchari quod sufficit, Fiat syrupus.

* Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoque mirifice ardentibus alijsque febribus acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

¶ Syrupus de Nymphaea compositus Francisci Pedemontani.

Recip. florum nymphaeæ albæ ℥.ij.

Florum nymphaeæ luteæ,

Semin. pŷyllij integri,

Sem. acetosæ ana ℥.i.

Seminum cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Melonum,

Lactucæ ana ℥.s.

Seminum endiuæ domesticæ,

Endiuæ syluestris,

Por-

Portulacæ ana ℥.ij.
 Radicum foeniculi ℥.i.
 Coquantur in aqua hordei sufficienti, & colaturæ
 adduntur
 Sacchari lib.i.
 Vini granatorum acidorum,
 Aceti albi ana ℥.ij.
 Fit syrupus, & aromatizatur cum
 Santali citrini,
 Spicæ nardi indicæ ana ℥.i.s.

* Idem quod præcedens potest, estq; eo validius.

¶ Syrupus è papauere simplex Mesuæ.

Recip. capitum papaueris albi,
 & nigri recentium ana ℥.lx.

Aquæ pluuiæ lib.iiij.
 Coquantur ad consumptionem librarum duarum
 & dimidiæ aquæ, & additis
 Sacchari,
 Penidiorum ana ℥.vi. Fiat syrupus.
 * Aduersus catarrhum, & sitim prodest, somnumq;
 conciliat.

¶ Syrupus è papauere compositus Mesuæ.

Recip. papaueris albi, & Iuiubas numero. xxx.
 nigri ana ℥.l. Seminum, lactucæ,

Capillorum Veneris ℥.xv. Maluæ,
 Glycyrrhizæ ℥.v. Cydoniorū añ. ℥.xi.

Coque in libris quatuor aquæ ad dimidij consum-
 ptionem, & cum Sacchari,
 Penidiorum ana ℥.viij. Fiat syrupus.

* Valet ad tussim ficcā, phthisim, catarrhum ca-
 lidum & aerem, somnumque conciliat.

¶ Syrupus de Eupatorio Mesuæ.

Recip. radicū fœniculi, Schoenanthi,

Apij, Cuscutæ,

Endiuix ana ℥.ij. Absinthij,

Glycyrrhizæ, Rosarum ana ℥.vi.

H 4 Capil-

LIBER SECVNDVS

Capillorum Veneris,	Mastichis ana ℥.iij.
Cardui benedicti,	Spicæ nardi,
Radicū cardui benedicti,	Alari,
Florum buglossæ,	Folij ana ℥.ij.
Anisi,	Aquæ lib.vij.
Feniculi,	Succorum apij,
Eupatorij ana ℥.v.	Endiuæ ana lib.ij.
Rhabarbari electi,	Sacchari lib.iiij.

Coquantur & fiat syrupus.

* Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitijs, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, maloque corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, vrinas, flatu dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur.

¶ Syrupus è Polypodio compositus.

Rec. Polypodij quercini ℥.x.	Alari ana ℥.s.
Melissæ,	Senæ,
Buglossæ ana M.s.	Epithymi ana ℥.i.
Cyperij,	Seminum lactucæ,
Corticum radicis capparidis,	Endiuæ,
Acori,	Scariolæ añ. ℥.i.s.

Coquantur in aqua secundū artē, & colaturæ adde Rosati colati lib.i. Fiat syrupus.

* Humores crassos ac lentos digerit ac vacuat, bilem atram, & pituitam crassam & lentam purgat etiam à iuncturis: Affectibus ob id melancholicis prodest, vt quartanis, & splenis duritiei.

¶ Syrupus de Pomis simplex Mesuæ.

Recip. succi pomorum dulcium,
& acetosorum ana lib.v.

Coque ad dimidij consumptionem, & colaturæ adiunge

Sacchari clarificati lib.iiij. Fiat syrupus.

* Cor imbecillum roborat, ob id cordis syncopen & tremorem sanat.

¶ Syrupus de Pomis Saporis.

Recip.

Recip. succorum boraginis,

Buglossæ ana lib. iij.

Succi pomorum dulcium lib. iij.

Foliorum senæ ℥. iij.

Croci ℥. ij.

Maceretur sena in dictis succis horas xxiiij. Coque

& cola, colaturæ adde Sacchari lib. iij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet, ligatum
in panno lineo raro.

* Efficacior est præcedenti.

¶ Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

Recip. quinque radicum ana ℥. i.

Seminum quatuor frigidorum maiorum ana ℥. i. s.

Hyslopi,

Capillorum Veneris,

Ceterach id est, aspleni ana M. s.

Violarum,

Hermodactylorum,

Florum rorismarini

Cuscuthæ, ana ℥. s.

boraginis añ. M. i. s. Anisi,

Cypero ℥. iij.

Feniculi,

Camomillæ ℥. ij.

Carui ana ℥. ij. s.

Passarū corinthiacarū ℥. i.

Polypodij ℥. iij.

Senæ ℥. ij.

Agarici ℥. ij.

Coquantur in aquæ lib. iij. & colaturæ adde

Sacchari lib. i. s.

Rhabarbari ℥. iij. s.

Rosarum ℥. i.

Turbith ℥. iij.

Hæc tenuissimè trita, in q̄; panno ligata suspendes in
syrupo cocto secundum artem.

ECLEGMATA, SEV LOCH.

Sectio quarta.

¶ Diacodion, Galeni: hoc est Diacodion simplex.

Recip. capita papaveris albi, mediocri magnitu-
dine, nec nimium viridibus, nec nimium matu-

H § ris

ris, num. xx.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ lib. iij.

Macera viginti quatuor horas, p̄dit coque, donec capita contabuerint, cola & additis

Mellis lib. ij. Coque in iustam consistentiam.

Fit etiam hodie cum saccharo.

* Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis,

¶ Diacodion cum sapa.

Recip. decoctionis prædictæ lib. ij.

Sapæ vini dulcis lib. ij.

Glycyrrhizæ ℥. ij.

Coquitur in iustam consistentiam.

¶ Diacodion compositum.

Recip. capita papaueris flaccida num. x.

Aquæ pluuiæ lib. i. s.

Coquantur ad tertias: Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ℥. iij.

Mellis ℥. i.

Coquantur ad perfectionem, deinde addantur

Acaciæ, Balaustiorum ana ℥. i.

Hypocistidis, Confectionis ramich ℥. iij.

Croci, Misce, serua.

* Præter simplicis facultates, sanguinis reiectionem à visceribus thoracis sistit.

¶ Loch de Papauere Mesuæ.

Recip. papaueris albi ℥. xxv.

Amigdalarum dulcium depellatarum,

Nucleorum pinearum nucum,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Succi glycyrrhizæ ana ℥. x.

Amyli,

Seminum portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum ana ℥. iij.

Croci

Croci ℥.i.

Penidiorum alborum ℥.iiij.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrupo papaueris lib.iiij.

Syrupus autē papauerinus fit in hunc modum.

Recip. capitum papaueris albi,
& nigri recentium,

Seminum lactucæ,

portulacæ,

Florum violarum ana ℥.i.

Bulliant in aqua cucurbitæ

Fiat syrupus cum Sacchari quod satis est.

* Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

¶ Loch de Psyllio.

Recip. mucaginis psyllij secundū artē extractę ℥.ij.
Sacchari clarificati lib.i.

Coquatur saccharum sufficienter donec candidum fiat, deinde admiscetur mucilago, & tamdiu agitatur donec probè vnita sint & albescant.

Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia huiusmodi eclegmata quæ mucilagines recipiunt.

¶ Loch de Tussilagine simplex.

Recip. radicum tussilaginis lib.i.

Coquantur in aqua donec dissolutæ sint,

Contunduntur & colantur, deinde additis

Mellis lib.ij.

Coquitur in iustam consistentiam: &

Eodem modo fit loch de althæa, baucia & similia.

¶ Loch de Tussilagine compositum Magistrale.

Recip. radicum tussilaginis ℥.vi.

Coquantur in aqua, deinde contusis & dissolutis in ipsa decoctione, adduntur

Sacchari lib.i.s.

Igni

LIBER SECVNDVS

Igni adponuntur, & agitantur donec in commodam
formam redigantur, adde

Nucleorum pinearum denudatorum ℥.i.s.

Passarum purgatarum ℥.ij.

Contusis in mortario lapideo, & permistis adde
Crocī,

Caryophyllorum ana ʒ.s.

Succi glycyrrhizæ ʒ.iiij.s.

Cinnamomi,

Macis ana ʒ.i.

Redigantur in puluerem tenuem, misce; fiat loch.

¶ Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Recip. tragacanthæ albæ ℥.ij.

Gummi arabici ℥.x.

Glycyrrhizæ,

Seminum cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Melonum mundatorum, ana ℥.s.

Camphoræ ʒ.s.

Penidiorum ℥.iiij.

Amyli candidi ℥.s.

Omibus probe tufis & in puluerem redactis, cum
Sacchari clarificati quod sufficit

Fiat loch.

* Medetur omnibus pulmonū & thoracis vitijs ari-
dis, maximè tabidis, macie confectis: inflammatione
lateris laborantibus, tufsi calidæ & siccæ, exaspera-
tioni linguæ & faucium.

¶ Diatragacanthum calidum Nicolai.

Recip. tragacanthi,

Hysfopi ana ℥.iiij.

Nucleorum pinearum mundatorum,

Amygdalarum depellatarum, ana ℥.vi.

Seminis lini,

Fœnigræci,

Cin-

Cinnamomi ana \mathfrak{z} .s. Zingiberis ana \mathfrak{z} .ij.
 Glycyrrhizæ rasæ, Sacchari albi quod satis est
 Succu glycyrrhizæ, Fiat loch.

*Valeat tussientibus ex frigido phlegmate, & non
 valentibus expuere, asthmaticis, empycis, anhelosis,
 suspiriosis, peripneumoniacis, phtisicis, ad omnem
 pectoris coarctationem.

¶ Loch sanum & expertum, Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Fœnigræci \mathfrak{z} .v.
Hyssopi,	Capill. ven. M.i.
Glycyrrhizæ ana \mathfrak{z} .s.	Anisi,
Iuubas,	Fœniculi,
Sebesten ana num. xxx.	Iridis,
Vuarum passarum,	Calaminthæ,
Ficum pinguium,	Seminis lini ana \mathfrak{z} .s.
Dactylorū pinguium ana \mathfrak{z} .ij.	

Coquantur in libris quatuor aquæ ad dimidij con-
 sumptionem, Colaturæ bene expressæ adde
 Penidiarum albarum lib. ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subse-
 quentia minutissimè trita.

Nucleorum pinearum mundatorum,	
Amygdalarum mundatarum ana \mathfrak{z} .v.	
Succu glycyrrhizæ,	Amyli candidi ana \mathfrak{z} .s.
Tragacanthi,	Iridis \mathfrak{z} .ij.
Gummi Arabici,	

Agitentur omnia simul in lebeate donec albescant.

*Tussi vocisque asperitati à frigiditate natæ auxi-
 lio est. Crassos in thorace & pulmone humores ex-
 tenuat.

¶ Loch de Pino Mesuæ.

Recip. nucleorum pinearū mundatorum \mathfrak{z} .xxx.	
Amygdalarum,	Succu glycyrrhizæ,
Auellanarū assatarum,	Amyli,
Tragacanthi,	Capillorum ven.
Gummi Arabici,	Iridis ana \mathfrak{z} .s.

Carnis

LIBER SECVNDVS

Carnis dactylorum ꝑ. xxxv.
 Amygdalarum amararum ꝑ. iij.
 Mellis passularum, id est, Sapæ,
 Butyri recentis,
 Sacchari optimi ana ꝑ. iij.
 Mellis optimi lib. iij. ꝑ. ij. Fiat loch.
 * Tussi diuturnæ, difficultati spiritus, & asthma
 succurrit, humores in thorace crassos incidit, & ex-
 tenuat.

¶ Loch Antipatri.

Recip. nucleorum pinearum mundatorum ꝑ. xij.
 Seminis lini afsi ꝑ. ix.
 Tragacanthi,
 Iridis ana ꝑ. xij.
 Carnis dactylorum ꝑ. xvij.
 Amygdalarum dulcium ꝑ. xvi.
 Dissoluatur tragacantha in aqua violarum, & reli-
 quis contusis, cum melle quantum sufficit fiat loch
 secundum artem.

* Earundem ferè virum cum superiori.

¶ Loch de Præsis Pauli.

Recip. comarum marrubij.
 Iridis, Glycyrrhizæ,
 Hyssopi, Seminis apij ana ꝑ. iij.
 Pulegij, Ficum passarum pinguium,
 Nucleorum pinearum mundatorum ana ꝑ. vi.
 Macerata in aqua sufficiente per noctem, decoquan-
 tur, & percolatis addatur mellis pars media. Coqua-
 tur ad perfectionem.

* Tabescentibus maximè conuenit.

¶ Loch ex Eruo Pauli.

Recip. amigdalorum amararum ꝑ. s.
 Farinæ orobi,
 Hyssopi ana ꝑ. i. Iridis ꝑ. ij.
 Nucleorum pinearum mundatorum ꝑ. i.
 Mellis quod satis est Fiat loch.

¶ Diaris

¶ Diaridis simplex.

Recip. iridis ζ .s. Specierū diatragacāthi añ. ζ .ij.
 Sacchari candi, Sacchari quod satis est.
 Coque, fiat loch.

* Præstat ferè idem quod sequens.

¶ Diaridis compositi Nicolai.

Recip. iridis ζ .i. Zingiberis,
 Pulegij, Piperis nigri ana ζ .iij.
 Hyssopi, Caricarum,
 Glycyrrhizæ ana ζ .vi. Carnis dactylorum,
 Tragacanthi, Passarum ana ζ .iij.s.
 Amygdalarum, Styracis calāmitæ \varnothing .vij.
 Cinnamomi, Mellis albi ζ .xxvij.
 Nucleorum pinearum, Coque, fiat loch.

* Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliatur, ab-
 scissæ vocis iacturā refarcit, quæ refrigeratione con-
 tracta sit.

¶ Diapenidion Nicolai.

Recip. penidiarum ζ .xvi.s.
 Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum,
 Seminis papaueris albi ana \varnothing .x.
 Cinnamomi, Seminum citrulli,
 Caryophyllorum, Melonis,
 Zingiberis, Cucumeris,
 Succu glycyrrhizæ, Cucurbite añ. ζ .i.s.
 Tragacanthæ, Camphoræ, Gr. viij.
 Gummi arabici, Syrupi violacei lib. i.s.
 Amyli, Coque, fiat loch.

* Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim à
 frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique,
 & purulenta exscreantibus succurrit.

¶ Diahyssopu Nicolai.

Recip. hyssopi, Piperis nigri,
 Iridis, Pulegij,
 Thymi ana ζ .xxx. Satureiæ,
 Ruta,

LIBER SECVNDVS

Rutæ,	Fœniculi ana ʒ. x.
Cymini ana ʒ. xx.	Zingiberis,
Carnis dactylorum,	Anisi,
Tragacanthæ,	Carui,
Glycyrrhizæ,	Seminis ligustici ana ʒ. v.
Caricarum pinguium,	Sacchari, aut
Passarū enucleatarum,	Mellis quod satis est,
Fiat loch.	

* Confert ad vitia capitis frigida, columellam efficit, arteriam asperam purgat, tussim compefcit, omnia frigida thoracis & stomachi vitia emendat, concoctionem iuuat.

¶ Loch de succo Scillæ Galeni.

Recip. succi Scillæ diebus canicularibus excepti vt dictum est lib. i.

Mellis lib. i. s.

Coque, fiat loch.

* Crassos & lentos humores, quiq; in thorace difficulter concoquuntur, incidit & extenuat: ideoque asthmaticis, & difficile spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat.

¶ Aliud eiusdem.

Ipsum scyllæ corpus è qua succus extractus, libram vnâ terito cum mellis lib. i. s.

Coque, fiat loch.

* Hoc facultate posterius est præcedenti.

¶ Loch de Scilla compositum Mesuæ, Loch ad Asthma nuncupatum.

Recip. scillæ in pane assatæ ʒ. iiii.

Marrubij,

Myrrhæ,

Hyssopi, ana ʒ. i.

Croci ana ʒ. s.

Iridis ʒ. ij.

Mellis quod sufficit fiat loch.

* Ad asthma & diurnam tussim valet, humorem enim crassum extenuat.

¶ Loch de pulmone vulpis.

Recip. pulmonis vulpini præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis

Seminis fœniculi, Mellis ℥.xvi.

Capill. veneris ana ℥.i. fiat loch.

* Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est alijs remedijs in phthisi.

¶ Loch de Carthamo Mesur.

Recip. medullæ feminis carthami ℥.vi.

Amygdalarum mundatarum ℥.ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ℥.i.

Mellis costi,

Succi scillæ ana quod sufficit

fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA

Sectio quinta.

¶ Aromaticum Rosatum Gabrielis, ex Mesue.

Recip. foliorum rosarum rubrarum ℥.xv.

Glycyrrhizę rasę ℥.vij. Tragacathę añ. ℥.iij. ʒ.ij.

Ligni aloës, Nucis moschata,

Sandali citrini ana ℥.iij. Cardamomi,

Cinnamomi ℥.v. Galangæ ana ℥.i.

Macis, Spicæ nardi ʒ.ij.

Caryophyllorū ana ℥.ij.s. Moschi ʒ.i.

Gummi Arabici, Ambre griseæ ʒ.ij.

Trita & in puluerem redacta permiscetur cum

Syrupi rosati,

Syrupi è corticibus citri,

Sacchari albi ana ℥.ix.

Coque; fiat electuarium iustæ consistentiæ.

Fiunt etiam morselli in hunc modum.

Recip. sacchari clarificati lib.i.

Specierum prædictarum ℥.s.

Fiant morsuli secundum artem.

* Cerebrum, cor, ventriculū, & omnia nutritioni

I famu-

LIBER SECUNDVS

famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

¶ Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ.

Recip. caryophyllorum ʒ. vii.

Macis,	Cardamomi maioris ana ʒ. i.
Zedoariæ,	Rosarum rubrarum ʒ. s.
Galangæ,	Glycyrrhizæ rasæ,
Santali citrini,	Galliæ moschatæ ana ʒ. ij.
Trochiscorú diarhodon	Folij,
Cinnamomi,	Cubebæ ana ʒ. ij. gr. vi.
Ligni aloës,	Ambræ ʒ. i.
Spicæ nardi,	Moschi ʒ. s.

His tenuissimè tritis & cum

Syrupi è citro,

Sacchari albi ana q. f. permistis

fiat electarium.

* Cor, ventriculū, & reliqua nutritionis membra roborat, nauseam, & vomitum reprimat, flatu dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet.

¶ Diamoschta dulce, Mesuæ.

Recip. croci,	Been albi, & rubri,
Doronici,	Folij,
Zedoariæ,	Spicæ nardi,
Ligni aloës,	Caryophyllorú ana ʒ. i.
Macis ana ʒ. ij.	Zingiberis,
Margaritarum albarum,	Cubebæ,
Serici crudi vsti,	Piperis longi ana ʒ. i. s.
Charabe,	Moschi ʒ. ij.
Coralli rubri ana ʒ. ij. s.	Excipe cum
Basilici citrati,	Mellis crudi lib. i. ʒ. vi.
Galliæ moschatæ añ. ʒ. ij. s.	Coque, fiat electarium.

* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi comatam tristitiam sine causa manifesta, ver-

vertiginē, epilepsiā, resolutionem, oris torturā, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit.

Diamoschu amarum fiet ad superiora additis
 Absinthij, Ligustici ana ℥.i.
 Rosarū rubrarū ana ℥.iij. Cinnamomi ℥.ij.s.
 Aloës lotæ ℥.iij. Excipiuntur
 Castorij, Mellis quāritati sufficiētī.

* Hęc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absorbit.

¶ Diarhodan Abbatis.

Recip. santali albi, Ligni aloës,
 Santali rubri añ. ℥.ij.s. Caryophyllorum,
 Tragacanthæ, Gallię moschatæ,
 Gummi arabici, Anisi,
 Spodij ana ℥.ij. Fœniculi,
 Asari, Cinnamomi,
 Mastiches, Rhabarbari,
 Spicæ nardi, Seminis basilici,
 Cardamomi, Berberis,
 Succī Glycyrrhizæ, Seminis portulacæ,
 Croci, Seminis scariolæ,
 Seminum cucurbitæ,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 Melonis,
 Papaueris albi ana ℥.i.

Margaritarum,
 Osis de corde cerui ana ℥.s.
 Sacchari candi,
 Rosarum rubrarum ana ℥.i. ℥.iij.
 Camphoræ gr. xv. Alij gra. vij.
 Moschi gr. iij. s.
 Conterantur, & fiat electarium cum
 Syrupi rosati,

I i Sac-

LIBER SECVNDVS

Sacchari albi ana q. sufficit.

* Valet aduersus ventriculi calorem, iecoris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

¶ Diatrion Santaløn.

Recip. fantali albi,	Gummi Arabici,
rubri,	Tragacanthæ,
citri,	Seminum melonis,
Rosarum,	cucumeris,
Sacchari candi ana ʒ. iij.	citrulli,
Rhabarbari,	cucurbitæ,
Spodij,	scariole ana ʒ. i. s.
Succi glycyrrhizæ,	Camphoræ ʒ. i.
Seminis portulacæ añ. ʒ. vi. s.	Sacchari quod fatis est

fiat electarium.

* Aduersus hepatis & ventriculi calorem utilis est; præterea mirum in modum tabidis & regio morbo correptis prodest.

¶ Diamargariton frigidum, Nicolai.

Recip. feminū citrulli,	Rosarum rubrarum,
Cucurbitæ,	Florum nymphææ,
Melonum,	Boraginis,
Cucumeris,	Baccarū myrti añ. ʒ. i.
Portulacæ,	Coralli albi,
Papaueris albi,	rubri añ. ʒ. s.

Sandali moschatellini, citrini, Margaritarum ʒ. iij.
Ligni aloës, Sacchari quod fatis est
Zingiberis, fiat electarium.

* Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopen iuuat, affhmaticos, tabidos, tussientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit.

¶ Diamargariton calidum, Auicennæ.

Recip. margaritarum,	Mastichis ana ʒ. iij.
Pyrethri ana ʒ. i.	Zedoariæ,
Zingiberis,	Doronici,

Semi-

Seminis apij,	Been rubri,
Radicum thapsiæ,	Piperis,
Cardamomi,	Piperis longi ana ʒ.iiij.
Nucis moschatæ,	Cinnamomi ʒ.v.
Macis ana ʒ.ij.	Sacchari quod satis est

fiat electarium.

* Ad vniuersi corporis refrigerationem confert, mulieres vterum gerentes, prefoctiones vteri, cordisq; syncopé iuuat: priuatim verò imbecillitati stomachi & cruditati eiusdem, corporis ac cordis exolutioni succurrit.

¶ Diambra Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Zingiberis ʒ.i.s.
Doronici,	Ligni aloës,
Caryophyllorum,	Santali citrini,
Macis,	Piperis longi ana ʒ.ij.
Nucis moschatæ,	Ambræ ʒ.i.
Folij,	Mofchi ʒ.s.
Galangæ ana ʒ.iiij.	Excipiantur
Spicæ nardi,	Syrupi rosati,
Cardamomi maioris,	Aquæ rosacæ,
Cardamomi minoris, añ. ʒ.i.	Sacchari albi ana sufficienti quantitate.

* Cerebrum, cor, ventriculum, ac ventrè reliquum inferiorè calefacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus alijs frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre.

¶ Pleres Archonticon Nicolai.

Recip. cinnamomi,	Schoenanthi,
Caryophyllorum,	Cyperij,
Ligni aloës,	Bosarum,
Galangæ,	Violarum añ. ʒ.i. Gr. xv.
Spicæ nardi,	Folij,
Nucis moschatæ,	Glycyrrhizæ,
Zingiberis,	Mastiches,
Spodij,	Styracis,

I 3

Maio-

LIBER SECVNDVS

Maioꝛanae,	Margaritarum,
Menta aquatica, id est, fy-	Been albi, & rubri
fimbrij balsamines,	Coralli rubri,
Cardamomi,	Serici vsti añ. ʒ. i. Gr. ij. s.
Piperis longi,	Moschi Gr. vij. s.
Piperis albi,	Caphurae Gr. v.
Seminis basilici,	Syrupi rosati,
Baccarum myrti,	Sacchari albi ana ʒ. viij.
Corticu citri añ. ʒ. ij. Gr. v.	fiat electarium.

* Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde nato succurrit, eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles sunt corroborat: Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus, & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

¶ Lætificans Galeni, secundum Nicolaum.

Recip. florum ocymi,	Rasura eboris,
Croci,	Thymi,
Zedoariae,	Epithymi ana ʒ. i.
Ligni aloës,	Caphurae,
Caryophyllorum,	Moschi,
Corticum citri,	Ambræ,
Galangæ,	Margaritarum,
Macis,	Osis e corde cerui añ. ʒ. s.
Nucis moschatae,	Folioru aui,
Styracis ana ʒ. ij. s.	argenti ana ʒ. i.
Anisi,	Sacchari quod sufficit

fiat electarium.

* Lætitiâ colorisq; bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & caniciem arceat.

¶ Lætificans Rasis ad Almanforem.

Recip. metissæ,	Croci,
Corticum citri,	Cinnamomi.
Caryophyllorum,	Nucis moschatae,
Gallia moschatae,	Cardamomi maioris,
Mastiches,	Seminis pœoniae,

Been

Been albi, & rubri,
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Seminis ocymi caryophyllati ana ℥.s.
 Moschi ℥.i. gr.v.
 Tritis omnibus & in puluerem redactis adde
 Sacchari quod satis est
 fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris forma electarij, ea syrupo sequenti
 excipies, qui

Recip. myrobal. } cepularum, num. xx.
 } emblicarum, num. xxx.

Trita, & in libris tribus aquæ communis, ad duarum
 tertiarum consumptionem, cocta percolabis: Cola-
 turæ addes

Mellis despumati lib. ij.

Coque, fiat syrupus quo prædicta excipies, & fiet
 electarium.

* Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes
 etiam roborat, admodum confert: palpitatione cor-
 dis emendat, valenter exhilarat, & coctionem iuuat,
 coloremque vitium efficit.

¶ Diatrion piperon Galeni.

Recip. piperis nigri, Anisi,
 albi, Thymi ana ℥.i.
 longi ana ℥.l. Mellis quod satis est,
 fiat electarium.

Zingiberis,
 Recipit etiam vniuscuiusq; generis piperum ℥.ij.

* Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quar-
 tanis, resolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur.

¶ Diatrion piperon Mesur.

Recip. triū piperū ana ℥.v. Anni,
 Zingiberis, Anomi,
 Thymi, Cinnamomi ana ℥.i.
 Anisi ana ℥.ij. Cassiæ,
 Spicæ nardi, Seminis apij,

℞ 4

Sese-

LIBER SECVNDVS

Seseleos, Radicum enulæ ana ℥.s.
 Afari, Mellis quod sufficit.
 fiat electarium.

* Hoc magis fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, conuenit.

¶ Diospoliticon Galeni.

Recip. cumini in aceto macerati & vsti,
 Piperis longi,
 Comarum rutæ flaccidarum ana ℥.i.
 Nitri ℥.s.

Terantur crassius, & cum
 Mellis despumati quod satis est
 fiat electarium in bona forma.

* Aluum deicit cibos qui in ventre corrupti sunt educendo; ijsque conuenit quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat & spiritum flatulentum expellit.

¶ Diacyminum Meliæ.

Recip. cymini pridie in aceto macerati, deinde ficcati ℥.x.

Zingiberis, Galangæ,
 Cynamomi ana ℥.s. Piperis longi,
 Caryophyllorum, Cardamomi ana ℥.ij.
 Ligni aloës, Moschi ℥.s.
 Macis ana ℥.ij.s. Mellis despumati q. f.
 fiat electarium forma conuenienti.

* Ventriculum & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat: flatus in dictis visceribus natos dissipat.

¶ Diacyminum Nicolai.

Recip. cymini in aceto præparati ℥.viij. ℥.i.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum ana ℥.ij.s.
 Zingiberis,
 Piperis nigri ana ℥.ij. Gr. v.
 Galangæ,
 Thymbræ,

Cala-

Calaminthes ana ꝑ.i. ꝑ.ij.

Ammi,

Ligustici ana ꝑ.i. Gr.xviij.

Piperis longi ꝑ.i.

Spicæ nardi,

Cardamomi,

Nucis moschatæ ana ꝑ.ij.s.

Omnibus tritis & in puluerem redactis, Mellisque despumati. q. s. exceptis fit electarium.

Fit etiam forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas specierum dimidias vncias, libram sacchari commiscendo.

* Confert frigiditati thoracis, stomachi, inflatis, colicis, febre quartana laborantibus, & ventriculi coctionem iuuat.

¶ Diacalaminthes Galeni.

Recip. calaminthes montanæ,

Seminis petroselinæ,

Pulegij,

Seseleos ana ꝑ.s.

Seminis apij,

Cacuminum thymi ana ꝑ.i.

Ligustici ꝑ.iiij.

Piperis lib. i.

Terantur subtilissimè, &

Melle despumato quantum satis est excipiantur.

* Crassa & lenta attenuat, & discutit, urinas mouet, ac muliebres menses.

¶ Diacalaminthe Mesuæ.

Recip. calaminthæ montanæ,

Calaminthæ campestris,

Seseleos,

Petroselinæ ana ꝑ.vi.

Zingiberis,

Seminis apij,

Comarum thymi ana ꝑ.iiij.

I s

Ligu-

Ligustici ℥.vi.

Piperis ℥.xij.

Excipe melle despumato quod fatis est.

* Auxiliatur ijs quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans, ægrè quoque spirantibus, ventriculo refrigeratione sentienti, & flatibus distento confert.

¶ Dia cinnamomum Mesuræ.

* Rec. cinnamomi ℥.xv.	Zingiberis,
Cassia,	Macis,
Cymini,	Nucis moschatae,
Radicum enuse ana ℥.s.	Ligni aloës ana ℥.iij.
Galangæ ℥.vij.	Croci ℥.i.
Caryophyllorum,	Sacchari ℥.v.
Piperis longi,	Moschi ℥.ij.
Cardamomi maioris,	Excepta
Cardamomi minoris,	Mellis despumati ℥.ij. ℥.viij.
Coque, fiat electarium.	

* Coctionem iuuat, etiam pituitæ putredine prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet.

¶ Diagalanga Mesuræ,

Recip. Galangæ,	Calaminthæ siccae,
Ligni aloës ana ℥.vi.	Menthæ siccae,
Caryophyllorum,	Cardamomi,
Macis,	Spicæ nardi,
Ligustici ana ℥.ij.	Seminum apij,
Zingiberis,	Fœniculi,
Piperis longi,	Anisi,
Piperis albi,	Carui ana ℥.i.
Cinnamomi,	Sacchari albi ℥.x.
Calami odorati ana ℥.i.s.	Mellis despumati q.s.

fiat electarium vt decet.

* Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam sanat: ob id coctionem iuuat, ructus æcidos cõpelcit, & flatus crassos potenter dissipat, atque ab eis natas inflationes: oris habitum commendat.

¶ Diacurcuma, id est, *Diakurkum*, Mesuræ.

Recip.

Rec. Tragacathę, ʒ. i. Carpobalsami,
 Croci, Rubiæ tinctorum,
 Afari, Succu absinthij,
 Seminū petroselini, Succu eupatorij,
 Apij, Olei balsami ana ʒ. ij.
 Dauci, Calami aromatici,
 Anisi añ. ʒ. iij. Cinnamomi ana ʒ. i. s.
 Rhabarbari optimi, Scordii,
 Mei, Ceterach. i. aspleni,
 Spicæ nardi ana ʒ. vi. Succu glycyrrhizę añ. ʒ. ij. s.
 Costi, Trita, &
 Myrrhę, Mellis despumati q. f. ex-
 Casiæ, cepta.
 Schoenanthi, fiat electarium.

* Ventriculi, iecoris, lienis morbos frigidos, ob idq;
 diurnos sanat, & hinc orta symptomata, vt hydro-
 pem, cachexiam, colorem corporis foedum, humo-
 rum in ventriculo corruptelam, renum & vesicæ vi-
 tia frigida, vrinamq; euocat.

¶ Diacurcuma minor Mesuræ.

Recip. spicæ nardi, Schoenanthi,
 Myrrhæ, Costi,
 Casiæ, Cinnamomi ana ʒ. i.
 Croci, Mellis despumati q. f.
 fiat electarium.

* Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

¶ Dialacca.

Recip. lacca lotæ, Amygdalarum amararum,
 Rhabarbari ana ʒ. iij. Costi,
 Spicæ nardi, Myrrhæ,
 Mastiches, Rubiæ,
 Seminis apij, Foeniculi,
 Succu absinthij, Anisi,
 Succu eupatorij, Afari,
 Ammi, Aritolochiæ rotundæ,
 Sabinæ, Gentianæ,
 Croci,

LIBER SECVNDVS

Croci, Schoenanthi,
 Cinnamomi, Bdellij ana ℥.i.s.
 Hyssopi, Piperis,
 Casia, Zingiberis ana ℥.i.

Myrrham & bdelliū in vino infunde, cætera tenuifimè tere, & melle despumato quantum satis est, excipe, fiat electarium.

* Ventriculum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit, eius scirrhu dissoluit, & ex his nascentem cacheriam & hydropen sanat, vrinas mouet, lapidemque renum & vesicæ frangit.

¶ Dianifon Mesuæ.

Recip. seminum anisi ℥.ij.s.

Glycyrrhizæ rasæ, Casia,
 Mastiches ana ℥.i. Pyrethri,
 Seminum carui, Calaminthæ ana ℥.ij.
 foeniculi, Cardamomi maioris,

Macis, Caryophyllorum,
 Galangæ, Cubebarum,
 Zingiberis, Croci,
 Cinnamomi ana ℥.v. Spicæ nardi ana ℥.i.s.
 Piperis nigri, Sacchari albi ℥.v.
 albi, Mellis despumati q.f.
 longi, fiat electarium.

* Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

¶ Dianthon Nicolai.

Recip. florum rorismarini ℥.i.

Rosarum rubrarum, Cinnamomi,
 Violarum, Zingiberis,
 Glycyrrhizæ ana ℥.vi. Zedoariæ,
 Caryophyllorum, Macis,
 Nucis moschatae, Ligni aloës,
 Galangæ, Cardamomi,
 Spicæ nardi, Seminis anethi,

Seminis

Seminis anisi ana ℥.iiij. Mellis q.f.
fiat electarium.

* Succurrit præter rationem tristibus, animi lætiam auget; Item cardiacis, elephantia correptis, animi defectionibus, & cordis syncopi, & in vniuersum omni corporis imbecillitati prodest.

¶ Cyphoides andromachi.

Recip. pulpæ passarum pinguium ℥.iiij.
Crocij, Schoenanthi ℥.ij.s.
Calami aromatici, Myrrhæ ℥.iiij.
Bdellij ana ℥.ij.s. Radicum aspalathi ℥.ij.
Casia, Terebinthinæ ℥.iiij.
Cinnamomi ana ℥.i.s. Mellis, &
Spicæ nardi ℥.iiij. Vini odorati ana q.f.
Coque, fiat electarium vt artis est.

* Ad hepaticos, & thoracis affectiones utilis est.

¶ Electarium de baccis Lauri Rafis.

Recip. foliorum rutæ ℥.x.
Seminum Ammi, Piperis nigri, &
Cymini, longi,
Nigellæ, Menthastrij,
Ligustici, Baccarum lauri,
Carui, Castorij ana ℥.ij.
Dauci, Sagapeni ℥.s.
Origani, Opopanacis ℥.iiij.

Amygdalarū amararum, Mellis lb.i. ℥.iiij.
Triticis diligenter quæ triturlanda sunt, fiat electuariū;
deinde addantur lachrymæ in vino dissolutæ.

* Valet ad colicam & iliacam passionem, & doloribus intestinorum ex causa frigida, vel flatuosa.

¶ Electuarium de cineribus Auicennæ.

Recip. cinerum vitri,
Scorpionum,
Radicum brassicæ,
Leporis,
putaminū ouorū è quib⁹ pullus exēptus sit,
Lapidis

LIBER SECVNDVS

Lapidis spongiæ,	Dauci,
Sanguinis hirci præparati,	Pulegij,
Lapidis Iudaici,	Gummi arabici,
Gummi iuglandis,	Seminis altheæ,
Acori ana ʒ.i.	Piperis nigri ana ʒ.i. s.
Petroselinij,	Mellis q.i.
fiat electarium.	

*datum ad ʒij
cum aqua
fornicibus
apii.*

¶ Confectio Anacardina Mesuæ.

Recip. piperis nigri,	Costi,
longi,	Anacardij,
Myrobalan. cepularum,	Croci,
Emblicarum,	Melanthij,
Bellericarum,	Baccarū lauri añ. ʒ. vi.
Indarum,	Cyperij ʒ. iiij.

Castorij, ana ʒ. ij.

Tere anacardia per se, & alijs tritis misce, & factum
Electarium cum

Butyri recentis non saliti,

Mellis despumati ana q. f. Coquatur vt artis est.

* Ad totius inferioris ventris, & cerebri affectus
frigidos conducit, sanguinem puriorem reddit, &
inde spiritu animali facto purgatiore, & tenuiore,
sensus omnes, apprehensionem, intellectum & me-
moriam iuuat, coloremq; viuidum corpori tribuit.

¶ Alia Confectio Anacardina.

Recip. aloës ʒ. i. s.	Myrobal. Bellericarum,
Iridis,	Emblicarum,
Cassia ana ʒ. vij.	Mei,
Zingiberis,	Epithimi ana ʒ. iiij. ʒ. i.
Anacardij,	Caryophyllorum,
Carpobalsami ana ʒ. iiij. s.	Schoenanthi,
Folij,	Rhei pontici,
Spicæ nardi,	Mastiches ana ʒ. ij.
Myrobal. fuluarum,	Corticum radicum foe-
Cepularum,	niculi lotorum lib. i.
Indarum,	Aceti optimi lib. ij.

Con-

Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem,
coquantur, & colentur; Colaturæ bene expressæ
adde

Mellis despumati lib.ij.

fiat electarium vt artis est.

¶ Electarium ex Asa foetida seu Lasere, Mesue.

Recip. laseris,	Foliorum rutæ ana ʒ.s.
Piperis,	Terantur, & excepta cum
Myrrhæ,	Mellis despumati ʒ.vij.

Coquantur vt decet.

* Ad febres antiquas, & circuitum repetentes, vt
quartanas quotidianas, somnum grauem, tremorem,
venenosos morfus vile est.

¶ Hiëra simplex Galeni.

Recip. cinnamomi,	Mastiches chiæ, ana ʒ.vi.
Xylobalsami,	Croci ʒ.v.
Asari radicum,	Aloës electæ ʒ.xc.
Nardi spicæ,	

Omnibus tritis & in puluerem redactis, deinde

Mellis quantitate sufficienti exceptis fit electarium.

Addita autem agarici præparati parte dimidia fiet
hiëra cum agarico. alijs quarta sufficere videtur.

* Præstantissimum medicamentum est ad vitiosos
succos, qui in vetriculi tunicis hærent. Vtiliter quoq;
exhibetur ijs qui suffusorum imagines, & alia sym-
ptomata ex stomachi vitio patiuntur: & præterea ijs
qui alio sunt adstricta, & mulieribus quæ non probe
purgantur.

¶ Hiëra composita Galeni.

Recip. colocinthidis ʒ.vij.	Sthœchadis,
Scillæ assatæ,	Hyperici,
Agarici,	Pulegij,
Ammoniâci,	Gentianæ,
Scammonij,	Spicæ nardi,
Corticum radicû hellebori ni-	Schoenâthian. ʒ.xvi.
gri,	Polij montani,

Epi-

LIBER SECUNDVS

Epithymi,	Sagapeni,
Polypodij,	Croci,
Bdellij,	Aristolochiæ rot.
Aloës,	Trium piperum,
Chamœdrios,	Cinnamomi,
Euphorbij,	Opopanacis,
Marrubij,	Castorij,
Casiæ ana ʒ.viij.	Petroselinij ana ʒ.iiij.
Myrrhæ,	

Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad specierum pondus.

* Medicamentum est efficacissimū ad omnes morbos contumaces, & tutissimum.

¶ Hiëra Archigenis ex Aëtio.

Recip.colocynthidos ʒ.i.	Piperis albi ana ʒ.v.
Chamædryos,	Cinnamomi,
Agarici,	Spicæ nardi,
Marrubij,	Myrrhæ,
Stœchadis ana ʒ.x.	Polij montani,
Opopanacis,	Croci ana ʒ.iiij.
Sagapeni ana ʒ.i.	Mellis despumati ad
Petroselinij,	pondus specierum
Aristolochiæ rot.	fiat electarium.

* Confert affectibus melancholicis, & ex pituita crassa natis, vt vertigini, epilepsiæ, spasmo, difficultati spirandi, psora, lepræ, & cæteris tuberculis à crassa materia nascentibus aut seroso excremento, item intestinis, ventriculo, vtero à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus.

¶ Hiëra Logadij ex Aëtio.

Recip.colocynthidis ʒ.xx.	Hyperici ana ʒ.i.
Scillæ assatæ,	Epithymi,
Agarici,	Polypodij,
Ammoniaci,	Bdellij,
Scammonij,	Aloës,
Corticis radicū ellebori nigri,	Chamædryos,

Mar-

Marrubij,	Opopanacis,
Cassæ ana ℥.i.	Sagapeni,
Myrrhæ,	Castorij,
Piperis albi,	Petrofelini,
nigri,	Aristolochiæ ana ℥.s.
Cinnamomi,	Mellis despumati ad pondus omnium specierum.
Croci,	

* Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocationem, incubum, tetanum, spasmodicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralysem, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, canculosque earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

¶ Hiæra Logadij, ex Nicolao.

Rec. pulpe colocynthidis,	Cassæ,
Polipodij ana ℥.ij.	Chamædryos.
Euphorbij,	Bdellij,
Polij montani,	Marrubij ana ℥.i. Gra.
Seminis thymelæ ana ℥.i.s.	xiiij.
Gr.vi.	Cinnamomi,
Abfinthij,	Opopanacis,
Myrrhæ ana ℥.i. Gr. xij.	Castorij,
Centaurij.	Aristolochiæ,
Agarici,	Trium piperum,
Ammoniaci,	Croci,
Folij,	Sagapeni,
Nardi indicæ,	Petrofelini ana ℥.s.
Scillæ,	Hellebori nigri,
Scamoniij præparati añ. ℥.i.	albi añ. G. vi.
Aloës,	Mellis despumati lib. i.
Comarum thymi,	℥.i.s.
Confice vt decet.	

* Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, conuulsiones, hemicraniam,

K ele=

LIBER SECVNDVS

elephantiam, impetigines, lethargum, prodest, spit-
mantibus & linguam mordentibus, his qui lethalia
venena sumperunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadi-
cis, & lumborum dolore infestatis vitiosos humores
educit & mulierum menstrua.

¶ Benedicta simplex Nicolai.

Recip. turbith electi,	Amomi,
Sacchari ana ʒ. x.	Cardamomi,
Efulæ,	Seminis petroselini,
Diagridij,	Lithospermi,
Hermodylorum,	Carui,
Rofarū rubrarū añ. ʒ. v.	Fœniculi,
Caryophyllorum,	Asparagi,
Spicæ indicæ,	Rusci,
Zingiberis,	Salis gemmæ,
Croci,	Galangæ,
Saxifragiæ,	Macis ana ʒ. i.
Piperis longi,	
Tritis tritrandis, fiat electarium cum	
Mellis despumati lib. iij.	

* Humores pituitosos, ad articulos potissimum de-
cumbentes, elicit. A renibus quoq; & vesica purgat.

¶ Diasene Gentilis de Fulgino.

Recip. foliorū senæ ʒ. iij.	Lapis armeni ʒ. i.
Auellanarum num. l.	Sacchari ʒ. v.
Serici vsti ʒ. ij.	Mellis despumati ʒ. vi.
fiat electarium secundum artem.	

¶ Diasena Nicolai.

Recip. senæ ʒ. iij.	Galangæ,
Auellanas tostas num. l.	Piperis nigri,
Serici vsti ʒ. ij.	Spicæ nardi indicæ,
Lapis armeni lauati, ʒ. i.	Folij,
Lapis lazuli loti ʒ. iij.	Seminis ocimi,
Sacchari ʒ. vi.	Cardamomi,
Cinnamomi,	Croci,
Caryophyllorum,	Zingiberis,

Zedo-

Zedoaria,
 Florum rorismarini,
 Piperis longi ana ℥.ij.
 Mellis despumati lib.ij.
 fiat electarium.

* Succurrit melancholicis, mania vexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephanticis, & omnibus vitijs ex atra bile procreatis.

¶ Diasena recens Rasis, quæ sub nomine Electuarij Lenitiui in vsu est.

Recip. passularum enucleatarum ℥.ij.
 Capillorum veneris,
 Violarum,
 Hordei mundati ana M.s.
 Sebesten,
 Iuiubas ana num.xx.
 Glycyrrhizæ ℥.s.
 Prunorum exemptis nucleis,
 Tamar indorum ana ℥.vi.
 Senæ mundatæ,
 Polipodij ana ℥.ij.
 Coctis ad tertiæ partis consumptionem, adde
 Mercurialis recentis M.i.s.
 Bulliant leuiter, cola. In colatura dissolue
 Pulpæ cassiæ,

Tamar indorum,
 Prunorum,

Per cribrum transcolentur, & adde
 Sacchari albi lib.iiij.s.
 Sacchari violati ℥.vi.

Coquantur omnia, & fiat electarium in bona forma, vocaturque diasena senæ expers. Qui verò voluerit cum senæ habere, ad singulas electarij vncias addat Pulueris senæ ℥.i.

* Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pieuritide, Emollit enim aluum; & vtramque bi-

K 2 lemi

LIBER SECVNDVS

Iem sine molestia & innoxie educit.

¶ Electarium de Sebeste, Montagnanæ.

Recip. sebesten,

Prunorum ficcorum,

Pulpæ tamar indorum ana ꝑ.v.

Aquæ violarum lib.i.

Aquæ iridis,

Anguriæ ana ꝑ.vi.

Succi mercurialis depurati ꝑ.iiij.

Penidiorum ꝑ.vij.

Seminum cucurbitæ enucleatorum,

Cucumeris,

Melonis,

Citrulli ana ꝑ.ij.

Diagridij ꝑ.iiij.

Coquuntur tamar indi, sebesten & pruna, & in aquis stillatitijs dissoluta commiscentur cum

Diapruni simplicis lib.i.s.

Postea adduntur penidia, & his dissolutis reliqua commiscentur, & fit electuarium.

* Confert febribus biliosis interpolatis, ac continuis exquisitis, febriumque vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per urinam educit.

¶ Diacassia Nicolai, sub nomine Cassiæ condita.

Recip. pulpæ cassiæ lib.i.

Pulpæ tamar indorum.

Sacchari violati,

Mannæ electæ,

Sacchari candi añ. ꝑ.i.s.

Penidiorum,

Syrupi violati ꝑ.iiij.

Hæc omnia dissolue in decocto sequenti.

Prunorum,

Polypodij ana ꝑ.i.

Violarum,

Foliorū senæ ꝑ.s.

Glycyrrhiæ,

Anisi,

Seminū communiū enucleatorū, Fœniculi ana ꝑ.i.

Coquantur in aqua ad tertie partis consumptionem, & colaturæ bene expressæ addantur supradicta, ac in ele-

electarij formam reducantur.

* Confert ijs qui dura sunt aluo, hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, &c.

¶ Diacassia magistralis.

Recip. iuiubarum, Tamarindorum,
Prunorum, Sebesten,
Capilli veneris, Violarum ana M.i.
Coquantur in aqua secundum artem, & in colatura
dissolue

Pulpæ cassiæ lib. x.

Sacchari albi lib. v.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

¶ Cassia communis.

Recip. violariæ,
Maluæ, Betæ,
Mercurialis, Parietariæ ana M.i.
Fiat horum viridium decoctio in
Aquæ communis lib. x.

Bulliant ad dimidij consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ℥. vi.

Coquitur in formam electuarij.

* Aluum leniter & citra molestiam omnem subducit, estque pro delicatis ac mollioribus.

¶ Diaprunum non laxatiuum Nicolai.

Recip. pruna electa num. c.

Coquantur perfectè in aqua sufficienti, deinde cribro raro transmittantur, & referuata pulpa decoctioni affunde

Violarum ℥. s.

Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ addantur

Sacchari lib. ij.

Pulpæ suprascriptæ lib. i.

K 3 Pulpæ

Pulpæ calsiæ

Tamar indorum ana ꝑ.i.

Coquantur lento igni, & addantur subsequētes species tenuissimè tritæ, semper commouendo,

Santalorum albi, Seminum scariolæ,
rubri, Berberis,

Spodij, Succu glycyrrhizæ,

Rhabarbari electi, Tragacanthæ ana ꝑ.ij.

Cinnamomi ana ꝑ.ij. Seminum cucurbitæ,

Rosarum rubrarum, Cucumeris,

Violarum, Melonū añ. ꝑ.i.

Seminum portulacæ, Contundantur vt supra.

* Facit ad acutas, ar dentes, omnesque alias febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodies, lityrias, & in summa ad omnem febrilem affectum.

¶ Diaprunum solutiuum.

Recip. diaprunis non laxatiui lib.i.

Diagridij ꝑ.i. fiat electarium.

¶ Diacatholicon Nicolai.

Recip. pulpæ calsiæ, Anisi ana ꝑ.i.

Tamar indorum, Glycyrrhizæ rasæ,

Senæ mundatę ana ꝑ.ij. Penidiorum,

Rhabarbari, Sacchari candi,

Polypodij, Quatuor sem. frig. ma-

Violarum, ior. ana ꝑ.ij.

Conterenda conterantur: Et sume

Polypodij recentis ꝑ.ij.

Seminiis foeniculi ꝑ.ij.

Aquæ communis lib.ix.

Coque ad dimidij consumptionem, & cola: colaturæ adde

Sacchari albi lib.ij.

Coquantur ad syrapi consistentiam, & supra scriptis additis, fiat electarium.

* Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis. Emollit enim, alterat, roburque

burque addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis, doloribus capitis succurrit.

¶ Diapolypodion Magistrale.

Recip. polypodij mundati lib. ij.

Mellis despumati lib. vi.

Aceti scillitici lib. i. ℥. ij.

Zingiberis ℥. vi. fiat electarium.

¶ Diacarthamu Arnoldi de villa noua.

Recip. specierum diatragacanthi frigidi ℥. s.

Pulpæ cydoniorum ℥. i. Mannæ ℥. ij.

Pulpæ carthami ℥. s. Mellis rosati colati,

Zingiberis ℥. ij. Sacchari candi ana ℥. i.

Scammonij præparati ℥. iij. Hermodactylorum ℥. s.

Turbith ℥. vi. Sacchari albi ℥. x. s.

fiat electarium liquidum.

* Flauæ bili & pituitæ educendę mirificè conducit.

¶ Electarium Episcopi siue Elefscoph Mesuæ.

Recip. scammonij præparati,

Turbith ana ℥. vi.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Myrobalanorum emblicarum,

Nucis moschatæ,

Polypodi ana ℥. ij. s.

Sacchari optimi ℥. vi.

Mellis despumati lib. i. ℥. iij.

Coquantur fiat electarium.

* Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articularum, laterisq; prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat.

¶ Diaphœnicon Mesuæ.

Recip. dactylorum mundatorum ℥. c.

Penidiorum ℥. l.

K 4

Amyg-

LIBER SECVNDVS

Amygdalarum purgatarum ℥.xxx.
 Turbith electi ℥.xxxv. Ligni aloës,
 Scammonij ℥.xij. Macis,
 Zingiberis, Anisi,
 Piperis longi, Fœniculi,
 Florum rutæ, Dauci,
 Cinnamomi, Galangæ ana ℥.ij.s.
 Daçtyle per triduum in aceto & totidem noctes ma-
 cerantur, deinde in mortario contunduntur cum a-
 mygdalis & penidijs. Reliqua tenuissimè teruntur,
 & in electarium reducuntur cum
 Mellis despumati lib.vi.

* Febribus cõpositis & diuturnis auxiliatur, bilem
 enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus
 mirificè confert, item doloribus ventriculi, & id ge-
 nus alijs vitijs ex crudis humoribus ortis.

¶ Electarium Hamech, Mesur.

Recip. myrobalanorum fuluarum ℥.iiij.
 Cepularum, Violarum ℥.i.s.
 Indarum, Epithymi ℥.ij.
 Rhabarbari electi añ. ℥.ij. Seminis anisi,
 Agarici, Fœniculi,
 Colocynthidis, Rosarû rubrarû añ. ℥.vi.
 Polypodij ana ℥.xviij. Succum fumarix lib.i.
 Abfinthij, Pruna num.lx.
 Thymi, Passularum enucleata-
 Senæ ana ℥.vi. rum ℥.vi.
 Macerentur omnia in fero lactis caprini sufficiente,
 in vase vitrato angustî oris, per dies quinque. Postea
 ferueant vna aut altera ebullitione, Colentur, cola-
 turæ bene expressæ adde
 Pulpæ casixæ ℥.iiij.
 Pulpæ tamarindorum ℥.v.
 Mannæ ℥.ij.
 Frica manu, cola, & adde
 Sacchari albi lib.i.s.

Scam-

Scammonij præparati ℥.i.s.

Coque ad mellis consistentiam, & adde

Myrobalanorū fuluarum, Rhabarbari,
 Cepularū, Seminis fumarie añ. ℥.s.
 Indarum, Spicæ nardi indicæ,
 Bellericarū, Anisi ana ℥.ij.
 Emblicarū, Confice electuarium.

* Morbis omnibus ex flaua bile & pituita falsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit. In summa omni foeditati cutis à biliosis & adultis humoribus procreatae conuenit.

¶ Electarium è succo Rosarum, Nicolai.

Recip. succi rosarum rubrarum,

Sacchari albi ana lib. i. ℥.iiij.

Scammonij præparati ℥.i.s.

Santali rubri,

albi,

lutei ana ℥.vi.

Spodij ℥.iiij.

Camphoræ ℥.i.

Coquatur saccharū cum succo rosarum, deinde reliqua trita adijciantur, & fiat electarium.

* Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articularum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

¶ Electarium rosatum, Mesuræ.

Recip. succi rosarum rub. lib.iiij.

Sacchari optimi lib. i. s.

Mannæ electæ & recentis ℥.vi.

Scammonij præparati ℥.i.s.

Coque igni lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequenta bene trita, & per cribrū transmissa, Trochisc. de spodio ℥.i. Croci ana ℥.ij.

Galliæ moschatae, Trochisc. de berberis ℥.s.

Confice secundum artem.

Hoc electario utimur in conficiendis catapotijs ag-

K 5 grega-

LIBER SECVNDVS

gregatiuis, & de hermodactylis.

* Cholagogum est clemens, ob id salubre biliofis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

¶ Electarium Indum maius Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Turbith electi ℥.i.
Caryophyllorum,	Sacchari optimi,
Spicæ nardi,	Penidiorum ana ℥.xx.
Rosarum rubrarum,	Galangæ,
Cassæ,	Cardamomi maioris,
Macis,	Cardamomi minoris,
Cypero ana ℥.s.	Afari,
Santali citrini ℥.ij.s.	Mastichis ana ℥.i.s.
Ligni aloës,	Scāmonij præparati ℥.i.s.
Nucis moschatæ ana ℥.ij.	

Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo amygdalarum dulcium recens extracto, bene inunctis, fricentur, & fiat electarium cum syrupo subsequenti, qui

Recip. succi apij,
Fœniculi,
Cydoniorum,
Granatorum ana ℥.vi.

Mellis despumati lib.ij.s.

Coquantur in formam syrapi.

* Purgat ventrem totum inferiorem, atq; aded iuncturas pituita etiam putri, flatusque dissipat: & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi, & aliorum viscerum, vtile est.

¶ Electarium Indum minus Mesuæ.

Recip. turbith electi,	Cinnamomi,
Sacchari ana ℥.vi.	Nucis moschatæ,
Macis,	Cardamomi ana ℥.vij.
Caryophyllorum,	Scāmonij præparati ℥.i.s.
Piperis,	Mellis despumati lib.ij.
Zingiberis,	

* Ad

* Ad eadem efficax est.

¶ Electarium de Pſyllis Meſuræ.

Recip. ſucci bugloſi ſine boraginis domeſticæ &
Endiuæ,

(ſylueſtris,

Apj, ana lib.ij.

Succi fumaræ ꝯ.iiij.

Clarificentur, & in his infunde

Cuſcutæ,

Capillorum ven.M.i.

Aniſi,

Aſari ꝯ.s.

Senæ ana ꝯ.s.

Nardi indicæ ꝯ.ij.

Macerentur vigintiquatuor horas, deinde ſemel fer-
neſiant, & adde

Violarum recentium ꝯ.iiij.

Epithymi ꝯ.ij.

Rurſus ferueſiant, colentur, colaturæ addantur

Pſyllij ꝯ.iiij.

Macerentur vigintiquatuor horas identidem agitan-
do, poſt exprime totâ mucaginem, in cuius lib.iiij.
coque igni lento

Sacchari optimi lib.ij.s.

Scammonij præparati ꝯ.iiij.s.

Coctis omnibus adde, ſubſequêtia ſubtiliſſimè trita

Trochiſcorum diarhodon,

de ſpodio,

Rhabarbari ana ꝯ.i.

Trochiſcorum de berberis ꝯ.s.

fiat electarium.

* Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus,
acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, &
vertigini à bilis vapore naſcenti, ictero & intempe-
rici calidæ hepatis.

¶ Triphera Perſica Meſuræ.

Recip. ſucci ſolani,

Endiuæ,

Apj,

Lupuli ana lib.i.

Viola-

LIBER SECUNDVS

Violarum ℥.ij.	Foliorum senæ ℥.ij.
Cuscute ℥.s.	Spicę nardi indice ℥.iij
Myrobalan.citrearum,	Agarici electi ℥.i.
Cepularum,	Pruna damascena nu.l.
Indarú ana ℥.ij.	

Macerentur in prædictis succis, fricatis prius myrobalanis oleo amygdalarú dulcium: Coque igni lento ad tertias, dein adijce

Epithymi ℥.xl.

Semel feruefiant, colentur, In dimidia parte colaturæ dissolue

Tamar indorú recentiu ℥.iij. Pulpæ casisæ ℥. iij.

Mannæ ℥.i.s.

Sacchari violati lib.i.

Alteri parti adde

Sacchari optimi lib.ij.

Aceti boni lib.i.

Coquantur lento igni & reliquis admisceantur, deinde adde

Rhabarbari ℥.ij.

Mastichis,

Myrobalan. citrinarum,

Cubearum,

Cepularum,

Spodij,

Indarú añ. ℥.i.

Santali citrini,

Bellericarum,

Seminú cucurbitæ,

Emblicarú añ.

Citrulli,

℥.s.

Melonum,

Seminis fumaris,

Cucumeris añ. ℥.ij.s.

Trochiscorú diarhodon,

Anisi ℥.s.

Macis,

Spicæ nardi ℥.ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, & fiat electarium secundum artem.

* Aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficac. Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, sitim reslinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

¶ Diaturbith Mesuræ.

Recip.

Recip. turbith albi & gummosi ℥.x.

Zingiberis ℥.v.

Mastiches ℥.iij.

Sacchari albi ℥.ij.s.

fiat electarium cum

Mellis sufficienti quantitate.

* Pituita, præsertim eã quæ est in ventriculo, elicit.

¶ Diaturbith cum Rhabarbaro, Montagnanæ.

Recip. turbith, Zingiberis ana ℥.i.s.

Hermodytyloru ana ℥.i. Mastichis,

Rhabarbari ℥.x. Anisi,

Scamoniij præparati ℥.s. Cinnamomi,

Santali albi, Croci ana ℥.s.

rubri, Sacchari albi lib. i. ℥.iij.

Violarum,

fiat electarium in forma competenti.

* Flauam bilem & pituitam educit, atque aqua intercutem laborantibus mirificè confert.

¶ Catharticum Imperiale, Nicolai.

Recip. scamoniij præparati,

Sacchari ana ℥.i. Spicæ nardi celticæ,

Cinnamomi, Piperis longi,

Spicæ nardi, Piperis albi,

Radicum saxifragiæ, Cardamomi,

Polypodij, Amomi,

Zingiberis ana ℥.s. Caryophyllorum ana ℥.iij.

Terantur omnia tenuissimè & fiat electarium cum Mellis despumati q. s.

* Bilem vtramq; & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat.

¶ Diamanna Galeni ex Mesue.

Recip. manna electæ lib. i.

Scamoniij præparati ℥.i.

Succi rosarum rubrarum lib. i.

Dissoluetur in succo manna, & coquatur sufficienter lento igne, deinde adde

Masti-

LIBER SECVNDVS

Mastiches puluerisatæ ꝓ.iiij.

fiat electarium.

* Bilem flauam educit sine molestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre.

¶ Electarium lenitiuum magistrale.

Recip. myrobalanorum flauarum,

Cepularum,

Indarum ana ꝓ.ij,

Bellericarum,

Emblicarum ana ꝓ.i.s.

Sacchari optimi ꝓ.s.

Terantur triduū in vase lapideo, singulis diebus bis vel ter aquam fontanam inspergendo, deinde sicca-
ta terantur in puluerem tenuem, cuius sumes ꝓ.i.

Turbith boni ꝓ.iiij.

Sandali rubri ana ꝓ.i.

Zingiberis ꝓ.i.s.

Scāmonij preparati ꝓ. i.s.

Cinnamomi,

Sacchari q. l.

Anisi,

fiat electarium.

¶ Theriaca Andromachi senioris ex Galeno.

Recip. trochiscorum scilliticorum ꝓ.xlviiij.

Trochisc. theriacorum,

Nardi indicæ,

Hedicroi,

Schœnanthi,

Piperis longi,

Thuris electi,

Opij ana ꝓ.xxiiij.

Piperis nigri,

Rosarū rubrarū purgatarū,

Dictamni cretici,

Iridis,

Comarum marrubij,

Succi glycyrrhizæ,

Rhapontici,

Seminis napi syluestris,

Stœchadis,

Scordij,

Petroselini,

Opobalsami,

Calaminthæ montanæ,

Cinnamomi,

Terebinthinæ,

Agarici ana ꝓ.xij.

Zingiberis,

Myrrhæ,

Radicū quinquefolij ana

Costi,

ꝓ.vi.

Croci,

Polij montani,

Cassæ,

Chamæpytyos,

Sty-

Styracis,	Sefeli,
Meu,	Acaciæ,
Amomi,	Thlafpi,
Nardi celticæ,	Hyperici,
Terræ lemnix,	Ammi,
Phu,	Sagapeni ana ꝑ.iiij.
Chamædryos,	Castorij,
Folij,	Aristolochiæ tenuis,
Chalcitidis toftæ,	Dauci,
Gentianæ,	Bituminis iudaici,
Anifi,	Opopanacis,
Succi hypociftidis,	Centaurij minoris,
Carpobalfami,	Galbani ana ꝑ.ij.
Gummi,	Mellis despumati lib.x.
Seminis foeniculi,	Vini optimi odorati q. fa-
Cardamomi,	tis est.

Galenus ætate plus aromatū admiscebant ad singulas libras mellis, & medicamentū solidius erat, quam nunc fit. Tam enim sumunt mellis lib. xx.

Conficitur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra lemnia, chalcitis, & bitumen, diligentissimè conteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & crebro subtilissimo cribrantur, semine thlafpi, napi sylvestris, & croco exceptis, quæ per se teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori inhæreant, & vt commodius conterantur.

Gummi, succi, & castorium per se teruntur, adfuso vino, vt etiam commodius teri possint.

In ipso compositionis tēpore, omniumque rerum mixtura, Primum liquefit terebinthina in duplici vase cum mellis pauxillo, deinde etiam opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea per se trita adfuso pauculo melle, vt facilius digitis explanentur, commisceanturque atque vniantur: Postea coquantur in ipso duplici vase cum terebinthina, donec ad iustam

stam consistentiam redacta sint, his admiscetur pars aliqua cōtritōrum, tum etiam in vino dissolutorum, donec mellis consistentiam consequantur, deinde in mortarium vastæ magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primum, pars aliqua eorum quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se & despumati: postremo, pars aliqua eorum quæ in puluerem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum quæ liquefacta in duplici vase, eaque tepida: Hæc omnia probè agitentur rudicula, & sic consequēter de residuo faciendum, donec omnia probè vnita sint, & hæc quidem ad Solem, vt facilius fiat, continuo agitando; & tundendo pila ferrea inuncta opobalsamo, vt facilius agitari possint, & commisceatur etiam opobalsamum reliquis: alioqui faciliè adhæreret pistillo medicamentum, & difficilior fieret agitatio: Hæc cōtinuè per quatuor aut quinque dies agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos menses: deinde reponitur medicamētum vasculis plumbeis, aut terreis bene coctis & vitratis.

Chalcitis quæ in hoc medicamen venit, sic præparanda est: Illius bona quantitas in olla cruda, succensis carbonibus coquitur, eaque liquefacta vbi bullas emiserit, partem supernam in marmor effundes, atque illic fines in vmbra donec frigeat. Hinc postea solummodo capies quod supernè spumeum fuerit, quodque cinerei est coloris, aut præsij, non quod flauum est, theriacam enim colore flauo, non nigro inficeret.

Hic autem animaduertendum est, omnes theriacæ compositiones quæ apud Galenum varijs locis reperiuntur, & diuersorū Authorum, recipere insuper Acori ꝓ.iiij.

Piperis albi ꝓ.vi.

* Exitialibus venenis, & ferarū virus eiaculantium ictibus

ictibus aduersatur. Inueteratis capitis doloribus, vertigini, aurium grauitati, comitialibus, attonitis, appoplecticis uel, resolutis, oculorum hebetudinis, uoci amissæ, asthmaticis, recenti & uetustæ tussi, sanguinem reuicentibus, ægrè excreantibus, & nõ nisi recta ceruice spirantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflationibus, colicis cruciatibus, ileosis, cholericis, cœliacis, regio morbo correptis opitulatur. Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus cõminuit, urinæ difficultati, & uesicæ exulcerationibus medetur. Febriũ horroribus & rigoribus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpe præsentis est auxilio. Menstrua cit, foetum mortuum excutit, articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus alijs malis iugiter data succurrit. Cæterũ in pestifera luë uix aliud præsentius magisque idoneum præsidium hac ipsa inueniri potest.

¶ Theriaca dia resaron Mesur.

Recip. gentianæ, Aristolochiæ rot. ana ℥.ij.
Baccarum lauri, Mellis despumati q. s.
Myrrhæ, Coquantur ut artis est.

* Ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralyfin, spasmus cynicum, id est, oris torturã: tum ventriculi, ut inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, ut hydropem cachexiam, obstructionẽ: præterea morsui scorpionis, & potioni ueneni confert.

¶ Mithridatium Andromachi secundum Galenum.

Recip. glycyrrhizæ ℥. viij. ʒ. s.
Opij ℥. iij. ʒ. i.
Folij, Rosarum siccarum,
Nardi celticæ, Cardamomi ana ℥. iij.
Seminis foeniculi, Castorij,
Gentianæ, Thuris,

L Myr-

Myrrhae, Carpopalsami,
 Succi hypocistidis añ. ʒ. vi. Sagapeni ana ʒ. ij.
 Polij, Croci,
 Costi, Cinnamomi,
 Sefeli, Zingiberis ana ʒ. vij. ʒ. i.
 Casia ana ʒ. v. ʒ. i. Styracis ʒ. v. ʒ. ij.
 Nardi indicæ, Dauci ʒ. vi. ʒ. i.
 Scordij, Petroselini ʒ. iij. s.
 Cyphi, Piperis longi ʒ. iij. s.
 Schoenanthi, Anisi ʒ. iij.
 Opopanacis, Thlaspi,
 Terebinthinæ añ. ʒ. vi. ʒ. i. Opopalsami añ. ʒ. vi. ʒ. ij.
 Acori, Galbani ʒ. vij. ʒ. i.
 Phu, Scinci ʒ. ij. ʒ. i.
 Hyperici, Vini optimi quod satis est,
 Acaciæ, Mellis despumati q. s.
 Gummi,
 Compone in modum theriacæ.

* Ad eadem quæ theriace valet, & ad pleraq; pernicioſa medicamenta & venena est efficacior: in vipera autè morſus citratione, theriaca inferior. Priuatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes & abſceſſus. Tabidis ventrisq; inflationibus medetur, appetentiam emendat & reſtituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac vrinæ difficultatem ſanat, Acuit viſum eorum qui illo crebrius vtuntur. Mortuum foetum eiicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atque iis quæ non concipiunt conducit. Item melancholiam non ſinit conſiſtere. Omne denique capitis malum, ex frigiditate ortum, dolores auriū, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriūq; omnia vitia, emplaſtri forma impoſita, ſanat.

¶ Mithridatium Damocratis.

Recip.

Recip. myrrhæ. Seminis dauci,
 Croci, Carpobassami,
 Agaraci, Cyphi,
 Zingiberis, Bdellij ana ʒ.vij.
 Cinnamomi, Nardi celticæ,
 Nardi indicæ, Gummi,
 Thuris electi, Petroselinij,
 Thlaspi ana ʒ.x. Opij,
 Sefeli. Cardamomi,
 Opobassami, Seminis foeniculi,
 Schœnanthi, Gentianæ,
 Stœchadis, Rosarum,
 Terebinthinæ, Dictamni cretici ana ʒ.v.
 Chalbani, Anisi,
 Costi, Ari,
 Piperis longi, Acori,
 Castorij, Phu,
 Hypocistidis, Sagapeni ana ʒ.iiij.
 Styracis, Meu,
 Opopanacis, Acaciæ,
 Folij ana ʒ.viiij. Scinchi,
 Cassiæ, Seminis hyperici añ. ʒ.ij.s.
 Polij montani, Vini q. f.
 Piperis albi, Mellis despumati q. f.
 Scordij, Confice secundum artem.

¶ Diarceuthidon Damocratis ex Galeno.

Recip. baccarum iuniperi ʒ.iiij.
 Terræ lemnis ʒ.ij.
 Trita excipiantur
 Olei dulcis quantitate sufficienti.
 Alij butyrum recens loco olei sumunt.

* Accipientem tutum à venenis reddit: nam si venenum nō subsit quiescens manet: si adsit, nausēā concitat, & euomere cogit, ita vt venenum quoque cum antidoto rejiciatur.

¶ Ambrosia Archibij, ex Galeno desumpta.

L 2 Recip:

Myrrha,	Afari,
Lapis hæmatitis,	Corticum mandragoræ,
Carabe,	Polij montani,
Sanguinis draconis,	Pulegij,
Coralli rubri,	Baccarum lauri,
Coffi,	Mei,
Boli armeni,	Piperis albi,
Mummix,	Piperis longi,
Consolidæ maioris,	Petrofelini ana ꝑ.s.
Terræ sigillatæ,	Mellis q.f.
Acori,	Confice vt artis est.

* Dysemeria laborantibus & cœliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Facit ad profluuium sanguinis narium, & eos qui cibum non retinent in ventriculo. Sanguinis præterea à quacunque causa natis reiectionibus auxiliatur.

¶ Paulina ex Galeno.

Recip. cinnamomi,	Piperis nigri,
Coffi,	Piperis longi,
Galbani,	Styracis ana ꝑ.i.
Castorij,	Mellis q.f.
Opij,	

Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur per angustissimum cribrum, galbanum in melle dissoluitur, & factum electarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream aut argenteam.

* Facit hæmoptoicis, tussientibus, phthificis, peripneumonicis, ad conuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomentes, ac sæcernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita, facit in malum habitum delapsis, cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenû iaculantium bestiarum.

¶ Philonis Tharsensis Antidotus ex Galeno,
similis ei quam Mesues describit.

L 3 Recip.

Recip. croci ℥.v. Piperis albi,
 Pyrethri, Seminis hyoscyami añ. ℥.
 Euphorbij, Opij ℥.x. (xx.)
 Nardi indicæ ana ℥.i. Mellis q. f.

Confice secundum artem.

* Expertissima ad sedandos vehementes & lethales partium dolores, ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus aut flatu crasso, aut ambrorum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffocationis periculum, singultū vehementē, & vrinæ difficultatem.

¶ Philonium Romanum Nicolai.

Recip. piperis albi, Croci ℥.s.
 Seminis hyoscyami ana Nardi indicæ,
 Opij ℥.ij.s. (℥.v. Pyrethri,
 Casæ ℥.i.s. Zedoariæ, ana G. xv.
 Seminis apij ℥.i. Cinnamomi ℥.i.s.
 Petroselinī, Euphorbij,
 Seminis fœniculi, Costi ana ℥.i.
 Dauci ana ℥.ij. G.v. Mellis despumati q. f.
 Confice &c.

* Idem quod præcedens potest.

¶ Philonium Persicum Mesuræ.

Recip. piperis albi, Pyrethri,
 Hyoscyami ana ℥.xx. Margaritarum,
 Opij, Carabe,
 Terræ lemnix ana ℥.x. Doronici,
 Lapidis hæmatitis, Zedoariæ,
 Croci ana ℥.v. Trochiscorum ramich
 Castorij, ana ℥.i.
 Nardi indicæ, Camphoræ ℥.i.
 Euphorbij, Mellis q. f.

* Ad sanguinem vndecunque manantem confert: quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itemq; sanguinis sputū cōpescit, ac foetum in vtero retinet.

¶ Try-

¶ Tryphera magna Nicolai.

Recip. opij ʒ.ij.	Corticum mandragoræ,
Cinnamomi,	Nardi celticæ,
Caryophyllorum,	Rosarum rubrarum,
Galangæ,	Piperis,
Nardi indicæ,	Anisi,
Zedoariæ,	Apij,
Zingiberis,	Petrofelini,
Costi,	Foeniculi,
Styracis calamitæ,	Dauci,
Calami aromatici,	Hyosciami,
Calaminthæ,	Cymini,
Iridis,	Seminis ocymi ana ʒ.i.
Peucedani,	Mellis despumati q.ʒ.
Acori,	

* Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, sumpta namque statim sudorem prouocat, phreneticis, mulieribus ex vteri dolore infomnibus, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum sanguine excernunt vtilissima est.

¶ Requies Nicolai.

Recip. rosarū rubrarū,	Nucis moschatae,
Violarum ana ʒ.iiij.	Cinnamomi,
Opij,	Sacchari ana ʒ.i.s.
Hyoscyomi,	Santali albi,
Papaueris albi,	rubri,
Papaueris nigri,	citri,
Corticis mandragoræ,	Spodij,
Seminum scariolæ,	Tragacanthæ ana ʒ.ij.
Lactuca,	Gr.v.
Portulacæ,	Mellis despumati q.ʒ.
Pfyllij,	

Confice secundum artem electarium.

* Ad febres continuas & ardentes, omnemque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem vtilis temporibus & pulsibus manuū in-

LIBER SECVNDVS

uncta, ac cordis doloré mitigat, somnumq; conciliat.

¶ Sotera Pauli.

Recip. nardi indicæ,	Piperis longi,
Castorij ana ʒ. xxxix.	Amomi,
Myrrhæ ʒ. xxvij.	Sefeli ana ʒ. xij.
Croci ʒ. xxxvij.	Sifonis ʒ. vi.
Opij,	Styracis,
Schœnanthi ana ʒ. xxxvi.	Hedycroi,
Petroselini ʒ. xl.	Costi,
Anisi ʒ. ix.	Afari ana ʒ. xvij.
Apij ʒ. vij.	Mellis q. f.
Calix ʒ. xij.	

PVLVERES.

Sectio sexta.

¶ Puluis aduerfus flatu magistralis.

Recip. coriandri præ-Cinnamomi ʒ. ij.
parati, Caryophyllorum ʒ. i.
Anisi purgati ana ʒ. ij. Macis ʒ. s.
Sacchari optimi ʒ. iij. fiat puluis tenuissimus.

¶ Alius ad idem magistralis.

Recip. cinnamomi ele- Piperis,
sti ʒ. i. Galangæ,
Zingiberis ʒ. s. Caryophyllorū ana ʒ. ii.
Cymini, Sacchari optimi lib. i.
fiat puluis tenuissimus.

¶ Alius similis magistralis.

Rec. cinnamomi ʒ. i. s. Nucis moschatae G. viij.
Zingiberis ʒ. i. Sacchari albi ʒ. ij.
Macis ʒ. s. fiat puluis tenuissimus.

¶ Puluis Senæ præparata, Montagnanæ.

Recip. foliorum senæ ʒ. i. s.
Zingiberis,

Macis

Macis ana ℥.ij. Tartari ana ℥.i.s.
Cinnamomi, terantur tenuissimè.

* Purgat caput mirabiliter.

¶ Pulvis è turbith magistralis.

Recip. turbith boni ℥.i. Hermodactylorum ℥.s.
Zingiberis albi ℥.ij. Sacchari albi ℥.s.
fiat pulvis.

¶ Alius Auicennæ.

Recip. zingiberis albi, Turbith electi ana ℥.x.
Mastiches electæ, Sacchari albi ℥.xxx.
Trita misceantur.

* Purgant humores phlegmaticos, datur pueris,
mulieribus, senibus, & humidis, delicatis, & ociosis.

¶ Pulvis laxatiuus magistralis.

Recip. turbith ℥.i. Anisi,
Zingiberis, Hermodactylorum,
Cinnamomi, Scammonij preparati
Mastiches, ana ℥.s.
Galangæ, Foliorum senæ ℥.ij.
Cardamomi, Sacchari albi ℥.iij.
Caryophyllorum,

Terantur omnia & commisceantur.

* Purgat choleram, pituitam & melancholiam.

¶ Pulvis ad suppositoria communia magistralis.

Recip. aloës, Salis gemmæ,
Cymini, Rutæ ana ℥.i.
Terantur & fiat glans cum Mellis q.f.

¶ Alius acutior.

Recip. aloës, Cymini,
Hellebori nigri, Rutæ ana ℥.ij.
Centaurij, fiat pulvis vt suprâ.

¶ Alius, & sedans dolorem.

Recip. cymini, Castorij,
Rutæ, Opij ana ℥.i.
fiat pulvis qui melle excipiatur.

¶ Pulvis capitalis calidus Magistralis.

L s Recip.

Recip. stœchadis, Maioranæ,
 Nucis moschatæ, Ligni aloës,
 Betonica, Caryophyllorum ana ꝓ.i.
 Radicum betonica, Moschi,
 Seseleos, Ambræ ana G.ij.
 fiat puluis.

¶ Puluis capitalis temperatus.

Recip. rosarum, Radicum præoniæ,
 Santali albi, Saluiæ,
 Labruscæ, Maioranæ,
 Betonica, Caryophyllorum,
 Stœchadis, Sandaracæ ana ꝓ.i.
 Terantur tenuissimè.

¶ Puluis ad dentifricia.

Recip. cornu ceruini Cinnamomi,
 vsti, Sideritidis tostæ ana ꝓ.i.
 Punicis, Moschi, Gr.vi.
 Tutia preparata, misce fiat puluis.

¶ Puluis pro epithemate cordis refrigerans.

Recip. santali albi,
 rubri,
 citrini ana ꝓ.s.

Been albi,

rubri,

Serici grano tinctorio infecti,

Osis e corde cerui ana ꝓ.i.

Sericum minutim incidatur, reliqua per se terantur,
 misce, conserua in pixide vitrea.

¶ Alius exalfaciens.

Recip. santali albi,
 rubri,
 citrini ana ꝓ.ij.

Been albi,

rubri,

Serici grano tinctorio infecti,

Osis de corde cerui ana ꝓ.i.

Croci

Croci, Ligni aloës ana ζ .s.
 Cinnamomi, Ambraë,
 Caryophyllorum, Moschi ana ϑ .i.
 Confice vt supra.

¶ Alius temperatus.

Recip. rosarum rubrarum,
 Coralli rubri, Croci,
 Corticum citri, Caryophyllorum,
 Osis de corde cerui, Cinnamomi,
 Seri grano tinctorum in- Ligni aloës ana ϑ .i.
 fecti ana ζ .i. Ambraë ϑ .s.
 Santali albi, Camphoraë ϑ .ij.
 rubri, Terantur vt supra.
 citrini ana ζ .s.

¶ Species pro Epithemate hepatis refrigerantes.

Rec. santali albi, Coralli,
 rubri, Spodij ana ζ .i.
 citrini ana ζ .s. Camphoraë ϑ .i.
 Rosarum, Terantur vt supra.

¶ Alia exalfacientes.

Recip. rosarum, Spodij,
 Santali albi, Nardi indicæ,
 rubri, Cinnamomi ana ζ .s.
 Absinthij, Moschi ϑ .i.
 Schoenanthi, fiat puluis tenuis.

¶ Puluis aduersus Pestem Magistralis.

Recip. dictami Cretensis, Boli,
 Coralli albi, Gentianæ ana ζ .i.
 Tormentillæ, Terræ lemniaë ζ .s.
 fiat puluis tenuis.

¶ Alius.

Rec. radicū tormētillæ, Dictamni cretensis,
 Santali citrini, Cornu ceruini vsti,
 Terræ lemniaë, Margaritarum,
 Sacchari albi ana ζ .ij. Rosarum rubrarum,
 Santali rubri, Boli,

Aristo-

LIBER SECVNDVS

Aristolochiæ rotundæ, Camphoræ,
 Pimpinellæ, Seminum citri,
 Myrrhæ, Croci,
 Zodoariæ ana ʒ.i. Hyacinthi ana ʒ.s.
 fiat puluis tenuis.

¶ Puluis contra scabiem communis.

Recip. sulphuris flauī, Baccarum lauri,
 Cimini, Staphidis agriæ ana ʒ.i.
 fiat puluis qui oleo rosato excipiatur.

¶ Alius Nicolai, efficacior.

Recip. lythargyri, Nitri,
 Hellebori nigri ana ʒ.i. Maioranæ ana ʒ.ij.
 Sulphuris,

Trita in puluerem excipiantur, &c.

¶ Puluis cephalicus Lucij ex Galeno.

Recip. iridis ʒ.iiij. Corticis radicū pana-
 Aristolochiæ rotundæ, cis ʒ.iiij.
 Pollinis thuris ana ʒ.ij. fiat puluis.

* Vtilis est etiam ad nomas.

¶ Alius ex Galeno.

Recip. iridis, Erti,
 Aristolochiæ rot. Pollinis thuris ana ʒ.i.
 Reducantur in puluerem tenuem. Nonnulli addunt
 radices panacis & cadmiam lotam,

¶ Alius Xenocratis ex Galeno.

Recip. farinæ erui, xorobi ʒ.vij.
 Iridis ʒ.x. Aristolochiæ rot.
 Thuris clari, Squamæ æris ana ʒ.v.
 Terantur vt suprâ.

¶ Alius Tryphonis.

Recip. corticis piceæ, Aristolochiæ rot.
 Squamæ æris, Resinæ pini frictæ ana
 Punicis cõbusti ana ʒ.vi. ʒ.iiij.
 Thuris, Aloës,
 Iridis, Myrrhæ ana ʒ.ij.
 Conterantur in puluerem vt suprâ.

* Aufert

* Aufert squamas ofsium.

¶ Pulvis constringens Galeni.

Recip. aloës,	Lapidis hæmatidis,
Mannæ thuris,	Hypocistidis,
Corticis pini,	Croci,
Terræ lemnix,	Gallæ omphacitidis añ. ʒ. i.
Boli armeni,	fiat pulvis.

¶ Pulvis emplasticus eiusdem, & sanguiné fistens.

Recip. resinæ frictæ,	Crypsi ana ʒ. iij.
Pollis farinæ triticæ,	fiat pulvis.

¶ Alius eiusdem ad omnē hæmorrhagiam.

Recip. thuris ʒ. i.	
Aloës ʒ. s.	

fiat pulvis, qui cum oui albumine subactis ad mellis crassitiem pilis mollissimis leporis excipietur.

¶ Pulvis incarnans, & sanguinem restringens,

Ioannis de Vigo.

Recip. aloës,	Sanguinis draconis,
Myrhæ ana ʒ. i.	Terræ lemnix ana ʒ. iij. s.
Sarcocollæ ʒ. i. s.	Tutix,
Thuris,	Lytargiri,
Pollinis farinæ ana ʒ. ij.	Tragacanthæ añ. ʒ. i.

fiat pulvis tenuis.

¶ Pulvis causticus sanguinem com-
primens Galeni.

Recip. chalcitidis ʒ. c.	Misyos torrefacti ʒ. xxv.
Chalcanthi ʒ. l.	Aeris vsti ʒ. xij. s.

fiat pulvis.

¶ Alius eiusdem.

Recip. chartæ cõbustæ,	Arsenici,
Plumbi vsti,	Squamæ ferri ana ʒ. i.
Aeris vsti,	Sulphuris viui ʒ. s.

fiat pulvis.

¶ Præcipitatum Ioannis de vico.

Recip. salis niri lib. i. s.	
Vitrioli Romani,	

Alu-

Aluminis ana lib.i.

Ex his per alembicū destillatis (quo fortius autem, eò melius) fumes lib.i.

Argenti viui lib.i.

In vas vitreum pone cum capello bene lutato, sic etiam recipiens lutabis, ne euaporet, & destillabis eousque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase argentum quod superest vstum erit, quod chymista præcipitatum vocant, hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua destillata quam seposueras rursus vasi vitreo imponito, atque destilla donec aqua destillata sit: tum confracto vase, argentum quod superest, denuo teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones, suppositoque igne valido, cum æneo baculo misce ac agita, per horæ ac dimidiæ spatiū: hoc enim pacto puluis melior efficitur, & ritè factus ipsum miniū coloris elegantia superat.

CATAPOTIA, siue PILVLAE.

Sectio septima.

¶ Pilula bechicæ Mesuæ.

Recip. succi glycyrrhizæ,

Sacchari albi ana ꝑ. x.

Amyli,

Tragacantha,

Amygdalarum dulcium ana ꝑ. i. s.

Muccaginis feminis cydoniorum q. s.

Tere fiant pilulæ.

* Ad tussim veterem & siccam, gutturisq̃ue & faucium asperitatem pollent.

¶ Pilulæ bechicæ Rafis.

Recip. amyli,

Tra-

Tragacanthæ, Capitem papaueris,
 Amygdalarū purgatarū, Gummi arabici,
 Fabarū decorticatarum, Boli armeni ana ℥.ij.

Seminis papaueris, Muccaginis psyllij q.f.

¶ Pilulæ bechicæ albæ magistræles.

Recip. sacchari candi, Penidiorum ℥.iij.
 Amyli ana ℥.vi. Tragacantha ℥.ij.

Tragacantha dissoluatur in aqua rosacea per diem, &
 fiant pilulæ.

¶ Pilulæ bechicæ emplasticæ Galeni.

Recip. gummi, Succu glycyrrhizæ ℥.i.
 Tragacanthæ ana ℥.s. Sapæ q.f.

fiant pilulæ.

¶ Pilulæ bechicæ cum terebinthina Galeni.

Recip. piperis, Galbani,
 Casiæ, Terebinthina ana ℥.i.

Cinnamomi ana ℥.ij. Mellis despumati q.f.

fiant pilulæ.

¶ Pilulæ communes.

Recip. aloës ℥.i. Croci ana ℥.s.
 Myrrhæ, Vini albi q.f.

fiant pilulæ. alijs croci ℥.ij. satis esse videntur.

* Mirificè aduersus pestiferæ luis contagia popula-
 tim grassantia pollent. Humores etiam ventriculo
 immerfos educunt.

¶ Pilulæ contra pestem Magistræles.

Recip. myrrhæ, Myrobalanorum
 Croci, rum ℥.ij.

Boli armeni, Aloës ℥.vij.
 Coralli rubri, Vini albi q.f.

Charabe ana ℥.i. fiat massa.

¶ Pilulæ de Hiera simplici Galeni.

Recip. specierum de hiera simpl. Gal. ℥.ij.
 Mellis rosati colati q.f.

fiant pilulæ.

* Aduersus vitia vetriculi ex humoribus biliosis &
 pitui-

pituitosis nata profunt.

¶ Pilulæ de Hiera cum Agarico.

Recip. specierum de hiera simpl. Gal.

Agarici trochiscati ana ꝓ.iiij.

Aloës ꝓ.i.

Mellis rosati colati q.f.

fiant pilulæ.

* Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & alijs stomachi & thoracis vitijs à crasis & pituitosis humoribus natis.

¶ Pilulæ de Hiera cum Agarico Magistri

Antonij de Scarperia

Recip. cinnamomi, Violarum,

Nardi indicæ, Epithymi,

Croci, Colocynthis ana ꝓ.i.

Schoenanthi, Agarici,

Afari, Turbith ana ꝓ.ij.

Mastichis, Rhabbarbari,

Cassæ, Scammônij preparati,

Xylobalsami, ana ꝓ.iiij.

Carpobalsami,

Confice cum vino albo & theriaca.

* Opem ferunt vitijs capitis neruorumque, & stomachi cruditatibus.

¶ Pilulæ ad matricem Auicennæ.

Recip. doronici, Seminis apij,

Zedoariæ, Anethi,

Nucis moschatæ, Margaritarum ana ꝓ.iiij.

Castorij ana ꝓ.i. Hyocyami ꝓ.ij.

fiant pilulæ cum aquæ arthemisiæ q.f.

¶ Pilulæ Galeni, similes Alephanginis.

Recip. cinnamomi, Xylobalsami,

Calami aromatici, Schoenanthi,

Cassæ, Dactylorum ana ꝓ.i.

Trita omnia, macerentur in aquæ pluuiæ sufficienti quantitate in olla noua, deinde excoquantur ad medias,

dias, Cola & colaturæ impone aloës sæpius lotæ in aqua pluuiæ, & puluerifatæ lib. i.

Permisceantur, & insolentur per dies caniculæ, donec exsiccata sint, deinde addita

Croci, Mastichis ana ꝑ. i.

Myrrhæ, Misce, fiant pilulæ.

* Idem præstant quod subsequentes.

¶ Pilulæ Alephanginæ Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Alari,
Cubebærum,	Mastichis,
Ligni aloës,	Schoenanthi,
Calami aromatici,	Nardi indicæ,
Macis,	Carpobalsami ana ꝑ. i.
Nucis moschatæ,	Absinthij,
Cardamomi,	Rosarû rubrarum añ. ꝑ. v.

Caryophyllorum,
Terantur crassius, & in libris duodecim aquæ communis per diem macerata, coquâtur ad dimidij consumptionem, deinde fricentur & colentur, & in colaturæ lib. ij. injice

Aloës sæpius lotæ secundum artem, & in puluerem redactæ lib. i.

Insolabis donec siccantur sæpius agitando, & addes Myrrhæ,

Mastiches ana ꝑ. v.

Croci ꝑ. iij.

Tere curiosè, prædicti decocti reliquum ipsis affunde, agita in Sole, donec siccantur, & in iustam crassitiam reducantur, vt fieri possint pilulæ secundum artem.

Confici debent hæ pilulæ mense Iunio aut Iulio.

* Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

¶ Pilulæ de tribus.

M Recip:

Recip. rhabarbari,
 Agarici,
 Aloës lotæ ana ꝑ.ij.s
 fiant pilulæ cum syrupo rosato.

¶ Pilulæ ex Rhabarbaro Mesuæ.

Recip. rhabarbari electi ꝑ.iiij.
 Succu glycyrrhizæ,
 Absinthij,
 Mastiches ana ꝑ.i.
 Myrobalanorum flauarum ꝑ.ij.s.
 Seminis apij,

Fœniculi ana ꝑ.s.

Trochiscorum diarhodon ꝑ.iiij.s.
 Specierum hieræ simplicis ꝑ.x.
 Aquæ fœniculi q.f.
 fiant pilulæ.

* In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus,
 & aquæ inter cutem iniijis conferunt.

¶ Pilulæ Mastichinæ Conciliatoris.

Recip. mastiches ꝑ.iiij.
 Agarici ꝑ.iiij.
 Aloës ꝑ.x.
 Agaricum elimatam aut erasum maceratur in oxy-
 melite, fiuntque pilulæ.

* Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos,
 vterum putribus humoribus purgant & roborant.

¶ Pilulæ Assaieret Auicennæ ex Gentile.

Recip. pulueris hieræ picræ Gal. ꝑ.ij.
 Mastiches, Aloës ꝑ.iiij.
 Myrobalanorū. añ. ꝑ.i. Succu aut aquæ maioranç q.f.
 fiant pilulæ.

* Bilem flauam & pituitam vacuant.

¶ Pilulæ ex fumaria Auicennæ.

Recip. Myrobal. flauarum,
 Cepularum,
 Indarum ana ꝑ.v.

Aloës

Aloës ℥.vij.

Scammonij præparati ℥.v.

Succi fumaris q.f.

Omnia in puluerem redacta comprehendere succo, & ficcari finito: rursus trita succo excipiantur, ficcetur: & sic tertium. & in pilulas formentur.

* Soluunt humores acres, biliosos, pituitam falsam, & alios adustos, à quibus pruritus & scabies.

¶ Pilulæ ex Agarico Mesuæ.

Recip. agarici ℥.iij. Specierum hieræ picræ,

Mastiches,

℥.iij.

Iridis,

Myrrhæ ℥.i.

Marrubij ana ℥.i.

Colocynthis,

Turbith ℥.v.

Sarcocollæ ana ℥.ij.

Agaricum lima in puluerem redigitur: reliqua contunduntur, fiuntque pilulæ cum

Sapæ sufficienti quantitate.

Colocynthis loco, satius erit trochiscos alhandal fumere.

* Auxiliantur asthmaticis, & alijs thoracis vitijs à crassis & pituitosis humoribus natis.

¶ Pilulæ Aggregatiuæ Mesuæ.

Recip. Myrobalanorum flauarum,

Rhabarbari ana ℥.s.

Turbith,

Succi eupatorij,

Aloës ana ℥.vi.

Absinthij ana ℥.iij. Mastiches,

Scammonij præparati ℥.vi. Rosarum rubrarum,

Myrobal. cepularum,

Salis gemmæ,

Indarum,

Epithymi,

Agarici,

Anisi,

Colocynthis,

Zingiberis ana ℥.i.

Polipodij ana ℥.ij.

Crasiusculè omnia conterantur, & fiant pilulæ cum

Electuarij rosati Mesuæ q.f.

* Valent ad diurnas febres, & vitia capitis, ventriculi, & iecinoris. Humores item biliosos, & pitui-

M 2 tofos

LIBER SECVNDVS

tosos educunt.

¶ Pilulæ sine quibus Nicolai.

Rec. aloës lotæ ꝓ. xiiij. Absinthij,
Myrobal. flauarum, Rosarum,
Cepularum, Violarum,
Indarum, Senæ,
Bellericarum, Agarici,
Emblicarum, Cuscuthæ ana ꝓ. i.

Rhabarbari, Scammonij præparati
Mastiches, ꝓ. vi. s.

Macerato scammonio in succi foeniculi q. s.

Infusionem, panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione fiat massa.

* Mirificè pituitam, bilem & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conferuantes: aurium dolorem sanant, & ileosis conferunt.

¶ Pilulæ Lucis minores Mesuæ.

Recip. xylobalsami, Indarum,
Carpobalsami ana ꝓ. i. Bellericarum,
Radicu chelidonię ꝓ. v. Emblicarum,
Rosarum, Agarici,
Violarum, Schoenanthi,
Absinthij, Lycij,
Euphrasie ana ꝓ. iiij. Lapidis lazuli ana ꝓ. ij. s.
Senæ, Aloës lotæ ꝓ. vi.
Epithymi, Succu foeniculi, aut chelidoniæ q. s.
Myrobal. flauarum, fiat massa.
Cepularum,

* Excrementa capitis pituitosa educunt, visumque roborant, Atram tamen bilem magis vacuant.

¶ Pilulæ Aureæ Nicolai.

Recip. aloës,
Scammonij præparati ana ꝓ. v.
Rosarum rubrarum,

Seminis

Seminis apij ana ʒ.ij.s. Croci,
 Seminis fœniculi, Pulpæ colocynthidis,
 Anisi ana ʒ.i.s. ana ʒ.i.

Mastiches,
 Trita crassius excipiantur tragacantha macerata in
 aqua fœniculi.

* Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, fla-
 tus ventriculi & intestinorū dissoluunt, ac citra mo-
 lestiam aluum deiciunt.

¶ Pilulæ ex Turbith aureæ Mesuæ.

Recip. aloës ʒ.xij.

Mastiches,

Rosarum rubrarum ana ʒ.vij.

Myrobalanorum flauarum ʒ.x.

Croci ʒ.iiij.

Turbith gummosi ʒ.xvi.

Puluerentur & cum

Succi absinthij q.f. fiat massa.

* Bilem & pituitam sine molestia purgant : hepar
 & ventriculum roborant, coctionem iuuant.

¶ Pilulæ cochix Rhafis.

Recip. specierum de hiera simplici ʒ.x.

Pulpæ colocynthidis ʒ.iiij. ʒ.i.

Scammonij præparati ʒ.ij.s.

Turbith,

Stœchadis ana ʒ.v.

Vini albi q.f. fiat massa.

* Caput magna efficacia expurgant, ex eoque ac
 neruis humores crassos euacuant.

¶ Pilulæ ex Colocynthide Galeni.

Recip. colocynthidis,

Succi absinthij ana ʒ.s.

Aloës,

Scammonij præparati ana ʒ.i.

Rhabarbari electi ʒ.iiij.

Trita omnia succo excipiantur.

M 3

Addi-

LIBER SECVNDVS

Addimus rhabarbarum.

* Pituitam à cerebro & alijs nervosis vacuant: ob id conferunt dolori capitis frigido.

¶ Pilulæ Alhandal. Mesuæ.

Recip. trochiscorum alhandal ʒ. xij.

Specierum de hiera simpl. ʒ. vij.

Mastiches ʒ. ij.

Salis gemmæ ʒ. i. s.

Ladani ʒ. i.

Ladanum, & mastiche iuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo: deinde reliqua trita addantur, & fiant pilulæ.

* Ad cephalæam, & hemicraniam difficilem, & affectus nervorum, & iuncturatum.

¶ Pilulæ de Hermodactylis Mesuæ.

Rec. hermodactylorú, Castorij,

Myrobalanorum citrinorum, Sarcocollæ,

Euphorbij,

Aloës, Opopanacis,

Turbith, Seminis rutæ,

Colocynthidis, Seminis apij ana ʒ. iij.

Bdellij, Croci ʒ. i. s.

Sagapeni ana ʒ. vi. Succı brassicæ q. f.

fiat massa.

* Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum.

¶ Pilulæ ex Turbith Mesuæ, Catapotia stomachica dicta.

Recip. turbith gummosi ʒ. x.

Mastiches ʒ. iij. Aloës ʒ. ij. ʒ. i.

Rosarú rubrarum ʒ. iij. Succı absinthij q. f.

fiat massa.

* Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex veniculo & cerebro vacuant.

¶ Pilulæ Indæ Mesuæ.

Recip. myrobalanorum indarum,

Hellebori

Hellebori nigri,	Salis indi ana ℥.iiij.
Polypodij ana ℥.v.	Succi eupatorij,
Epithymi,	Nardi indicæ ana ℥.ij.
Stęchadis ana ℥.vi.	Zingiberis ℥.i.
Agarici,	Specierũ de hiera simpl.
Lapidis lazuli lauati,	℥.i.℥.iiij.
Colocynthidis,	Succi apij q.f.
fiat massa.	

* Valent ad affectus melancholicos, cancrum non ulceratum, elephantiam, alphas nigros curatu difficile, melancholiam morbum, & inde ortum timorem & merorem, quartanam, icterum splenicum, & splenis dolorem.

¶ Pilulæ fetidæ maiores Mesuæ.

Recip. sagapeni,	Efulæ ana ℥.ij.
Ammoniacy,	Scāmonij præparati ℥.iiij.
Opopanacis,	Turbith ℥.iiij.
Bdellij,	Cinnamomi,
Colocynthidis,	Nardi indicæ,
Harmel,	Croci,
Aloës,	Costi ana ℥.i.
Epithymi ana ℥.v.	Zingiberis ℥.i.s.
Hermodytylorum,	Euphorbij ℥.ij.
Dissoluantur lachrimæ in succo porri, & fiat massa.	

* Vacuant pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, alijsque cutis vitijs.

¶ Pilulæ fetidæ minores Mesuæ.

Recip. sagapeni,	Myrrhæ ana ℥.v.
Ammoniacy,	Turbith ℥.x.
Opopanacis,	Colocynthidis ℥.vi.
Bdellij,	fiant vt priores.

* Idem pollut.

¶ Pilulæ Arabicæ Nicolai.

Recip. aloës ℥.iiij.

M 4 Radi-

LIBER SECVNDVS

Radicum bryoniæ,	Rofarum,
Scammonij præparati,	Maftiches,
Myrobal.citrinarum,	Afari ana ℥.i.
Cepularum,	Castorij ℥.iij.
Indarum,	Croci ℥.i.
Bellericarum,	Succi feniculi q.f.
Emblicarum,	fiat maſſa.

* Valent ad capitis dolorem, vertiginem, hemi-
miamque, lætitiã generant, mentisquẽ vigorem
conſeruant, viſum acuunt, auditumquẽ amiſſum re-
parant, ac ſtomachum à vitioſis humoribus purgât.

¶ Pilulæ ex Sagapeno Meſuæ.

Recip. ſagapeni,	Caſtorij,
Ammoniãci,	Rutæ agreſtis ana ℥.ij.
Bdellij,	Colocynthidis ℥.iij.
Opopanacis,	Salis gemmæ ℥.i.
Aloës,	Cum ſucci porri q.f.
fiat maſſa.	

* Pituitam lentam purgant: ob id iuuant paraly-
ſim, ſpasmus, dolorem iuncturarum, dorſi, poda-
gramquẽ frigidam.

¶ Pilulæ ex Bdellio Meſuæ.

Recip. bdellij ℥.i.s.	Concharũ venerearum
Myrobal. cepularum,	viſtarum,
Indarum,	Charabe ana ℥.ij.s.
Bellericarum,	Ammi ℥.iij.
Emblicarum,	Succi porri q.f. excipiãtur.

* Ad fluxum hemorrhoidum & vlcerum in eis, &
ad menſes immodicos.

¶ Pilulæ de Sarcocolla Meſuæ.

Recip. ſarcocollę ℥.iij.	Zingiberis ana ℥.i.s.
Turbith ℥.iiij.	Salis gemmi ℥.i.
Colocynthidis,	Aquæ roſarum q.f.
fiat maſſa.	

* Pituitam vacuant, ob id pituitoſis affectibus com-
modant.

¶ Pilulæ

¶ Pilulæ de Euphorbio Mefuæ.

Recip. euphorbij, Sagapeni ana ʒ.ij
 Agarici, Aloës ʒ.v.
 Colocynthidis, Succij porri q.f.
 Bdellij,

* Pituitam frigidam & crudam ad neruos fluëtem
 vacuant: ob id conferunt paralyfi.

¶ Pilulæ ex Opopanace Mefuæ.

Recip. opopanacis, Piperis longi,
 Hermodactylorum, Caffæ,
 Sagapeni, Myrobal. citrinarum,
 Bdellij, Indarum,
 Ammoniaci, Bellericarum,
 Colocynthidis ana ʒ.v. Emblicarû añ. ʒ.i
 Croci, Scâmonij præparati ʒ.ij.
 Caftorij, Turbith ʒ.s.
 Myrrhæ, Aloës ʒ.i.s.
 Zingiberis, Succij brafsicæ q.f.
 Piperis nigri, fiat massa.

* Ad paralyfim, fpafmum cynicum, gonagram, po-
 dagram, & aliorum articulorum dolores, morbosq;
 partium neruofarum frigidos, vtiles funt.

¶ Pilulæ de lapide Lazuli Mefuæ.

Recip. lapidis lazuli loti ʒ.v.
 Epithymi, Scammonij præparati,
 Polypodij ana ʒ.i. Hellebori nigri,
 Caryophyllorum, Salis indi ana ʒ.ij.s.
 Anifi ana ʒ.s. Agarici electi ʒ.i
 Specierû hierę simpl. ʒ.xv. Succij endiuæ q.f.
 fiat massa.

* Valent ad affectus melancholicos, & bile vfta
 natos.

¶ Pilulæ ex lapide Armeno Mefuæ.

Recip. lapidis armeni loti,
 Specierum hieræ ana ʒ.v.
 Polypodij,

M ʒ Epi-

LIBER SECVNDVS

Epithymi ana ꝑ.i. Salis indi ꝑ.i.s.
 Scámonij præparati ꝑ.iiij. Succi solani q.f.
 Caryophyllorum ꝑ.ij. fiat massa.

* Melancholiá, & bilem vřtam multiplicé vtramq;
 clementer vacuant: ob id morbis inde natis confe-
 runt.

¶ Pilulæ è sex rebus Galeni.

Recip. aloës, Bdellij,
 Scammonij, Gummi arabici,
 Colocynthidis, Rhabbarbari ana ꝑ.s.
 Agarici, Tere, fiat massa.
 Rhabbarbarum à nobis additum est.

* Pituitam à cerebro & alijs neruosis euacuunt.

¶ Pilulæ de octo rebus Nicolai.

Recip. aloës, Agarici,
 Scammonij præparati, Mastiches,
 ana ꝑ.ij. Dauci,
 Pulpæ colocynthidis, Myrobalanorū cepularū,
 Epithymi, Absinthij ana ꝑ.i.
 Tere, fiat massa cum
 Succi solani q.f.

* Purgant humores crassos à capite, visum acuunt,
 & suffusionem arcent.

¶ Pilulæ ex Opio magistrales.

Recip. opij, Castæ ana ꝑ.s.
 Croci, Vini albi q.f.

* Faciunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant.

¶ Pylulæ de cynoglossa Nicolai.

Recip. cynoglossæ, Thuris ꝑ.v.
 Opij, Caryophyllorum,
 Seminis hyoscyami ana Cinnamomi,
 ꝑ.s. Styracis calamitæ, añ. ꝑ. ij.
 Myrrhæ ꝑ.vi. Aquæ rosæcæ q. f.
 fingatur massa.

* Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis di-
 stillationibus, ac doloribus mitigandis.

¶ Pilulæ

¶ Pilulæ de Arnoglossò magistrales.

Recip. Myrrhæ, Succì glycyrrhizæ ana ʒ. i.
 Thuris, Succì plantaginis q. s.
 fiat massa.

* Siftunt tenues destillationes, ac eandem ferè cum superioribus facultatem obtinent.

¶ Pilulæ de Styrace Mesuæ.

Recip. styracis liquide, Succì glycyrrhizæ,
 Thuris, Opij ana ʒ. i.
 Myrrhæ, fiat massa.

* Ad eadem efficaces ad quæ sequentes.

¶ Pylulæ Styracis Galeni.

Recip. styracis ʒ. ix. Myrrhæ ana ʒ. iiij.
 Opij, Sapæ q. s.
 finge catapotia.

* Faciunt ad tussim recentem, & hæmoptoicos, do-
 lorem leuant, ac somnum inducit.

¶ Aliæ similes Galeni.

Recip. myrrhæ, Castorij,
 Piperis, Galbani ana ʒ. ij.
 Opij, Sapæ q. s.
 Styracis, fac pilulas.

* Faciunt ad destillationem, dolorem capitis, ægrè
 spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & vteri affe-
 ctiones.

¶ Pilulæ Harmoniæ Galeni.

Recip. styracis, Myrrhæ,
 Castorij, Seminis hyoscyami ana
 Piperis, ʒ. iiij.
 Cardamomi, ana ʒ. iiij. Sapæ q. s.
 Opij, reduc in catapotia.

* Ad destillationes & inexuperabilem defluxû vti-
 les sunt.

¶ Pilulæ Scribonij, ex Galeno.

Recip. sagapeni,
 Myrrhæ ana ʒ. ij.

Opij,

LIBER SECVNDVS

Opij, Piperis albi ℥.i.s.
 Cardamomi, Sapæ q.f.
 Castorij ana ℥.iiij. fiant pilulæ.

* Phthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis,
 educunt pelliculas & repurgant sufficienter: verum
 immorari pharmaco oportet.

PASTILLI, SEV TROCHISCI, ET
 COLLYRIA SIVE SIEF.

Sectio Octaua.

¶ Trochisci de Vipera Galeni.

Recip. viperas num. xx.
 Sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore
 capte sunt, sed à medio potissimum. Aprile in finem
 vsque Maij, aut paulò tardius, locisque procul à ma-
 re disitis. Eligendæ sunt foeminae, quæque colore
 subflauo sint, non prægnantes, quæ caput latius ha-
 beant & depressum, collum longius, graciliusque
 quàm mares, ventre vastiores, cauda minore, quæ non
 inuoluta est, sed potius contorta & distensa, incesso
 quieti proximo, quæ tamen postremas partes in in-
 cessu magis moueant, aspectu ferino & inuerecun-
 do, oculis subrubentibus, & recens captæ. Capita
 primùm & caudas amputabis quatuor digitorum lon-
 gitudine vtrinque: his amputatis considerandum est
 si motum quendam in ipsis residuum conspicias, san-
 guinemque multum fundent, nam hæc ceu præstan-
 tissimæ, sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, in-
 teranea cum adipe abijcienda erunt, reliquum cor-
 pus in ollam nouam bene coctam immittendum, &
 coquendum in aqua fontana, additis anethi comis,
 & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto è car-
 bonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec car-
 nes

nes à spinis separentur. Cùm coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes nulla iuscule addita parte, & addito puluere panis biscosti maximè puri, quàm pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad meridiem conuersa, à puluere diligèter mundata, sæpè autem cõuertendi sunt, per quindecim dies aut eo amplius, donec probè exsiccati fuerint, deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum vnum integri perseuerant, quantum longè melius sit, haud multo postquam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam qui illis obnasci consueuit, qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo, conseruari possunt integri ad tertium annum.

¶ Trochisci de Scylla Galeni.

Scillam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & ea perforata, stilo ligneo tentabis num scilla vndiq; tenera sit: Ea exempta partem interiorem diligenter teres, cui admisceris farinæ erui tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium in cella probè mundata. Meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probè siccata sint, deinde repones vt supra dictum est de pastillis viperinis.

¶ Hedyroum Andromachi ex Galeno.

Recip. mari,
Asari,

Maioranæ,
Alpalathi ana ʒ. ij.

Schœ-

LIBER SECVNDVS

Schoenanthi,	Folij,
Calami odorati,	Nardi indicæ,
Phu,	Croci,
Xylobalsami,	Casæ, ana ꝑ. vi.
Opobalsami,	Amomi ꝑ. xij.
Cinnamomi,	Mastiches ꝑ. i.
Costi, ana ꝑ. iij,	Vini q. f.

Myrrhæ,
fiant trochisci, inunctis prius manibus opobalsamo;
deinde siccantur vt superiores.

¶ Crocomagma Damocratis ex Galeno.

Recip. croci ꝑ. c.	Amyli,
Myrrhæ,	Gummi arabici añ. ꝑ. xxx.
Rosarú rubrarú ana ꝑ. l.	Vini q. f.

fiant trochisci.

¶ Cyphi Damocratis.

Recip. pulpæ passularum,	
Terebinthinæ coctæ ana ꝑ. iij.	
Myrrhæ,	Cyperj,
Schoenanthi ana ꝑ. i. s.	Baccarú iuniperi añ. ꝑ. iij.
Calami aromatici ꝑ. ix.	Aspalathi ꝑ. ij. s.
Cinnamomi ꝑ. iij.	Croci ꝑ. i.
Vnguis odorati,	Mellis q. f.
Nardi indicæ,	Vini modicum,
Casæ,	forma trochiscos.

* Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque inter-
narumque partium exulcerationes.

¶ Trochisci Alhandal. Mesuæ.

Recip. pulpæ colocynthidis ꝑ. x.	
minutim incisa fricetur cum	
Olei rosarú ꝑ. i.	Gummi arabici,
Tragacanthi,	Bdellij ana ꝑ. vi.

Macerentur quatrduum in aqua rosacea, his colatis
& expresis partem vnã cum colocynthide per-
miscibus, & fiet massa, quæ siccata in Sole, rursum ter-
retur, atque addetur altera pars colaturæ, & forma-
buntur

buntur trochisci, qui iniici possunt in omnes compositiones quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt.

¶ Trochisci de Agarico Mesuæ.

Recip. agarici ℥.iiij.

Salis gemmæ ℥.s.

Zingiberis ℥.iiij.

Oxymelitis q.f.

Agaricū lima cōfringendum, & formandi trochisci.

* Purgāt ex cerebro, & capite phlegma crassum cū cholera mixtum. Et præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

¶ Agaricum Trochiscatum Mesuæ.

Recip. agarici electi ℥.iiij.

Vini in quo maceratum sit Zingiber q.f.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci.

Additur insuper gummi, aut tragacantha vt in vniuersalibus dictum est, & potest iniici in omnes compositiones in quas agaricū ingreditur, vires enim habet agarici, & tutius agit minoreq; vetriculi noxa.

¶ Trochisci Diarhodon Nicolai.

Recip. rosarum recentium ℥.iiij.

Spodij ℥.ij.

Santali rubri ℥.i.s. G.vij.

Santali albi ℥.i. G.xij.

Croci ℥.ij. G.vij.

Camphoræ G.xij.

fiunt in hunc modū. Rosas recentes in mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerē redacta addes, ac cū aqua rosacea q.f. formabis, sub finē camphorā addito, sicca in umbra, ac serua.

* Hæc compositio administratur in magnis compositionibus Nicolai.

¶ Trochisci Diarhodon Mesuæ.

Recip. rosarum rubrarum ℥.ix.

Ligni aloës.

Nardi

LIBER SECVNDVS

Nardi indicæ ana ℥.iij. Mastiches ℥.ij.
 Glycyrrhizæ ℥.iiij.s. Croci ℥.ij.s.
 Spodij ℥.i.s. Vini albi q.f.
 fiant trochisci.

* Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

¶ Trochisci de Rosis Rasis ex Mesue.

Recip. rosarum rubrarum ℥. s.
 Ligni aloës ℥.ij. Nardi indicæ,
 Mastiches ℥.i.s. Casia,
 Absinthij, Schœnanthi ana ℥.i.
 Cinnamomi,

fac trochiscos cū vino antiquo, & decoctione quinque radicum.

* Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur.

¶ Trochisci de Camphora Mesuæ.

Recip. foliorum rosarum rubrarum ℥.iiij.
 Spodij ℥.ij. Gummi arabici,
 Santali citrini ℥.ij. s. Nardi indicæ ana ℥.i.
 Croci ℥.i. Ligni aloës,
 Glycyrrhizæ ℥.ij. Cardamomi maioris,
 Seminum citruli, Amyli,
 Melonis, Camphoræ ana ℥.ij.
 Cucumeris, Sacchari albi,
 Cucurbitæ, Mannæ ana ℥.ij.

Tragacanthæ,
 forma trochiscos cum mucagine feminis psyllij extracta cum aqua rosacea.

* Ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his fitim inexpletam, icterum quoque, ac phthisim & hecticam conferunt.

¶ Tro-

¶ Trochisci de Gallia Moschata Mesuæ.

Recip. ligni aloës ℥.v.

Ambræ ℥.iij.

Moschi ℥.i.

Muccaginis tragacathæ, extractæ cū aqua rosarū q.f.

fiant trochisci parui.

* Cerebrum, corq̄ue roborat, oris atque adeo corporis totius odorem commendat, compositionibus alijs miscetur.

¶ Alipta Moschata Nicolai.

Recip. Ladani ℥.iij.

Ambræ ℥.i.

Styracis ℥.i. s.

Camphoræ ℥.i. s.

Styracis rubræ ℥.i.

Moschi ℥.s.

Ligni aloës ℥.ij.

Aquæ rosaceæ q.f.

formentur trochisci secundum artem.

* Valet pueris laborantibus asthma, & ijs qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatq̄ue vsū optimi & odoriferi suffitus.

¶ Trochisci Ramich Mesuæ.

Recip. succi acetosæ ℥.xvi.

Rosarum ℥.i.

Baccarum myrti ℥.ij.

Boli pauxillum, colentur, & colaturæ adiunge

Gallarum tritarum ℥.iij.

Coque aliquantulum, cola, & adde insuper subse-

quentia bene tritūrata

Rosarum ℥.i.

Santali citrini ℥.x.

Gummi arabici ℥.i. s.

Sumach,

Spodij, ana ℥.i.

Omphacij seu agrestæ ℥.vij.

Baccarum myrti bene tritarum ℥.iij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

N

Nucis

LIBER SECVNDVS

Nucis moschata ana ꝓ.iiij.

Misce omnia, & siccentur in scutella figulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum ꝓ.i.s. de camphora & aqua rosacea q.f.

Succi acetosæ loco, sumi potest vinum è codonijs acerbis: sunt qui aromatizent Gra.xviij. moschi.

* Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera ac intestina, cholera morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquilum, omnem hæmorrhagiam cohibet: os quam naribus sanguine cohibet, os quâ naribus sanguine fluëtibz stando impellitur, alijs medicamētis miscetur.

¶ Trochisci de Rhabarbaro Mesuæ.

Recip. rhabarbari boni ꝓ.x.

Succi eupatorij,

Amygdalarum amararum ana ꝓ.iiij.

Rosarum, Seminis apij,

Nardi indicæ, Absinthij,

Anisi, Asari ana ꝓ.i.

Rubiæ, Aquæ cuscuthæ q.f.

fiant trochisci ponderis drachmæ vnius cū dimidia.

* Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturâ, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

¶ Trochisci de Violis magistrales.

Recip. violarum nigrarum ꝓ.vi.

Turbith ꝓ.iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Mannæ,

Scammonij præparati ana ꝓ.ij.

formentur trochisci. fiunt etiam sine scammonio.

* Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, flatusque dissipant.

¶ Trochisci ligni aloës Mesuæ.

Recip. ligni aloës,

Rosarum rubrarum ana ꝓ.ij.

Masti-

Mastiches,	Cardamomi maioris,
Cinnamomi,	Pastinacæ,
Caryophyllorum,	Galliæ,
Nardi indicæ,	Corticis citri ana ꝑ.i.s.
Macis,	Moschi,
Nucis moschatæ,	Ambræ ana ꝑ.s.
Cubebæ,	Mellis passulati q. s.
Cardamomi minoris,	formentur trochisci.

* Ventriculum, cor, hepar imbecilla roborant : ob id valent ad oris foetorem, pulsuum cordis, & syncope & hydropem.

¶ Trochisci de Croco Nicolai.

Recip. croci ꝑ.ij.	Myrrhæ ana ꝑ.i.s.
Rosarum rubrarum,	Ligni aloës ꝑ.ij.
Ammi,	Aquæ rosacæ q. s.

fiant trochisci.

¶ Trochisci de Eupatorio Mesuæ.

Recip. mannæ electæ,	Spodij ꝑ.ij.s.
Succi eupatorij ana ꝑ.i.	Rhabarbari electi,
Rosarum rubrarum ꝑ.s.	Asari,
Nardi indicæ ꝑ.ij.	Anisi ana ꝑ.ij.

Fiant trochisci cum succo eupatorij.

* Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

¶ Trochisci de Absinthio Mesuæ.

Recip. rosarum,	Seminis apij,
Absinthij,	Amygdalarum amararum,
Anisi ana ꝑ.ij.	Nardi indicæ,
Rhabarbari,	Mastichis,
Succi eupatorij,	Folij ana ꝑ.i.
Asari,	Succi endiuicæ q. s.

Formentur trochisci.

* Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

LIBER SECVNDVS

¶ Trochisci de Aniso Mesuræ.

Recip. anisi,	Asari,
Succi eupatorij ana ʒ.ij.	Apij,
Seminis anethi,	Amygdalarum amararum ana ʒ.s.
Nardi indicæ,	Aloës ʒ.ij.
Mastiches,	Syrupi absinthij q.f.
Folij.	formentur trochisci.
Foliorum absinthij,	

* Obstructiones hepatis, & alios eius morbos & inde natas febres antiquas sanant.

¶ Trochi. seu Pastilli Hepatici Asclepiadis ex Galeno.

Recip. anisi	Amygdalarum,
Seminis apij,	Absinthij ana ʒ.iiij.
Asari,	Aqua pluuix q.f.
fiant trochisci.	

* Hepaticos iuuant, habent enim hepar expurgandi per vrinas, dantur cū vino, febrientibus cū aqua.

¶ Troch. seu Pastilli ex Amygdalis amaris Pauli.

Recip. anisi,	Amygdalarum amararum ana ʒ.ij.
Apij,	Aquæ q.f.
Asari,	fiant pastilli.
Comarum absinthij,	

* Idem præstant. Dantur febri carentibus ex multo, febricitantibus cum hydromelite.

¶ Trochisci de Capparibus Mesuræ.

Recip. corticum radicum capparibus,	
Seminis agni ana ʒ.vi.	Foliorum rutæ,
Seminis nigellæ,	Aristolochiæ rotundæ,
Calaminti,	Seminis nasturtij,
Succi eupatorij,	Ammoniaci ana ʒ.ij.
Acori,	Cyperij,
Amygdalarum amararum,	Ceterach ana ʒ.i.
Ammoniacum dissoluito, & reliqua triturato: deinde fiant trochisci.	

* Ad splenis duritiæ & flatus eius dissipandos valent.

¶ Tro-

¶ Trochisci de Myrrha Rhafis.

Recip. myrrhæ ʒ. iij. Cumini,
 Lupinorum ʒ. v. Rubiæ,
 Foliorum rutæ, Afæ foetidæ,
 Mentastri, Sagapeni,
 Pulegij, Opopanacis ana ʒ. ij.

Dissoluuntur gummi in aceto, formanturque trochisci cum absinthij succo.

* Prouocant menstrua, & sedant dolores qui ex re-tentis menstruis proueniunt.

¶ Trochisci de Lacca Mesuæ.

Recip. laccæ, Afari,
 Succij glycyrrhizæ, Amygdalarū amararum,
 { eupatorij, Rubiæ,
 Absinthij, Seminis apij,
 Berberis, Seminis anisi,
 Rhabarbari, Schoenanthi ana ʒ. i.
 Aristolochiæ longæ, Vini q. f.
 Costi, formentur trochisci.

* Valent ad obstructiones hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

¶ Trochisci de Berberis Mesuæ.

Recip. berberis ʒ. ij. Gallæ moscharæ,
 Spodij, Nardi indicæ ana ʒ. i.
 Ligni aloës, Gummi arabici ʒ. iij.
 Seminis acetosæ, Rosarum rubrarum ʒ. v.
 Mastichis, Aquæ rosarum q. f.
 formentur trochisci.

* Valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

¶ Trochisci de Spodio Mesuæ.

Recip. rosarum rubrarum ʒ. i. s.
 Spodij ʒ. x.
 Seminis acetosæ ʒ. vi.
 Seminis portulacæ,

LIBER SECVNDVS

Coriandri præparati, Berberis ana ℥.ij.
 Sumach ana ℥.ij.s. Gumi arabici affati ℥.i.s.
 Amyli vsti, Agrestæ q.f.
 Balaustiorum, formentur trochisci.

* In febribus biliosis cū alui fluore efficaces sunt:
 Inflammationem ventriculi & hepatis & sitim con-
 tinuam sedant.

¶ Pastilli dia spermatorum Galeni.

Recip. seminis apij, Opij,
 Ammi ana ℥.i. Cassiæ ana ℥.ij.
 Anisi, Aquæ pluuiæ q.f.
 Fœniculi ana ℥.s. formentur trochisci.

* Dantur ex passo, aut aqua, sedant dolorē, ad om-
 nes internos affectus, & pleuritidas vtilēs sunt, &
 sanguinem reieciantibus.

¶ Trochisci de Corallo Nicolai,

Recip. coralli rubri, Cassiæ,
 Cinnamomi, Folij,
 Myrrhæ, Mastiches,
 Amomi, Phu,
 Seminis papaueris añ. ℥.s. Polij montani,
 Schoenanthi, Afari,
 Croci ana ℥.ij. Pedis columbini ana ℥.i.
 Calami aromatici, Vini q.f.
 Xilobalsami, formentur trochisci.

* Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, coelia-
 cis, cibum fastidientibus mirè subueniunt.

¶ Dia Corallu Galeni.

Recip. coralli rubri, Seminis hyoscyami,
 Terræ sarniæ ana ℥.i. Opij,
 Balaustiorum, Hypocistidis ana ℥.ij.
 Amyli, Succij plantaginis,
 Terræ lemniæ ana ℥.iiij. formentur trochisci.

* Ad eadem efficac.

¶ Trochisci de Terra sigillata Mesuæ.

Recip. sanguinis draconis,

Gummi

Gummi arabici affati,	Coralli rubri,
Trochiscorum ramich,	Charabæ ana ꝓ.ij.
Rosarum rubrarum,	Margaritarum,
Spodij,	Tragacanthæ,
Seminis rosarum,	Seminis papaueris nigri,
Amyli affati,	ana ꝓ.i.s.
Acaciæ,	Seminis portulacæ,
Lapis hæmatitis,	Cornu cerui vsti,
Hypocistidis,	Thuris,
Balauftiorum,	Gallarum,
Boli armenici,	Croci ana ꝓ.ij.
Terræ sigillatæ,	Aquæ plantaginis q.f.
Formentur trochisci.	Qui volet cum opio addat
Opij ꝓ.ij.	

* Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, frôti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti, vel pubi illiti: ad miçtum sanguinis, in vesicam iniecti: & ad alias hæmorrhagias, parti sanguinis fluenti impositi.

¶ Trochisci de Carabe Mesuæ.

Recip. charabæ ꝓ.ix.	Mastiches,
Cornu cerui vsti,	Laccæ,
Gummi arabici affati,	Papaueris nigri affati,
Coralli rubei vsti,	ana ꝓ.iiij.
Tragacanthæ,	Thuris,
Acacia,	Croci,
Hypocistidis,	Opij ana ꝓ.ij. gr.xv.
Balauftiorum,	Mucilaginis psyllij q.f.
Formentur trochisci.	

* Vtiles sunt ad constringendum sanguinem vndeunque fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

¶ Pastilli Dia electru Galeni.

Recip. psyllij,

N 4 Iridis

LIBER SECVNDVS

Iridis, Succini ana ꝑ. xxx.
 Mastiches, Opij ꝑ. xv.
 Pfyllum aqua calida macerato, atque iam expressa
 mucilagine Pastillos secundum artem formato.

* Fluxum sanguinis præsertim à thorace, pulmone,
 hepate, renibus, vtero hæmorrhoidibus cum succo
 plâtuginis vel polygони, aut vino granatorû sumpti.

¶ Trochisci Stellæ Auicennæ.

Rec. lapidis stellaris ꝑ. v. Corticis mandragoræ,
 Costi, ana ꝑ. s.
 Opij, papaueris albi,
 Croci ana ꝑ. v. Dauci,
 Myrrhæ, Seminis { Anisi,
 Castorij, { Hyoscyami,
 Nardi indicæ, Apij,
 Casiæ, Sileris montani,
 Terræ sigillatæ, Styrcis liquidæ ana ꝑ. i.
 Gummi macerantur in vino, reliqua terantur, & for
 mentur trochisci.

* Conueniunt stomachi eructationibus, dolori capi
 titis & dentium, catarrhis, sanguinis sputum & pro
 fluuium sanant, & periodicas febres.

¶ Aster Galeni.

Recip. croci ꝑ. s. Castorei ꝑ. ij.
 Seminis { Hyoscyami, Opij ꝑ. iij.
 { Apij añ. ꝑ. vi. Myrrhæ ꝑ. ij.
 Anisi, Succi mandragoræ ꝑ. s.
 Styrcis, Piperis albi ꝑ. vi.
 Dauci ana ꝑ. s. Aquæ pluuiæ q. f.
 Fiant trochisci.

* Datur ex aqua, sistit dolorem, hoc vti possumus
 ad omnem fluxum, dolorem, & omnes internos af
 fectus, & destillationes, ad vesicam, ad suffocatio
 nes, fluxum muliebrem, stomachi fluxionem, dysen
 tericos, & sanguinem reijcientes.

¶ Trochisci Alkekengi Mesuæ.

Recip.

Recip. fructus alkekengi ꝑ.iii.

Seminis } Citrulli,
 } Cucumeris,
 } Cucurbitæ ana ꝑ.iii.s.

Boli armenici, Amyli,
 Gummi arabici, Pinearū mūdarū añ.ꝑ.vi.
 Thuris, Seminis apij,
 Sanguinis draconis, Carabæ,
 Seminis papaueris albi, Terræ figillatæ,
 Amygdalarū amararum, Hyofcyami,
 Succij glycyrrhizæ, Opij ana ꝑ.ij.
 Tragacanthæ, Iulepi violati q.f.
 Formentur trochisci.

* Valent ad renum & vesicæ vlcera & natam inde dysuriam.

¶ Pastillus Andronius ex Andromacho.

Recip. florum mali punici ꝑ.x.

Gallæ omphacitidis ꝑ.viii.

Myrrhæ,

Aristolochiæ ana ꝑ.iiij.

Calcanthi

Aluminis scifsilis } ana ꝑ.ij.

Misy

Formentur trochisci cum

Sapæ q.f.

* Facit ad recentia vulnera & vetera, curat fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta, reprimat omnem carnis excrescentiam: valet ad phagedænas & condylomata.

¶ Pastilli Polyidæ ex Andromacho.

Recip. florum mali punici ꝑ.xij.

Aluminis scifsilis ꝑ.iiij. Calcanthi ꝑ.ij.

Thuris, Fellis taurini ꝑ.vi.

Myrrhæ ana ꝑ.iiij. Aloë ꝑ.viiij.

Formentur pastilli cum

Vini austeri q.f.

N 1 * Ad

LIBER SECVNDVS

* Ad nomas, & eadem ferè quæ præcedens potest.

¶ Pastilli Musæ.

Recip. aluminis scissilis Croci,
Aloës,
Myrrhæ,
Calcanthi ana ʒ. vi.
Formentur pastilli cum
Vini odorati &
Mellis ana q. f.

Crocomagmatis añ. ʒ. iij.
Florum malorū granato-
rum domesticorū ʒ. iij.

* Pastillus multiplicis vsus, pus educens, & relaxas.

¶ Trochisci de Minio erodentes Ioannis de Vigo.

Recip. Medullæ panis non cocti bene fermenta-
ti ʒ. iij.

Sublimati electi ʒ. i.

Minij ʒ. s.

Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci, qui in chibano tepente resiccati
feruentur.

* Omnes carnis prauas excrementas liquat, sordi-
da vlcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mira-
biliter sanat.

¶ Sief album Mesuæ.

Recip. sarcocollæ in lacte asinino macerata ʒ. v.

Amyli ʒ. s.

Thuris ʒ. i. s.

Tragacanthæ ʒ. iij.

Ceruse lotæ ʒ. x.

Opij ʒ. i.

Aquæ pluuiæ q. f.

Fiat sief.

* Confert ophthalmiæ cum est in augmento, &
dolorem sedat.

¶ Aliud simile eiusdem.

Recip. gummi arabici, Ceruse lotæ ʒ. vi.

Tragacanthæ,

Opij ʒ. i.

Amyli ana ʒ. iij.

fac sief cum

Oui albumine.

Fit etiam sine opio.

* Hic vtimur initio vehemētis doloris à causa calida.

¶ Try-

¶ Trypherum Galeni.

Rec. cadmię lotę ʒ. xvi. Gummi,

Cerufæ ʒ. viij.

Tragacanthæ ana ʒ. iij.

Amyli,

Opij ʒ. ij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

* Ad epiphoras, & affectiones oculorum : vide sequens.

¶ Aliud Galeni.

Rec. cadmię lotę ʒ. xvi. Cerufæ ʒ. xlvij,

Amyli,

Opij ʒ. vi.

Thuris ana ʒ. viij.

Gummi ʒ. xvi.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

* Ad inustiones oculorum, pustulas, chemoseis, maximè in his, qui nullam mordacitatem perferre possunt.

¶ Cygnus Galeni.

Recip. cadmiæ ʒ. xvi. Acaciæ,

Cerufæ lotæ ʒ. viij.

Opij ana ʒ. ij.

Amyli,

Gummi ʒ. xij.

Tragacanthæ,

fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

* Ad maximos dolores & affectiones oculorum,

¶ Dia rhodon Nilei ex Galeno.

Recip. rosarum. ʒ. iij. Opij,

Crocij ʒ. ij.

Nardi indicæ ana ʒ. i.

Gummi ʒ. iij.

Aquæ pluuiæ q. f.

fiat collyrium.

* Ad doloris molestias, fluxum vberem, ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

¶ Aliud Mesuræ, Sief de rosis dictum.

Recip. foliorum rosæ ʒ. xv.

Crocij,

Gummi arabici ana ʒ. viij.

Opij,

Nardi

LIBER SECVNDVS

Nardi indicæ ana ʒ.ij.

fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Eadem quæ præcedens potest.

¶ Collyrium seu Sief de Thure.

Recip. cadmiæ,	Opij,
Pompholigis,	Gummi ana ʒ.vi.
Thuris ana ʒ.x.	Aquæ pluuiæ q.f.
Cerufæ ʒ.xl.	fiat collyrium.

* Ad fluxiones oculorum & chemoseis.

¶ Aliud Mesuæ.

Recip. thuris ʒ.x.	Sarcocollæ ana ʒ.v.
Ammoniæ,	Croci ʒ.ij.

fiat sief cum

Mucilaginis foenigræci q.f.

* Vlcera oculorum ducit ad maturitatem.

¶ Collyrium Nardinum.

Recip. cadmiæ,	Acaciæ ana ʒ.x.
Croci,	Nardi indicæ ʒ.iiij.
Gummi ana ʒ.xij.	Opij,
Aeris vsti ʒ.v.	Myrrhæ ana ʒ.v.
Stibij, id est, antimonij,	Vini q. f.

fiat collyrium.

* Ad doloris vexationes, fluxum tenuem & multum, pustulas & aspretudines oculorum.

¶ Dia œnu.

Recip. cadmiæ,	Aeris vsti ʒ.vij.s.
Lapidis hæmatitæ,	Chalcitidis ʒ.vij.
Aluminis scissilis ana ʒ.x.	Seminis papaueris ʒ.v.

Maceretur semen papaueris in aquæ pluuiæ q.f. Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium cum vini austeri q.f.

* Ad claritatem & cicatrices oculorum.

¶ Diahæmatites.

Recip. æris vsti & loti ʒ.xxiiij.
Lapidis hæmatitæ ʒ.i.

Croci

Croci,
Opij ana ʒ.iiij.
fiat collyrium.

Gummi ʒ.xij.
Aceti q.f.

* Aspseudinibus commodum: facit ad veteres affectiones, ad ficosa, & ad omnem extuberantiam oculorum.

¶ Diamyrtha.

Recip. cadmiæ lotæ ʒ. xxviiij.
Lapidis hæmatitæ vsti & loti ʒ. xxv.
Spodij ʒ. xxiiij. Piperis albi, Gr. nu. xxx.
Myrrhæ ʒ. vi. Gummi ʒ. vi.
Crocii ʒ. s. Vini q.f.
Opij ʒ. i.

* Accommodatum est ad veteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopos.

¶ Viride Antei.

Recip. cadmiæ ʒ. vi. Squammarum æris,
Myrrhæ ʒ. iiij. Nardi indicæ,
Crocii ʒ. vi. Acaciæ ana ʒ. vi.
Opij ʒ. iiij. Gummi ʒ. xxiiij.
Plumbi vsti & loti ʒ. i.
fiat collyrium cum aquæ pluuiæ q.f.

* Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

¶ Aliud viride.

Recip. cadmiæ vstæ, & vino odorato extinctæ ʒ. i.
Crocii,
Stibij, id est, antimoniij vsti & in lacte extincti an. ʒ.
Amyli ʒ. i. (iiij.)
Gummi ʒ. ij.
Succi anagallidis foemineæ q.f.

* Ad idem valet.

¶ Aliud Mesuræ.

Recip. æruginis æris ʒ. iiij.
Calcanthi vsti ʒ. vi.
Auripigmenti rubri,

Spumæ

LIBER SECVNDVS

Spumæ nitri,
 Spumæ maris ana ꝑ.i.
 Ammoniâci ꝑ.i.s.
 Salis hammoniâci ꝑ.s.
 Ammoniacum macerato in aqua rutæ, & fac collyrium.

* Eiusdem facultatis est ferè cū sief rubro sequenti.
 ¶ Sief rubrum Mesuæ.

Recip. feminis cannabis ꝑ.iiij.
 Aeris vsti, Piperis nigri ꝑ.s.
 Myrrhæ ana ꝑ.ij. Aquæ pluuiæ q.f.
 Croci ꝑ.i. Si voles acrius, adde
 Aeruginis æris,
 Salis hammoniâci ana ꝑ. s. fiat sief.

* Vtile est oculorum scabritiei, pruriginique, suffusionibus & vngui.

¶ Aliud Galeni.

Recip. cadmiæ ꝑ.xl. Piperis albi,
 Chalcitidis vstæ, Gummi ana ꝑ. xx.
 fiant pastilli cum Aquæ q.f.

* Ad lippitudinem, sycosin, & carnis excrescentias.

¶ Sief luteum Mesuæ.

Recip. cadmiæ lotæ, vstæ, & in lacte muliebri macerata ꝑ. x.

Cerusæ lotæ ꝑ. viij. Tragacanthæ,
 Squammæ ferri ꝑ. iiij. Gummi arabici ana ꝑ. iiij.
 Opij ꝑ. ij. fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Confert doloribus oculorum vehementibus à causa calida.

¶ E cornu Ceruino.

Recip. cornu cerui vsti & loti,
 Thuris, Opij, ꝑ. i.
 Plûbi vsti & loti añ. ꝑ. iiij. Gummi ꝑ. iiij.
 Squammæ æris lotæ ꝑ. ij. fiat collyrium cum
 Aquæ pluuiæ q.f.

* Facit

*Facit ad vlcera & pustulas oculorum, cicatrices
exterit.

¶ Aliud.

Recip. plumbi vsti & loti,
Cornu ceruini vsti & loti ana ꝓ. xvi.
Thuris, Croci ꝓ. viij.
Acaciæ, Myrrhæ ꝓ. iij.
Spodij ana ꝓ. viij. Tragacanthæ ꝓ. i.
Amyli ꝓ. iij. Gummi,
Opj, Seminis hyoscyami ana
Squamæ æris ana ꝓ. ij. ꝓ. viij.
fiat collyrium cū mucagine seminis hyoscyami.

* Ad eadem efficax.

¶ Libianum.

Recip. cadmiæ vstæ & lotæ,
Cerusæ lotæ,
Stibij, id est, antimonij vsti & loti ana ꝓ. xvi.
Plumbi vsti & loti ꝓ. viij. Terræ samia,
Amyli ꝓ. xij. Tragacanthæ ana ꝓ. viij.
Pompholigis, Opj,
Myrrhæ, fiant pastilli cū albumine oui.
* Ad pustulas, inustiones, rupturas, cōcauitates, ocu
los purulentos, chemoseis, staphylomata, & ad circū
molestantem dolorem facit, & cicatrices exterit.

¶ Aliud.

Recip. pompholigis ꝓ. viij.
Cadmia vstæ & lotæ ꝓ. xvi.
Stibij, id est, antimonij vsti & loti ꝓ. xij.
Cerusæ lotæ ꝓ. xvi. Myrrhæ,
Amyli ꝓ. xij. Opj,
Terræ samia, Tragacanthæ ana ꝓ. ij.
Plumbi vsti ana ꝓ. viij. formentur pastilli cum
Aquæ pluuiæ q. s.

* Eiusdem cum priore facultatis.

¶ Sief de Plumbo Mesuræ.

Recip. plumbi vsti,

Anti-

LIBER SECVNDVS

Antimonij,

Tutiæ lotæ,

Aeris vsti,

fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Replet & consolidat vulnera oculorum.

Gummi arabici,

Tragacanthæ ana ꝑ. viij.

Opij ꝑ. s.

DE OLEIS.

Seçtio nona.

¶ Oleum Rosatum vulgare.

Recip. olei communis lib. iij.

Rosarum rubrarum purgatarum ꝑ. xvi.

Macera, & insola per octo dies: Rosas exemptas bene exprime, atque alias impone vt supra: atque ita tertium fac: Cola & serua.

Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt.

* Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorū clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

¶ Oleum rosatum completum Mesuæ.

Recip. olei ex oleis maturis, aqua fontana multoties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarum repurgata quantum satis est in vitreum vas: obturetur vas, ac per dies septem insola: coque tribus horis in vase duplici. Expressis folijs & abiectis, noua immitte: insola iterum, coque in balneo, & exprime vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosarū (eo modo confectæ vt in syrupo rosato dictum est) quartam partem: misce, insola dies quadraginta in vase vitreo obturato: post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alij

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo supra dictum est modo conficiunt.

* Roborat, resoluit commodè, lenit, & sedat.

¶ Oleum rosatum Pauli.

Recip. rosarum exemptis vnguibus ℥. iij.

Olei omphacini ℥. vi.

Immitte in vas vitreum obturatum ne expiret: dies quadraginta insolato.

Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquam dies quadraginta.

* Inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materiarum per corpus fluxum cohibet.

¶ Oleum Rosatum Omphacinum.

Recip. olei oliuarum immaturarum loti lib. i.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥. iij.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac vt dictum est, ter rosas permutando.

* Eiusdem cum superiori facultatis.

¶ Oleum Chamæelinum Pauli.

Recip. florù chamæmeli, demptis folijs albis ℥. iij.

Olei oliuarum lib. ij. s.

Siccentur flores in umbra. 24. horis, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angusti oris, bene obturatum, & quadraginta dies insolato.

* Initio colici, arthritici, & aliorum dolorum præstantissimū est, parū enim repellit & modicè digerit.

¶ Oleum Cydoniorum Mesuæ.

Fit ex carnis cydoniorū præmaturorū cū cortice, Succi cydoniorum ana ℥. vi.

Olei oliuarum immaturarum lib. ij.

Omnia in vas vitreum obturatum immittito, & diebus quindecim insolato: deinde horis quatuor coquito in duplici vase. Cola & exprime: in expressione caro & succus mutetur: rursus insoletur, coquatur,



tur,

LIBER SECVNDVS

tur, & exprimatut vt diximus: tertium sic facito: postremò colatum reconde ne perspiret.

* Refrigerat, adstringit: ob id ventrem totum inferiorem, & neruos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit.

¶ Oleum Mastichinum Mesuæ.

Recip. olei rosati omphacini lib. i.

Mastiches ℥. iij.

Vini odoriferi ℥. iij.

Omnia in vase vitreo imposita coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

* Cerebrum, neruos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duos lenit, dolores sedat.

¶ Oleum Absinthij.

Recip. comarum absinthij ℥. iij.

Olei omphacini lib. i.

Insolato in vase vitreo, absinthiumque permutatè, veluti de rosis dictum est in oleo rosato.

* Calfacit ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetentiã, obstructions auferit, lumbricosque enecat.

¶ Oleum Menthæ.

Recip. mentæ domesticæ ℥. iij.

Olei omphacini lib. i.

fiat vt supra.

* Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

¶ Oleum Sambucinum.

Recip. olei veteris lib. i.

Florum sambuci ℥. iij.

fiat vt oleum rosatum, ter flores innouando.

* Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepatis infirmo, obstructo, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

¶ Oleum Populinum Nicolai.

Recip.

Recip. olei lib. vij. ζ . ij.

Vini lib. iiij.

Gemmarum populi arboris recentium lib. iiij.

Gemmae populi diutissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, pòst coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

* Expediit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & vbicunq; dolor fit.

¶ Oleum Liliorum simplex.

Recip. florum liliorum alborum, abiecto quòd croceum est ζ . iiij.

Olei veteris lib. i.

Fit vt oleum rosatum, ter lilia renouanda sunt.

¶ Oleum Liliorum compositum.

Recip. foliorum liliorum alborum ζ . ix.

Mastiches, Caryophyllorum,

Calami aromatici, Cinnamomi ana ζ . s.

Carobalsami ana ζ . i. Croci ζ . iiij.

Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululù coquantur, & additis lilijs, oleique veteris lib. ij. aliquantum bulliant: Tunc omnia iniecta in vas vitreum in sola dies quadraginta: pòst colatum & bene obstructum reponatur.

* Calfaciunt, resoluūt: ob id à frigore dolores thoracis, ventriculi, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, lenit & coquit.

¶ Oleum Irinum Mesuz.

Recip. radicum ireos lib. i.

Florum eiusdem lib. ij.

Macerentur in decoctione aliarum radicù ireos q. s.

Olei veteris lib. ij.

In vase duplici coque, exprime, radicesque nouas & flores immitte, coquantur denuò, & tertium, colatum seruato & obturato.

○

* Tergez

LIBER SECVNDVS

* Tergit, tenuat, coquit, resoluit potenter : ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, vteri, articulorum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis, & pulmonis coquit : strumas dissipat, & alios tumores duros, spasmm emendat, & narium foetorem.

¶ Aliud Nicolai.

Recip. olei veteris lib. xiiij.
 Aquæ lib. iij. ℥. ij.
 Radicum iridis lib. ij. ℥. iij.
 Florum liliorum alborum ℥. xv.
 Radicum $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cyperii recentium} \quad \text{℥. vi.} \\ \text{helenij} \quad \text{℥. iij.} \\ \text{buglossæ} \quad \text{℥. ij.} \end{array} \right.$

Cinnamomi,
 Nardi indicæ,
 Asæ odoratæ ana ℥. i.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad Solem vel loco calido : postea in duplici vase coquito donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito.

* Vsurpatur ad diuturnum catharrum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum & auribus iniectum tollit, asthmaticis garganisimo adhibito opitulatur: hæmorrhoidas veteres inunctum sine colo iniectum educit.

¶ Oleum Ligustrinum siue de Alcanna.

Recip. florum ligustri ℥. iij.
 Olei veteris ℥. x.
 Fit vt rosatum.

* Partes neruofas roborat, capillos à canicie vindicat.

¶ Oleum Nardinum simplex Mesuæ.

Recip. nardi indicæ ℥. iij.

Vini,

Vini,

Aquæ ana ℥.ij.s.

Olei loti lib.i.s.

Minutim incisam macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resoluantur, coletur deinde oleum & reponatur.

¶ Oleum Nardinum compositum Mesuz.

Recip. nardi indicæ ℥.ij.

Sampfuchi, id est, maioranæ ℥.ij.

Ligni aloës, Foliorum lauri,

Enulæ, Cyperi,

Folij indi, Schoenanthi,

Calami aromatici, Cardamomi ana ℥.i.s.

Contundantur omnia leuiter, & illis adfunde

Vini,

Aquæ ana q.f.

Olei loti lib.vi.

Macerentur horis duodecim, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

* Calfaciunt, tenuant, digerunt, modicè adstringunt, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, vetriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri magnoperè iuuant, naribus iniectum caput purgât, corporis colorem & odorem commendant.

¶ Oleum Sampfuchinum.

Recip. foliorû sampfuchi, id est, maioranæ M.iiij.

Serpilli M.ij.

Foliorum myrti M.i.

Abrotoni,

Sisymbrij seu mentæ aquaticæ ana M.s.

Cassæ ℥.ij.

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia & impone in vitreum vas, & insola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde, coque rursus, & tertium idem facito: deinde colatum repone.

O 3

*Lasi-

LIBER SECVNDVS

*Lassitudini vtile est, & morbis cerebri & neruorum frigidis prodest, ob id spinæ in balneo inunctum paralyfin iuuat, & spasmm cynicum, vulgo torturam oris, naribus iniectum: vt auribus immisum, à flatu tinnitû dilsipat, menses ciet, morui scorpionis prodest.

¶ Oleum Moschellinum Nicolai Alexandrini.

Recip. olei puri lib. viij. Myrrhæ,

Aquæ lib. iij.

Folij,

Nardi indicæ,

Costi,

Mastiches ana ʒ. iij.

Styracis calamitæ,

Croci,

Folium myrrham, cassiam, carpobalsamum & bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera,

postea coque supra lentum ignem in duplici vase

vsque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua

in tenuissimū puluerem redacta insperge præter

moschum: iterum macera & coque parumper:

ultimo moschum addito: probè omnia misceto &

repone, & interdum vas agitato.

* Est optimum ad omnem frigiditatem corporis,

potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris

inunctum: Stranguria & colico vexatis, & ad omne

neruorum vitium illitum optimè facit, miscetur epi-

thematibus & emplastris quæ ad stomachi & renum

affectiones asciscuntur.

¶ Oleum Hyperici.

Recip. summitatum hyperici ʒ. iij.

Macerentur in vino odorifero diebus tribus & noctibus,

bulliant deinde in vase duplici obturato orificio vasis:

postea exprime, & recentis hyperici summitatum bene tritarum

par pondus iniice, & macera

tres dies ac noctes: postea adde

Tere-

Terebinthinæ ℥.iij.

Olei veteris ℥.vi.

Croci ℥.i.

Coquantur in duplici vase vsque ad vini consumptionem, cola & reponc.

* Calidum est & siccum, & tenuium partium: vulnera incisorum neruorum consolidat & combustionem ignis: sedat dolores foemoris & vesicæ, & prouocat urinam.

¶ Oleum Hyperici Magistrale.

Recip. olei veteris lib. iij.

Vini albi potentis lib. i.

Florum hyperici cum semine recentium M. iij.

Tere & macera in vase vitreo, obturato eius orificio, duos dies: coque in duplici vase, & fortiter exprime: in colaturam iniice alios flores, vt dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde

Terebinthinæ ℥.vi.

Tormentillæ,

Olei absinthij ℥.iij.

Carlinæ,

Diſtamni,

Calami aromatici añ. ℥.ij.

Gentianæ,

Lumbricorū in vino pluri-

Cardui benedicti,

ries lotorum ℥.ij.

Terantur omnia & insolentur triginta aut quadraginta diebus, & bene obturatum reponas.

* Ad eadem vtile, superiori tamen efficacius est.

¶ Oleum de Capparibus.

Recip. corticis radicum capparum ℥.i.

Corticum tamarisci,

Cyperum ana ℥.ij.

Foliorum tamarisci,

Olei oliuarum lib. i.

Seminis agni,

Aceti albi fortis,

Ceterach siue asplenij,

Vini albi ana ℥.ij.

Trita leuiter coquantur in duplici vase vsque ad vini consumptionem & aceti.

* Ad duritiem, obstructionem, & dolorem splenis vtile est, & omnem eius ægritudinem.

O 4

¶ Oleum

LIBER SECVNDVS

¶ Oleum Vulpinum Mefuæ.

Recip. vulpem integram exemptis interaneis,
Aquæ fontanæ,
Aquæ marinæ ana q. f.
Olei veteris clari lib. iij.
Salis ꝑ. iij.
Coquantur, & inter coquendum adijce
Anethi,
Thymi ana lib. i.

Coquantur autem donec ab ofsibus recedat caro,
& aqua consumatur, deinde excoletur oleum & reponatur.

* Ad podagras, reliquasque arthritidis species, ac dorsi, renumque dolorem est efficacissimum.

¶ Oleum Scorpionum simplex Mefuæ.

Recip. scorpiones num. xxx.
Olei amygdalarum amararum lib. ij.
Macerentur in vase vitreo stricti orificij probè obstructo, & insolentur per dies xxx. caniculares, vel alias tota æstate calidissimis diebus, postea colatum ad vsus repone.

* Lapidem renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi perinæo illitum, aut per meatum vrinarium iniectum.

¶ Oleum Scorpionum compositum Mefuæ.

Recip. aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Cyperi,
Corticum radicum capparum ana ꝑ. i.
Olei amygdalarum amararum lib. i. s.
Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus xx. in vase vitreo probè obturato: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, iniectis ad vltimum scorpionibus viuis num. xx.
Iterum serenis diebus xxx. insolentur: postremò excolatum oleum reponatur.

* Hoc

* Hoc efficacius est priore, præterea mirandarū est virium contra venena omnia & pestilentiam.

¶ Oleum Castorei magistrale.

Recip. castorei,	Costi ana ℥.ij.
Styracis calamitæ,	Cyperi,
Galbani,	Schœnanthi,
Euphorbij,	Piperis longi,
Castiæ,	Piperis nigri,
Croci,	Sabinæ,
Opopanacis,	Pyrethri ana ℥.ij.s.
Carpobalsami,	Olei lib. iiii.
Spicæ nardi indicæ,	Vini lib. ij.

Galbanum & opopanacē in vini parte seorsim dissolues, deinde reliqua omnia contusa cum oleo & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici vase ad consumptionem vini, & sæpius miscens repone.

* Optimum est ad frigidos affectus partium omnium præsertim neruosarum, medetur paralyfi, spasmus, tetano, & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur.

¶ Oleum ex Euphorbio Mesuræ.

Recip. euphorbij ℥.s.

Olei cheyrini ℥.v.

Vini tantundem,

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

* Iuuat maximè frigidos cerebri & neruorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum naribus immissum: articulorum quoque & hepatis & splenis dolores illitum iuuat.

¶ Oleum Costinum Mesuræ.

Recip. costi ℥.ij.

Castiæ ℥.i.

Summitatum sampsuchi ℥.viij.

Vini q. l.

O 3 Olei

LIBER SECVNDVS

Olei oliuarum lib.iiij.

Trita macerentur biduo : deinde coquantur in duplici vase ad consumptionem vini.

* Calfacit, obstructa aperit, neruosum genus roborat, vt neruos musculos, tendones, ligamenta, ventriculum : præter hæc, hepar & capillos : canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odoré commendat.

¶ Oleum ex Styrace,

Recip. styracis ℥.iiij.

Olei communis lib.i.

Vini q. sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

* Calfacit : ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ vtero, neruis, musculis, tendonibus, iuncturis.

¶ Oleum Papauerinum.

Recip. capitum papaueris,

Foliorum papaueris,

Florum papaueris ana partes æquales,

Olei q. s.

Insolato in vase vitreo per octiduum : deinde cola, & noua rursus immitte: idem tertio facito : postremò colatum repone.

* Intemperiem calidam sanat & inde ortum dolorem: somnum quoque conciliat.

¶ Oleum Mandragoræ Nicolai.

Recip. olei communis lib.ij.

Succi pomorum mandragoræ ℥.iiij.

Hyoscyami albi ℥.ij.

Papaueris nigri ℥.iiij.

Violarum,

Cicutæ ana ℥.i.

Opij,

Styracis calamitæ ana ℥.s.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur,

tur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolurum pauculo oleo probe miscero, & repone.

* Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis male dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum vehementer opitulatur: pulvis brachiorum & plantis pedum illitum quocunque modo vigilijs fatigatum, celerrimè obdormiscere facit.

¶ Oleum Nymphaeatum.

Recip. florum nymphaeae ℥.iiij.

Olei omphacini lib.i.

Macerentur in Sole diebus decem: deinde exprime & novos flores immitte, tertio idem facito.

* Vires habet violati, refrigerat tamè magis quam violatum, minus quam papaverinum: hypnoticis, & intemperiem partium, ut renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & Veneris tentiginem prohibet genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

¶ Oleum Myrrinum Mesuae.

Recip. succi foliorum myrti lib.i.

Olei communis, id est, oliuarum lib.ij.

Coquantur in duplici vase ad succi consumptionem, & adde

Ladani ℥.i.

Misce & repone.

* Cerebrum, nervos, cor, ventriculum roborat.

¶ Oleum Lumbricorum.

Recip. lumbricorum terrestrium lib.s.

Probe laentur in vino, deinde immittantur in

Olei rosati omphacini lib.ij.

Vini ℥.ij.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem, colatum repone.

* Nervos infrigidatos confortat, & vtile est doloribus iuncturarum.

¶ Oleum Balsami Magistrale.

Recip.

LIBER SECVNDVS

Recip. terebinthinæ lib. i.

Olei veteris ℥. vi.

Olei laurini ℥. iij. Spicæ nardi,

Cinnamomi ana ℥. ij.

Tegularum recentium bene coctarum ℥. viij.

Tritis tritrandis, per alembicum destilla.

* Vrinam mouet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium tinnitui à flatu crasso, paralyfi, spasmo cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iuncturarum doloribus prodest, potum aut inunctum: sed parua eius portio, aquæ affectui aptæ mista, bibatur.

¶ Oleum Balsami Petri de Ebano.

Recip. myrrhæ, Sarcocollæ,

Aloës, Croci,

Spicæ nardi, Mastiches,

Sanguinis draconis, Gummi arabici,

Thuris, Styracis liquidæ ana ℥. ij.

Mumiæ, Ladani,

Opopanacis, Castorei ana ℥. ij. s.

Carpobalsami, Moschi ℥. s.

Bdellij, Terebinthinæ ad pondus

Hammoniæ, omnium.

Tritis coterendis, miscentur omnia & alembico destillantur secundum artem.

* Eadem potest quæ præscriptum & efficacius.

¶ Liquor exsicicans ad Vulnera.

Recip. myrrhæ, Resinæ abietinæ,

Aloës, Radicū cōsolidæ añ. ℥. iij.

Thuris, Gummi elemi ℥. ij.

Mastiches ana ℥. i. Croci ℥. i.

Terebinthinæ lib. ij. Aquæ vitæ lib. iij.

Contusis contundendis, & omnibus probè mixtis, immitte in vitreum vas, obstructo orificio, bulliant omnia in duplici vase vna hora: deinde colatum recondatur in phiala vitrea bene obturata.

DE

DE VNGVENTIS, EMPLASTRIS,
ET CERATIS.

Sectio decima.

¶ Vnguentum infrigidans Galeni.

Recip. olei rosati omphacini lib. i.
Cerae albæ ℥. iij.

Ceram in oleo liquabis, & sæpius aqua frigida laua-
bis donec albescat: postremum aqua rosacea lauato,
& paululum aceti rosati addito.

* Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, &
sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar,
& per spinam dorsi linitum.

¶ Vnguentum Pectorale Magistrale.

Recip. olei amygdalarum dulcium ℥. iij.

Olei chamæmeli, Adipis anatis ana ℥. ij.

Olei violati ana ℥. iij. Iridis ℥. ij.

Butyri recentis ℥. vi. Croci ℥. s.

Adipis gallinæ, Cerae albæ ℥. iij.

Ceram & adipem in oleis liquato, deinde sæpius la-
uato aqua Capillorum veneris, aut aqua hordei,
His probè lotis, adde iridem & crocum in tenuissi-
mum puluerem redacta.

* Mitigat dolores pectoris & tussim, digerit, ma-
turat, faciliat sputum, & resoluit pleuresim.

¶ Vnguentum Stomachicum Magistrale.

Recip. olei absinthij, Cinnamomi,

Mastichini, Ligni aloës;

Nardini ana ℥. i. Mastiches,

Rosarum rubrarum, Menthæ,

Coralli rubri, Schœnanthi ana ℥. i.

Caryophyllorum, Cerae quantum sufficit.

fiat vnguentum secundum artem.

* Ventriculum & hepar roborat, horum dolorem
à fri-

LIBER SECVNDVS

à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionē iuuat.

¶ Vnguentum ad vermes magistrale.

Recip. succi { Absinthij,
Abrotoni,
Centaurij minoris,
Radici aristolochiæ rot.
Perficariæ,
Foliorum persicæ,
Foliorum lupini,

Radicum ebuli,

Balaustij ana ꝑ. i.

Succi Porri ꝑ. ij.

Nasturtij aquatici lib. i.

Olei absinthij lib. i. s.

Ceræ q. f.

fiat vnguentum secundum artem.

¶ Vnguentum ad oculos Magistrale.

Recip. carnis pinguis exsiccatæ,

Maluatici vini ana ꝑ. iij.

Tutiæ præparatæ ꝑ. i.

Ceræ albæ q. f.

Caro cum maluatico coquatur vsq; ad vini maluatici consumptionem, deinde cola, & cera liquata, adde postremò tutiã: probè cõmisceto & repone.

¶ Aliud Magistrale,

Recip. butyri recentis ꝑ. iij.

Ceræ albæ ꝑ. i.

Liqua, & laua sepius aqua rosacea, & prunorum, & adde Tutia præparatæ ꝑ. s.

Camphoræ ꝑ. ij. fiat vnguentum.

¶ Vnguentum ad Ambusta Magistrale.

Recip. olei rosati ꝑ. viij.

Olei ex ouis ꝑ. ij.

Nitri albi puluerisati tantundem,

Ceræ albæ ꝑ. i. s.

Corticis mediani sambuci M. i.

fiat

fiat vnguentum lento igne secundum artem.

¶ Aliud ad idem.

Recip. hederæ foliorum,
Baccarum hederæ ana part. æquales.

Contunde & succum exprime:

Ex huius autem succi lib.i.

Olei communis tantundem

Ceræ q. s.

fiat vnguentum.

¶ Vnguentum de Artanita maius Mesuræ.

Recip. succi cyclaminis lib.iiij.

Cucumeris agrestis lib.i.

Olei irini lib.ij.

Butyri lib.i.

Pulpæ colocynthidis ℥.iiij.

Polipodij ℥.vi.

Euphorbij ℥.s.

Contundenda terantur. & macerentur succis & oleis
dies octo in vase vitreo : post semel feruefac in du-
plici vase, cola: Colaturæ adde

Sagapeni ℥.vij.s.

Myrrhæ ℥.iiij.

Dissoluantur hæc in aceto, & coquantur in prædicta
colatura ad succorū consumptionem: deinde adde

Ceræ ℥.v.

Fellis vaccini ℥.vij.s.

Feruefac simul donec cera liquefcat: tunc insperge
paulatim puluerem subsequentiū medicamentorū.

Scammonij,

Salis gemmæ ℥.iiij.s.

Aloës,

Euphorbij,

Colocynthidis,

Piperis longi,

Mezerei,

Zingiberis,

Turbith ana ℥.vij.s.

Chamæmeli ana ℥.iiij.

Misce & fiat vnguentum.

* Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrio
autem inunctum, aluum deijcit: ob id hydropicos

mirè

LIBER SECVNDVS

mirè iuuat, feorsum excrementum largè vacuando:
vermes quoque necat & educit. Adhibetur non po-
tentibus fumere medicamentum purgans.

¶ Vnguentum Rosatum Mesuæ.

Axungia porcina lib.i.

Lauatur nouies aqua calente, & toties frigida: de-
inde addito

Rosarum rubrarum recentium lib.i.

Probè terantur, & marcescant cum ea dies septem:
coque igni lento, cola: rursus tantundem rosarum
recentiũ cum ea tere vt supra: idem fac tertio: quar-
to autem præter rosas affunde

Succi rosarum rubrarum ℥.vi.

Olei amygdalarum dulcium ℥.v.

Coque igni lento ad succi consumptionem, cola &
repone.

Alij addunt Opii ℥ i.

* Phlegmonas, erysipelata, herpetas sedat, cepha-
lalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intempe-
riem calidam mitigat.

¶ Vnguentum Violatum.

Fit vt rosatum, sed ex violis nigris.

* Idem quod rosatum pollet: præterea pleuritidi,
& thoracis inflammationi prodest.

¶ Vnguentum Somniferum.

Recip. olei papauerini,

Nymphaeæ ana ℥.s.

Opii,

Croci ana ʒ. i.

Cassia,

misce cum pauca cera.

¶ Vnguentum album Auicennæ,

Vnguentum de Cerusa dictum.

Recip. lithargyri ʒ. i.

Cerusa ʒ. v.

Cera albæ ʒ. vii.

Olei rosati ʒ. ij.

Albuminis ouorum num. i.

Cera liquata in oleo rosato lento igni, iniijce ceru-
sam

fam & lithargyrum probè contrita, misce, & postremò adde albumen oui.

Alij addunt caphuræ momentum & caphuratum vocant.

* Pollet aduersus vlcera, scabiem & aduersionem.

¶ Unguentum de Tutia Magistrale.

Recip. olei rosati,

Olei omphacini ana ℥.vi.

Olei myrtini,

Vnguenti populei ana ℥.ij.

Foliorum plantaginis,

Solani ana M.ij.

Herbas minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere sinas: deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes

Ceræ albæ ℥.iiij.s.

Coquantur igni lento donec cera liquata sit, semper agitando, aufer ab igne & adde

Lithargyri ℥.vi.

Pompholigis siue tutiæ præparatæ,

Cerufæ tritæ ana ℥.ij.

Plumbi vsti ℥.vi.

Caphuræ ℥.i.

Omnia in pilam plumbeâ iniecta horis duabus continuis agitentur, deinde in vase vitrato reponantur.

¶ Aliud simile, Nicolai.

Recip. olei rosati,

Ceræ albæ ana ℥.vi.

Succi solani ℥.i.

Cerufæ lotæ ℥.ij.

Plumbi vsti & loti,

Tutiæ præparatæ ana ℥.i.

Thuris ℥.s.

Ceram liqua cum oleo lento igni, & in pilam plumbeam inijce, additis quæ terèda sunt in tenuissimum puluerem reductis, moue còtinuò, & paulatim suc-

P

cum

LIBER SECVNDVS

eum supradictum instillato, perpetuo mouens sex horis continuis.

* Vtilia sunt ad exsiccanda cryspelata, vulnera for-
dida purganda, & sananda tibiaram vlcera, aliorum
locorum concaua vel dissipata replent, refrigerant
& cicatrizant.

¶ Vnguentum de Lythargyro.

Recip. lithargyri ℥.ij. Aceti ℥.i.
Cerusæ ℥.s. Olei rosati q.s.
Fiat vnguentum lento igni: Potest etiam fieri cru-
dum in mortario plumbeo.

* Vlcera, & excoriationes à calore Solis, strictiore
calceo, itinere, equitatione, frictione, & coitu sanant.

¶ Tripharmacum crudum Mesuræ.

Recip. lithargyri,
Aceti fortis ana ℥.iij.
Olei communis ℥.vi.
Lithargyros leuissimè tritus mouetur continuò pau-
latim affusus oleo vicissim & aceto.

* Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt superius.

¶ Vnguentum ad Scabiem.

Recip. styracis liquidæ, Succii limonum ℥.i.s.
Terebinthinæ lotæ, Hellebori nigri pulueri-
Butyri loti ana ℥.ij. Salis ℥.ij. (sati ℥.i.
Mulle, fiat vnguentum in mortario plumbeo.

¶ Vnguentum de Minio.

Recip. minij leuissimè triti ℥.ij.
Olei rosati,
Olei myrtini ana ℥.ij.
Coquantur lento igni cum
Cera albæ ℥.s.

¶ Aliud de Minio Camphoratum.

Recip. minij triti ℥.ij. Camphoræ ana ℥.iij.
Lithargyri ℥.ij. Olei rosati lib. i. s.
Cerusæ ℥.i.s. Cera albæ ℥.ij.
Tutiæ,

Liqua-

Liquatam ceram cum oleo lento igni, misce in mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

* Valent ad vlcera mala & antiqua.

¶ Tetrapharinacon Galeni.

Recip. picis nigræ, Ceræ,
Resinæ, Adipis vaccini,
fiat vnguentum.

* Calfacit, humectat, dolorē sedat, & pus mouet.

Macedonicum ex iisdem constat: sed insuper additur thuris vna pars.

¶ Vnguentum Basilicon minus Mesuræ.

Recip. ceræ flauæ, Picis græcæ ana lib. i.
Resinæ pinguis, Olei communis q. f.
Fit vnguentum lento igni.

Alij terebinthinam addunt: Alij verò terebinthinam picis loco ponunt.

* Idem pollet quod basilicon maius, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & neruofarū partium vulneribus & vlceribus aptius erit.

¶ Vnguentum Basilicon maius Mesuræ.

Galeni Enneapharmacum est.

Recip. ceræ albæ, Terebinthinæ,
Resinæ pini, Thuris,
Sepi vaccini, Myrrhæ ana ℥. i.
Picis græcæ, Olei communis q. f.
Picis nigræ, fiat vnguentum.

¶ Aliter.

Ceræ ℥. vi. Reliquorum ana ℥. i. s.
Picis græcæ ℥. iij. Olei q. f.

* Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium neruofarum, terget, carne implet.

¶ Vnguentum fuscum Nicolai.

Recip. olei lib. i. s.
Ceræ nouæ ℥. iij.
Picis græcæ } ana ℥. ij.
Picis nigræ }

P 2 Masti-

LIBER SECVNDVS

Mastiches }
 Chalbani } ana ℥.i.
 Thuris }
 Sagapeni ℥.ij.
 Therebinthinæ ℥.i.
 Fiat vnguentum.

* Sanandi vim habet & extrahendi.

¶ Aliud.

Recip. olei communis } ana lib. i.
 Sepi hircini }

Picis nigræ lib. s.

Picis græcæ ℥. iij.

Mastiches,

Thuris,

Galbani,

Hammoniacy } ana ℥. s.

Opopanacy,

Sagapeni,

Ceræ,

Oleum, sepum, & picem liquabis: deinde gummi
 dissoluta secundum artem adijcies: deinde reliqua
 tenuissimè trita, semper agitando donec percoquã-
 tur. His ab igne sublatis adde

Terebinthinæ ℥. ij.

Probè misceantur & reponantur.

¶ Vnguentum è Caprifolio Magistrale.

Recip. caprifolij M. iij.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo
 maceratum die vno, coques ad tertias, cola, & cola-
 turæ adde

Olei rosati lib. vi.

Resinæ pinguis }

Terebinthinæ } ana lib. i.

Ceræ flauæ }

Fiat vnguentum vt artis est.

¶ Vnguentum Capitale Conciliatoris.

Recip.

Recip. gummi elemi ℥.iiij.

Hammoniacci ℥.ij.

Terebinthina

Resinæ pini } ana ℥.iiij.s.

Ceræ q.s.

Fiat vnguentum, gummi dissolutis secundum artem:
Percoquitur etiã amplius vt cerati formam sumat.

¶ Vnguentum è Caprifolio, Carpi.

Recip. terebinthinae

Resinæ pini

Ceræ nouæ

Olei rosati ℥.viij.

Mastiches

Thuris } ana ℥.i.

Gummi elemi ℥.ij.

Caprifolij } ana ℥.iiij.

Betonice } ana ℥.iiij.

Vini optimi lib.x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & ma-
cera vino horis vigintiquatuor, deinde reliqua ad-
de, præter gummi, thus, & mastichen. Coquantur lu-
culento igni, donec vini pars dimidia consumpta
sit, imò donec virefcere incipiat, cola, & concrefcere
finito: deinde, effuso vino, rursus coquatur donec
quicquid remanserit vini absumptum sit: iterum co-
la, & reliqua adde in puluerem tenuem redacta, &
coque lento igni donec coalescant semper agitan-
do: aufer postmodum ab igne, & frigido loco repo-
ne donec refrixerit perpetuò mouens.

* Ad capitis vulnera præstantissimum est.

¶ Vnguentum è Calce Magistrale.

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fun-
do sydere permittes, & aquam spongia exprimes
decem diebus continuis: deinde aqua rosacea laua-
bis, & sicari fines.

Recip. huius calcis ita extinctæ ℥.iiij.

P 3

Olei

LIBER SECVNDVS

Olei rosati lib.i.

Ceræ albæ ℥.iiij.

Cerā in oleo liquato: Huic ab igne exemptæ & iam concreſcere incipienti, Calcem læuiſſimè tritam admisceto, & reponito.

* Ad ambuſta valet.

¶ Vnguentum Populeon Nicolai.

Recip. oculorum populi arboris recentium menſe Martio collectorum lib.i.s.

Axungia porcina præparata lib.iiij.

Oculi populi contundantur & macerentur cū axungia, donec ſequentes herba colligi queant: deinde

Foliorum	}	Papaueris agreſtis	} ana ℥.iiij.
		Mandragoræ	
		Hyofcyami	
		Solani	
		Vermicularis aut craſſula	
		Lactucæ	
		Semperuiui	
		Bardana	
Portulacæ			
Violariæ			
Umbilici veneris			

Summitatum pruni tenerarum

Herba contundantur, & miſceantur axungia & oculis populi: adde

Vini optimi q. ſatis eſt.

Coquantur ad vini conſumptionem: deinde cola, exprime, & fiat vnguentum.

* Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum ſomnum conciliat.

¶ Vnguentum Dialthea ſimplex Nicolai.

Recip. rad. altheæ lib.ij.

Seminis Lini } ana lib.i.

Fœnigraci } Terebinthina ℥.ij.

Olei lib.iiij. } Reſina ℥.vi.

Radi-

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ macerentur tribus diebus in aquæ lib. viij. deinde feruefiant, & mucilaginis inde expressæ lib. ij. fume, & coque cum alijs rebus, donec aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit: & fac vnguentum.

* Emolliendi vim habet, calefacit, & humectat.

¶ Vnguentum Dialthæa cum Gummis Nicolai.

Recip. radicum althææ lib. ij.

Seminis lini	} ana lib. i.	Ceræ lib. i.
Foenigræci		Terebinthinæ ℥. ij.
Pulpæ scyllæ ℥. vi.	} añ. ℥. vi.	Resinæ
Olei lib. iij.		Picis græcæ

Fiat vnguentum vt superius: deinde addes gummi subsequentiâ dissoluta in aceto,

Galbani	} ana ℥. ij.
Gummi hederæ	

Misceantur probè & reponantur.

* Valet propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleurisi, & super pectus inunctû sanat omnia loca infrigidata: calefacit, mollificat, & humectat.

¶ Vnguentum Comitissæ Gulielmi de Varignana.

Rec. corticis mediani	} añ. M. i.
Glandium	
Castanearum	
	} Quercus arboris

Baccarum myrti	} añ. M. i.	
Caudæ equinæ		
Gallarum		
Corticum fabarum		
Acinorum vuarum		
Calycum glandium		
Sorborum immaturorum siccorum		
Mespilorum acerborum siccorum		
Foliorum		} Capparis
Radicum chelidonij,		

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti

LIBER SECVNDVS

cocti plantaginis q.f. ad dimidij consumptionem:
cola & in dicta colatura laua subsequencia

Olei { myrtini } ana lib.i.s.
 { mastichini }

Ceræ nouæ ℥. viij. s.

Liqua & laua vt dictum est: postea insperge sequen-
tium rerum tenuissimum puluerem.

Corticis mediani { Castanearum }
 { Glandium }
 { Quercus arboris } añ. ℥. i.

Gallarum

Succi hypocistidis

Cineris ofsium cruris bubuli ℥. s.

Baccarum myrti } ana ℥. s.
Acini vuarum }

Trochiscorum de charabe ℥. ij.

Misce, fiat vnguentum bonæ consistentiæ.

* Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides fi-
sit, ac laxatos renes conciliat.

¶ Vnguentum Santalinum Mesuræ.

Recip. rosarum rub. ℥. i.

Sandali { rubri ℥. i. ℥. ij. } Spodij ℥. s.
 { citrini } añ. ℥. vi } Caphuræ ℥. ij.
 { albi } Ceræ albæ ℥. iij. ℥. vi.

Boli armeni ℥. vij. Olei rosati lib. i.

Ceram liquabis in oleo, & sæpius aqua frigida laua-
bis: deinde reliqua in tenuissimum puluerem trita
addes, & facies vnguentum.

* Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas
ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè
extinguit.

¶ Defensium Magistrale.

Recip. boli armeni }
Sanguinis draconis } ana ℥. i.
Terræ sigillatæ }
Olei rosati ℥. vi.

Ceræ

Ceræ ℥.i.s. Aceti ℥.iiij.

Coquantur simul oleum, cera, & acetū, donec acetum consumptum fuerit : deinde sublatur ab igne ubi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita.

¶ Mundificatiuum Magistrale.

Recip. mellis rosati colati ℥.i.s.

Terebinthinæ claræ ℥.iiij.

Succi { Apij } ana ℥.s.
 { Prasiij }

Succi absinthij ℥.ij.

Simul coquantur, deinde addantur

Farinæ { Hordei } ana ℥.vi.
 { Fabarum }
 { Lupinorum } ℥.iiij.
 { Orobi }

Sarcocollæ } ana ℥.i.s.
Myrrhæ }

Reduc in puluerem, & fac vnguentum.

¶ Vnguentum viride Andromachi ex Galeno.

Recip. resinæ pini lib.ij.

Ceræ lib.i.s.

Olei communis ℥.viij.

Aeruginis æris ℥.iiij.

Resinam & cerā in oleo liquabis: deinde æruginem æris tenuissimè tritam addito.

* Recentia vulnera, & quæcunq; non magna sunt, sanat.

¶ Vnguentum Apostolorum Auicennæ.

Recip. ceræ albæ

Terebinthinæ } ana ℥.xiiij.
Resinæ }

Hammoniaci

Aristolochiæ longæ } ana ℥.vi.
Thuris }

Bdellij

P 5 Myrrhæ

LIBER SECUNDVS

Myrrhæ } ana ꝑ. iij.

Galbani }
Lithargyri ꝑ. viij.

Opopanacis } ana ꝑ. ij.

Aeruginis }
Olei communis lib. ij.

Hyeme verò lib. iij.

Gummi in aceto albo soluta coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad aceti consumptionem: deinde reliqua adde tenuissimè trita.

* Efficax est contra vulnera, & vlcera difficilia & fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram molliit, & plagas sanat.

¶ Vnguentum Aegyptiacum Mesuz.

Recip. aeruginis ꝑ. v.

Mellis ꝑ. xiiij.

Aceti albi ꝑ. viij.

Coque igni, & tantisper moue, donec fiat rubrum.

Alij sumunt eius medicamenti ꝑ. vi.

Calcanthi vsti ꝑ. ij.

Olei rosati ꝑ. iij.

Ceræ q. s.

fiat vnguentum.

* Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: Carnis excrescētiae medetur, vehementerque exsiccat.

¶ Aliud Ioannis de Vico.

Recip. aquæ plantaginis }
Vini malorum granatorum } ana ꝑ. ij.

Mellis

Aluminis rupis } ana ꝑ. x.

Aeruginis }

Coque & moue donec fiat rubrum.

¶ Aliud Guidonis.

Recip. mellis lib. i. Aeruginis ꝑ. i.

Aceti optimi ꝑ. vi. Aluminis rupis ꝑ. v.

Coque & moue, donec rubrum fiat.

¶ Em-

¶ Emplastrum de Meliloto Mesuæ.

Recip. meliloti ℥.vi.

Florum chamæmeli

Foenigræci

Baccarum lauri

Radicum altheæ

Comarum absinthij

Seminis absinthij

Cardamomi

Iridis

Cyperi

Spicæ nardi

Casia

Seminis ammi

Foliorum persici ℥.iij.

Hammoniæ ℥.x.

Styracis

Bdellij

Terebinthinæ ℥.i.s.

Ficus pinguis num. xij.

Sepi hircini

Resinæ picis

Cerae ℥.vi.

Olei sampfucini

Olei nardini

Confice, sic

Fit decoctio

Meliloli

Foenigræci

Chamæmeli

} ana ℥.ij.

} ana ℥.i.s.

} ana ℥.v.

} ana ℥.ij.s.

} ana lib. i.

} ana q. f.

Coquantur ad medias, deinde in colaturam immis-
 sis triturandis subtilissimè puluerifatis, rursus co-
 quuntur additis oleis, terebinthina, & similibus, gum-
 misque in aceto dissolutis: postremò adduntur ra-
 dices & ficus simul cocti & bene contusi. Misce,
 fiat emplastrum.

* Mollie

LIBER SECVNDVS

* Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriaque tensa sanat.

¶ Dia Melilorum Andromachi ex Galeno.

Recip. nardi gallicæ }
 Cyperi } ana ℥.viij.
 Iridis }
 Myrrhæ }
 Croci ℥.iiij. }
 Meliloti ℥.xxv. }
 Hammoniæ } ana ℥.l.
 Terebinthinæ }
 Cerae ℥.c.
 Olei cyprini ℥.vi.
 Aceti q.f.
 fiat emplastrum.

* Eadem quæ præcedens pollet.

¶ Polyarchion Galeni.

Recip. cerae }
 Terebinthinæ } ana lib. i.
 Bdellij }
 Hammoniæ }
 Cardamomi }
 Cyperi }
 Amomi }
 Spicæ nardi } ana ℥.xxv.
 Croci }
 Myrrhæ }
 Thuris }
 Cinnamomi }
 Olei cyprini ℥.xvi.
 Vini odoriferi q.f.
 fiat emplastrum.

* Ad lienosos, & hepaticos.

¶ Philaggianum Pauli.

Recip. croci ℥.i.s

Aloës

Aloës
 Hammoniāci } ana ℥.i.
 Bdellij
 Styracis
 Pinguedinis anserinæ ℥.ij.
 Ocyphi ℥.iiij.
 Dactylorum ℥.ij.
 Ceræ lib.i.
 Spicæ nardi } ana ℥.vi.
 Olei melini

Vini q.f.
 fiat emplastrum.

* Idem præstat cum præcedenti.

¶ Martiatum Pauli.

Recip. mastiches } ana ℥.iiij.
 Ceræ
 Styracis
 Ocyphi ℥.vi.
 Terebinthinæ ℥.i.
 fiat emplastrum.

* Ad articulorum morbos, & corporis languores
 ac resolutiones.

¶ Martiatum Nicolai.

Recip. foliorum { Lauri lib.iiij.
 Rutæ lib.ij.s.
 Maioranæ lib.ij.
 Rorismarini lib.i.s.
 Myrti lib.i.
 Balsamitæ } ana ℥.vi.

Seminis ocymi

Buryri ℥.v.

Styracis

Medullæ cervinæ } ana ℥.iiij.

Adipis vrsini

Adipis gallinacci

Mastiches ℥.iiij.

Thuris

LIBER SECVNDVS

Thuris ℥.ij.s. Olei communis lib.vi.
 Olei nardini ℥.i. Ceræ lib.iiij.
 Confice vt artis est.

* Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos, ischidicos, & ad omnia vitia, & dolores neruorum valet.

¶ Emplastrum Diaphanicon calidum Mesuæ.

Recip. ceræ ℥.ij.

Olei rosati }
 Olei nardini } ana ℥.iiij.

Simul liquentur : deinde

Dactyli sicci num. xl.

Panis biscocti ℥.v.

Macerentur in vino odoro biduum: post

Carnis cydoniorum in vino coctorum ℥.i.

permultum teres cum dactylis & pane biscocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene contusa

Mastiches }
 Thuris } ana ℥.ij.s
 Absinthij }

Ligni aloës

Macis

Myrrhæ

Aloës lotæ

Spicę nardi

Acaciæ

Galliæ moscata

Ramich

Calani aromatici

Ladani ℥.ij.

Misce, fiat emplastrum.

* Ventriculum & hepar firmat: ob id lienteriam, & dysenteriam hepaticam adiuuat.

¶ Emplastrum Diaphœnicum frigidum Mesuæ.

Recip.

Recip. dactylorum maturitati proximorum in vino austero coctorum $\mathfrak{z}.v.$

Panis biscocti $\mathfrak{z}.i.$

Carnis cydoniorū in vino austero coctorum $\mathfrak{z}.j.s.$

Syracis calamitæ

Mastiches

Ladani

Acaciæ

Omphacij

florum labruscæ

Rosarum rubrarum

Sandali citrini

Ramich

Myrrhæ

Ligni aloës

Ceræ $\mathfrak{z}.iiij.$

Olei rosati $\mathfrak{z}.xv.$

} ana $\mathfrak{z}.iiij.$

Vini austeri q.f.

fiat emplastrum.

* Ventré totū inferiorē, ne aliarū partiū recremēta suscipiat, roborat, coctionē iuuat: ab hæc vomitum, cholera morbū, lienteria, dysenteria hepaticā iuuat.

¶ Emplastrum de baccis Lauri Mesuz.

Recip. thuris

Mastiches

Myrrhæ

Baccarum lauri $\mathfrak{z}.ij.$

Cyperi

Costi

} ana $\mathfrak{z}.i.$

} ana $\mathfrak{z}.s.$

Mellis despumati q.f.

fiat emplastrum.

* Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat.

¶ Emplastrum Galeni.

Recip. farinæ

Iridis

{ Fabarum }

{ Orobi }

} ana $\mathfrak{z}.i.$

Oxy-

LIBER SECVNDVS

Oxymellis ꝛ. ij.

Picis ꝛ. iij. fiat emplastrum.

¶ Emplastrum de tribus farinis Auicennæ.

Recip. farinae { Fabarum } ana lib. ij.
 { Orobi }
 { Hordei }

Lixiuij q. f.

Coque lento igni & adde

Oxymellis simplicis q. f.

¶ Emplastrum de quinque farinis eiusdem.

Recip. farinae { Fabarum } añ. partes equales
 { Orobi }
 { Ciceris }
 { Lupinorum }
 { Hordei }

Lixiuij, Oxymellis simpl. ana q. f.

¶ Emplastrum ex fermento Democriti ex Mesue.

Recip. mellis } ana lib. i.
 Fermenti }

Visci querni ꝛ. iij.

Hammoniacci in aqua fœnigræci, aut lacte mori arboris ꝛ. iij.

Fæcis olei veteris q. f.

fiat emplastrum.

* Spinæ & surculos extrahit, ac etiã ossa fracti cranij, meningibus infixa etiam profundius.

¶ Aliud simile.

Recip. fermenti }
 Mellis } ana ꝛ. i.
 Olei communis }
 Lactis muliebris }
 Vitelli ouorum }

fiat emplastrum.

* Coquit & maturat phlegmonas, abscessusq; rûpit. Si bdellium & hordei farina miscetur his, spinas extrahit: idq; valentius si his dissoluta aceto galbani pars

pars dimidia iungatur.

¶ Emplastrum de Cruſta panis Montagnanæ.

Recip. maſtiches

Menthæ	} ana ꝑ.i.
Spodij	
Coralli rubri	
Santali { rubri } albi	

Cruſtæ panis toſtæ & maceratæ per horã mediã ꝑ.ij.

Olei maſtichini	} ana ꝑ.i.
Olei cydoniorum	

Farinæ hordei q.f.

fiat emplaſtrum.

* Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non poſſunt.

¶ Emplaſtrum è Calamintha.

Recip. calaminthę montanæ

Farinæ { hordei } tritici	} ana ꝑ.ij.
Oefypi	

Croci gr.vi.

Aquę	} ana q.f.
Vini	

fiat emplaſtrum.

¶ Emplaſtrum ex allijs Aëtij.

Recip. ceræ lib.ij.

Picis græcæ	} ana ꝑ.vi.
Medullæ ceruinæ	

Nitri albi ꝑ.vij

Olei lib.iiij.

Allia num. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde cerã, poſtremò nitrũ bene pulueratum: fiat emplaſtrum.

* Vim attractoriã habet: Facit ad omnẽ durtiam, abſceſſus, furunculos, ſtrumas, inguinum tumores, fiſtulas, impetigines humidas, ac mãmas induratas.

Q ¶ Hy-

¶ Hydrelæon Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Aquæ limpida } an. lib. ij.
Olei puri }

Lithargyros læuissimè terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igni, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensis: Ad Solem conficiendum est medicamentû die serena, vt albescat: pereunte igne alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitâdo donec cerati crassitiem adipiscatur: Potest autem in vnguenti formam redigi si minus coquatur.

Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lib. ij. olei tantundem, & aquæ lib. ij. tunc enim candidius fit citiusque coquitur.

* Refrigeratoriâ habet vim mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & quod iam influxit, ad partes circûiacentes retrudit: hinc prurit^{us} desquamata, & parua hulcera persanat.

¶ Oxelæum Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Olei veteris } ana lib. ij.
Aceti optimi }

Confice vt supra.

Componitur etiam ex olei & aceti lib. ij. s. Vel ex singulorû lib. ij. tunc enim nigrius est & valentius.

* Exsiccat, fistulas quæ nondû callum durû habent, curat: vulnera cruenta glutinat.

¶ Onelæum Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Olei clari } ana lib. ij.
Vini albi optimi }

Coque & confice vt superiora.

* Exsiccat, proinde in rheumaticis dispositionibus vile est, & cruenta vulnera sanat.

¶ Diz

¶ Dia pipereos Galeni.

Recip. lithargyri argenti

Ceruse

Olei communis lib. ij.

Cere \mathfrak{z} . vi.Terebinthinæ \mathfrak{z} . iij.

Fit in hunc modum.

Lithargyros læuissimè tritus coquendus est ad Solem in oleo, & tâtisper mouendus, donec emplastri crassitiem habeat, nec manus inquinet: deinde additur cera & terebinthina: his liquatis iniice puluerem tenuissimum thuris aluminis, & piperis: postremò cerusam tenuissimè pulueratam, semper mouendo. Confice ceratum ad iustam crassitiem.

* Iuuat senum vlcera, & eorū qui mollem habent cuticulam: denique omne vlcus curat quod non facile cicatricem admittit, & abrasa.

¶ Dia Chalciteos Galeni, Palmeū vnguentū dictum.

Recip. axungie porci veteris à membranis per liquationem & colationem purgatæ lib. ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti } ana lib. iij.

Chalcitidis vstæ \mathfrak{z} . iij.

Coque igni, & moue rudicula ex ramo palmæ recentissimo confecta: cū ferè excoctum erit, adde tenerorum palmæ ramorum minutim incisorum & nodulo ligatorum M. iij.

Coque ad cerati crassitiem.

Vfus eius est liquati cum varijs rebus pro Medici instituto.

* Ad vulnera crueta, tumores pestilentes, & exituras, vsta, rupta, contusa & inde nata ecchymomata.

¶ Dia chylon Mesuræ primæ descriptionis.

Recip. muccaginis

{ sem. foenigraci
 { sem. lini
 { radicū altheæ

} ana \mathfrak{z} . i.

Q 2 Li-

Lithargyri ℥.i.s.

Olei antiqui clari ℥.iiij.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum oleo subigatur & misceatur: post igni lèto coque, spatha semper agitando donec probè mista sint. Exime igni, paulatim frigescat: postea muccagines affunde, permisce & recoque igni ad iustam crassitiem.

* Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, & aliarū partium, ipsas choeradas & durities reliquas emollit & iuuat.

Alij addunt pulueris iridis } ana ℥.i.
Muccaginis meliloti

valentius tunc resoluit & maturat, magis item est anodynum.

Alij olei veteris loco, accipiunt

Olei chamæmelini } ℥.i.s.

Olei irini

Præstantius quoque fit Addes etiam si voles

Galbani

Hammoniacy } ana partes æquas.

Sagapeni

Diachylon gummatum vulgus appellat.

¶ Emplastrum Dia Chylon magnum Mesuzæ.

Recip. lithargyri lib. i.

Olei { Chamæmelini } ana ℥. viij.
 { Trini }
 { Anethini }

Muccaginis { feminis lini }
 { fœnigræci }
 { althææ }
 { ficuum pinguium }
 { vuarum passarum } ana ℥. xij. s.

Succi { Iridis }
 { Scillæ }

Oesyphi

Ichthyocollæ

Tere-

Terebinthinæ ℥.iiij.

Resini pini }
Cerae flauæ } ana ℥.ij.

fiat ceratum vt prius.

* Scirrhus emollit & digerit & inflationes.

¶ Emplastrum Diachylon paruum Mesuæ.

Recip. lithargyri ℥.vi.

Olei veteris lib.i.

Muccaginis psyllij ℥.iiij.

Muccaginis seminis hyoscyami ℥.i.s.

Muccaginis } seminis lini }
 } radicum althææ } ana ℥.ij.

Fiat vt primum.

* Tumores calidos digerit & maturat.

¶ Diasandix Aëtij.

Recip. minij læuissimè triti lib.i.

Olei clari lib.ij.

Coque ad cerati crassitiem.

* Ulcera maligna ac diuturna, & in tibijs oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit.

¶ Ceratum è Cerusa.

Recip. cerusæ lib.i.s.

Olei rosati lib.ij.

Cerae candidæ ℥.iiij.

Cera in oleo liquata, adde cerusam tenuissimè læuigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant.

* Sanat ambusta, cryspelata, scabiem siccam, & vlcera calida.

¶ Ceratum è Betonica, Carpenfis.

Recip. terebinthinæ }
Resinæ pini }
Cerae flauæ } ana ℥.iiij.

Resinæ pini

Cerae flauæ

Betonicæ pulueratæ ℥.i.

Mastiches }
Thuris } ana ℥.s.

Thuris } ana ℥.s.

Q 3

Mumiæ

LIBER SECVNDVS

Mumia ꝑ.iiij. Misce, fiat malagma.

* Ad capitis vulnera vtile.

¶ Ceratum Capitale, Carpenfis.

Recip. terebinthina in vino malu-	} ana ꝑ.iiij.
tico sapius lota,	
Resina pini	
Cera alba	

Mumia ꝑ.i.s.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiam lauisimè tritam: coque igni, semper mouendo, deinde inijce in vas argenteum, aliudue tersum, in quo habeas aceti rosati è vino maluatico lib. iij.

Macerentur horis 24. deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum, repone vase vitreo.

¶ Ceratum è styrace Magistrale.

Recip. styracis liquidæ ꝑ.iiij.

Cera flaua ꝑ.ij.

Thuris

Myrrha } ana ꝑ.i.

fiat ceratum secundum artem.

* Neruorum iuncturarumq; tumores duros lenit.

¶ Ceratum Gratia Dei.

Recip. galbani

Opopanacis

Aeruginis

Thuris

Aristolochia longa } ana ꝑ.i.

Mastiches

Myrrha

Hammoniæ ꝑ.i. ꝑ.ij.

Cera ꝑ.viiij.

Lithargyri

Olei communis } ana ꝑ.xviiij.

Bdellij ꝑ.ij.

Lapidis calaminaris } an. ꝑ.i.

Lapidis hæmatitis

Olei

Olei absinthij ꝑ.iiij.

Terebinthinæ ꝑ.vi.

fiat ceratum.

* Mollit, terget, glutinat.

¶ Diacadnia Galeni.

Recip. cadmiæ præparatæ } ana ꝑ.xvi.

Chalcitidis vstræ

Ceræ ꝑ.lxxx.

Colophonix ꝑ.lxiiij.

Olei myrtini lib.i.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum tâto vino subiguntur donec mellis crassitiem adeptæ sint : deinde cera & colophonia in oleo liquatis : Coque aliquantulum, exime igni, & vbi refrixerint adde reliqua.

* Efficax est ad cicatricem ducendam in vlceribus.

¶ Διά ιτέων. De Salice.

Recip. misy

Aluminis rotundi

Chalcitidis

Melantherij

Aeruginis

Aluminis scissilis

Gallarum acerbarum

Ceruse

Ceræ

Resinæ frictæ

Picis brutæ

Bituminis

Olei omphacini

Foliorum salicis tenerorum

Coquantur folia in aceti fortis q. s. deinde siccata puluerabis tenuissimè : Alia liquabis, & coques ad sufficientiâ, deinde frigere fines, & addes pulueres.

* Facit ad vlcera curatu difficilia, item ad erysipelata, aliosque plurimos affectus sine vsturis, & fistulas, impostum.

Q 4

¶ Bar-

LIBER SECVNDVS

¶ Barbarum paruum Galeni.

Recip. picis nigrae

Cera	}	ana lib. i.
Resinae pini		
Picis graecae		
Bituminis		
Lithargyri	℥. x.	
Cerulae	}	ana ℥. v.
Aeruginis		
Opopanacis	℥. iij.	
Olei	℥. ix.	

Terenda contendantur in mortario cum aceto forti: reliqua liquentur misce. coque quousque manus non amplius manus inquinat.

Si uoles sedando dolori aptius reddere, adde
Succi hyoscyami } ana ℥. s.
Opij }

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumque morsus, condylomata, inflammata ad articulorum vitia omnia in principio, & podagram valet.

¶ Barbarum magnum Galeni.

Recip. picis	lib. viij.	
Cerae	lib. vi. ℥. viij.	
Resinae pini	lib. v. ℥. iij.	
Bituminis	lib. iij.	
Olei	lib. i. ℥. vi.	
Lithargyri	}	ana ℥. iij.
Cerulae		
Aeruginis		
Thuris	℥. vi.	
Aluminis liquidi	℥. i. s.	
Aluminis scissilis	℥. iij.	
Opopanacis	}	ana ℥. xij.
Squammæ æris		
Galbani		

Aloës

Aloës }
Opij } ana ℥.iiij.

Myrrhæ }
Succi mandragoræ ℥.vi.

Terebinthinæ lib.ij.

Aceti lib. v. Confice vt in paruo dictum est.

* Eiusdem cum superiori efficaciam: Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, vt præcedens ad minora.

¶ Ifis ex Galeno.

Recip. ceræ ℥.c.

Terebinthinæ ℥.cc.

Squammæ aris

Aeruginis

Aristolochiæ

Thuris

Salis hammoniæ

Hammoniæ

Aeris vsti

Aluminis vsti ℥.vi.

Myrrhæ }
Aloës } ana ℥.xij.

Galbani }
Olei veteris ℥.x.

Coque vt supra: deinde subige manibus aceto forti

lotis, fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem. Alij addunt radicis dracontij ℥.viiij.

* Capiti accommodatum est, ad chironia vlcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum.

¶ Ceratum viride Machæronis ex Galeno.

Recip. olei rosati omphacini ℥.vi.

Aristolochiæ

Galbani

Opopanacis

Hammoniæ

Aeruginis

Myrrhæ

Iridis

} ana ℥.i.

Q s Tere-

Terebinthinae ℥.vij.s.

Cerae tantundem, fiat ceratum.

* Ad omnia recentia vulnera, conglutinat, & pleurionem arcet, ubi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: ite ad aurium, naturaliumque, & narium vlcera facit: in ossibus denudatis carnem producit.

¶ Dia dictamni Galeni.

Recip. olei veteris lib.ij.s.

Lithargyri lib. i. ℥. s.

Aeruginis ℥. i.

Squamæ æris ℥. vi.

Colophonæ ℥. vi. ℥. ij.

Pollinis thuris ℥. i. s.

Hammoniæ ℥. ij.

Aeris vsti ℥. i.

Diphrygis } ana ℥. vi.

Gentianæ } ana ℥. vi.

Propoleos } ana ℥. i.

Aloës } ana ℥. i.

Galbani ℥. i. s.

Aristolochiæ rot. } ana ℥. i. ℥. ij.

Dictamni cretenf. } ana ℥. i. ℥. ij.

Cerae ℥. xxv. Confice in hunc modum:

Lithargyrum cum oleo mixtū coques tantisper dum probè coierint, cōtinenter agitando, & additis æruginæ & squama æris, ferueat aliquantulū: exime igni, & dum adhuc bullit immitte resinā & hammoniacum in aceto dissoluta, & eousque mouebis donec deferbuerit, tum ceram & æs vstum immitte: Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probè moueto, & confice magdalias.

* Facit ad recentia vulnera, neruorum præcisiones, vetera vlcera, & cicatricem ægrè ducētia, abscessus, strumas, furūculos, duritias: tela educit, aculeos: ossa ex capite: & ad cuiuslibet virulenti ictus efficax est.

¶ Cera-

¶ Ceratum Oxycroceum Nicolai.

Recip. croci

Picis nigræ

Picis græcæ

Cere

Terebinthinæ

Galbani

Hammoniacy

Myrrhæ

Thuris

Mastiches

} ana ℥.iiij.

} ana ℥.i.℥.iiij.

Galbanum & hammoniacy in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, coque dum dissoluta sint, cola, & rursum coque donec acetum in vaporem euauerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec percocta sint ad cerati crassitiem. Infunde in aquâ frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocum in tenuissimū puluerem redactum admisce, fiat ceratum.

* Prodest ossibus fractis, itē partib⁹ q̄ dolore aliquo affliguntur, duritiē deniq; omnē emollit & discutit.

¶ Ceratum ex pelle arietina Arnoldi de villa noua.

Recip. lithargyri

Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armeni

Opij

Mastiches

Hammoniacy

Mumiæ

Galbani

Thuris

Costi

Lumbricorum

} ana ℥.s.

Picis

LIBER SECVNDVS

Picis nigrae }
 Picis graecae } ana ℥.i.
 Cerae albae }
 Cerae rubrae }

Radicum consolidae } maioris } ana ℥.iij.
 minoris }

Rosarum rubrarum }
 Myrrhae } ana Gr. xvij.
 Aloës }

Succi hypocistidis }
 Gallarum immaturarum } ana ℥.vi.
 Balaustiorum }

Aristolochiae rotundae }
 Visci quercini } ana ℥.ij.
 Terebinthinæ }

Sanguinis hominis rufi ℥.ix.

fit autem in hunc modum.

Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quendam quem colabis.

Huius colaturæ fume lib. i. immitte in vas nouum in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando, iniice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & mastichen: his liquatis adde gummi aceto dissoluta & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice quæ terenda sunt probè trita, probè misceto, & confice magdalias.

* Magnæ est efficacæ in rupturis.