

Tamarindorum ℥.s.
Seminum communium maiorum ana ℥.ij.

¶ Decoctum Pectorale.

Recip. passarum ℥.i. Hordei purgati ℥.i.
Sebesten, Glycyrrhizæ ℥.s.
Iuiubas ana xv. Adianti M.s.
Dactylos vi. Hyssopi ℥.ij.
Coque vt suprâ.

¶ Decoctum flatus pelleus, seu Carminatiuum
vt vocant.

Recip. anisi. Glycyrrhizæ ℥.s.
Dauci, Florum chamæmeli M.s.
Cymini, Passarum ℥.i.s.
Foeniculi ana ℥.iij. Coque vt dictum est.

DE SAPIIS SEV ROB, IVLEPIS,
ET SYRYPIS,

Sectio tertia.

¶ Diamoron, Galeni.

Recip. succi mororum domesticorum lib.v.
Mellis lib.i.

Clarificatur primùm succus, dein vnâ cum melle co-
quiritur ad iustam consistentiam, & seruetur in vsu.
Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter suprâ di-
cta, recipit

Myrrhæ

Croci ana ℥.i.s.

Omphacij, agrestam vocant, ℥.i.

Coquitur omphacium cum succo & melle : myrrhæ
verò & crocum sub finem immittuntur, cum scilicet
ab igne medicamentum tollitur.

* Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affe-

G 3 ctus,

LIBER SECVNDVS

ctus, & gingiuarum noxas vitia sunt, atque ad omnia oris vitia.

¶ Diamoron vsitatum Nicolai.

Recip. succi mororum batinorum lib. i.

Succi mororum domesticorum lib. s.

Mellis lib. s.

Sapæ ꝑ. iij.

Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinē, serua.

* Idem quod superiora præstat.

¶ Diarhæon, Galeni.

Recip. succi malorum granatorum, acidorum,

dulcium, &

acidodulcium ana lib. s.

Mellis lib. i.

Coquitur succus ad mellis consistentiam, deinde addito melle iterum coquitur & seruatur.

* Intemperiem calidam tollit, vomitum compefcit & alui fluorem, & ventriculum roborat.

¶ Diacaryon Galeni, tale est & Mesuræ.

Recip. succi corticum viridium iuglandium, diebus canicularibus extracti lib. iij.

Mellis lib. ij.

Coque vt supra.

Aliqui sumunt mellis partē vnā, syrui rosati partem vnā, & balauftia addunt, aliaque simplicia pro rei necessitate.

* Destillationi tenuium & acium humorum à capite, & phlegmonem excitantium, confert.

¶ Iulepum rosatum Mesuræ, quod & syrupus rosarum recens.

Recip. aquæ, in qua rosæ tertio sunt maceratæ, ꝑ. v. Sacchari lib. iij.

Coquuntur lento igne vt supra.

* Febricitantiū acutē sitim inexpletam sedat, ventriculi, cordis, & iecoris æstum mitigat.

Eodem modo fit iulepū ex infusionibus violarum;

Com-

Componitur etiam vtrunque ex aqua stillatitia, & succo rofarum & violarum: exempli gratia.

Sumuntur rofarum aut violarum aquæ stillatitiæ, aut succi lib. iij. Sacchari lib. ij.

Coquantur vt suprà.

Eadem ratione compositum est Rhodostacton Pauli è melle & succo rofarum.

¶ Hydromelum Pauli.

Recip. succi malorum cydoniorum lib. iij.

Mellis lib. vi.

Aquæ lib. viij.

Coque in modum iulepi.

* Aduersus alui profluvia biliosa valet, vètriculum firmat, & ventriculum cohibet.

¶ Hydromelon aliud Pauli.

Recip. malorum cydoniorum purgatorum concisorum lib. v. aquæ fontanæ lib. xij.

Coquito donec flaccida fiant, cola, & ad ipsam aquam mellis despumati tantundem admisceto, rursusq; coquito donec octaua pars fuerit consumpta.

* Idem potest quod præcedens.

¶ Hydrorofatum Pauli.

Recip. rosarum ablatis vnguibus, siue purgatarum lib. iij.

Aquæ lib. viij.

Mellis lib. vi.

Coque despumans in iulepi modum, cola, & serua.

* Siticulosi in febre ardente, & exolutis ac stoniacho male habentibus conuenit.

¶ Apomeli ex Philagrino, D. Pauli

Recip. fauorum melle plenorum alborum lib. i.

Aquæ fontanæ lib. ij. s.

Mel expressum in fictili coquito, donec spuma & quod velut cerosum supernatat ablatum fuerit, tunc diligenter vasis bene obturatis reponito.

* Sputum educit, mouet vrinas, aluum emollit, & humores attenuat.

G 4

¶ Aqua

LIBER SECVNDVS

¶ Aqua mulsa.

Recip. mellis lib. i.

Aquæ pluuiæ lib. viij.

Coque lento igne, donec amplius nõ spumet, vt ere. Augetur quandoque mellis quantitas, & decoquitur ad iulepi consistentiã, nempe quando à Medico præscribitur, aut quòd ita illi visum est, aut quòd diutius seruanda sit: & aromatizatur cinnamomo, folijs saluiæ, & similibus, prout vsus postulat.

* Affectus frigidus cerebri, neruorum, & iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem promouet, colicis prodest, & calculum in meatibus vrinæ gigni prohibet.

Aqua pectoralis fit his additis quæ decoctum pectorale supra descriptum ingrediuntur.

¶ Oxymeli simplex Galeni.

Recip. mellis despumati lib. ij.

Aceti albi lib. i.

Coquantur donec qualitates aceti & mellis probè permixtæ sint, hoc est ad quartam partem.

Mesues addit

Aquæ fontanæ lib. i.

Coquitque ad dimidias.

Fit etiam acetosius, aut minus acetosum, pro eius palato cui præscriptum est.

Fit etiam oxymeli imbecillius addita aqua, ab Arabibus secheniabin nuncupatum, hoc modo.

Mellis lib. ij.

Aquæ fontanæ lib. iij.

Coquantur simul, donec probè despumata sint; deinde addita

Aceti lib. i.

Iterum coquantur, donec eorum qualitates planè vnitæ fuerint.

Interdum mel, aqua, & acetum eodem momento permiscentur, decoquanturque ad quartam, aut tertiam partem.

* Humo-

* Humores crassos, lentos, ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, obstructions aufert, sputū educit, & sitim sedat.

¶ Oxymeli compositum.

Recip. corticum radicum eleoselini, (apium vulgare intelligit)

Foeniculi, Seminis apij vulgaris

Petroselini, Foeniculi ana ℥.i.

Asparagi, Aquæ lib.xij.

Rusci ana ℥.ij.

Coque donec dimidium absumatur, Colaturæ adde Mellis despumati lib.iiij.

Aceti lib.i.

Rursus coquito ad tertias.

* Humores crassos & pituitosos incidit, & extergit: ob id iecoris, lienis, & renum obstructions tollit: vrinam mouet, sudoremque euocat.

¶ Oxymeli scilliticum Mesuæ.

Recip. mellis despumati lib.iiij.

Aceti scillitici lib.ij.

Coquantur vt prædicta.

* Humores crassos, lentos, frigidos eradicatu difficiles extenuat, incidit & abstergit, ideoque ad cindum vomitum efficax, ructum acidum sanat, & vrinæ incontinentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, fit vt oxymeli compositum.

¶ Acetum scylliticum Mesuæ, quale est & Galeni.

Recip. scillæ candidæ, mediæ magnitudinis, laminas inter corticem & cor medias, acu lignea filo traiectas tanto interuallo ne se contingant, siccabis in vmbra dies 40. postea concisam cultello ligneo, lib. vnam insolabis in aceti boni lib. viij. in vase vitrato angusti oris, bene obstructo, dies alios 40. canicularum, postea frica, & cola.

Nicolaus scillæ sumit pane inuolutæ, & in cliba-

G 5 no

LIBER SECVNDVS

no coctæ lib.i.s.

Aceti acerrimi lib.vij.

& in vase vitrato per dies 40. in folat.

* Efficacissimnm est ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiam & vertiginem: gingiuas laxas, & putrescentes sanat, dentes confirmat, oris odorem comendat foetore illius dissipato: partes respiratorias iuuat & expurgat, & guttur roborat, ob id vocem clariorem efficit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, concoctione enim iuuat, hepar & lienem expurgat eorumque dolore leuat. Intestinorum & vesicæ retentricem vim firmat, vuluarum strangulationibus & iuncturarum affectibus prodest. Admodum imbecillos recreat, corpus sanum reddit, bonumque colorem conciliat.

¶ Syrupus acetatus simplex Mesuæ.

Recip. aceti potentis lib.iiij

Sacchari aqua secundam artem clarificati lib.v.

Coquito in vase lapideo aut figulino bene cocto vitrato & fit Syrupus.

* Affectibus biliosis, febribus maxime auxiliatur, quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit & extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, vrinas mouet ac sudores.

¶ Syrupus acetatus cum radicibus Mesuæ.

Recip. aquæ fontanæ lib.x. Seminum apij.

Radicum apij,

Foeniculi,

Foeniculi,

Anisi ana,

Intybi seu endiuix ana ℥.iiij. Endiuix ana ℥.i.

Coquantur lento igne ad dimidias, Calaturæ adde

Sacchari repurgati lib.iiij.

Aceti albi lib.ij.

Coquito in syrapi consistentiam.

Fit etiam sine aceto.

* Bilē crassam & auulsu difficilē ac pituitā incidit, terget, obstructions hepatis, lienis, & renū aperit.

¶ Syru-

¶ Syrupus de quinque radicibus.

Recip. radicum apij, Rusci,
 Fœniculi, Asparagi ana ℥.ij.
 Petroselinî, Aquæ fontanæ lib.vi.

Coque ad tertiæ partis consumptionem: expressum
 coquitur cum sacchari lib.ij. addendo ad finem aceti
 albi ℥.viiij.

* Prædicto efficacior, ad syrups Bizantini vires pro-
 ximè accedens.

¶ Syrupus acetatus diarhodon Mesuræ.

Recip. succorum intybi, Rosarum siccarum ℥.i.
 Apij, Glycyrrhizæ ℥.s.
 Lupuli ana lib.ij.s. Nardi indicæ ℥.ij.s.
 Radicum intybi, Seminum anisi,
 Apij, Fœniculi,
 Fœniculi ana ℥.ij. Apij ana ℥.vij.

Macerata in aquæ lib. vi. coque ad duarum partium
 consumptionem, deinde cum

Sacchari lib. ij.

Aceti lib. ij.

fiat syrupus.

* Ad febres complexas, & eas quæ formam corpo-
 ris corrumpunt utilis est, obstructiones hepatis &
 lienis aperit.

¶ Oxyfacchara simplex Nicolai.

Recip. sacchari albi lib. i.

Succi malorum granatorum acidorum ℥.viiij.

Aceti ℥.iiij.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Nonnulli, aceti loco, vinum malorum granatorum
 sumunt.

* Confert ad febres tertianas, tertianas duplices,
 ardentes & heclicas.

¶ Oxyfacchara composita Nicolai.

Recip. adianti siue capillorum veneris

Phyllitidis, siue linguæ ceruinæ,

Cete-

LIBER SECVNDVS

Ceterach, id est aspleni, Radicum foeniculi,
 Polytrichi, Rusci,
 Hepaticę, Asparagi,
 Violarum, Graminis ana lib. i.

In vino siue succo malorum granatorum omnia tri-
 duum macerato, deinde percoquito, forti expressio-
 ni addito sacchari quod satis est. Coquito secundum
 artem.

* Concalesceta corpora potum iuuat, longis febr-
 bus quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecoris
 auxilio est, & lienis obstructiones tollit.

¶ Syrupus acetositatis citri Mesua.

Recip. succi citriorum acidi lib. vi.

Sacchari lib. iiii.

Coquantur secundum artem.

* Aestum ac feruorem bilis flauę, febriumque ar-
 dentium, & pestilentialem mitigat, sitim quoque ve-
 hementem restinguit, ebrietati resistit, vertiginemque
 iuuat.

¶ Syrupus acetositatis limonum.

Recip. succi acidi limonum maturorum transco-
 lati lib. vi.

Sacchari albi lib. iiii.

Coque vt artis est.

* Præcedente magis refrigerat & penetrat, Cor &
 stomachum roborat, putrefactioni resistit, & spiritus
 resolui prohibet.

¶ Syrupus Bisantinus simplex Mesua.

Recip. succorum endiuia,

Apij, ana lib. ij.

Boraginis,

Succorum lupuli,

Buglosi ana lib. i.

Feruesiant semel, purgentur

eius succi clarificati lib. iiii.

Sacchari albi lib. ij. s.

Coquito lento igne, & fiat syrupus.

Interdum ad singulas succi clarificati libras, ace-
 ti

ti ꝑ. vi. adduntur.

* Compositus fit hunc in modum.

Adduntur prædictis

Rosarum aridarum ꝑ. ij.	Seminum anisi,
Glycyrrhizæ ꝑ. s.	Apij,
Nardi indicæ ꝑ. ij.	Fœniculi ana ꝑ. iij.

Builiant cum prædictis succis, Colaturæ adde saccharum.

* Humores crassos & lentos incidit atq; extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit. Compositus ad hæc omnia efficacior est.

¶ Syrupus rosatus solutiuis.

Recip. infusionis rosarum secundum artē ^{nonum} iteratæ lib. x.

Sacchari tantundem.

Coquuntur in syrupi consistentiam.

Nonnulli cum melle conficiunt.

* Bilem purgat.

¶ Syrupus rosatus è rosis ficcis.

Recip. infusionis rosarum aridarum, Sacchari albi ana lib. ij.

Percoquuntur secundum artem ad syrupi consistentiam.

* In febribus calorem extinguit: ob id sitim quoque sedat, & ventriculum roborat.

¶ Syrupus violatus solutiuis.

Recip. infusionis violarum nonum iteratæ, Sacchari clarificati ana lib. v.

Coquuntur lento igne ad syrupi consistentiam.

* Ad eadem efficacax ad quæ rosatus solutiuis.

¶ Syrupus è succo violarum.

Recip. succi violarum in mortario marmoreo con-
tufarum depurati lib. iij.

Sacchari clarificati tantundem.

Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

* Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitii calidis confert.

¶ Syru-

LIBER SECVNDVS

¶ Syrupus violatus Mefuæ.

Recip. violarum ꝑ.ij.

Seminum cydoniorum, &

Maluæ ana ꝑ.i. Iuiubas,

Sebesten ana xx. cum aquæ cucurbitæ lib.vi.

Coque ad tertiam partem, & addita

Sacchari lib.i.s. Fiat syrup. secundum artem.

* Pleuritidi & tussi à causâ calida prodest.

¶ Syrupus Endiuixæ simplex.

Recip. succi endiuixæ clarificati & depurati lib.vij.

Sacchari optimi libras totidem.

Coque lento igne in formam syrupi.

* Valet ad immodicum calorem hepatis, aliorumq; membrorum nutritiuorum: in morbo laterali maxime conuenit.

Syrupus è cichorio eodem modo fit quo endiuixæ, similiter & syrupus è fumaria, reliquique syrupi simplices ex succis herbarum compositi, vt superiori libro dictum est cap. de Syrupis.

¶ Syrupus Endiuixæ compositus.

Recip. endiuixæ recentis,

Boraginis, Melissæ,

Scariolæ, Eupatorij ana. M.i.

Hepaticæ, Seminum frigid. maiorum ana ꝑ.i.

Buglossæ, Sandalorum albi, rubri ana ꝑ.i.

Florum cordialium ana ꝑ.ij.

Coquatur secundum artem in aqua, cola, & colaturæ adde

Succi endiuixæ depurati lib.v.

Vini granatorum ꝑ.ij.

Sacchari albi lib.iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Alia exēplaria habent succi endiuixæ depurati ꝑ.i.

¶ Alius syrupus Endiuixæ compositus, Gentilis, qui in vsu est.

Recip. succi endiuixæ,

Succi

Succi hepaticæ ana lib. iij.

Clarificatis ad ignem, adduntur

Violarum, Florum nymphææ,
Rosarum rubrarum, Lenticulæ aquaticæ,

Trichomanis, vulgò polytrichi ana ℥. s.

Capill. Veneris, hoc est adianti,

Hordei mundati,

Seminum frigidorum maiorum ana ℥. i.

Contusa & horas xij. in dictis succis macerata co-
quuntur, & colaturæ adduntur

Sacchari albi lib. iij.

Fiat syrupus: & aromatizetur cum

Santalorum { rubrorum,
 { alborum,

Berberis, Ligni aloës,

Seminum cydoniorum, Cinnamomi,

Corticum citri ana ℥. i.

Tunde & aromatiza secundum artem.

* Valet uterq; syrupus compositus endiuia ad im-
modicum iecoris, cordis & aliorum nutritioni ser-
uientium instrumentorum calorem, in summa ad
omnem calidam intemperiem. Soluit obstructions
& partes à calore debilitatas roborat.

¶ Syrupus de Cichorio compositus Ni-
colai Florétini.

Recip. intybi seu endiuia domestica & syluestris.

Cichorij, Glycyrrhizæ,
Taraxacon ana M. ij. Capillorum Veneris,

Cicerbitæ, Ceterach. i. aspleni,

Hepaticæ, Adianthi,

Lactucæ, Polytrichi,

Scariolæ, Cuscutæ ana ℥. vi.

Fumariæ, Radicum foeniculi,

Lupili ana M. i. Apij,

Hordei ℥. ij. Alparagi ana ℥. ij.

Vesicariæ. i. alkekangi,

Co-

Coquantur in sufficiēti aqua & percolentur, & cum
saccharo albo fiat syrupus : pro singulis libris inter
coquendum adde

Rhabarbari electi ℥.iiij.

Spicæ nardi ℥.iiij.

Tunduntur & in nodulo ligata suspenduntur in vase
in quo syrupus iam coctus referuatur, ac ibi relin-
quuntur.

* Confert aduersus omnem materiam venenatam,
& in febre pestilentiali. Corroborat cor, & instru-
menta nutritioni famulantia, expurgat per vrinas &
aluum, excitat appetentiam, & somnum inducit.

¶ Syrupus è fumarìa compositus Mesuræ.

Recip. myrobalanorum flauarum,

Cepularum ana ℥.ij.s. Epithymi,

Florum boraginis, Polypodij ana ℥.vij.

Buglossæ, Pruna C.

Violarum, Vuarû passarû purgatarû ℥.s.

Absinthij, Tamarindorum,

Cassuthæ ana ℥.i. Pulpæ cassiæ ana ℥.ij.

Glycyrrhizæ, Aquæ communis lib.x.

Rosarû rubrarû ana ℥.s.

Omnia præter cassiâ & tamarindos lento igne per-
coquuntur secundum artem, & colatur: in colatura
dissoluuntur ipsa cassia & tamarindi; deinde additis
Succi fumarïæ depurati,

Sacchari albi ana lib.iiij.

Rursus coquuntur in formam syrupi.

* Ventriculû & hepar roborat, obstructions ape-
rit, cutis morbos, præcipuè ab humore falso vel vsto
natos, vt psoriam, lepram impetiginè, serpiginè curat.

¶ Syrupes de Lupulo.

Recip. succi lupuli depurati lib.iiij.

Succi fumarïæ depurati lib.ij.

Sacchari lib.vi.

Fit syrupus secundum artem.

* Re-

* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem ictero laborantibus detrahit, pituitam in hydrope per aluum exigit.

¶ Syrupus myrtinus simplex Mesuæ.

Recip. succi baccarum myrti depurati lib. viij.
Sacchari clarificati lib. iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Ventriculū & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & sitim mitigat.

¶ Syrupus myrtinus compositus.

Recip. baccarum myrti ℥. xx.

Sanrali albi, Berberis ana ℥. xv.

Sumach. i. Rhois, Mespilorum ℥. l.

Balauftiorum, Aquæ fontis lib. viij.

Omnia coque ad medietatem, cola, colato adde

Succi granatorum,

Succi cydoniorum ana lib. s.

Sacchari lib. iij. & confice syrupum.

* Profluuium ventris etiam diurnum sistit, & sanguinis excreationem cohibet.

¶ Syrupus è Iuiubis Mesuæ.

Recip. iuiubas nu. lx. Seminum cydoniorum,

Violarum, Papaueris albi,

Seminis maluæ ana ℥. v. Melonis,

Capillorum Veneris, Lactuce,

Hordei mundati, Tragacanthi ana ℥. iij.

Glycyrrhizæ ana ℥. i.

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate,

& cum sacchari lib. duabus fiat syrupus.

* Confert raucitati, tussi & pleuritidi.

¶ Syrupus è Glycyrrhiza Mesuæ.

Recip. glycyrrhizæ ℥. ij. Hyssopi ℥. s.

Capillorum Veneris ℥. i. Aquæ pluuiæ lib. iij.

Macerentur horis xxij. coque ad dimidias, cola-

turæ adde

Mellis despumati,

H

Sac-

LIBER SECVNDVS

Sacchari clarificati,
Penidiorum alborum ana ℥.viij.

Aquæ rosarum ℥.vi. Fiat syrupus secundum artem.
* Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque diu-
turnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.

¶ Syrupus Capillorum Veneris simplex.

Recip. infusionis capillorum Veneris recentiu ter
factæ secundum artem lib.iiij.

Sacchari albi lib.ij. Coque, fiat syrupus.

¶ Syrupus Capill. Ven. compositus Magistralis.

Recip. capill. Veneris ℥.v.

Glycyrrhizæ rasæ ℥.ij.

Macerentur in aqua horas xxiiij. deinde coque ad di-
midij consumptionem: colaturæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum,

Aquæ capillorum Ven. ana ℥.viij.

Coque, fiat syrupus.

* Valent ad thoracis affectus calidos, & viscerum
obstructiones.

¶ Syrupus è corticibus Citri. *mas.*

Recip. corticum citri recentium lib.i.

Chermes ℥.ij.

Aquæ fontanæ lib.x.

Coquantur ad duarum tertiarum consumptionem,
& percolantur: colaturæ adduntur

Sacchari clarificati lib.ij.s.

Fiat syrupus secundum artem, & aromatizetur cum
moschi Orientalis ℥.iiij.

* Cerebrum, cor, stomachum roborat, & oris gra-
tiam commendat.

¶ Syrupus de Mentha maior Mesuæ.

Recip. succi pirorum cydoniorum,

Sruthiorum,

Granatorum dulcium,

Granatorum acidiorum,

Granatorum mezorum ana lib.i.s.

In

In quibus, horas 24. macera

Menthæ siccæ lib.i.s.

Rosarum rubrarum ℥.ij.

Coque igni lento ad dimidias, & cola, colaturę adde Mellis, siue Sacchari lib.ij.

Fiat syrupus vt artis est, & cum seponitur, aromatiza Galliæ moschatae ℥.iij. nodulo ligatis & ex orificio vasis suspensis.

* Ventriculū frigidū roborat, ob id nauſeam, vomitū, ſingultū, fluorem alui ſedat.

¶ Syrupus de Mentha minor Meſuæ.

Recip. ſucci menthæ depurati,

Granatorum dulcium,

Granatorum acidorum ana lib.i.

Sacchari, aut Mellis lib.i.

Fiat ſyrupus ſecundum artem.

* Eandem ferè cum ſuperiore facultatem habet.

¶ Syrupus de Abſinthio M.

Recip. abſinthij Romani lib.s.

Rosarum rubrarum ℥.ij.

Spicæ nardi ℥.iij.

Vini albi, veteris, boni, odori,

Succi cydoniorum ana lib.ij.s.

Maceratur in vaſe vitratō per noctem vnam, deinde decoquantur vt artis eſt, colaturę adde

Mellis lib.ij. Fiat ſyrupus.

* Ventriculū & hepar roborat, ob id appetētiā excitat, retentricem vim firmat: contra regium morbum prodeſt, flatus diſcutit, humoresque per vrinam pellit.

¶ Syrupus de Calamintha eiufdem.

Recip. calaminthæ montanæ,

Calaminthæ domesticæ ana ℥.ij.

Seminum leuiſtici,

Dauci,

Schoenanthi ana ℥.v.

H z

Paſſa-

LIBER SECVNDVS

Passarú purgatarum lib.s. Aquæ quantum satis est,
Mellis lib.ij. Fiat syrupus.

* Asthma, tussim antiquam, intemperiem viscerum
frigidam, & splenicos iuuat.

¶ Alius eiusdem.

Recip. fucci calaminthæ,
Granatorum acidorum
Vini albi odori ana lib.iiij.
Coque ad dimidias, & clarificato adde
Sacchari albi lib.iiij.

Fiat syrupus vt artis est, & aromatiza
Galliæ moschatæ ℥.ij.

* Singultum, & vomitum à pituita vel bile flaua
crassa sedat.

¶ Syrupus de Epithymo Mesuæ.

Recip. epithymi ℥.xx.
Myrobalan. flauarum,
indarum ana ℥.xv.

Cassuthæ,	Agarici,
Fumariæ ana ℥.x.	Stœchadis, ana ℥.vi.
Thymi,	Rosarum rubrarum,
Buglossæ,	Fœniculi,
Calaminthæ,	Anisi ana ℥.ij.s.
Myrobal. emblicarum,	Pruna nu.xx.
bellericarum,	Passarú purgatarum ℥.iiij.
Glycyrrhizæ,	Tamar indorum ℥.ij.s.
Polypodij,	Aquæ quod satis est,
Bulliant secundum artem: colaturæ adde Sacchari lib.iiij.	

Sapæ lib.ij. Fiat syrupus.

* Atram bilem, & alios humores vstos vacuat, ob
id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum,
vlcera maligna, fistulosa, lepram psoriam, præcauet,
curatque.

¶ Syrupus de Prasio Mesuæ.

Recip. marrubij, hoc est, prasi ℥.ij.

Capil-

Capillorum Veneris, Lini,
 Hyssopi, Iridis ana ꝓ.iiij.
 Calaminthæ, Seminum cydoniorum ꝓ.ij.
 Anisi ana ꝓ.vi. Vuarú passarú purgatarú ꝓ.ij.
 Radicum apij, Ficus passas pingues nu.xvi.
 Fœniculi ana ꝓ.v. Penidiorum,
 Seminum malux, Mellis ana lib.ij.
 Fœnigræci, Aquæ quod sufficit,
 Fiat syrupus.

* Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa,
 lenta, putri; hinc asthmatis, & antiquæ tussis prodest,
 quales affectus senibus & natura frigidis sunt fre-
 quentes.

¶ Syrupus de Hyssopo Mesuæ.

Recip. hyssopi ficci, Capillorum Ven. ꝓ.vi.
 Radicum apij, Iuiubas,
 Fœniculi, Sebesten ana nu.xxx.
 Petrofelini, Passarú purgatarú ꝓ.i.s.
 Glycyrrhizæ ana ꝓ.x. Ficus passas pingues,
 Hordei mundati ꝓ.iiij. Dactylos pingues añ.nu.x.
 Seminum malux, Penidiorum alború lib.ij.
 Cydoniorum ana ꝓ.iiij. fiat syrupus.

* Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, humo-
 resque excreatu contumaces extenuat & educit.

Syrupus de Stœchade simplex.

Recipit florum stœchadis ꝓ.xxx.

Thymi, Anisi ꝓ.vij.
 Calaminthæ, Passarum purgatarum ꝓ.iiij.
 Origani añ.ꝓ.x. Aquæ quod satis est.
 Coquantur secundum artem, & colaturæ adde
 Mellis lib.iiij.s.

Condiatur cum

Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Zingiberis ana ꝓ.i.s.

Ligenrur in sindone, & in syrupo suspendantur.

H 3 *Iuuat

LIBER SECVNDVS

* Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruotum, vt paralyfin, epilepsiam, conuulsionē, spasmus cynicum, tremorem.

¶ Syrupus de Stœchade compositus Mesuæ.

Recip. florum stœchadis ℥.xxx.

Thymi,	Piperis longi ℥.iij.
Calaminthæ,	Zingiberis ℥.ij.
Origani ana ℥.x.	Passarum ℥.iiij.
Anisi,	Aquæ quod satis est,
Pyrethri ana ℥.vij.	Mellis lib.v.

Fiat syrupus lento igni, deinde aromata subsequētia leuiter contusa, panno raro ligata in eo suspendes;

Cinnamomi,	Croci,
Calami aromatici,	Zingiberis,
Spicæ nardi,	Piperis longi, & nigri, añ. ℥.i.s.

* Idem quod præcedens efficit.

¶ Syrupus de Nymphaea simplex Nicolai.

Flores nymphaeæ, quot uoles macerato, ac ter flores mutato, horum infusionis accipies lib.iiij.

Sacchari quod sufficit, Fiat syrupus.

* Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoque mirificè ardentibus alijsque febribus acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

¶ Syrupus de Nymphaea compositus Francisci Pedemontani.

Recip. florum nymphaeæ albæ ℥.ij.

Florum nymphaeæ luteæ,

Semin. pŷyllij integri,

Sem. acetosæ ana ℥.i.

Seminum cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Melonum,

Lactucæ ana ℥.s.

Seminum endiuæ domesticæ,

Endiuæ syluestris,

Por-

Portulacæ ana ℥.ij.
 Radicum foeniculi ℥.i.
 Coquantur in aqua hordei sufficienti, & colaturæ
 adduntur
 Sacchari lib.i.
 Vini granatorum acidorum,
 Aceti albi ana ℥.ij.
 Fit syrupus, & aromatizatur cum
 Santali citrini,
 Spicæ nardi indicæ ana ℥.i.s.

* Idem quod præcedens potest, estq; eo validius.

¶ Syrupus è papauere simplex Mesuæ.

Recip. capitum papaueris albi,
 & nigri recentium ana ℥.lx.

Aquæ pluuiæ lib.iiij.
 Coquantur ad consumptionem librarum duarum
 & dimidiæ aquæ, & additis
 Sacchari,
 Penidiorum ana ℥.vi. Fiat syrupus.
 * Aduersus catarrhum, & sitim prodest, somnumq;
 conciliat.

¶ Syrupus è papauere compositus Mesuæ.

Recip. papaueris albi, & Iuiubas numero. xxx.
 nigri ana ℥.l. Seminum, lactucæ,

Capillorum Veneris ℥.xv. Maluæ,
 Glycyrrhizæ ℥.v. Cydoniorū añ. ℥.xi.
 Coque in libris quatuor aquæ ad dimidij consum-
 ptionem, & cum Sacchari,
 Penidiorum ana ℥.viij. Fiat syrupus.

* Valet ad tussim ficcā, phthisim, catarrhum ca-
 lidum & aerem, somnumque conciliat.

¶ Syrupus de Eupatorio Mesuæ.

Recip. radicū foeniculi, Schoënanthi,
 Apij, Cuscute,
 Endiuicæ ana ℥.ij. Absinthij,
 Rosarum ana ℥.vi.

H 4 Capil-

LIBER SECVNDVS

Capillorum Veneris,	Mastichis ana ʒ.iiij.
Cardui benedicti,	Spicæ nardi,
Radicū cardui benedicti,	Alari,
Florum buglossæ,	Folij ana ʒ.ij.
Anisi,	Aquæ lib.vij.
Feniculi,	Succorum apij,
Eupatorij ana ʒ.v.	Endiuæ ana lib.ij.
Rhabarbari electi,	Sacchari lib.iiij.

Coquantur & fiat syrupus.

* Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitijs, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, maloque corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, vrinas, flatus dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur.

¶ Syrupus è Polypodio compositus.

Rec. Polypodij quercini ʒ.x.	Alari ana ʒ.s.
Melissæ,	Senæ,
Buglossæ ana M.s.	Epithymi ana ʒ.i.
Cyperij,	Seminum lactucæ,
Corticum radicis capparidis,	Endiuæ,
Acorij,	Scariolæ añ. ʒ.i.s.

Coquantur in aqua secundū artē, & colaturæ adde Rosati colati lib.i. Fiat syrupus.

* Humores crassos ac lentos digerit ac vacuat, bilem atram, & pituitam crassam & lentam purgat etiam à iuncturis: Affectibus ob id melancholicis prodest, vt quartanis, & splenis duritiei.

¶ Syrupus de Pomis simplex Mesuæ.

Recip. succi pomorum dulcium,
& acetosorum ana lib.v.

Coque ad dimidij consumptionem, & colaturæ adiunge

Sacchari clarificati lib.iiij. Fiat syrupus.

* Cor imbecillum roborat, ob id cordis syncopen & tremorem sanat.

¶ Syrupus de Pomis Saporis.

Recip.

Recip. succorum boraginis,

Buglossæ ana lib. iij.

Succi pomorum dulcium lib. iij.

Foliorum senæ ℥. iij.

Croci ℥. ij.

Maceretur sena in dictis succis horas xxiiij. Coque

& cola, colaturæ adde Sacchari lib. iij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet, ligatum
in panno lineo raro.

* Efficacior est præcedenti.

¶ Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

Recip. quinque radicum ana ℥. i.

Seminum quatuor frigidorum maiorum ana ℥. i. s.

Hyslopi,

Capillorum Veneris,

Ceterach id est, aspleni ana M. s.

Violarum,

Hermodactylorum,

Florum rorismarini

Cuscuthæ, ana ℥. s.

boraginis añ. M. i. s. Anisi,

Cyperii ℥. iij.

Feniculi,

Camomillæ ℥. ij.

Carui ana ℥. ij. s.

Passarū corinthiacarū ℥. i.

Polypodij ℥. iij.

Senæ ℥. ij.

Agarici ℥. ij.

Coquantur in aquæ lib. iij. & colaturæ adde

Sacchari lib. i. s.

Rhabarbari ℥. iij. s.

Rosarum ℥. i.

Turbith ℥. iij.

Hæc tenuissimè trita, in q̄; panno ligata suspendes in
syrupo cocto secundum artem.

ECLEGMATA, SEV LOCH.

Sectio quarta.

¶ Diacodion, Galeni: hoc est Diacodion simplex.

Recip. capita papaveris albi, mediocri magnitu-
dine, nec nimium viridibus, nec nimium matu-

H § ris