

LIBER SECVNDVS

Opij,	Piperis albi ℥.i.s.
Cardamomi,	Sapæ q.f.
Castorij ana ℥.iiij.	fiant pilulæ.

* Phthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis, educunt pelliculas & repurgant sufficienter: verùm immorari pharmaco oportet.

PASTILLI, SEV TROCHISCI, ET
COLLYRIA SIVE SIEF.

Seçtio Octaua.

¶ Trochisci de Vipera Galeni.

Recip. viperas num. xx.
Sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore capte sunt, sed à medio potissimum. Aprile in finem vsque Maij, aut paulò tardius, locisque procul à mare disitis. Eligendæ sunt foemina, quæque colore subflauo sint, non prægnantes, quæ caput latius habeant & depressum, collum longius, graciliusque quàm mares, ventre vastiores, cauda minore, quæ non inuoluta est, sed potius contorta & distensa, in cessu quieti proximo, quæ tamen postremas partes in incessu magis moueant, aspectu ferino & inuerecundo, oculis subrubentibus, & recens captæ. Capita primùm & caudas amputabis quatuor digitorum longitudine vtrinque: his amputatis considerandum est si motum quendam in ipsis residuum conspicias, sanguinemque multum fundent, nam hæc ceu præstantissimæ, sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, interanea cum adipe abijcienda erunt, reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto è carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec car-

acs

nes à spinis separentur. Cùm coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes nulla iusculi addita parte, & addito puluere panis biscosti maximè puri, quàm pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad meridiem conuersa, à puluere diligèter mundata, sæpè autem cõuertendi sunt, per quindecim dies aut eo amplius, donec probè exsiccati fuerint, deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum vnum integri perseuerant, quantum longè melius sit, haud multo postquam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam qui illis obnasci consueuit, qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo, conseruari possunt integri ad tertium annum.

¶ Trochisci de Scylla Galeni.

Scillam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detractò, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & ea perforata, stilo ligneo tentabis num scilla vndiq; tenera sit: Ea exempta partem interiorem diligenter teres, cui admisceris farinæ erui tenuissimè cribratæ vncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium in cella probè mundata. Meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probè siccati sint, deinde repones vt supra dictum est de pastillis viperinis.

¶ Hedyroum Andromachi ex Galeno.

Recip. mari,
Asari,

Maioranæ,
Alpalathi ana ʒ. ij.

Schœ-

LIBER SECVNDVS

Schoenanthi,	Folij,
Calami odorati,	Nardi indicæ,
Phu,	Croci,
Xylobalsami,	Casæ, ana ꝑ. vi.
Opobalsami,	Amomi ꝑ. xij.
Cinnamomi,	Mastiches ꝑ. i.
Costi, ana ꝑ. iij,	Vini q. f.

Myrrhæ,
fiant trochisci, inunctis prius manibus opobalsamo;
deinde siccantur vt superiores.

¶ Crocomagma Damocratis ex Galeno.

Recip. croci ꝑ. c.	Amyli,
Myrrhæ,	Gummi arabici añ. ꝑ. xxx.
Rosarú rubrarú ana ꝑ. l.	Vini q. f.

fiant trochisci.

¶ Cyphi Damocratis.

Recip. pulpæ passularum,	
Terebinthinæ coctæ ana ꝑ. iij.	
Myrrhæ,	Cyperj,
Schoenanthi ana ꝑ. i. s.	Baccarú iuniperi añ. ꝑ. iij.
Calami aromatici ꝑ. ix.	Aspalathi ꝑ. ij. s.
Cinnamomi ꝑ. iij.	Croci ꝑ. i.
Vnguis odorati,	Mellis q. f.
Nardi indicæ,	Vini modicum,
Casæ,	forma trochiscos.

* Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque inter-
narumque partium exulcerationes.

¶ Trochisci Alhandal. Mesuræ:

Recip. pulpæ colocynthidis ꝑ. x.	
minutim incisa fricetur cum	
Olei rosarú ꝑ. i.	Gummi arabici,
Tragacanthi,	Bdellij ana ꝑ. vi.

Macerentur quadriduum in aqua rosacea, his colatis
& expressis partem vnã cum colocynthide per-
miscibus, & fiet massa, quæ siccata in Sole, rursum ter-
retur, atque addetur altera pars colaturæ, & forma-
buntur

buntur trochisci, qui iniici possunt in omnes compositiones quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt.

¶ Trochisci de Agarico Mesuæ.

Recip. agarici ℥.iiij.

Salis gemmæ ℥.s.

Zingiberis ℥.iiij.

Oxymelitis q.f.

Agaricū lima cōfringendum, & formandi trochisci.

* Purgāt ex cerebro, & capite phlegma crassum cū cholera mixtum. Et præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

¶ Agaricum Trochiscatum Mesuæ.

Recip. agarici electi ℥.iiij.

Vini in quo maceratum sit Zingiber q.f.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci.

Additur insuper gummi, aut tragacantha vt in vniuersalibus dictum est, & potest iniici in omnes compositiones in quas agaricū ingreditur, vires enim habet agarici, & tutius agit minoreq; vetriculi noxa.

¶ Trochisci Diarhodon Nicolai.

Recip. rosarum recentium ℥.iiij.

Spodij ℥.ij.

Santali rubri ℥.i.s. G.vij.

Santali albi ℥.i. G.xij.

Croci ℥.ij. G.vij.

Camphoræ G.xij.

fiunt in hunc modū. Rosas recentes in mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerē redacta addes, ac cū aqua rosacea q.f. formabis, sub finē camphorā addito, sicca in umbra, ac serua.

* Hæc compositio administratur in magnis compositionibus Nicolai.

¶ Trochisci Diarhodon Mesuæ.

Recip. rosarum rubrarum ℥.ix.

Ligni aloës.

Nardi

LIBER SECVNDVS

Nardi indicæ ana ℥.iij. Mastiches ℥.ij.
 Glycyrrhizæ ℥. iij. s. Croci ℥.ij. s.
 Spodij ℥. i. s. Vini albi q. f.
 fiant trochisci.

* Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhaerentes detergendos.

¶ Trochisci de Rosis Rafis ex Mesue.

Recip. rosarum rubrarum ℥. s.
 Ligni aloës ℥. ij. Nardi indicæ,
 Mastiches ℥. i. s. Casiæ,
 Absinthij, Schœnanthi ana ℥. i.
 Cinnamomi,

fac trochiscos cū vino antiquo, & decoctione quinque radicum.

* Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma corrumpitur.

¶ Trochisci de Camphora Mesuæ.

Recip. foliorum rosarum rubrarum ℥. iij.
 Spodij ℥. ij. Gummi arabici,
 Santali citrini ℥. ij. s. Nardi indicæ ana ℥. i.
 Croci ℥. i. Ligni aloës,
 Glycyrrhizæ ℥. ij. Cardamomi maioris,
 Seminum citruli, Amyli,
 Melonis, Camphoræ ana ℥. ij.
 Cucumeris, Sacchari albi,
 Cucurbitæ, Mannæ ana ℥. ij.

Tragacanthæ,
 forma trochiscos cum mucagine feminis psyllij extracta cum aqua rosacea.

* Ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his fitim inexpletam, icterum quoque, ac phthisim & hecticam conferunt.

¶ Tro-

¶ Trochisci de Gallia Moschata Mesuæ.

Recip. ligni aloës ℥.v.

Ambræ ℥.iiij.

Moschi ℥.i.

Muccaginis tragacathæ, extractæ cū aqua rosarū q.f.
fiant trochisci parui.

* Cerebrum, corque roborat, oris atque adeo corporis totius odorem commendat, compositionibus alijs miscetur.

¶ Alipta Moschata Nicolai.

Recip. ladani ℥.iiij. Ambræ ℥.i.

Styracis ℥.i.s. Camphoræ ℥.i.s.

Styracis rubræ ℥.i. Moschi ℥.s.

Ligni aloës ℥.ij. Aquæ rosaceæ q.f.

formentur trochisci secundum artem.

* Valet pueris laborantibus asthma, & ijs qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatque usum optimi & odoriferi suffitus.

¶ Trochisci Ramich Mesuæ.

Recip. succi acetosæ ℥.xvi.

Rosarum ℥.i.

Baccarum myrti ℥.ij.

Boli pauxillum, colentur, & colaturæ adiunge

Gallarum tritarum ℥.iiij.

Coque aliquantulum, cola, & adde insuper subse-

quentia bene trituro

Rosarum ℥.i.

Santali citrini ℥.x.

Gummi arabici ℥.i.s.

Sumach,

Spodij, ana ℥.i.

Omphacij seu agrestæ ℥.vij.

Baccarum myrti bene tritarum ℥.iiij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

N

Nucis

LIBER SECVNDVS

Nucis moschata ana ꝑ.iiij.

Misce omnia, & siccentur in scutella figulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum ꝑ.i.s. de camphora & aqua rosacea q.f.

Succi acetosæ loco, sumi potest vinum è codonijs acerbis: sunt qui aromatizent Gra.xviij.moschi.

* Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera ac intestina, cholera morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquilum, omnem hæmorrhagiam cohibet: os quam naribus sanguine cohibet, os quâ naribus sanguine fluëtibz stando impellitur, alijs medicamētis miscetur.

¶ Trochisci de Rhabarbaro Mesuæ.

Recip.rhabarbari boni ꝑ.x.

Succi eupatorij,

Amygdalarum amararum ana ꝑ.iiij.

Rosarum, Seminis apij,

Nardi indicæ, Absinthij,

Anisi, Asari ana ꝑ.i.

Rubiæ, Aquæ cuscuthæ q.f.

fiant trochisci ponderis drachmæ vnius cū dimidia.

* Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturâ, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

¶ Trochisci de Violis magistrales.

Recip.violarum nigrarum ꝑ.vi.

Turbith ꝑ.iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Mannæ,

Scammonij præparati ana ꝑ.ij.

formentur trochisci. fiunt etiam sine scammonio.

* Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, flatusque dissipant.

¶ Trochisci ligni aloës Mesuæ.

Recip.ligni aloës,

Rosarum rubrarum ana ꝑ.ij.

Masti-

Mastiches,	Cardamomi maioris,
Cinnamomi,	Pastinacæ,
Caryophyllorum,	Galliæ,
Nardi indicæ,	Corticis citri ana ꝑ.i.s.
Macis,	Moschi,
Nucis moschatæ,	Ambræ ana ꝑ.s.
Cubebæ,	Mellis passulati q. s.
Cardamomi minoris,	formentur trochisci.

* Ventriculum, cor, hepar imbecilla roborant : ob id valent ad oris foetorem, pulsuum cordis, & syncope & hydropem.

¶ Trochisci de Croco Nicolai.

Recip. croci ꝑ.ij.	Myrrhæ ana ꝑ.i.s.
Rosarum rubrarum,	Ligni aloës ꝑ.ij.
Ammi,	Aquæ rosacæ q. s.

fiant trochisci.

¶ Trochisci de Eupatorio Mesuræ.

Recip. mannæ electæ,	Spodij ꝑ.ij.s.
Succi eupatorij ana ꝑ.i.	Rhabarbari electi,
Rosarum rubrarum ꝑ.s.	Asari,
Nardi indicæ ꝑ.ij.	Anisi ana ꝑ.ij.

Fiant trochisci cum succo eupatorij.

* Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

¶ Trochisci de Absinthio Mesuræ.

Recip. rosarum,	Seminis apij,
Absinthij,	Amygdalarum amararum,
Anisi ana ꝑ.ij.	Nardi indicæ,
Rhabarbari,	Mastichis,
Succi eupatorij,	Folij ana ꝑ.i.
Asari,	Succi endiuicæ q. s.

Formentur trochisci.

* Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

LIBER SECVNDVS

¶ Trochisci de Aniso Mesuræ.

Recip. anisi,	Afari,
Succi eupatorij ana ʒ.ij.	Apij,
Seminis anethi,	Amygdalarum amararum ana ʒ.s.
Nardi indicæ,	Aloës ʒ.ij.
Mastiches,	Syrupi absinthij q.f.
Folij.	formentur trochisci.
Foliorum absinthij,	

* Obstructiones hepatis, & alios eius morbos & inde natas febres antiquas sanant.

¶ Trochi. seu Pastilli Hepatici Asclepiadis ex Galeno.

Recip. anisi	Amygdalarum,
Seminis apij,	Absinthij ana ʒ.iiij.
Afari,	Aqua pluuix q.f.
fiant trochisci.	

* Hepaticos iuuant, habent enim hepar expurgandi per vrinas, dantur cū vino, febrientibus cū aqua.

¶ Troch. seu Pastilli ex Amygdalis amaris Pauli.

Recip. anisi,	Amygdalarum amararum ana ʒ.ij.
Apij,	Aquæ q.f.
Afari,	fiant pastilli.
Comarum absinthij,	

* Idem præstant. Dantur feбри carentibus ex multo, febricitantibus cum hydromelite.

¶ Trochisci de Capparibus Mesuræ.

Recip. corticum radicum capparibus,	
Seminis agni ana ʒ.vi.	Foliorum rutæ,
Seminis nigellæ,	Aristolochiæ rotundæ,
Calaminti,	Seminis nasturtij,
Succi eupatorij,	Ammoniaci ana ʒ.ij.
Acori,	Cyperij,
Amygdalarum amararum,	Ceterach ana ʒ.i.
Ammoniacum dissoluito, & reliqua triturato: deinde fiant trochisci.	

* Ad splenis duritiæ & flatus eius dissipandos valent.

¶ Tro-

¶ Trochisci de Myrrha Rhafis.

Recip. myrrhæ ʒ. iij. Cumini,
 Lupinorum ʒ. v. Rubiæ,
 Foliorum rutæ, Afæ foetidæ,
 Mentastri, Sagapeni,
 Pulegij, Opopanacis ana ʒ. ij.

Dissoluuntur gummi in aceto, formanturque trochisci cum absinthij succo.

* Prouocant menstrua, & sedant dolores qui ex re-tentis menstruis proueniunt.

¶ Trochisci de Lacca Mesuæ.

Recip. laccæ, Afari,
 Succij glycyrrhizæ, Amygdalarū amararum,
 { eupatorij, Rubiæ,
 Absinthij, Seminis apij,
 Berberis, Seminis anisi,
 Rhabarbari, Schoenanthi ana ʒ. i.
 Aristolochiæ longæ, Vini q. s.
 Costi, formentur trochisci.

* Valent ad obstructiones hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

¶ Trochisci de Berberis Mesuæ.

Recip. berberis ʒ. ij. Galliæ moschatæ,
 Spodij, Nardi indicæ ana ʒ. i.
 Ligni aloës, Gummi arabici ʒ. iij.
 Seminis acetosæ, Rosarum rubrarum ʒ. v.
 Mastichis, Aquæ rosarum q. s.
 formentur trochisci.

* Valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

¶ Trochisci de Spodio Mesuæ.

Recip. rosarum rubrarum ʒ. i. s.
 Spodij ʒ. x.
 Seminis acetosæ ʒ. vi.
 Seminis portulacæ,

LIBER SECVNDVS

Coriandri præparati, Berberis ana ℥.ij.
 Sumach ana ℥.ij.s. Gumi arabici affati ℥.i.s.
 Amyli vsti, Agrestæ q.f.
 Balaustiorum, formentur trochisci.

* In febribus biliosis cū alui fluore efficaces sunt:
 Inflammationem ventriculi & hepatis & sitim con-
 tinuam sedant.

¶ Pastilli dia spermatoen Galeni.

Recip. seminis apij, Opij,
 Ammi ana ℥.i. Cassiæ ana ℥.ij.
 Anisi, Aquæ pluuiæ q.f.
 Fœniculi ana ℥.s. formentur trochisci.

* Dantur ex passo, aut aqua, sedant dolorē, ad om-
 nes internos affectus, & pleuritidas vtiles sunt, &
 sanguinem reiectantibus.

¶ Trochisci de Corallo Nicolai,

Recip. coralli rubri, Cassiæ,
 Cinnamomi, Folij,
 Myrrhæ, Mastiches,
 Amomi, Phu,
 Seminis papaueris añ. ℥.s. Polij montani,
 Schoenanthi, Afari,
 Croci ana ℥.ij. Pedis columbini ana ℥.i.
 Calami aromatici, Vini q.f.
 Xilobalsami, formentur trochisci.

* Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, coelia-
 cis, cibum fastidientibus mirè subueniunt.

¶ Dia Corallu Galeni.

Recip. coralli rubri, Seminis hyoscyami,
 Terræ samix ana ℥.i. Opij,
 Balaustiorum, Hypocistidis ana ℥.ij.
 Amyli, Succij plantaginis,
 Terræ lemnix ana ℥.iiij. formentur trochisci.

* Ad eadem efficac.

¶ Trochisci de Terra sigillata Mesuæ.

Recip. sanguinis draconis,

Gummi

Gummi arabici affati,	Coralli rubri,
Trochiscorum ramich,	Charabæ ana ʒ.ij.
Rosarum rubrarum,	Margaritarum,
Spodij,	Tragacanthæ,
Seminis rosarum,	Seminis papaueris nigri,
Amyli affati,	ana ʒ.i.s.
Acaciæ,	Seminis portulacæ,
Lapis hæmatitis,	Cornu cerui vsti,
Hypocistidis,	Thuris,
Balauftiorum,	Gallarum,
Boli armenici,	Croci ana ʒ.ij.
Terræ sigillatæ,	Aquæ plantaginis q.f.
Formentur trochisci.	Qui volet cum opio addat
Opij ʒ.ij.	

* Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, frõti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti, vel pubi illiti: ad miætum sanguinis, in vesicam iniecti: & ad alias hæmorrhagias, parti sanguinis fluenti impositi.

¶ Trochisci de Carabe Mesuæ.

Recip. charabæ ʒ.ix.	Mastiches,
Cornu cerui vsti,	Laccæ,
Gummi arabici affati,	Papaueris nigri affati,
Coralli rubei vsti,	ana ʒ.iiij.
Tragacanthæ,	Thuris,
Acacia,	Croci,
Hypocistidis,	Opij ana ʒ.ij. gr.xv.
Balauftiorum,	Mucilaginis psyllij q.f.
Formentur trochisci.	

* Vtiles sunt ad constringendum sanguinem vndeunque fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

¶ Pastilli Dia electru Galeni.

Recip. psyllij,

N 4 Iridis

LIBER SECVNDVS

Iridis, Succini ana ℥.xxx.
 Mastiches, Opij ℥.xv.
 Pſyllium aqua calida macerato, atque iam expreſſa
 mucilagine Paſtillos ſecundum artem formato.

* Fluxum ſanguinis præſertim à thoraçe, pulmone,
 hepate, renibus, vtero hæmorrhoidibus cum ſucco
 plâtaginis vel polygoni, aut vino granatorû ſumpti.

¶ Trochiſci Stellæ Auicennæ.

Rec. lapidis ſtellaris ℥.v. Corticis mandragoræ,
 ana ℥.s.

Coſti,	
Opij,	
Croci ana ℥.v.	
Myrrhæ,	Seminis { papaueris albi, Dauci, Aniſi, Hyoſcyami, Apij,
Caſtorij,	
Nardi indicæ,	
Caſiæ,	
Terræ ſigillatæ,	Sileris montani,
Gummi macerantur in vino, reliqua terantur, & for mentur trochiſci.	Styracis liquidæ ana ℥.i.

* Conueniunt ſtomachi eructationibus, dolori ca-
 pitis & dentium, catarrhis, ſanguinis ſputum & pro-
 fluuium ſanant, & periodicas febres.

¶ Aſter Galeni.

Recip. croci ℥.s.	Caſtoſei ℥.ij.
Seminis {	Hyoſcyami, Opij ℥.iij.
	Apij añ. ℥.vi. Myrrhæ ℥.ij.
Aniſi,	Succi mandragoræ ℥.s.
Styracis,	Piperis albi ℥.vi.
Dauci ana ℥.s.	Aquæ pluuiæ q.ſ.
Fiant trochiſci.	

* Datur ex aqua, fiſtit dolorem, hoc vti poſſumus
 ad omnem fluxum, dolorem, & omnes internos af-
 fectus, & deſtillationes, ad veſicam, ad ſuffocatio-
 nes, fluxum muliebrem, ſtomachi fluxionem, dyſen-
 tericos, & ſanguinem reiſcipientes.

¶ Trochiſci Alkekengi Meſuæ.

Recip.

Recip. fructus alkekengi ꝓ.iiij.

Seminis } Citrulli,
 } Cucumeris,
 } Cucurbitæ ana ꝓ.iiij.s.

Boli armenici, Amyli,
 Gummi arabici, Pinearū mūdārū añ.ꝓ.vi.
 Thuris, Seminis apij,
 Sanguinis draconis, Carabæ,
 Seminis papaueris albi, Terræ figillatæ,
 Amygdalarū amararum, Hyofcyami,
 Succij glycyrrhizæ, Opij ana ꝓ.ij.
 Tragacanthæ, Iulepi violati q.f.
 Formentur trochisci.

* Valent ad renum & vesicæ vlcera & natam inde dysuriam.

¶ Pastillus Andronius ex Andromacho.

Recip. florum mali punici ꝓ.x.

Gallæ omphacitidis ꝓ.viiij.

Myrrhæ,

Aristolochiæ ana ꝓ.iiij.

Calcanthi

Aluminis scifsilis } ana ꝓ.ij.

Misy

Formentur trochisci cum

Sapæ q.f.

* Facit ad recentia vulnera & vetera, curat fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta, reprimat omnem carnis excrescentiam: valet ad phagedænas & condylomata.

¶ Pastilli Polyidæ ex Andromacho.

Recip. florum mali punici ꝓ.xij.

Aluminis scifsilis ꝓ.iiij. Calcanthi ꝓ.ij.

Thuris, Fellis taurini ꝓ.vi.

Myrrhæ ana ꝓ.iiij. Aloë ꝓ.viiij.

Formentur pastilli cum

Vini austeri q.f.

N 1 *Ad

LIBER SECVNDVS

* Ad nomas, & eadem ferè quæ præcedens potest.

¶ Pastilli Musæ.

Recip. aluminis scissilis Croci,
Aloës,
Myrrhæ,
Calcanthi ana ꝑ. vi.
Formentur pastilli cum
Vini odorati &
Mellis ana q. f.

Crocomagmatis añ. ꝑ. iij.
Florum malorū granato-
rum domesticorū ꝑ. iij.

* Pastillus multiplicis vsus, pus educens, & relaxas.

¶ Trochisci de Minio erodentes Ioannis de Vigo.

Recip. Medullæ panis non cocti bene fermenta-
ti ꝑ. iij.

Sublimati electi ꝑ. i.

Minij ꝑ. s.

Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci, qui in chibano tepente resiccati
feruentur.

* Omnes carnis prauas excrementas liquat, sordi-
da vlcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mira-
biliter sanat.

¶ Sief album Mesuæ.

Recip. sarcocollæ in lacte asinino macerata ꝑ. v.

Amyli ꝑ. s.

Thuris ꝑ. i. s.

Tragacanthæ ꝑ. iij.

Ceruse lotæ ꝑ. x.

Opij ꝑ. i.

Aquæ pluuiæ q. f.

Fiat sief.

* Confert ophthalmiæ cum est in augmento, &
dolorem sedat.

¶ Aliud simile eiusdem.

Recip. gummi arabici, Ceruse lotæ ꝑ. vi.

Tragacanthæ,

Opij ꝑ. i.

Amyli ana ꝑ. iij.

fac sief cum

Oui albumine.

Fit etiam sine opio.

* Hic vtimur initio vehemētis doloris à causa calida.

¶ Try-

¶ Trypherum Galeni.

Rec. cadmię lotę ʒ. xvi. Gummi,
 Cerusę ʒ. viij. Tragacanthę ana ʒ. iij.
 Amyli, Opij ʒ. ij.

Fiat collyrium cum

Aquę pluuię q. f.

* Ad epiphoras, & affectiones oculorum : vide sequens.

¶ Aliud Galeni.

Rec. cadmię lotę ʒ. xvi. Cerusę ʒ. xlvij,
 Amyli, Opij ʒ. vi.
 Thuris ana ʒ. viij. Gummi ʒ. xvi.

Fiat collyrium cum

Aquę pluuię q. f.

* Ad inustiones oculorum, pustulas, chemoseis, maximè in his, qui nullam mordacitatem perferre possunt.

¶ Cygnus Galeni.

Recip. cadmię ʒ. xvi. Acacię,
 Cerusę lotę ʒ. viij. Opij ana ʒ. ij,
 Amyli, Gummi ʒ. xij.
 Tragacanthę, fiat collyrium cum

Aquę pluuię q. f.

* Ad maximos dolores & affectiones oculorum,

¶ Dia rhodon Nilei ex Galeno.

Recip. rosarum. ʒ. iij. Opij,
 Croci ʒ. ij. Nardi indicę ana ʒ. i.
 Gummi ʒ. iij. Aquę pluuię q. f.
 fiat collyrium.

* Ad doloris molestias, fluxum vberem, ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

¶ Aliud Mesuę, Sief de rosif dictum.

Recip. foliorum rosę ʒ. xv.

Croci,

Gummi arabici ana ʒ. viij.

Opij,

Nardi

LIBER SECVNDVS

Nardi indicæ ana ʒ.ij.

fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Eadem quæ præcedens potest.

¶ Collyrium seu Sief de Thure.

Recip. cadmiæ,

Opij,

Pompholigis,

Gummi ana ʒ.vi.

Thuris ana ʒ.x.

Aquæ pluuiæ q.f.

Cerufæ ʒ.xl.

fiat collyrium.

* Ad fluxiones oculorum & chemoseis.

¶ Aliud Mesuæ.

Recip. thuris ʒ.x.

Sarcocollæ ana ʒ.v.

Ammoniæ,

Croci ʒ.ij.

fiat sief cum

Mucilaginis foenigræci q.f.

* Vlcera oculorum ducit ad maturitatem.

¶ Collyrium Nardinum.

Recip. cadmiæ,

Acaciæ ana ʒ.x.

Croci,

Nardi indicæ ʒ.iiij.

Gummi ana ʒ.xij.

Opij,

Aeris vsti ʒ.v.

Myrrhæ ana ʒ.v.

Stibij, id est, antimonij,

Vini q. f.

fiat collyrium.

* Ad doloris vexationes, fluxum tenuem & multum, pustulas & aspretudines oculorum.

¶ Dia œnu.

Recip. cadmiæ,

Aeris vsti ʒ.vij.s.

Lapidis hæmatitæ,

Chalcitidis ʒ.vij.

Aluminis scissilis ana ʒ.x. Seminis papaueris ʒ.v.

Maceretur semen papaueris in aquæ pluuiæ q.f. Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium cum vini austeri q.f.

* Ad claritatem & cicatrices oculorum.

¶ Diæ hæmatites.

Recip. æris vsti & loti ʒ.xxiiij.

Lapidis hæmatitæ ʒ.i.

Croci

Croci,
Opij ana ʒ.iiij.
fiat collyrium.

Gummi ʒ.xij.
Aceti q.f.

* Aspretudinibus commodum: facit ad veteres affectiones, ad ficosa, & ad omnem extuberantiam oculorum.

¶ Diamyrtha.

Recip. cadmiæ lotæ ʒ.xxviiij.
Lapidis hæmatitæ vsti & loti ʒ. xxv.
Spodij ʒ.xxiiij. Piperis albi, Gr.nu.xxx.
Myrrhæ ʒ.vi. Gummi ʒ.vi.
Crocij ʒ.s. Vini q.f.
Opij ʒ.i.

* Accommodatum est ad veteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopas.

¶ Viride Antei.

Recip. cadmiæ ʒ.vi. Squammarum æris,
Myrrhæ ʒ.iiij. Nardi indicæ,
Crocij ʒ.vi. Acaciæ ana ʒ. vi.
Opij ʒ.iiij. Gummi ʒ.xxiiij.
Plumbi vsti & loti ʒ.i.
fiat collyrium cum aquæ pluuiæ q.f.

* Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

¶ Aliud viride.

Recip. cadmiæ vstæ, & vino odorato extinctæ ʒ.i.
Crocij,
Stibij, id est, antimoniij vsti & in lacte extincti añ. ʒ.
Amyli ʒ.i. (iiij).
Gummi ʒ.ij.
Succi anagallidis foemineæ q.f.

* Ad idem valet.

¶ Aliud Mesuræ.

Recip. æruginis æris ʒ.iiij.
Calcanthi vsti ʒ.vi.
Auripigmenti rubri,

Spumæ

LIBER SECVNDVS

Spumæ nitri,
 Spumæ maris ana ꝑ.i.
 Ammoniâci ꝑ.i.s.
 Salis hammoniâci ꝑ.s.
 Ammoniâcum mâcerato in aqua rutæ, & fac collyrium.

* Eiusdem facultatis est ferè cû sief rubro sequenti.
 ¶ Sief rubrum Mesuæ.

Recip. feminis cannabis ꝑ.iiij.

Aeris vsti, Piperis nigri ꝑ.s.
 Myrrhæ ana ꝑ.ij. Aquæ pluuiæ q.f.
 Croci ꝑ.i. Si voles acrius, adde

Aeruginis æris,
 Salis hammoniâci ana ꝑ. s. fiat sief.

* Vtile est oculorum scabritiei, pruriginique, suffusionibus & vngui.

¶ Aliud Galeni.

Recip. cadmiæ ꝑ.xl. Piperis albi,
 Chalcitidis vstæ, Gummi ana ꝑ. xx.
 fiant pastilli cum Aquæ q.f.

* Ad lippitudinem, sycosin, & carnis excrementias.

¶ Sief luteum Mesuæ.

Recip. cadmiæ lotæ, vstæ, & in lacte muliebri mâceratæ ꝑ. x.

Cerusæ lotæ ꝑ. viij. Tragacanthæ,
 Squammæ ferri ꝑ. iiij. Gummi arabici ana ꝑ. iiij.
 Opij ꝑ. ij. fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Confert doloribus oculorum vehementibus à causâ calida.

¶ E cornu Ceruino.

Recip. cornu cerui vsti & loti,
 Thuris, Opij, ꝑ. i.
 Plûbi vsti & loti añ. ꝑ. iiij. Gummi ꝑ. iiij.
 Squammæ æris lotæ ꝑ. ij. fiat collyrium cum
 Aquæ pluuiæ q.f.

* Facit

*Facit ad vlcera & pustulas oculorum, cicatrices
exterit.

¶ Aliud.

Recip. plumbi vsti & loti,
Cornu ceruini vsti & loti ana ꝑ. xvi.
Thuris, Croci ꝑ. viij.
Acaciæ, Myrrhæ ꝑ. iij.
Spodij ana ꝑ. viij. Tragacanthæ ꝑ. i.
Amyli ꝑ. iij. Gummi,
Opij, Seminis hyoscyami ana
Squamæ æris ana ꝑ. ij. ꝑ. viij.
fiat collyrium cū mucagine seminis hyoscyami.
* Ad eadem efficax.

¶ Libianum.

Recip. cadmiæ vstæ & lotæ,
Cerusæ lotæ,
Stibij, id est, antimonij vsti & loti ana ꝑ. xvi.
Plumbi vsti & loti ꝑ. viij. Terræ samix,
Amyli ꝑ. xij. Tragacanthæ ana ꝑ. viij.
Pompholigis, Opij,
Myrrhæ, fiant pastilli cū albumine oui.
* Ad pustulas, inustiones, rupturas, cōcauitates, ocu-
los purulentos, chemoseis, staphylomata, & ad circū
molestantem dolorem facit, & cicatrices exterit.

¶ Aliud.

Recip. pompholigis ꝑ. viij.
Cadmæ vstæ & lotæ ꝑ. xvi.
Stibij, id est, antimonij vsti & loti ꝑ. xij.
Cerusæ lotæ ꝑ. xvi. Myrrhæ,
Amyli ꝑ. xij. Opij,
Terræ samix, Tragacanthæ ana ꝑ. ij.
Plumbi vsti ana ꝑ. viij. formentur pastilli cum
Aquæ pluuiæ q. s.

* Eiusdem cum priore facultatis.

¶ Sief de Plumbo Mesuræ.

Recip. plumbi vsti,

Anti-

LIBER SECVNDVS

Antimonij,

Tutiæ lotæ,

Aeris vsti,

fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q.f.

* Replet & consolidat vulnera oculorum.

Gummi arabici,

Tragacanthæ ana ꝑ. viij.

Opij ꝑ. s.

DE OLEIS.

Seçtio nona.

¶ Oleum Rosatum vulgare.

Recip. olei communis lib. iij.

Rosarum rubrarum purgatarum ꝑ. xvi.

Macera, & insola per octo dies: Rosas exemptas bene exprime, atque alias impone vt supra: atque ita tertium fac: Cola & serua.

Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt.

* Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorū clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

¶ Oleum rosatum completum Mesuæ.

Recip. olei ex oleis maturis, aqua fontana multoties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarum repurgata quantum satis est in vitreum vas: obturetur vas, ac per dies septem insola: coque tribus horis in vase duplici. Expressis folijs & abiectis, noua immitte: insola iterum, coque in balneo, & exprime vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosarū (eo modo confectæ vt in syrupo rosato dictum est) quartam partem: misce, insola dies quadraginta in vase vitreo obturato: post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alij