

PIERAMIDAAL A J U G A
SENEGROEN. PIJRAMIDALIS.

De XIIIde C L A S S E.

C L A S S I S XIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUJN, *IIde*
Deels IXde St., bl. 268.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIIdi part.*
2da pag. 892.

SENEGROEN, INGROEN, dat vier-
hoekig pieramidaal en ruig is,
met de Wortelbladen zeer groot.

a. De eenbladige, half in vijven ge-
deelde, Kelk of Bloemdop.

b. De eenbladige gaapende Bloem-
krans, geopend, 't onderste boven,
met de vier Meeldraadjes, waar
van twee korter, twee langer
zijn.

c. Een afgezonderd Meeldraadje,
met zijn tweedeelig Knopje of
Helmpje.

d. Het vierdeelig Vruchtbeginzel,
met den Stijl langer, en uitlo-
pende in twee spitse Stempels.

BLOEITIJD In de Maanden Ju-
ny en July. Het groeit aan We-
gen in Bergagtige drooge Landen
van Europa, ongeveer een half
Voet hoog; doch schijnt in ons Ge-
west nog niet gevonden te zijn.

BUGULA tetragona pijramidalis vil-
losa, Follis radicalibus maximis.

a. Perianthium monophyllum, semi-
quinquefidum villosum.

b. Corolla monopetala ringens
aperta & inversa, cum staminibus
quatuor, quorum duo bre-
viora, duo longiora.

c. Stamen separatum, cum An-
therâ didymâ.

d. Germen quadrifidum, cum stijlo
longiore & duobus stigmatibus
tenuibus.

TEMP. FLOR. Mense Junio &
Julio. Crescit ad Vias, in locis
siccis montosis Europæ, altitudine
circiter semipedali; in nostra Re-
gione ut videtur, nondum reperta.

GEbruik. Met het bij ons gemeene Senegroen (*Bugula*), op Plaat
XI. afgebeeld, heeft dit Kruid in kragten veel overeenkomst, wor-
dende gehouden voor de eigentlijke *Consolida media* der Autheuren,
die, inwendig gebruikt, wegens haare Wondheelende of Wondzuiver-
ende eigenfchap den naam heeft.

GE-



Ajuga Pyramidalis. L.



