



Polygonum fagopyrum. L.

B O E K P O L I J G O N U M
W E I T F A G O P I J R U M.

De VIIIste CLASSE. CLASSIS Villva.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door HOUTTUIJN, IIde Deel VIIIste St., bl. 482. Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed. GMELINI, Tom. IIde part. Ima pag. 639.

BOEKWEIT met Pijlswijs Hartvormige Bladen, een bijna regtopstaande ongedoornde Steng, de hoeken van het Zaad effen. FAGOPIJRUM Foliis Cordato-Sagittatis, Caule erectiusculo inermi, Seminum angulis æqualibus.

- a. De vijfdeelige Bloemkrans zonder Kelk.
- a. Corolla quinquesida absque Perianthio.
- b. De agt Meeldraadjes, met de drie Stempels, daar boven uitspreekende.
- b. Stamina octo, cum tribus Stigmatibus, supra eminentibus.
- c. Een afgezonderd Meeldraadje, met zijn Knopje.
- c. Stamen separatum cum Antherâ.
- d. Het driezijdig Vruchtbeginzel, met de drie Stijlen en derzelver ronde Stempels.
- d. Germen triquetrum, cum Stipulis tribus eorumque Stigmatibus subrotundis.

De BLOEITIJD is in de Maand Junij. Het wordt hier te lande veel op Akkers geteeld en is uit de Oosterfche Gewesten, of uit Arabie afkomstig. TEMP. FLOR. In Mense Junio. Multum in nostra Regione in Arvis colitur, huc translata ex Regionibus Orientalibus vel & ex Arabia.

GEBRUIK. Dit kan bijna onder 't Koorn geteld worden en verfrekt, door zijn geringen prijs, zeer veel tot Voedzel voor den Gemeenen Man, op veele plaatsen. Ook is 't een gezonde spijs, ligter verteerbaar dan Tarw of Rogge, maar niet zo voedzaam of versterkende. De Pap daar van, in Water of Karmelk gekookt, frekt, als een *Cataplafma* gebruikt, ongemeen tot rijpmaaking van Gezwellen, als ook om de Pijnen te doen verslaan. Het Plumge diert wordt 'er vet van, en de Boekweite Doppen hebben insgelijks, als 't over bekend is, haare nuttigheden.

VAR-