

8 P L A A T A CVII.
 VARKENS-GRAS, POLYGONUM
 DUIZEND-KNOOP. AVICULARIA.

De VIIIste C L A S S E.

C L A S S I S VIIIya.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
 door HOUTTUIJN, *Ildc*
Deel VIIIste St., bl. 475.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
 GMELINI, *Tom. Ildi part.*
Imæ pag. 639.

VARKENS-GRAS met agtmannige
 driewijvige Oxelbloemen, Lan-
 cetvormige Bladen, en leggen-
 de Kruidige Stengeljes.

- a. De vijfdeelige gekleurde Bloem-
 dop of Kelk.
 b. De agt Meeldraadjes, omringen-
 de het Vruchtbeginzel.
 c. Een afgezonderd Meeldraadje
 met zijn Knopje.
 d. Het driezijdige Vruchtbeginzel,
 met de Stijlen en drie eenvoudige
 spitse Stempels, tusfchen de Meel-
 draadjes vertoond.

POLYGONUM Flor. octandris trigij-
 nis axillaribus, Foliis lanceola-
 tis, Caule procumbente Her-
 baceo.

- a. Perianthium quinque-partitum.
 b. Stamina octo, Germen cingen-
 tia.
 c. Stamen unum separatum cum
 Antherâ suâ.
 d. Germen triquetrum cum Stijlâ
 & tribus Stigmatibus simplici-
 bus acutis, inter Stamina com-
 parens.

De BLOEITIJD is den geheelen
 Zomer. Dit kruipend Gewas groeit
 alom overvloedig aan de Wegen, op
 fteenachtige en allerlei onbebouwde
 woeste plaatfen, dikwils meer dan
 een Voet hoog opfchietende.

TEMP. FLOR. Per totam æsta-
 tem. Hæc herba reptans crefcit
 abunde ad vias, in locis lapidosis,
 incultis, desertis, altitudine sæ-
 pius Pedem superans.

GEBRUIK. Door zijne famentrekkende hoedanigheid is het Sap
 of Afkookzel van dit Kruid, in Wijn of Water, uitwendig opge-
 legd, tegen Breuken, Bloedloop en andere Vloeiingen dienftig
 bevonden. Het bijna onzichtbaar kleine Zaad, van zelf op de
 Aarde verspreid, ftrekt 's Winters tot Voedzel voor het klein Ge-
 vogelte.



Polygonum aviculare. L.



