



Urtica dioica. L.

G R O O T E
B R A N D E N E T E L.

De XXIIe CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IId*e
Deel XIde St., bl. 225.BRANDENETEL met gepaarde Hart-
vormige Bladen en dubbelde Tros-
jes.

- a. De vierbladige Bloemdop of Kelk, bestaande in de Vrouwelijke Bloemen uit twee veel kleiner Blaadjes.
- b. Het Kruikvormig Honigbakje.
- c. De vier Meeldraadjes in de Bloemdop vervat.
- d. Een afgezonderd met zijn tweedeelig of dubbelde Helmpje.
- e. Het Vruchtbeginzel met den Haarigen Stempel, van de afzonderlijke Wijfjes Plant.
- f. Een vergrootte Stekel der Bladen, met zijn kleine aan 't Blad gehechte Blaasje.

De BLOEITIJD van deeze groote ruuwe Brandenetels, iedereen bekend, is in de Zomer. Zij groeijen overal langs de Wegen, in Kreupelbosch en op verlaten Gronden, die niet al te droog zijn, door geheel Europa, dikwijls meer dan Mans langte hoog.

GEBRUIK. Van de ongemeene nuttigheid van dit zo gemeene, lastige en verachte Onkruid, de Brandenetels, overtreffende die van de meeste andere Kruiden, is door Doctor M. HOUTTUIJN, in zijne *Natuurlijke Historie*, als boven, omstandig gewag gemaakt, CELSUS en andere oude Geneeskundigen hebben reeds de Brandenetels aangepreezen als een zeer gezond Voedzel, den Afgang en Waterloozing bevorderende en de Borst verzagtende, niet minder dan Spinagie en dergelijke Kost. De geheele Plant en derzelver Sap, of ook de Wortels, gekookt en uitwendig opgelegd, kunnen dienstig zijn, om Bloedvloeiingen te stempen. Het Afkookzel der Wortelen heeft eene openende en afzettende hoedanigheid, inzonderheid tegen het Blaauwschuit (*Scorbutus*) dienstig. Het Zaad wordt, in Honig gekookt zijnde, tegen verscheide Borstkwaalen geroemd, enz.

B 2

GROO-

U R T I C A
D I O I C A.

CLASSIS VIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde part.*
Imæ. pag. 268.URTICA Foliiis oppositis Cordatis,
Racemis geminis.

- a. Perianthium quadriphillum. Hoc in Flore fœmineo diphillum est, Foliolisque constat multo minoribus.
- b. Nectarium Cjathiforme.
- c. Stamina quatuor Perianthio contenta.
- d. Unum Stamen separatum cum Antherâ suâ didijmâ.
- e. Germen cum Stigmate villoso, desuntum ex Planta hujus speciei fœminea.
- f. Aculeus Foliorum, magnitudine aucta, cum Vesicula suâ parvâ, Folio annexâ.

TEMP. FLOR. Harum Urticarum, quæ sæpe hominis altitudinem superant, est per totam æstatem. Crescunt ubique ad Vias, in Dumetis & aliis locis incultis, non valde siccis, per totam Europam.