

S A N I -
K E L.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIIste St., bl. 15.SANIKEL met de Wortelbladen rond
vijfkwabbig, alle de Blommetjes
ongesteld.

- a. De bijzondere vijfdeelige Kelk
of Bloemdop.
b. De vijfbladige Bloemkrans met
vijf lange Meeldraadjes.
c. Een afgezonderd Meeldraadje
met zijn Knopje, aan het Bloem-
blaadje zittende.
d. Het flekelig Vrugtbeginzel met
de twee omgeboogene Stijlen of
Stempels.

BLOEITIJD in de Maand Junij.
Dit Kruid groeit in Duitschland
veel in lommerijke Boschagiën,
doch is hier te lande zeer zeldzaam,
zijnde echter bij Engelenburg en
Ulenpas in Gelderland gevonden,
omtrent twee Voeten hoog.

S A N I C U L A
E U R O P Æ A.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di part.
I mæ pag. 468,SANICULA Foliis radicalibus orbicu-
laribus quinquelobis, Flosculis
omnibus sesilibus.

- a. Perianthium partiale quinquepar-
titum.
b. Corolla quinquepetala cum Sta-
minibus quinque longis.
c. Stamen separatum cum Antherâ
suâ, & Petalum cui adhaeret.
d. Germen hispidum, cum Stijlis
vel Stigmatibus incurvis.

TEMP. FLOR. in mense Junio.
Hæc Herba plurimum crescit in
Sijlvis nemorosiss Germaniæ, sed in
nostra Regione valde rara est, at-
tamen in quibusdam locis umbro-
sis Gelriæ reperta; altitudine
circiter duorum Pedum.

GEbruik. De Sanikel is in de Apotheeken aangetekend als
een Wondmiddel (*Vulneraria*) en door zijne samentrekkende eigen-
schap tot stemping van Bloedyloeijingen dienstig, doch bij ons wei-
nig in gebruik.

SCHUB-



Sanicula Europaea. L.



