

M O N D H O U T , L I G U S T R U M

L I G U S T E R .

V U L G A R E .

De IIde C L A S S E .

C L A S S I S IIde.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deels IVde St., bl. 24.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde part.
Ima pag. 25.

MONDHOUT met Eijronde stompe
Bladen, de Pluim eenvoudiglich
in drieën gedeeld.

LIGUSTRUM Foliis ovatis obtusis,
Paniculâ simpliciter trichotomâ.

a. De eenbladige, zeer kleine vier-
tandige Kelk.

a. Perianthium monophyllum, mi-
nimum, quadridentatum.

b. De eenbladige Trechervormige
Bloem, aan den Mond vierdeelig,
met de twee Meeldraadjes.

b. Corolla monopetala infundibuli-
formis, Limbo quadripartito,
cum duobus Stamina.

c. Het rondachtig Vrugbeginzel,
met den Stijl en tweespleetigen
Stempel.

c. Germen subrotundum cum Stijlo
& Stigmate bifido.

d. De rijpe Vruggtros, uit Besjen
bestaande als

d. Racemus Baccarum maturarum,
quarum una

e. Overlangs en

e. Longitudinaliter, altera

f. Overdwars doorgesneeden.

f. Transversim dissecta.

g. De Zaadjes, daarin vervat.

g. Semina illis contenta.

BLOEITIJD in Junij en Julij.
Dit Gewas, dat oneindig tot Ha-
gen in onze Hoven, om de sierlijk-
heid, gebruikt wordt, groeit natuur-
lijk in 't Kruwelbosch aan onzen
Duinkant, in Gelderland en andere
Provinciën, wel vijf of zes Veten
hoog.

TEMP. FLOR. Mense Junio &
Julio. Hic Frutex, ubique in Hor-
tis ob elegantiam usualis, sponte
crescit in Dumetis nostrarum Du-
narum, ac in Gelriâ, altisque Pro-
vinciis, altitudine sæpius quinque
vel sex Pedum.

GEBRUIK. Deze Heester, dien men ook *Maagdeboom* en
Keelkruid genoemd vindt, heeft de Bladen eenigermaate wrang,
scherp en bitter. Een Gorgeldrank, daarvan, wordt tegen Ontsteek-
king van de Keel, Mondzweeren en Ongemakken in het Tand-
vleesch aangepreezen, daar het in sommige omstandigheden dienst
doet. Dus heeft men ook het Afkookzel, inwendig, gehouden voor
een Wondmiddel (*Vulnerarium*), doende de Bloemen daar bij; doch
hier te Lande is het weinig in gebruik. Van de Besjen kan een
blauwachtige Inkt worden gemaakt. Soms tijds bevatten zij twee,
soms tijds vier Zaaden.

PAR-



Ligustrum vulgare. L.



