



Plantago psyllium. L.

VLOO.

K R U I D.

De IVde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door HOUTTUIJN, IIde Deel VIIde St., bl. 324.

- VLOOKRUID met een Takkige Kruidige Steng, de Bladen eenigermate getand en omgekromd, de Hoofdjes ongebladerd.
- a. De vierdeelige Kelk of Bloemdop.
 - b. De eenbladige Pijpbloem aan den rand vierdelig, in de Kelk.
 - c. Dezelve geopend, met haare vier Meeldraadjes.
 - d. Een enkel Meeldraadje met zijn Knopje, dwars geplaatst.
 - e. 't Eijronde Vruchtbeginzel met een zeer dunnen Stijl, naauwlijks Stempeldraagende.

BLOEITIJD in Julij. De Groei-plants is in de Zuidelijke deelen van Europa, tusfchen 't Koorn, ter hoogte van anderhalven Voet. Bij ons vindt men 't alleenlijk in de Hoven.

PLANTAGO

PSIJLLIUM.

CLASSIS IIIa.

Conf. LINNÆI Sjfst. Nat. Ed. GMELINI, Tom. IIde part. Ima. pag. 254.

- PSIJLLIUM Caule ramofo herbaceo, Foliis subdentatis recurvatis, Capitulis aphijllis.
- a. Perianthium quadrifidum.
 - b. Corolla monopetala tubulofa, Ore quadrifido, in Calijce.
 - c. Eadem aperta, cum quatuor Staminibus suis.
 - d. Stamen unum separatum, cum Antherâ transverfâ.
 - e. Germen ovatum cum Stijlo tenuiffimo & Stigmate vix notabili.

TEMP. FLOR. in Mense Julio. Sponte crefcit in Australioribus Europæ, inter Frumenta, ad fequipedalem altitudinem. Apud nos folummodo reperitur in Hortis.

GEBRUIK. In de Oosterfche Landen werdt de Slijm, die het Zaad in Water afgeeft, oudtijds tot een Laxeer- en Zweetmiddel gebruikt, zo ALPINUS meldt, doch BOERHAAVE telt dezelve, wanneer men 'er veel van inneemt, onder de Vergiften. In Klijfteenen; echter, is zij fomtijds van dienst bevonden tegen Bloedloop, wegens haare famentrekkende; in Infpuitingen, wegens haare verzagjende, en uitwendig in Oog- Ontfteekingen, Ontvellingen enz. wegens haare zuiverende hoedanigheid. De gedaante van het Zaad geeft den naam aan deeze Plant, die ook tot verdrijving der Vlooljen dienftig zou zijn. Het Zaad is fcherp van Smaak; de verfche Bladen zijn aangenaam van Reuk.