

KANARIJ.

PHALARIS

Z A A D - P L A N T . C A N A R I E N S I S .

De Ilde C L A S S E .

C L A S S I S Illia.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUYN, *Ilde*
Deel XIIIde St., bl. 150.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ pag. 153.

KANARIJ met eene bijna Eijronde
Afrachtige Plum, de Kafjes ge-
kiëd.

PHALARIS Paniculâ subovatâ Spi-
ciformi, Glumis carinatis.

a. a. De eenbloemige tweekleppige
Bloemaop.

a. a. Gluma uniflora bivalvis.

b. b. De tweekleppige Bloem.

b. b. Corolla bivalvis.

c. Dezelve geopend, met haare drie
Meeldraadjes.

c. Eadem aperta, ostendens tris
Stamina sua.

d. De dubbelde Stijl met de twee
ruige Stempels, op het Vrugtbe-
ginzel zittende.

d. Stijlus duplex cum duobus Stig-
matibus villosis, Germini infi-
dens.

e. Het Zaad.

e. Semen.

De BLOEITIJD is in Julij.
Jaarlyks wordt deeze Plant op de
Akker gezaaid, tot de teeling van
het Kanarij-Zaad, groeiende meer
dan twee Voeten hoog.

TEMP. FLOR. in Mense Julio.
Hæc Planta quotannis in Arvis
seritur pro cultura Seminis Cana-
riensis, excrescens altitudine bi-
pedali & ultra.

GEBRUIK. Van de Medicinaale kragten is niets bekend; dan
het wordt, in sommigen der Zuidelijke deelen van Europa, wel on-
der de Tarw gemengd tot Brood, en 'er kan een *Emulsie* van ge-
maakt worden, die verfrischende is en versterkende. Men weet,
dat het een gewoon Voedzel is voor de Kanaries en ander klein Ge-
vogelte. Het wordt ook wel gebruikt tot Voeder voor Paarden,
die 'er zeer vlug door worden en glad van Huid.



Phalaris Canariensis, L.



