



Teucrium scorodonia . L .

W I L D E T E U C R I U M
S A L I E S C O R O D O N I A.

De *XIVde* CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIda*
Deel IXde St., bl. 283.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
IIda pag. 896.

WILDE SALIE met Hartvormige,
rond getande, gefeelde Bladen,
de Bloemtrosjes zijdelings aan
een opstaande Steng.

a. De eenbladige, gelipte Kelk of
Bloemdop.

b. De eenbladige Gaasperachtige
Bloem.

c. Dezelve geopend, met de twee
langere, twee kortere Meeldraad-
jes en haare Knopjes.

d. Het vierpleetig Vruchtbeginzel
met den Stijl, en den Siempel in
tweeën gedeeld.

SCORODONIA Foliis Cordatis, ro-
tunde dentatis, Racemis latera-
libus secundis, Caule erecto.

a. Perianthium monophyllum la-
biatum.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Badem aperta, cum Staminibus
binis longioribus, binis brevio-
ribus, eorundemque Antheris.

d. Germen quadripartitum cum
Stijlo, & Stigmate in duas partes
diviso.

De BLOEITIJD is in Julij. Het
Gewas groeit veel op Zandige Gron-
den van Boschagien in Gelderland
en elders, komende ook overvloedig
in onze Duinen, van den Haag tot
Haarlem, voor, ter hoogte van twee
of drie Voeten. Het blijft over.

TEMP. FLOR. in Mense Julio.
Plurimum crescit hæc Planta in
Sijlvarum solo arenoso, tam Gelria
quam alibi, itemque copiose repe-
riunda inter Dunas nostras, ab
Hagâ ad Harlemum, altitudine
duorum triumve Pedum. Pereni-
nis est.

GEBRUIK. Dit Kruid heeft in Reuk eenige overeenkomst met
de Salie, en in kragten met de *Scordium* of Water-Look, die in 't
voorgaande Deel van dit Werk op Plaat XXXVI afgebeeld en bl. 37
beschreeven is. Van 't een en ander is waarschijnlijk de benaaming
afkomstig. Men acht het een openende en tevens famentrekkende
kracht te hebben, weshalve het bijzonderlijk tegen de Waterzucht
(*Hijdrops*) van dienst zou zijn; doch het is hier te lande weinig in
gebruik.

GLAS-