

## K O O R N -

## C E N T A U R E A

## B L O E M .

## C I J A N U S .

De XIXde. C L A S S E .

C L A S S I S XVIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
DOOR HOUTTUIJN, IIde  
Deel XIde St., bl. 31.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*  
GMELINI, Tom. IIde Part.  
IIde pag. 1264.

KOORNBLOEM met Zaagtandige  
Kelken en Linaale effenrandige  
Bladen, de onderste getand.

- a. De algemeene Keik.
- b. Een getande Schub daar van.
- c. De samengefelde Bloem.
- d. Een tweeflachtig Blommetje.
- e. De deelen der Sexe daar uit.
- f. De vijf samengevoegde Meel-  
knotjes met haare Draadjes.
- g. Het Vrugtbeginzel met den Stijl  
en gepiststen tweedeeligen Stem-  
pel.
- h. Een Vrouwelijk Blommetje, dat  
hoog blaauw is, uit de Krans.
- i. Deszelfs zeer klein Vrugtbegin-  
zel.
- k. Een der Wortelbladen.

BLOEITIJD in Julij en Augus-  
tus. 't Gewas komt overvloedig  
voor, op de Bouwlanden tuschen  
't Koorn, meer dan anderhalven  
Voet hoog. Het blijft niet over.

CIJANUS Calijcibus ferratis, Foliis  
Linearibus integerrimis, infimis  
dentatis.

- a. Calijx communis.
- b. Ejus Squama denticulata.
- c. Flos compositus.
- d. Corolla hermaphrodita ex Disco.
- e. Ejusdem partes Sexuales.
- f. Anthera quinque coalita, cum  
Staminibus suis.
- g. Germen cum Stijlo & Stigmate  
acuminato bifido.

h. Corolla Fœminea, coloris azu-  
rei, ex Radio Floris.

i. Ejusdem Germen pufillam.

k. Unum ex Foliis radicalibus.

TEMP. FLOR. in Julio & Au-  
gusto. Abunde crescit in Arvis,  
inter Frumenta, altitudine sesqui-  
Pedali & ultra. Annua est Planta.

GEBRUIK. De Bloemen van dit Gewas zijn onder de Winkel-  
middelen nog eenigzins bekend, dewijl het Aftrekzel daar van, met  
Water, tegen Zeere Oogen aangepreezen wordt. De hoog blaau-  
we Kleur, welke zij daar aan geeven, kan zelfs in 't schilderen met  
Waterverw van dienst zijn. Het Zaad zou Afgang verwekken.

PAR-



*Centaurea cyanus*. L.



