



Arifolochia rotunda. L.

R O N D E

ARISTOLOCHIA

OSTERLUCIE.

R O T U N D A.

De XXste CLASSE.

CLASSIS VIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIdc*
Deel VIIdc St., bl. 210.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Ima pag. 591.

OSTERLUCIE met Hartvormige, bij
na ongesteelde stompe Bladen,
een zwakke Steng en eenzaame
Bloemen.

ARISTOLOCHIA Foliis Cordatis sub-
sessilibus obtusis, Caule infir-
mo, Floribus solitariis.

- a. De eenbladige Pijpachtige Bloem.
- b. Dezelve opengefreeden.
- c. De zes Meeldraadjes van onderen aan den Stempel aangegroeid.
- d. De Vrughtknop met den rondachtige zesdeeligen Stempel gekroond.
- e. Dit alles doorgesneeden.
- f. De Stempel, met de zes Meelknopjes, van boven gezien.
- g. Een afgezonderd Meelknopje.

- a. Corolla monopetala tubulosa.
- b. Eadem secundo aperta.
- c. Antheræ sex subtus Stigmati adnata.
- d. Germen Stigmate subgloboso sexpartito coronatum.
- e. Idem in toto dissectum.
- f. Stigma, cum Antheris sex, superne visum.
- g. Anthera una separata.

De BLOEITIJD valt in Augustus.
Dit Gewas, dat in de Zuidelijke
deelen van Europa natuurlijk groeit,
wordt bij ons in Tuinen geteeld. en
heeft de Stengen dikwils een Elle
lang. Het blijft over.

TEMP. FLOR. in Mense Augusto.
Hæc Planta, sponte crescens in-
partibus Australioribus Europa,
colitur apud nos in Hortis, Cau-
libus sæpe gaudens Ulnæ longitu-
dine. Perennis est.

GEBRUIK. Deeze Soort van *Osterlucie* voert den naam, wegens haaren Bolachtig ronden Wortel, die ons droog wordt aangebragt, zijnde van buiten bruin, van binnen van kleur als Palmboomhout, met een dikken groven Bast, Kruidrig van Reuk en Smaak, doch wat bitterachtig. Van de kragten is hier voor, bladz. 100, van 't I. Deel, in de beschrijving der *Duune Osterlucie*, melding gemaakt.

LAN-