

L A N G E

ARISTOLOCHIA

OSTERLUCIE. L O N G A .

De XXste C L A S S E

C L A S S I S V I I a .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *Ide*
Deel V I de St., bl. 210.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. I I di Part.*
Ima. pag. 591.

OSTERLUCIE met Hartvormige ge-
steelde effenrandige stompachtige
Bladen, een zwakke Steng en
eenzaame Bloemen.

ARISTOLOCHIA Foliis Cordatis
petiolatis integerrimis, obtu-
sifusculis, Caule infirmo, Flori-
bus solitariis.

- a. De eenbladige Pijpachtige Bloem
van vooren.
b. De zelfde van agteren gezien.
c. Dezelve met de Vrughtknop
geopend.
d. Het Vrughtbeginzel met den Kogel-
ronden Stempel, waar, van boven,
de Meelknopjes aangegroeid zijn.
e. Een derzelve afzonderlijk.
f. De Stempel met de zes Meelknop-
jes van boven.

- a. Corolla monopetala tubulosa,
anterior.
b. Eadem a parte postica conspecta.
c. Eadem cum Germinis recepta-
culo aperta.
d. Germen cum Stigmate globofo,
in cujus parte superiore Anthera
adnata sunt.
e. Una Anthera separata.
f. Stigma cum Antheris sex, su-
perne conspectum.

De BLOEITIJD valt in Julij. De
natuurlijke Groeiplaats is de zelfde
als die der Ronds Osterlucie. Zij
wordt dikwils een lastig Onkruid in
de Tuinen en groeit meer dan een
Voet hoog. Het blijft over.

TEMP FLOR. in Mense Julio,
Sponte crescit in iisdem Regioni-
bus ac Aristolochia Rotunda. In
Hortis sæpe incommodat instar
zizaniarum, crescens altitudine
unius Pedis & ultra. Perennis est.

GEBRUIK. Wat de kragten aangaat komt de *Lange*, die wegens
de gedaante der Wortelen ook dus genoemd wordt, met de *Ronde*
Osterlucie taamelijk overeen. Deeze beiden komen in de *Tinctura*
Vulneraria der Heelmeesteren, als dienende tot zuivering van Vui-
le Zweeren, de Rotting tegenstaande en de *Gangrana* verhoedende;
maar, dewijl zij scherper zijn, wordt tot inwendig gebruik, zo te-
gen de Jicht, als tot Borst en Maagmiddelen, de *Dunne Osterlucie*,
waar van gemeld is, veel veiliger geoordeeld.


NB. De naam *Aristolochia Longa* is in het voorgaande Eerste
Deel, op Plaat XCVIII, verkeerdelijk onder de Afbeelding der
Aristolochia Clematitis gesteld.


WEST-



Aristolochia anguicida. L.







Aristolochia longa. L.