

ADDERS-TONG, OPHIOGLOSSUM
SPEERKRUID. VULGATUM.

De XXIV^{de} CLASSE.CLASSIS XIX^{na}.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, *Ildes*
Deel XIVde St., bl. 41.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
Ildes pag. 894.

ADDERS-TONG met Eijrond Loof,
de Steng eenbladig.

OPHIOGLOSSUM Fronde ovata, Sca-
po unifolio.

Wegens de ongemeene kleinheid der Vrughtmaakende deelen van dit Gewas, niet dan door sterke Vergroo-ting met het Mikroskoop waar te neemen, zijn dezelve hier niet in Plaat gebragt. Het groeit door geheel Europa op vogtige, Zandige, Boschvelden, en bij ons in de Duin-Valeijsen, als ook in vogtige Landen van andere Provinciën, ter hoogte van omtrent een half Voet. Men vindt het in 't voorste van den Zomer.

Propter eximiam parvitatem partium Fructificationis, hujus Plantæ, non nisi Vitris Microscopis valde magnificatæ observabilem, illæ in hac Tabulâ non depictæ sunt. Crescit per totam Europam, in pratis arenosis humidis Sijlvarum & apud nos inter Dunas maritimas, etiamque in Terris humidis aliarum Provinciarum, altitudine vix semipedali, Ætatis initio reperiunda.

De Vrughtmaking is, in deeze Plant, zeer duister, gelijk die der Varens (*Filices Osmundæ*) en dergelijken, waar over ik de waarneemingen van alle mij bekende Aetheuren, in 't begin van 't XIV Stuk mijner *Natuurlijke Historie*, heb bijeengebragt en vergeleeken.

GEBRUIK. Wat de kragten aangaat; dit *Speerkruid* heeft een lijmerigen zoeten Smaak en is derhalve voor een Wondmiddel gehouden; ja men heeft het inwendig tegen Breuken (*Herniæ*) aangepreezen.

BLOED-



Ophioglossum vulgatum L



