



Rumex Sanguineus. L.

BLOEDKRUID,

R U M E X

DRAAKENBLOED.

S A N G U I N E U S.

De Vde CLASSE.

CLASSIS Vta.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel VIIIJte St., bl. 389.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ pag. 584.

BLOEDKRUID met tweeſlagtige Bloemen, de Klepjes effenrandig, één korreldraagende, de Bladen Lancetſwijſ Hartvormig.

a. De driebladige Kelk.

b. De driebladige Bloem, met zes Meeldraadjes of Knopjes.

c. Een dubbeld Meelknopje afzonderlijk met zijn fijn Draadje.

d. Het driekantig Zaadbeginzel, met drie neergeboogene Stijlen en derzelve Stempels.

e. Het rijpe harde Zaad, aan één Bloemblaadje of Klepje zittende.

De BLOEITIJD is in *Augustus*. Dit Kruid, dat zeer takkig is, komt niet alleen van zelf in de *Moeshoven* voort, maar wordt ook aan de *Wegen* gevonden, ter hoogte van twee of drie *Voeten*.

RUMEX Floribus hermaphroditis; Valvulis integerrimis, unica granifera, Foliis Cordato-lanceolatis.

a. Perianthium triphijllum.

b. Corolla tripetala cum sex Stamini-
nibus seu Antheris.

c. Una Anthera didijma cum Stamine tenuissimo.

d. Germen triquetrum, cum Stijlis tribus reflexis, eorundemque Stigmatibus.

e. Semen maturum durum, uni Petalo seu Valvulae adhaerens.

TEMP. FLOR. in Mense *Augusto*.
Hæc Herba, ramosissima, non solum in Hortis sponte crescit, sed etiam ad Vias reperitur, altitudine duorum vel trium Pedum.

GEBRUIK. Deze Soort van *Patich* onderscheidt zig van alle de anderen, door de Bloedkleurige Aders der Ribben in de groene Bladeren, en geeft, door uitpersing, een Bloedachtig Sap, 't welk ingenomen zijnde Afgang maakt. Het Zaad, onder andere Middelen in Afkookzel gemengd, zo wel als de Wortel, wordt tot Bloedstemping aangeprezen.

G 2

AL