



Lichen aphtosus. L.

SPRUUWIG

L I C H E N

S C H U R F T M O S . A P H T H O S U S .

De XXIV^{te} C L A S S E .C L A S S I S XIX^{na}.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel XIVde St., bl. 533.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. II di Part.
IIde pag. 1373.

SCHURFTMOS dat Leleyachtig is,
kruipende, gekwabd, stomp,
vlak; met verspreide Wratten; en
een opstijgend Randschildje.
a. De Oppervlakte, met de verhe-
vene Mannelijke Bloemdeeltjes.

b. Een gedeelte van onderen gezeten.

LICHEN Coriaceus, repens, lob-
batus, obtusus, planus; Verru-
cis sparsis; Peltâ marginali ad-
scendente.

a. Superficies Lichenis, cum parti-
bus Florum Masculinis adscen-
dentibus.

b. Pars ejusdem inferne viva.

Onder de Geneverboomen in ons
Wereldsdeel, als ook in Pijnboom-
Boschen, komt deeze Soort van
Schurftmos voor, doch schijnt in ons
Land nog niet waargenomen te zijn.

Hæc Lichenis Species in Euro-
pa crescit sub Juniperis, & in
Sijlvis Pinastrorum. Apud nos
nondum observata esse videtur.

GEbruik. Sommigen willen, dat het den naam zou hebben van
de vertooning, die het maakt; anderen van deszelfs gebruik in Swee-
den, alwaar het, in Melk gekookt, de Kinderen met vrugt tegen
de Spruw (*Aphthæ*) is ingegeven. Eindelijk heeft men ontdekt,
dat het tegen de Wormen dienstig ware; zie *Amoen. Acad.* Vol. 2.
p. 69. Frisch heeft het eene hoog Groene, maar gedroogd eene
Zeeegroene kleur gegeeven.

ASCH.