



Lichen cocciferus. L.

ROODTOPPIG

L I C H E N

S C H U R F T M O S .

C O C C I F E R U S .

De XXIV^{de} C L A S S E .C L A S S I S XIX^{na} .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUYN, *Ildæ*
Deel XIVde St., bl. 541.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed:*
GMELINI, *Tom. Ildi Part.*
Ildæ pag. 1375.

SCHURFTMOS dat Kelkjes draagt,
eenvoudig effenrandig, met ronde
Steeltjes en hoogroode Knobbeltjes.

a. De donker groene bedding, als
van kleine Bekertjes, waar mede
dit Schurftmos den Grond be-
kleedt.

b. De witachtige Steeltjes met hoog-
roode Knopjes, die zij uitgeeyen,
tot de Vruchtmaaking dienende.

LICHEN Scijpifer simplex integeri-
rimus, Stipite Cijlindrico, Tu-
berculis Coccineis.

a. Torus obscure viridis, quasi
parvorum poculorum, quibus
hic Lichen Terram incrustat.

b. Cauliculi abescentes cum Capi-
tulis ruberrimis, inde emissi,
Fructificationi inservientes.

GEBRUIK. Het is, onder den naam van *Muscus pijxidatus*, zo
wijlen de Hoogleeraar DE GORTER aantekent, in de Apotheeken
bekend geweest. Men vindt een ander Schurftmos, dat weezentlijk
Doozig zou mogen heeten, of *Bekerachtig*, zijnde in de *Nat. Hist.*
Pl. CIII. Fig. 13, afgebeeld, onder den naam van *Lichen pijxidatus*.
Hedendaags maakt men 'er weinig gebruik van; hoewel het oudstijds
tegen de Kinkhoest is aangepreezen. Het groeit hier te lande veel
op dorre Heijgronden en in 't Haagse Bos. Elders vindt men het
in Bergachtige Boschagiën en op dorre Rotfen, onder 't Mos.

K

LON.