



*Matricaria chamomilla. L.*

GEMEENE

K A M I L L E.

De XIXde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door HOUTTUJN, 11de Deel Xde St., bl. 761.

KAMILLE met den stoel Kegelachtig, uitgebreide Bloemstraalen, de Kelkschubben aan den rand gelijc.

- a. De algemeene gelijkrandige Keik.
- b. De samengestelde Straalbloem.
- c. Een enkel tweestachtig middel-Blommetje.
- d. De vijf samengegroeide Meeldraadjes of Knoesjes, daaruit.
- e. Het Vruchtbeginzel met den Stijl en dubbelen Stempel.
- f. Een Vrouwelijk Blommetje van den gestraalden rand.
- g. Deszelfs Vruchtbeginzel met Stijl en Stempels.

BLOEITIJD. Dit is een jaarlijks Kruid, dat overvloedig voorkomt in de Zaaivelden en Velden, groeiende bij de twee Voeten hoog en bloeiende in de Zomer.

MATRICARIA

CHAMOMILLA.

CLASSIS XVIIva.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed. GMELINI, Tom. 11di Part. 11de pag. 1249.

CHAMOMILLA Receptaculis conficis, Radiis patentibus, squamis Calijcinis margine æqualibus.

- a. Calijx communis margine æquali.
- b. Corolla composita Radiata.
- c. Flosculus Hermaphroditus ex Disco.
- d. Stamina quinque vel Antheræ coalitæ ex Flosculo.
- e. Germen cum Stijlo & Stigmatibus bifido.
- f. Flosculus Fœmineus ex margine radiato.
- g. Ejsdem Germen cum Stijlo & Stigmatibus.

TEMP. FLOR. Herba est annua, quæ copiose reperitur in Arvis & Pratibus, altitudine circiter duorum Pedum, florida in æstate.

GEBRUIK. De Kamille-Bloemen zijn algemeen bekend en worden, 't zij in Afkookzel of Aftrekzel, gebruikt, als verzagende en Pijnstillende, dienstig tegen allerlei Krampachtige en Slijmige Verstopningen der Ingewanden; weshalve menze ook nitwendig in Pappen en Stoovingen bezigt; maar de Bloemen der Edele of Rooinsche Kamille (*Anthemis nobilis*), vervolgens te beschrijven, zijn voortreffelijker.