

REIJNETTE,
GEITENBAARD.

De XIIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 44.

- REIJNETTE met gevinde Bladen, het endelingsse grooter en gekwabd, de Bloemen Trosachtig.
- De eenbladige half vijfdeelige Kelk.
 - De vijfbladige Bloem, met menigvuldige, in den Kelk ingeplante, Meeldraadjes.
 - Een Meeldraadge afzonderlijk.
 - De vijf Vruchtbeginzels, met Stijltjes en geknopte Stempels.
 - Een Vruchtbeginzel afzonderlijk.
 - De gedraaide Zaadhuisjes.

De BLOEITIJD is in Julij, van dit Kruid, dat veel groeit op vogtige belommerde plaatsen, aan Wegen en Haagen, ter hoogte van twee of drie Voeten. Het blijft over.

SPIRÆA
ULMARI A.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 850.

- ULMARI A Foliis pinnatis, impari majore lobato, Floribus cijmosis.
- Perianthium monophyllum femiquinquesidum.
 - Corolla pentapetala cum Stamibus numerosis, Calijci insertis.
 - Stamen separatum.
 - Germina quinque, cum Stijlis & Stigmatibus capitatis.
 - Germen separatum.
 - Capfulæ Seminales contortæ.

TEMP. FLOR. in Mense Julio, hujus Herbæ, quæ abunde crescit in locis humidis umbrosis, ad vias & sepes, altitudine duorum vel trium Pedum, perennis.

GEBRUIK. Het heeft een ongemeen sterken Kruidrigen Reuk; weshalve het Landvolk, op sommige plaatsen, den Vloer der Huizen, op Feestdagen, daar mede bestroot. Door Destillatie geeven de Bloemen een Water, dat dienstig is, om de Uitwaasening, in Koortfen met Uitslag, te bevorderen. De Wortels, van eene famentrekkende en zuiverende hoedanigheid, zijn derhalve, zo tegen in- als uitwendige Wonden en Zweeren, in Bloedspuwingen en de Roode Loop, aangepreezen. Men kan 'er ook met vrugt gebruik van maaken, tot versterking, in Zenuw-Kwaalen.

DROPE



Spiraea Ulmaria L.



