

S C H U R F T -
K R U I D .

De IVde C L A S S E .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 243.SCHURFTKRUID met vierdeelige
straalende Blommetjes, een steke-
lige Steng en Vinswijze inge-
sneeden Bladen.

- a. De Bloem van agteren, om den
veelbladigen gemeenen Kelk te
beschouwen.
- b. De dubbelde bijzondere Kelk.
- c. De algemeene Bloemkrans.
- d. Een enkelde Blommetje, ongelijk
vierdeelig.
- e. Hetzelve geopend, met de vier
Meeldraadjes.
- f. Een afzonderlyk Meeldraadje.
- g. De Stamper, of het Vrugtbegin-
zel met Stijl en Stempel.
- h. Een der Wortelbladen.

BLOEITIJD. Aan de kanten van
Zandige Zraijlanden en in de
Duin-Valeijen, komt dit Kruid
menigvuldig voor, ter hoogte van
twee Voeten; bloeiende in Junij en
Julij en overblijvende.

S C A B I O S A
A R V E N S I S .

C L A S S I S IVa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. Ildi Part.*
*Imæ. pag. 229.*SCABIOSA Corollulis quadrifidis
radiantibus, Foliis pinnatifidis
incisis, Caule hispido.

- a. Flos a posteriori visus, ut Calijx
communis, polijphijllus, ap-
pareat.
- b. Perianthium proprium duplex.
- c. Corolla universalis.
- d. Flosculus simplex inæqualiter
quadrifidus.
- e. Flosculus apertus cum quatuor
Staminibus.
- f. Stamen separatum.
- g. Pistillum seu Germen cum Stijlo
& Stigmate.
- h. Unum ex Foliis radicalibus.

TEMP. FLOR. In lateribus Ar-
vorum Arenosorum & in Pratis
Dunarum nostratium abunde cres-
cit, altitudine bipedali: Junio &
Julio floret, Planta perennis.

GEbruik. Men heeft dit Kruid, van ouds, voor een sterk
Zweetdrijvend, af- en uitzettend middel gehouden, waarvan het
Afkookzel, met Honig gemengd, nuttig was in allerlei Long- en
Borstkwaalen, om de uitwerping der Fluimen te bevorderen. Het
is nog niet buiten gebruik, inzonderheid het uitgeperste Sap, dat,
door betting of baading, tegen veelerleij Schurft en dergelijke Huid-
kwaalen dienstig bevonden wordt. Het komt ook met weinig of
niet ingesneeden Bladen voor, gelijk deeze Afbeelding aanduidt.

DUI.



Scabiosa arvensis. L.

