



*Anagallis arvensis* L.

## G U I J C H E L H E I J L . ANAGALLIS ARVENSIS.

De Vte C L A S S E .

C L A S S I S Vta.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUIJN, 11de  
Deel VIIde St., bl. 510.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.  
GMELINI, Tom. 11di Part. I  
Imæ pag. 332.

G U I J C H E L H E I J L met onverdeelde  
Bladen en leggende Stengetjes.

a. De vijfdeelige spitse Kelk met den  
Stamper.

b. De eenbladige vijfdeelige Ra-  
derachtige Bloem, met de Meel-  
draatjes in de Kelk.

c. Een afzonderlijk Bloemblaadje,  
met het Meeldraadje en zijn  
Knopje.

d. Het ronde Zaadhuisje.

ANAGALLIS Foliis indivisis, Caule  
procumbente.

a. Perianthium quinque-partitum,  
acutum, cum Pistillo.

b. Corolla monopetala rotata quin-  
que-partita, cum Staminibus,  
in Calyce.

c. Pars Floris petaloidea, cum Sta-  
mine & eisdem Antherâ.

d. Capsula Seminalis rotunda.

BLOEITIJD. Men vindt het ook,  
doch zeldzaamer, met paarfche,  
bleekroode of blaauwe Bloemen. Dit  
komt menigvuldig op de Bouwlan-  
den en als een Onkruid in de Tui-  
nen, doch ook op naakte Zandige  
Gronden, voor. De Stengetjes leg-  
gen meest op den Grond. Het bloeit  
in den Nazomer, en zaait zig  
zelve.

TEMP. FLOR. Hæc etiam sed ræ-  
rius, reperitur, Floribus purpu-  
reis, carneis aut cæruleis. Sæpis-  
sime Flore rubro occurrit in Arvis,  
etiamque ut Zizania in Hortis &  
in locis nudis Soli Arenosi, ubi  
Caulis ut plurimum procumbunt.  
Tempus florendi est ad finem  
Æstatis. Quotannis ex Semine  
renascitur.

GEBRUIK. Dit Kruid is, mogelijk wegens den naam, eenige  
kracht tegen Zinneloosheid (*Mania*) toegeschreeven; weshalven het  
genoemd werdt *Heil der Zotten*, doch men houdt zulks, zo wel als  
die tegen de Hondsdolheid, hedendaags, voor beuzelaarij. Het is  
uit den zuuren samentrekkende met eenige schertheid en derhalve  
tot Bloedzuivering niet ondienstig, kunnende ook uitwendig tot ge-  
meezing van Zweeren worden gebruikt.