



Borago officinalis. L.

B E R N A G I E.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel VIIde St., bl. 450.

BERNAGIE met alle Bladen, over-
hoeks en gaapende Kelken.

- a. De vijfdeelige ruige Kelk.
- b. De eenbladige Raderachtige vijf-
deelige Bloem.
- c. Een Meeldraadje met het Klaau-
wier gehecht aan een Bladerach-
tig gedeelte der Bloem.
- d. Een Meelknopje afzonderlijk met
dit Klaauwier.
- e. De vier Vruchtbeginzels met den
Stijl en een rond Stempeltje.
- f. Het Zaad.

BLOEITIJD. Dit Kruid, dat men
meent uit de Zuidelijke deelen van
Europa of uit Asia afkomstig te
zijn, komt thans jaarlijks uit Zaad
wild voort in Tuinen, aan de We-
gen en elders in ons Land, ter
hoogte van twee Voeten of daar om-
trent, bloeiende in de Zomer.

BORAGO OFFICINALIS.

CLASSIS VII.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIIdi Part.*
Imæ pag. 321.

BORAGO Foliis omnibus alternis,
Calijcibus patentibus.

- a. Perianthium villosum quinque-
partitum.
- b. Corolla monopetala rotata quin-
que-partita.
- c. Stamen Appendice conjunctum
cum parte Petaloideâ Corollæ.
- d. Anthera separata cum dictâ Ap-
pendice.
- e. Germina quatuor, cum Stijlo &
Stigmatibus subrotundo.
- f. Semen.

TEMP. FLOR. Hæc Herba, quæ
originem habuisse creditur in Au-
stralioribus Europæ partibus vel
& Asia, jam quotannis ex femine
sponte crescit in Hortis, ad Vias
& alibi in nostrâ Regione, altitu-
dine circiter bipedali, florens
Æstate.

GEBRUIK. Behalve de schoon hemelschblauwe, komt de Ber-
nagie ook somtijds voor, met witte, bleekroode en bonte Bloemen.
Het Loof is altoos ruig, doch somtijds breeder, somtijds smaller.
De Bloemen worden onder de Hartsterkende Middelen geteld, zijn-
de het Water, daar van gedestilleerd, als ook de Conferf daar van
gemaakt, in de Apotheeken niet onbekend. Het Kruid, van een
lijmerigen Salpeterigen Smaak, is door BOERHAAVE in heete Ziek-
ten, als ook tegen de Jicht aangepreezen. De Apotheker HAGEN,
te Koningsbergen, zou 'er vijfderleij Zout in waargenomen hebben.

MELK.