

MELK-DISTEL,

SONCHUS

GANZEN-DISTEL.

OLERACEUS.

De XIXde CLASSE.

CLASSIS XVIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel Xde St., bl. 363.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
IIdæ, pag. 1174.

MELK-DISTEL met de Bloemsteelen
Wollig, de Kelken glad.

- a. De gemeene knobbelige Kelk.
- b. De samengefelde Bloem.
- c. Een enkel Tweeflagtig Blommetje
daar uit.
- d. Hetzelve zonder Vrughtbeginzel.
- e. De vijf samengegroeiide Meel-
knopjes.
- f. Het Vrughtbeginzel met den Stijl
en dubbelden ruigen Stempel.
- g. Het Wollig Kroontje van het
Zaad.

SONCHUS *Pedunculis tomentosus,*
Calijcibus glabris.

- a. *Calijx communis Ventricosus.*
- b. *Flos compositus.*
- c. *Corolla specialis Hermaphrodita,*
exinde.
- d. *Eadem absque Germinè.*
- e. *Antheræ quinque coalitæ.*
- f. *Germinè cum Stijlo & Stigmatè*
villoso, duplicato.
- g. *Seminis Corona papposa.*

BLOEITIJD. Een zeer gemeene
Plant is dit op ruige woeste plaat-
sen en een lastig Onkruid in de
Tuinen, vooral in de Moeshoven;
alwaar deeze Melk-Distel stekelig
voorkomt, of glad, al of niet in
gesneeden; tot een zelfde Soort be-
hoorende; ongevaar twee Voeten
hoog of kleiner, bloeiende den ge-
heelen Zomer.

TEMP. FLOR. *Vulgatissima est*
Planta in locis incultis Herbofis
& Zizania molesta in Hortis, im-
primis Oleraceis; ubi hic Sonchus
asper occurrit & lævis, laciniatus
& non laciniatus, ad eandem Spe-
ciem referendi; altitudine circiter
bipedali vel minore, per totam
Æstatem floridus.

•GEBRUIK. Met de Moeskruiden heeft deeze *Melk-Distel* veel
overeenkomst, volgens den Latijnschen bijnaam en het Melkachtig
Sap, dat een weinig bitter is, 't welk zij door 't afbreeken der
Bladen en holle Stengen uitgeeft, doetze veel naar de Paardebloem-
men (*Taraxacum*) gelijken. Men kanze ook als een Moeskruid ge-
bruiken, en het uitgeperste Sap is tegen Verstoppingen der Inge-
wanden en Klieren van dienst bevonden.



Sonchus oleraceus (Lactuca). L.



