



Echium vulgare. L.

S L A N G E - E C H I U M

K R U I D.

V U L G A R E.

De *Vde* C L A S S E.C L A S S I S *Vta.*

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel VIIde St., bl. 463.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
Inæ pag. 323.

SLANGEKRUID met de Steng stekelig
geknobbeld, Lancetvormige ste-
kelige Bladen en zijdelings ge-
airde Bloemen.

- a. De Kelk in vijven gedeeld.
b. De Bloem eenbladig, Klokvor-
mig, vijfdeelig.
c. Dezelve geopend, met de vijf
Meeldraadjes.
d. Een derzelven afzonderlijk.
e. De vier Vruchtbeginzels, met
den Draadvormigen Stijl en ge-
spleeten Scempel.
f. Het Zaad naar een Slangekop
gelijkende.

BLOEITIJD. Het groeit in 't al-
gemeen, op drooge, dorre, Steen-
achtige plaatsen, zo in ons Land
als elders, ter hoogte van twee Voet-
ten, bloeiende in de Nazomer.

ECHTUM Caule tuberculato hispi-
do, Fol. Caulinis Lanceolaris
hispidis, Floribus spicatis late-
ralibus.

- a. Perianthium quinque-partitum.
b. Corolla monopetala campanula-
ta, quinquesida.
c. Eadem aperta cum quinque Sta-
minibus.
d. Stamen unum separatum.
e. Germina quatuor, cum Stijlo
Filiformi & Stigmate bifido.
f. Semen Viperini Capitis formâ.

TEMP. FLOR. Crescit valde
communiter, in locis aridis, de-
sertis, Ruderalibus, tam nostræ
Regionis quam alibi, altitudine duo-
rum Pedum, floridum in Augusto.

GEBRUIK. Wegens de gelijkenis der Zaaden naar een Slangen
of Ilever Adders Kop, waar dit Kruid den naam van heeft, hebben
sommigen hetzelfde, in Wijn afgetrokken, tegen Slangebeten aan-
gepreezen. Van de zonderlinge ruigte der Bladen, met Haartjes
die uit Bolletjes voortkomen, is een blijk in de onderste Afbeel-
ding. De Bloemen vallen blaauw, doch ook rood van kleur.

M

SAF.