



Sinapis nigra. L.

Z W A R T S I N A P I S
M O S T E R D - Z A A D . N I G R A .

De XVde C L A S S E .

C L A S S I S XIVta.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *Ilde*
Deel IXde St., bl. 730.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIIi Part.*
Imæ pag 989.

MOSTERD-ZAAD met gladde Haauwen, tegen elkander aangedrukt.

SINAPIS siliquis glabris Racemo appressis.

a. a. De afwijkende vierbladige Kelk.

a. a. Perianthium tetraphyllum patens.

b. De vierbladige Bloem.

b. Corolla tetrapetala.

c. Een Bloemblad afzonderd, met zijn Nagel.

c. Petalum separatum cum Ungue.

d. De zes Meeldraadjes, waar van twee korter.

d. Stamina sex, quorum duo breviora.

e. Een derzelven afzonderlijk.

e. Stamen unum separatum.

f. Het Vruchtbeginzel met den Stijl en geknoopten Stempel.

f. Germen cum Stijlo & Stigmatum capitato.

g. De vier Honigkliertjes onder aan den Stijl.

g. Glandulæ quatuor Nectariferæ, ad basin Stijli

h. Het Zaadpeultje overlans

h. Siliqua longitudinaliter

i. Hetzelve dwars doorgesneeden.

i. Eadem transversim dissecta.

k. Het Zaad.

k. Semen.

BLOEITIJD. Het Zwarte, zo wel als 't Witte Mosterd-Zaad, wild voorkomende in de Zuidelijke deelen van Europa, wordt alom, inzonderheid in onze Nederlanden, op Akkers gezaaid en uit gevallen Zaad ook wel in 't wilde gevonden. Het bloeit in Julij en blijft niet over.

TEMP. FLOR. Planta hæc, tam Semine nigro quam albo, sponte nascitur in Australioribus Europa plagis; hic in Belgio, & alibi, feritur in Arvis, ex Seminibus dispersis etiam in vago reperunda. Annuæ est, florens in Julio.

GEBRUIK. Van dit Zwarte Mosterd-Zaad is het Loof grover dan van het Witte, gelijk uit het om laag afgebeelde Blad blijkt. Het Zaad valt ook bruiner en scherper, als uit de gemalen Mosterd in de Huishouding bekend is. Daar dient het als een Kruidery bij het eeten van Vleesch, gezouten Visch en Spek; doch te rijkelyk gebruikt is het nadeelig. Met Azijn getemperd is het tegen 't Blaauwschuit dienstig; als ook tegen Zwakheden, die uit eene vergaaring van koude, slijmige Stoffen ontstaan. Uitwendig dient de Mosterd als een schroeiend, Blaartrekkend middel, en om de opgelegde Pappen (*Cataplamata*) tot Verzweering sterker te doen werken, enz.

M 2

GE-