



*Gentiana centaurium*. L.

KLEINE GENTIANA  
SANTORIE. CENTAURIUM.

De Vde CLASSE.

CLASSIS Vta. 36

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUIJN, IIde  
Deel VIIde St., bl. 824.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.  
GMELINI, Tom. IIde Part.  
Ima pag. 461.

GENTIAAN met vijfdeelige Trechterachtige Bloemen, gegaffelde Stengen en een enkelden Stamper.

GENTIANA Corollis quinquefidis infundibuliformibus, Caule dichotomo, Pistillo simplici.

- a. De vijfdeelige spitspuntige Kelk.
- b. De Trechteragtige Bloem aan den Mond in vijven gedeeld.
- c. Een der vijf Meeldraadjes daar in zittende.
- d. Het rolrond Vruchtbeginzel met de twee Stempels, bij
- e. Afzonderlijk vertoond.

- a. Perianthium quinque-partitum acutum.
- b. Corolla Infundibuliformis Ore quinquefido.
- c. Unum de quinque Staminibus in Corolla hospitantibus.
- d. Germen Cylindraceum cum binis Stigmatibus, apud
- e. Seorsim delineatis.

De BLOEITIJD valt in Julij en Augustus. Dit Kruid, naauwlijks twee derden van een Voet hoog, groeit hier en daar door geheel Europa, op opene Velden en Gebergten. Het is in onze Duinvalleijen zeer gemeen, als ook in de Weidlanden in sommige deelen van Gelderland, van het Sticht, van Friesland en elders; zeer overvloedig voorkomende op 't Eiland Schier-monnik Oog aan de Noord-zee.

TEMP. FLOR. in Julio & Augusto. Hæc Herba, vix altitudine octo pollicum, crescit in Pratis apricis & Montibus per totam Europam. Reperitur apud nos abunde inter Dunas, atque in Pascuis plurimis Gelriæ, Ultrajecti, Frisiæ & alibi; maximâ copiâ proveniens in Insulâ Schier-monnik-Oog ad Mare Boreale. Annua est.

GEBRUIK. Het Aftreksel der Bloemen van dit Kruid, onder den naam van *Centaureum minus* bekend, dat eene aanmerkelijke bitterheid heeft, is zeer Maagsterkende, dienstig tegen benaauwdheden in zwakke Gestellen, als ook, somtijds, tegen de Jicht en Afgaande Koortsen. Gemeenlijk wordt het, mischien uit dien hoofde, *Duizendgulden-Kruid* genoemd.

M 3

BIT.