

BITTER-  
KRUID.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN, *Ildde*  
*Deel VIIde St.*, bl. 828.GENTIAAN met vijfdeelige Trom-  
petachtige Bloemen, die den Keel  
gebaard hebben.a. De vijfdeelige Kelk of Bloem-  
dop.b. De eenbladige Bloem, egaal in  
vijven gedeeld, opengesneeden;  
waar in zig de ruigte van den  
Keel vertoont, met de vijf Meel-  
draadjes.c. Deeze het Vruchtbeginzel en den  
Stijl omringende, die een dub-  
belen Stempel heeft.De BLOERTIJD valt in September.  
Dit Kruid is op drooge Bergvelden,  
zo in Oostenrijk als in Switserland,  
gemeen. Het heeft de Steng naauw-  
lijks een Span hoog en de Bloemen  
zijn uit den blaauwen en paarschen  
veranderlijk van Kleur. De Blad-  
den zijn roodachtig.GENTIANA  
AMARELLA.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*  
GMELINI, *Tom. Ildi Part.*  
*Imæ pag. 462.*GENTIANA Corollis quinquefidis  
Hijpocrateriformibus, Fauce bar-  
batis.

a. Perianthium quinque-partitum.

b. Corolla monopetala, æqualiter  
quinquefida, secundo aperta, ut  
apparet Faux barbata, cum  
quinque Staminibus.c. Hæc Stamina, Germen & Stijl  
lun cingentia, qui duplici gau-  
det Stigmate.TEMP. FLOR. in Septembrim  
incidit. Hæc Herba abunde crescit  
in Pratis Montosis aridis, tam  
Austriæ quam Helvetiæ. Caulem  
habet vix Spithamæ altitudine,  
Floremque ex cæruleo & purpureo  
Colore variabilem. Folia rubescunt,GEBRUIK. Deeze Soort heeft van de uitsteekende Bitterheid,  
die der voorige, zo men wil, nog overtreffende, den naam, en  
wordt ook wel *Laatbloem* geheten. LINNÆUS heeft ze onder de  
Geneesmiddelen opgetekend.

BIT-



*Gentiana amarella*. L.



