



Gentiana pnermonanthe. L.

BLAAUWE GENTIAAN,
HERFST - KLOKJES.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel Vilde St., bl. 816.

GENTIAAN met Klokvormige ge-
paarde Bloemen, die gesteeeld zijn,
de Bladen Linaaal.

a. a. De Kelk in vijven gedeeld.

b. De Klokvormige Bloem, eenbla-
dig, aan den rand vijfdeelig.

c. De Bloem opengefneeden, waar
in de vijf Meeldraadjes met den
Stamper, die dik en gestippeld is,
zig vertoonen.

De BLOEITIJD is in September,
de Groeiplaats alom op vogtige Heij-
Velden, en in de Veenlanden onzer
Provinciën, met Stengetjes van
naauwlijks een half Voet of een
Span hoogte. Het blijft over.

GENTIANA
PNEUMONANTHE.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ pag. 460.

GENTIANA Corollis Campanulatis,
oppositis, pedunculatis, Foliis
linearibus.

a. a. Perianthium quinque - parti-
tum.

b. Corolla Campanulata, monope-
tala, limbo quinquefido.

c. Eadem secando aperta, unde
Stamina quinque apparent cum
Pistillo crasso, punctato.

TEMP. FLOR. in Septembris in-
cidit. Crescit ubique in Pratis
humidis Ericetorum etiamque in
Agris Cæspitosis nostrarum Pro-
vinciarum reperiunda, Cauliculis
vix Pedis dimidii vel Spithamæ
altitudine. Perennis est.

GEBRUIK. Dit Plantje strekt in de Parterres der Tuinen tot
sieraad, wegens zijne hoog blaauwe Bloemen, en de naam zou
Langebloem kunnen betekenen; doch, voor 't overige, vind ik 'er,
onder de Geneesmiddelen, geen gewag van gemaakt.

N

HEIL-