



*Prunella vulgaris* L.

BRUINELLE.

De XIVde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN, *IIde*  
*Deel IXde St., bl. 438.*

BRUINELLE met alle de Bladen  
langwerpig Eijrond en gestield,  
de Kelken met de Bovenlip ge-  
knot drietandig.

- a. De eenbladige tweelippige Kelk.
- b. De Gaaperachtige eenbladige  
Bloem geopend, met twee langere  
twee kortere Meeldraadjes.
- c. Een Meeldraadje afzonderlijk.
- d. Het vierdeelig Vruchtbeginzel,  
met den Draadachtigen Stijl en  
gespleeten Stempel.

BLOEITIJD. Dit Kruid groeit  
alom in de Velden, komende in vette  
Weiden en Boschagten somtijds een  
Voet hoog, niet alleen met blaauwe,  
maar somtijds ook met paarsche of  
witte Bloemen voor. In de Nazomer  
bloeit het en blijft 's Winters over.  
In 't Bentveld, bij Haarlem, vindt  
men eene Verscheidenheid met groote  
Bloemen en gesnipperde of getande  
Bladen var boven.

PRUNELLA VULGARIS.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*  
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*  
*IIde. p. 920.*

PRUNELLA Foliis omnibus ovato-  
oblongis petiolatis, Callicibus  
Labio superiore truncato tri-  
dentato.

- a. Perianthium monophyllum bila-  
biatum.
- b. Corolla monopetala ringens  
aperta, cum duobus Stamini-  
bus longioribus.
- c. Stamen unum separatum.
- d. Germen quadripartitum, cum  
Stijlo Filiformi & Stigmate  
bifido.

TEMP. FLOR. Crescit hæc Herba  
in Pratis ubique, altitudinem ha-  
bens in Pascuis udis nonnunquam  
unius Pedis. Flores sæpius cærulei  
sunt, aliquando tamen purpurei  
vel albi. In serâ Æstate reperit-  
ur florida & perennis est. In  
Campo dicto Bentveld prope Har-  
lemum Varietas occurrit Floribus  
magnis & Foliis superioribus den-  
tatis.

GEBRUIK. Volgens de naams aanduiding is dit Kruid in Gorge-  
dranken, tegen eene Keelziekte, de Bruine genaamd, van nuttig-  
heid. Het is, inderdaad, verkoelende en zagtelijk samentrekkende.  
Het wordt van BOERHAAVE geteld onder de zuiverende Kruiden in  
een opene Borstzweering dienstig. In Mondzweeren wordt het ook  
geroemd.