



Lycium agrum. L.

AFRIKAANSCH
BOKSDOORN.

L I J C I U M

A F R U M.

De Vde C L A S S E.

C L A S S I S Vta

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIdē*
Deel IVde St., bl. 258.Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ pag. 389.BOKSDOORN met getopte Bladen
van egale breedte en gespitsē
Takken.LIJCIUM Foliis fasciculatis lineari-
bus, Ramis strictis.a. De eenbladige Trompetachtige
Bloem geopend, met de vijf
Meeldraadjes daar in.a. Corolla monopetala hiypocrate-
riformis aperta, cum quinque
Staminibus in illa contentis.

b. Een Meeldraadje afzonderlijk.

b. Unum Stamen separatum.

c. Het Vrugtbeginzel met den Stijl
en Stempel.

c. Germen cum Stijlo & Stigmate.

d. De Vrugt of Besie.

d. Fructus sive Bacca.

e. Dezelve doorgesneeden.

e. Eadem dissecta.

f. Een gedroogde Besie.

f. Bacca siccata.

g. Derzelver middelschot, waar aan
de Zaaies hangen.g. Ejusdem dissepimentum cui ad-
hærent femina.

h. Het Zaad in de natuurlijke grootte.

h. Semen magnitudine naturali.

i. Hetzelve vergroot.

i. Idem auctâ magnitudine.

BLOEITIJD. In Afrika en de Zui-
delijke deelen van Spanje komt dit
Gewas wild groeiende voor, en
wordt bij ons in Winterhuizen na-
gehouden. Het is een overblijvende
Heester, die in Augustus bloeit.TEMP. FLOR. Sponte crescit in
Africa & Australibus Hispaniæ hic
Frutex, apud nos in Caldariis
Hijeme asfervandus, perennans
& florens Mense Augusto.GEBRUIK. Het Sap der Bladen, die een Zoutigen Smaak heb-
ben, daar uit geperst, is in de Apotheeken, van sommige deelen van
Duitschland, als een Geneesmiddel bekend.

O

KRUIS-